



OP 10-75 2- a sus.

2447. Imacus Companies N697.





Содержащій вы себь по Алфавиту описаніе большой части по сіе время извыстныхы, какы иностранныхы, такы и здытнихы деревь, кустовь, травь, цвытовь, корней, мховь, грибовы и сымянь, и ихы на Россійскомы, Латинскомы, Францускомы, Италіянскомы, Аглинскомы и Греческомы языкахы названія, сы показаніемы на какихы мыстахы растуть, вы какое время цвытуть, какы, и вы какихы бользняхы употребляются, что изы нихы вы Аптекахы дылается, вы какой классы Господами Линнеемы и Турнефортомы полагаются, сы приложеніемы Россійскаго перевода сы Латинскаго изы системы Господина Линнея, всыхы родовыхы Латинскихы и до Ботаники касающихся учебныхы названій,

СЛБДУЯ ЛУЧШИМЪ АВТОРАМЬ, СОЧИНЕННЫЙ

Артиллерін Офицеромь и Вольнаго Россійскаго Собранія при Императорскомь Москопскомь Униперситеть Членомь Андреемь Мейеромь.


Часть І.



въ москвъ

きょくじゅうしょうじゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅうしゅ

Въ Университетской Типографіи у Н. Новикова, 1781 года.



всепресвътлъйшей,

державнъйшей,

великой государынъ,

ЕКАТЕРИНЪ АЛЕКСЪЕВНЪ,

императрицъ

И

САМОДЕРЖИЦЬ

всероссійской, и проч. и проч. и проч.

всемилостивый шей государыны!

Всенижайше посвящает Б

Всеподданнъйшій рабъ

Андрей Мейеръ

BOTHPECESTATAMEN.

AEPMABHAIMEN

великой государына,

EKATEPINHE AJEKCEEBHE.

MMHEPATPHILE

11

CAMONEPMEN

BOEFOCCINGRON,

n drog, w nrow a nroc.

SCRMILLOSTER EMER POCYARDINE

durant so bis each a must be

page

Mandall Transact

предисловіє.

Trailing of goods, the Kursus purious Themen during the trailing out of the

Познаніе растъній есть столь превосходно и полезно, что и въ отдаленнъйшей древности возбуждало многихъ любопытство, и составляло наипріятнъйшее упражненіе великихъ мужей. Многіе высокаго рода, какъ то Князи Мезур, Митридать и другіе упражнялись ві ономъ съ великимъ удовольствіемъ и успъхами.

И по справедливости преимущества сего знанія всякому весьма ощупительны: ибо вопервых в довольно всвив изв встно, что помощію единаго испытанія произрасшЪній бытіе и безконечная премудрость Творда всъхъ ясно открывается: что сверьхъ сего отъ любопытнаго изслъдованія оныхъ безнисленныя пользы и выгоды, служащія къ сохраненію, спокойствію и удовольствію челов вческой жизни проистекли и происшекають непресшанно: что на конець кь оному единственно должно относить первыя начала и основание врачебной науки. По чему неоспоримая истинна есть, что оное необходимо нужно для всъхъ желающихъ какъ сохранить свое здравіе, такъ и вспомоществовать другимъ во время бользненных в случаевь; желашельно бы для сего, чиобъ молодые люди обращающіеся въ разныхъ наукахъ, а особливо упражняющіеся въ ученіи Священнаго Писанія и пріугошовляющіе себя къ духовному званію, по примъру другихъ Государствъ, старались пріобръщать хотя одной шолько сей части Исторіи Нашуральной, то есть, врачебной Ботаники познаніе, до кошораго удобно помощію сего Словаря прилъжаніемъ своимъ досшигнушь могушъ; дабы чрезъ сіе всеобщая польза, или по крайней мъръ въ сельскихъ общежищельствахъ, къ вспомоществованію неимущихъ другихъ средствъ могла удобнъе распространиться: чего безъ сомнЪ-

сомнънія ожидать должно, особливо въ нынъшнія времена, въ которыя какъ вообще всякаго рода благодъянія роду человъческому, подъ покровительствомъ Безпримърной нашей МОНАРХИНИ, непрестанно умножаются, такъ науки и художества восходять до высочайшей степени своего совершенства.

Я предпріяль сей трудь, и всь средства употребиль ласкаясь, тто всякаго званія людямъ можеть оной принесть нъкоторую пользу. Я въ немъ во первыхъ описываю всякаго произрасшънія наружной видъ Ботаническимъ порядкомъ, послъдуя славнъйшимъ Ботаникамъ Г. Линнею, Турнефоршу, Бургаву, Плюмірру, Вальяншу, Палласу и другимЪ ученым в людим в Для означенія, сколько находится всякаго раствніх родовь, поставиль я передъ Россійскимь названіемь число оных Римскими числами. Для удовольствія же любопытных в непреминул в сообщить и названія ихъ на разныхъ употребительнъйшихъ языкахъ: гдъ на Греческомъ и на прочихъ, кромъ Лашинскаго, не могъ найши подлиннаго имени, то положиль въ переводъ. Предлагаю при семъ всъ растънія не шолько зд'єсь находящіяся, но и въ других в частях в свъта, и не только употребляемыя въ врачебной наукъ, но и служащія особливо къ домостроительству: для того непреминулъ присовокупинь и примъчанія достойнъйшія о способахъ полезныхъ для разведенія ихъ и умно. женія въ садахъ изъ иностранныхъ деревъ состоящихъ. Главное же мое намъреніе было описать дъйствіе и силу всъхъ растъній, какую въ тълъ человъческомъ оныя для сохраненія жизни и здоровья производяшь. Не малую между тъмъ прудность имълъ я въ сыскани подлинныхъ Россійских в наименованій, кои по разным в м встам в разныя им вютв, но оную, сколько можно было, преодол валь чшеніемь всьхь на семь языкъ о произрастъніяхъ выданныхъ сочиненій; освъдомлялся при семъ у всъхъ почти здъшнихъ ученыхъ и знающихъ людей, особливо у извъстинаго Господина Профессора Палласа, поспъществовавшаго мнъ доставленіем в нъскольких в названій и книгъ. Не меньше обязанным в себя признаю и Господину Коллежскому Ассессору, Императорскаго Московскаго Университета Профессору и Медицины Доктору Зыбелину, который для облегченія разных в запірудненій, пересмапіривал в піруды мои, умножаль ихь, сколько ему время дозволяло, своими примъчаніями, и снабдъвалъ меня къ тому нужными книгами. demonso desirges, deservansio



Хотя я столь щастливь, что и разумью находящіяся вы семь Травникь языки, сколько для переводу и уразумьнія нужныхь кы сочиненію онаго книгы потребно: однакожь вы разсужденіи мосго недостатка не могы бы Обществу вы томы услужить, естьлибы Типографія Московскаго Императорскаго Университета не приняла на себя оный напечатать. Впрочемы совершеннымы признавать сей труды мой я никакы не осмышаюсь, но довольно, что болье знающимы впредь опкрылы путь кы доставленію и собранію совышенный принять будеть благосклонно, что за понесенные вы сочиненій онаго по мыры силь во младости моей труды, единымы и лучшимы почту для себя магражденіемы и воздаяніемы

АНДРЕЙ МЕЙЕРЪ.




Осовы подписапшіеся на сіе Сочиненіе.

Его Преосвященство, Сильвестр В Епископ в, управляющий Воскресенским в, Новый Ге	apw.
салимъ, именуемымъ монасшы емъ 1 екз.	Tw
Высокоблагородіе Николай Николаевичь Баншышь-Каменской 2 екз.	
Сіятельство, Князь Николай Михайловичь Голицын 1 екз.	
Высокопревосходишельство Александръ Ивановичь Глёбовъ г екз.	
Сіяшельство, Князь Павель Федоровичь Голипынь і екз.	100
- Князь Александръ Александровичь Урусовъ г екз.	
Превосходишельство Данило Афанасьевичь МерлинЪ 1 екз.	
Сіящельство, Князь Петръ Сергъевичь Вадбальской і екз.	
Благородіе Сергей Петровичь СоковнинЪ і екз.	
Высокоблагородіе Борись Алексвевичь Владыкинь і екз.	
Высокородіе Евграфъ Васильевичь Ташищевъ і екз.	
Благородіе Максимъ Михайловичь Борисяковъ 1 екз.	
Высокоблагородіе Алексей Захарьевичь Опухшин в 1 екз.	
Сіятельство, Князь Петръ Никитичь Трубецкой і екз.	
Г. Апшекарь Любим В Кресшьяновичь Гильдебранть 2 екз.	
Его Высокопреподобіе Өеофилакть Архимандрить Славенскій і екз.	
Высокопреосвященство Веніаминъ Митрополить Казанскій и Свіяжскій і екз.	
Высокоблагородіе Машвей Дмишріевичь Булдаковь і екз.	
Степанъ Ивановичь Посниковъ 1 екз.	
Благородіе Василій Афанасьевичь СтупишинЪ г екз.	
Высокоблагородіе Василій Ивановичь Баженовъ г екз.	
Превосходительство Алексви Андреевичь Ржевской 1 екз.	
Высокоблагородіе Петръ Якоглевичь Плюсковъ і екз.	
Николай Ивановичь Бахметевь г екз.	
Михайло Васильевичь Волынской г екз.	
Сергей Ивановичь ВласьевЪ г екз.	
Благородіе Андрей Сергвевичь Рагозин в 1 екз.	
Сіятельство Графь Владимиръ Григорьевичь Орлсвъ і екз.	
Высокоблагородіе БорисЪ Михайловичь СалшыковЪ 3 екз.	
Превосходишельство Петрь Ивановичь Вырубовь 1 екз.	
Высокоблагородіе Родіонь Родіоновичь Кошелевь і екз.	
Студенть Г. Браунтвейть г. екз.	
Высокоблагородіе Василій Ильичь Мещериновъ 1. екг.	
Высокородіе Николай Андреевичь Ахлібинин і екз.	
Преосвященство Антоній Епископъ Нижегородскій и Алаторскій і екз.	
— Высокородіе Андрей Михайловичь Ниловъ і екз.	
Сіящельство, Князь Иванъ Петровичь Щербатовъ 1 екз.	
Превосходишельство Всеволодъ Алексвевичь Всеволожскій і екл.	
Благородіе Иван В Баснлыевичь Апехшин В 1 екз.	
варгородта иван в васнавскичь ганскийн в 1 скг.	



ΣΥΝ ΤΩ ΘΕΩ БОТАНИЧЕСКОЙ СЛОВАРЬ, ИЛИ ТРАВНИКЪ.



AA AB

AAMKOROCK, Аамкорокь. Смотри Cinnamomum, Циннамомумъ.

AAMSANGILEM, Aamcahrunemb. Cmo-

три Sarcocolla, Саркоколла.

AARON, Aaponb. Смотри Arum, АрумЪ AASSACH, Aaccaxb. Смотри Ammoniacum, АммоніакумЪ.

AATIM, Aamumb. Смотри Nux

Moschata, НуксЪ Мошата.

ABAFINA, Авафина. Смотри Folia Sennae, Фоліа Сенне.

ABALZEMER, Авалземерь. Смотри Senna, Сенна.

ABANI, Asanu. Смотри Marrubium,

МаррубіумЪ.

ABALAROSA, Авалароза. Смотри Semen Mandragorae, Семень - Мандрагоре.

ABBAS, Авбась. Смощри Асасіа Germanica, Акація Германика.

ABCAVFE, Авкауфе. Смотри Sebesten, Себестень.

ABCELLA, Абщеппа. Смотри Agri-

Часть І.

ABD ABE

ABDAMISSEMEN, Авдамиссемень. Смощри Carpobalfamum, Карпобальзамумъ.

ABDIOS, Argioch. Смотри Sempervivum majus, Семпервивумъ маюсъ.

ABEBEORÉ, Абебеоре. Смощри Nux Moschata, Нуксъ Мошаша.

ABEL, Абель. Смотри Sabina, Сабина. ABELADHOR, Абеладгорь. Смо-

три Anacardium, АнакардіумЪ.

ABELASIS, Ασεπαсись, есть Египетская, каштанной вкусь им вющая, трава.
По Гречески, Α΄ βελάσης χόρτος της Αεγύωτος;
по Нъмецки Abelasis, eine Planke in Egypten;
по Французски, Abelasis, plante d' Egypte; по
Италіански, Abelasis, pianta d' Egypto; по
Аглински, Abelasis, an Egyptian Plant.

ABELATRONE, АБЕЛатроне. Смотри

Semen Citri, Семенъ Цитри.

ABELCHADEACHOR, Asenxageaxopb.

Смотри Васса Lauri, Бакка Лаври.

ABELCORA, Абелькора. Смотри Сисигвіта, Кукурбита.

ABEL-

ABELCORASIS, Авелькоразись. Смотри Semen Apii, Семенъ Апіи.

AEELDRAS, Абельдрась. Смотри Semen Staphylagriae, Семенъ Стафисагріе.

AEELGAGAR, Arentraraph. Смощри Semen Apii, Семенъ Апіи.

ABELHADOR, Asenragoph. Смотри

Anacardium, АнакардіумЪ.

ABELICEA, AGERNIJEA, Honor Belli, Pseudosantalum Creticum. Casp. Bauhinii, АБЕЛИЦЕА, ИЛИ МНИМЫЙ Кандійскій Сандаль, есть прямое, высоко расшущее и суковатое дерево, прекраснаго вида, котораго лиспівя подобны оливковымЪ, кромъ того только, что кругловатье и высъчка на нихъ глубже. Плодъ его величиною и видомъ перцу подобная ягода, темнозеленаго цввта: дерево, по внутренному своему качеству сходствуеть съ красным в Сандалом в, кръпко и нѣсколько пахучо. Оно расшеть въ Кандіи островь, лежащемь вь средиземномь моръ, навершинахъ высокихъ горъ, и употре бляется тамъ на строение домовъ: впрочемъ оно содержишь вь себъ много масленых и соляных в частей, вяжеть и укрвпляеть. По Гречески аВеліне́а; по НЕмецки Ubelicea man falsch Candel Solk aus Candia; no Француски, faux Santal de Candie; по Италіански Sandalo falso di Candia; По Аглински fals Sandel of Candea.

ABFLIVS, Абеліусь. смотри Semen Staphylagriæ семенъ стафисагріе.

ABELLADAR, AGERRAQupb. CMOMPH

Anacardium, АнакардіумЪ.

ABELLASAFOGET, Авелласафотеть, Смотри Cydonia, Цидоніа.

ABFILLESON, Авеплесонь. Смотри Carpobalfamum, Карпобальсамумъ.

ABELLI, AGENAU. CMOMPU Sabina, Ca-

бина.
ABELLINA, Абеллина. Смотри Avel-

Iana, Авеллана.

ABELMOSCH, Абельмощь. Смотри
Ватіа Molchata, Баміа Мошапа.

ABER, Asepb. Cmompu Rolmarinus, Pocmapunycb.

АВНАКНАК, *Авгаргаръ*. смотри Вассае Juniperi, Бакце Юнипери.

ABHAVSOL, Asray301b. Смотри

Scilla, Сцилла.

ABHEID, Asrengb & смотри Sabina,

ABHEL, Asrena & Смотри Сабина.

ABHVL, Asryan. Смотри Juniperus,

Юниперусъ.

ABIENALIVM, Asienaniymb. Cmompu. Absinthium, Ascummiymb.

ABIES, Asiech Clus. Hift. Pinus Abies, Linn. Abies conis furfum spectantibus, siue mas-C. B. Abies foemina, I. B. Abies taxi folio fructu fursum spectante. Pit. Tournesort. XII. EAB a съ Нъмецкаго бълая Ель, есть высокое, пирамидою растущее, и всегда зелен вощее дерево, которое ростеть во встхв Стверныхъ странахъ Россіи, на гористыхъ, сужих в и каменистых в м встах в. Она им ветв бълое, мяхкое и легкое, но шяжелъе Пихшы дерево, покрышое гладкою, смолистою, вЪ холодных в странах в обыкновенно б вловатою, а когда еще молода, блёдножелтою корою, которая на старомъ деревъ сърветь, становишся шерохованою, и снизу вдоль разщеляется. Сучья ея расположены крестообразно, растуть около дерева и окружающся авшомЪ и зимою зелеными. узкими, жесткими, не много къ концу завостренными, и къ двумъ сторонамъ въшви обращенными иглами, (Distichi) бывающими на молодыхъ деревьяхъ длиннъе, нежели на старыхв, на коихв весною оказывающся по концамЪ сучьевЪ желшыя и красныя кисточки, разтворяющіяся вскоръ потомь, издавающія изь двухь гивздь своих в множество желтой пыли, и оставляющія послів опаденія краснованный, прямый и изъ многихъ вмѣстѣ соединенныхъ цвѣточковъ составленный цвьть (Flos Aggregatus) изЪ которато раждаются съмянныя шишки пурпуроваго цввта св зеленою смъсью,

см всью, кои чрезв всю зиму остаются на деревв, и поспввають въ началь Октября мвсяца. Онв имвюшь фигуру конуса, и состоять изв многихв кв верьху обращенных в чешуекв, подв каждою копорых в находишся обыкновенно по два съмячка съ крылошками, которыя по растворенію шишекъ слепають въ срединъ Февраля мъсяца съ дерева. Коренья ея распроспраняющся по поверхносии земли подъ правою. Дъйсшейемь и свойсшвомь своимь въ Медицинъ сходствуеть она съ Пихнюю. Изъ еловаго авсу пилянъ доски и двлають бочки и всякую мълкую хотя не прочную посуду; а кривый авсь употребляения на книсы и другія кривыя члены при сшроеніи мореходных Б Кресшьяне корою часто кроють свои крышки и развозять ее на кожевныя заводы. Абіесь есшь Лашинское оть Римлянъ принятое имя, котораго начало и смыслъ не извъсшны. Госполинъ Линней полагаеть Ель въ XXI классь деревь им вющихъ на одномъ и пюмъ же корнъ цвъпы и мужескіе и женскіе, а Господинъ Турнефорть въ XIX классь въ I родъ деревъ и кустарниковъ имъющихъ изъ многихъ вмЪстъ соединенныхъ цвъточковъ сосиавленный цв втв, у коего гуменцо (Receptatulum) тонкое и чешуйчатое. По Гречески έλατή τηλεία; πο Ητωεικи Tannen = Baum; Eannen; по Француски Sapin vrai; по Ишаліански Abete; или Abeto; по Аглински Fir-tree.

ABIES ALBA, Asiech Ansa. Смошри Abies Абіесь.

АВІЕЅ DOD. Авіесь Додонен, Pinus Picea Linn. Abies tenuiore folio, fructu deoríum inflexo. Pit. Tournef. Abies rubra, С. В. Рісеа Latinorum, Т. В. ХІХ Пихта дерево растеть въ Сибири при Уральскихъ, а особливо при Алтайскихъ горахъ, такожъ къ Югу до ръки Волги, и въ Камчаткъ около ръчки Березовой и различествуетъ отъ Ели корою, которая гладка, въ рукъ мяхка, темнооливковаго цвъта и отъ спу-

жи бълбеть; наклоненными къ землъ сучьями, выходящими обыкно енно по пяши вдругь, снизу длиннве, а въ вершинв короче, от чего кажутся подобны пирамидамЪ; иглами, конорыя меньше, кЪ верьху зеленъе, а къ низу блъднъе, шерохованы, концом в тупы, сверьху вдоль посредин в выдались ложбиною, остающия на дерев в зимою и лътомъ зелены и не столь колючи; и обращенными своими шишками съ широкою шелухою и шемно - коришневаго цвъща. Осенью съ шишекъ шелука вкругъ опадаетъ, съмя слетаеть и шолько остается въ шишкъ голый сшебель: съмя крупнъе и длиниве еловаго и одъщо разными кожинами, между коими находишся много масла или смолы. Ель и Пихта содержать въ себъ много масла и соли : вареный из в молоденьких в их в листов и почек декокшЪ, полезенЪ ошЪ цынги и лому вЪ костяхь, и гонить мочу. Кора сущить. вяжешь и употребляется наружно оть обжоги и опухолей: почки унимають зубную боль; шишки вяжунь. Изь молоденькихь еловых в шишечек в, собираемых в в Маршв мвсяцв, пригоповляють следующимь образомЪ кровочиспишельный декокшЪ. Дол--эшиш бхимунумых в при горсти упомянумых в шишечекЪ, налишь на нихЪ большую бушылку чистой колодезной воды и столькоже былаго винограднаго вина, и замазавъ писстомъ варишь вЪ муравленомЪ горшкъ около чешшверши часа, а потомъ процъдишь. Сей деконть должно употреблять ежедневно по двъ рюмки чрезъ цълый мъсяцъ. Я знаю что простое сіе питіе помогло многимЪ какЪ отъ цынги, такъ и происходящаго от нее лому въ костяхъ. Текущая изъ дерева, чрезъ здъланныя насъчки смола, продается иногда въ Аптекахъ вмъсто терпентина, ибо дъйствіем в и цвътом в сь онымь сходствуеть. Оная смола, горька, умягчаеть, разбиваеть, унимаеть боли, выгоняеть мъсто и прошивится, по

A 2

причинъ балсамического своего свойства, цынтв. Для наружнаго употребленія двлають изъ неемазь и мъщающь въ составы раздъляющихъ пластырей. Обитающие по ръкъ Камъ крещеные Таппары употребляють Пихнювую кору вмёсню хаёба. Нёконюрые изънихъмъщають ее съ малымъ числомъ ржаной муки, а другіе пишаются мягкою корою. ГосподинЪ КапишанЪ РычковЪ, вЪ журнал'в своего пущеществія по разнымЪ провинціямь Россіи, упоминаеть, что въ возрасшных в людях в примъчается то, что когда они послъ пихтовой пищи, допущены бывають къ всивь настоящаго хлвба, то оказывается шакая сильная опухоль на ихъ ногахъ, что они нъсколько дней принуждены бывають лежать неподвижно. У Камчадаловь, Пихша хранишся какъ заповъдной аъсъ, такъ, что никто изъ нихъ нетокмо рубить его, но и прикоснуться не смветь; ибо увврены они преданіемь стариковъ своихъ, что всякъ, ктобъ ни дерзнуль имъ прикоснупься, бъдственною смершью оной скончается. (Смотри описаніе Камчашки Господина Крашенинникова.) Сказывають, что дымь оть зажженаго Пихшоваго дерева прогоняеть мухь и комаровь изЪ комнатъ. Едь и Пихту сажаютъ вЪ садахь для алей и обръзывають у сучьевь концы, для пигамидъ и другихъ фигуръ. Пихтевый льсь потребень вы строеніяхы на стропины, брусья и тому подобное, а въ Нъмецкой земав употребляють молодыя его бревна на переводы. Также годенъ онъ на дъло гонша, на разныя домашнія сосуды и въ столятной, бочарной и прочимъ рабощамъ, шолько пишья въ новыхъ пихтовых в сосудах в горькнутв и желтвють. Счищающь его способнымь и на дъланіе музыкальных в инсперуменновв. Вв Англію и другія приморскія Государства привозять пих шогый хъсъ изъ Америки и съ Пиринейских в горь для мачшь. Вы Апшекахы имъешся еловая смола, и из в оной перегна-

ABI

тое масло (Oleum Pini.) Господинъ Линней и Турнефортъ полагають ее съ елью въ одинъ классъ; по Гречески тіль; по Нъмецки Fichte, rothe Zanne или красная Ель; по Француски Peffe; по Италіански Рісео, или какъ ла Круска называеть Рісеа; по Аглински Ріссь - tree; по Татарски Нарекъ; по Башкирски Карагаи.

ABIES Cadanensis, fructu breui, Asiech Каданенсись, фрукту вреши, Abies minor, pectinatis foliis, Virginiana, conis paruis subrotundis Pluk. Phytogr. Виргинская Ель, есть по наружности своей сЪ нашею Пихтою сходсшеующее дерево, котораго иглы однакожь еще мъльче, короче, и расположены на подобіе зубцовь у гребня, а съмянныя шишки около двухъ претей меньше и круглованыя. Сіе дерево растеть въ Америкъ, въ Канадъ и Виргиніи, гдъ изъ него достають густую смолу или скипидарЪ, превышающій проспый терпентинъ запахомъ и пріятствомъ вкуса. Оная употребляется внутренно въ бульйонъ, въ сладкомъ миндальномъ маслъ, или въ яичномъ желпкъ въ количествь двухь или трехь зернышекь для очищенія внутренняго от нарывовь; по Нъмецки. Canadifter Zannenbaum; по Франпуски, Epinette ou sapinette de Canada; по Италіански, Abeto di Canada; по Аглински. Fir - tree of canada, πο Γρεчески έλλατος της Bupyivias.

ABIES FOEMINA, Africo D Muha, CMO-

mpu Abies alba, Afiech anfa.

ABIES MAS, Asiech Mach. Смотри Abies Dod. Asiech Дод.

ABIES NIGRA Affect Hurpa. Cmompu Abies Dod. Affect Aog.

ABIES PLINII, Aciech Плиніи. Смотри Abies alba, Aciech anca.

ABIES PRIMA, Asiech прима.

ABIES RVBRA, Asiech pyspa. CMompu Abies Dod. Asiech Aog.

ABIES TAXI FOLIO, Asiech Taxen Conio. Cmompu Abies Clus. Asiech Kays.

ABI-

ABIES TENVIORE FOLIO, Asiech meнуторе фолю. Смощри Abies Dod. Абіесь Дод. ABIEZATVM, Авіезатумь. Смощри Anilum, Анисумь.

ABIGA, Asura. Chompu Chamaepitys.

Хамепитись.
ABION, Авіонь. Смотри Afphodelus,

Асфоделусь.

ABIOTOS, Авіотось. Смощри Сісита,
Цикуща.

ABISBESACH, Abusbesaxb. Cmompu. Macis, Manucb.

ABISCVS, Asuckych. CMompu Althaea, Anmea.

ABLIBABLON, Аблибаблонь Смотри ABLIBLABLON, Аблибаблонь Lilium album, Лиліумъ албумъ.

ABNANI, Abnahu Cmompu Marrubium, album, Mappy 6iymb ax 6ymb.

ABNECHEL, Абнехель. Смотри Juniperus, Юниперусъ.

ABOANIFE, Авоанифе. Смотри Soldanella, Солданелла.

ABORACH, Аворахв. Смотри Plantago,

ABOZOBIA, Авозовія Смотри Sclarea, Склареа.

ABRENGING, Авренгингь. Смотри Lignum Aloes, Лигнумь Алоесь.

ABRENISA, Аврениза. Смотри Dacty-lus, Дактилусь.

АВКОТАNOIDES, Авротанопдесь, planta faxea. Cluf. или Abrotano fimilis faxea. C. В. Маdrepora Abrotanoides Pit. Тоивпеботь. Авротанопдесь, если морское, каменистое, вълвистое на полевое Божіе дерево похожее и вы седьмы вершковы вышиною вырастающее растыніе. Вы Медициньоное не употребляется, но вы Индіи, понеже оно выпамощимы моряхы на дикихы каменьяхы растеть вы великомы изобиліи, приготовляють изы негочрезь сожженіе (calcinatio, годную кы строенію известь. Господины Турнефорты полагаеть сіе растыніе вы ХVІІ. классь, вы

VI. po β b морских b и рвчных b раствній, имвющих b обыкновенно неизвістный цввть и пло β b. по Гречески Αβροτανοίδες, φυτον πετροδοής της βαλασσης; Πο Η β menku Abrotanoides, eine Art von Madrepurn, oder versteinerten Gers Pflanke; по Француски Abrotanoides, plante pierreuse maritime; по Италіански Abrotanoides, pianta marina pietrosa; по Аглински Abrotanoides a sex stony Plant.

ABROTANVM Авротанумь, Божіе дерево.

ABROTANVM ALBVM, Авротанумь альумь. Смотри Absinthium Ponticum, Абсинтіумь Понтикумь.

ABROTANVM ANGVSTIFOLIVM, Авротанум Бангустифоліумь. Смотри Авготанит тав, Абротанум Бмась.

ABROTANVM ARBORESCENS, Абротанумь арборесценсь. Смотри Abrotanum Mas, Абротанумъ Масъ.

ABROTANVM CAMPESTRE, C. B. Pin. Авротанумь кампестре, Божіе дерепо поленое; около Яика называется степная Чилига; а около Камы, Змъевникъ, права растепъ въ южныхъ странахъ Россіи, около Воронежа, между ръками Самарою и Яикомъ и въ великомъ множествъ на луговой сторонъ рѣки Камы, а обыкновенно между кусшами на песчаных в мъстах в и близь береговъ. Полевое Божіе дерево бълве садоваго, и им веть часто вкусь и запахь Пуховника (Carlina). Оно отворяеть, разбиваеть, прогоняеть вътры, полезно отв желчи и одышки и вареное исцаляеть Ногтовду. Обипіающіе около Камы жишели распариваюшь листья его, и обкладывають сь пользою случающіяся на тьль раны. По Гречески Авротаном йуриом; по Нъмецки Генд Ставwurf; по Француски Auronne des champs; по Италіански Abbruotano campestre; по AFAUHCKU Small (weet Southernwood).

ABROTANVM CAPPADOCIVM, Aspomanymb Kannagoniymb w ABRO-

ABROTANVM DENSE FRVTICOSVM Авротанумь денсе фрутикозумь. См. Abrotanum Campestre, Абротанумъ Кампестре.

ABROTANVM FLORE MAIORE, As-

ротанумь флоре магоре и

ABROTANVM FOEMINA, Аврота. нумь фемина. Смотри Santolina, Сантолина.

ABROTANVM CALATICVM, Авротанумь Галатикумь. Смотри Abrotanum, Абротанумъ.

ABROTANVM HVMILE, Aspoma-

нумь тумиле и

ABROTANVM INODORVM, Авротанумь Инодорумь. Смотри Abrotanum Абротанумъ.

ABROTANVM INSIPIDVM, Авротанумь Инсипидумь. Смотри Abrotanum, Абротанумъ.

ABROTANVM LATIFOLIVM, Appo-

танумь Латифоліумь и

ABROTANVM MAIVS, Авротанумь маюсь. Смотри Abrotanum mas, Абротанумь мась.

ABROTANVM MAS Appomanymb mach, Brunf. Artemisia Abrotanum Linn. Abrotanum vulgare Dod. I. B. Abrotanum mas angusti folium maius C. B. Pit. Tournesort. Abrotanum primum et minus, Frag. Abrotanum nigrum seu mas. Cord. in Diosc. Hist. Божіе дерепо садовое, еснь прозимующее, от в полутора до двухъ аршинъ вышиною бывающее раствніе, которое цввтеть вы Іюль и Августв мъсяцахъ и имъешъ множесшво длинныхъ, ломкихЪ, вётвистыхЪ, бёловатыхЪ и густымъ бълымъ сокомъ наполненныхъ стеблей, или прутьевь, кои покрываются зелеными узкими на феникольные похожими и мыжо разръзанными листыями съ глубокою выстукою пріятнаго запаха и горьковатоостраго вкуса: цвёты и сёмена походять на полынные, только что, желтве и мяхче: корень ея древенветь. (lignosus): Она водишся въ садахъ и содержишь въ себъ много масла и соли, разжижаеть, чистить были,

разбиваеть, тонить мъсячную кровь, глисты, камень и мочу, прошивуд виствуеть яду, и заразишельному воздуху, разгоняень в вторы, двлаеть кожу чистою, производить легкую испарину, укръпляеть на головъ волосы, упопребляется от боли въ почкахъ и маткъ и полезною починается от убоевь и рань. Листья собираются абтомь. Оть матошных в припадковь, о особливо отв язвы пьющь оные съ цвъщомь на подобіе шравнато чая. Приложенные исцъляють они уязвленныя ядовипыми гадами части на твль: многіе запекають ихь сь малымь количествомъ можжевеловыхъ ягодъ въ хлъбы, и прикладывають горячіе къ вискамъ оть стральбы вы оныхы и оть жестокой головной боли, въ Апшекахъ имъешся сушеная права, перегонная из в оной вода (destillata) и настоянное деревянное масло сЪ листьями (Oleum infusum.) АбротанумЪ происходить от Греческаго слова авратов, значущаго шраву, которую для горести всть нельзя. ГосподинЪ Линней полагаетъ Божіе дерево въ XIX классъ многобрачных в растъній, у коихЪ гвоздки цвѣшные или мужчинки (flamina) срослись съ нижнею частію тычковой головки (Anthera). Syngenefia Polyga. тіа; а господинъ Турнефорть считаеть его въ XII. классъ въ III. родъ правъ имъберонрошений фхинкем бхинон бен бхинон составленный цевть (flos flotculofus) и гладкое съмя. По Гречески авротаном; по Арабски Alvile Cathlum, Kelum, Gaiffum по Нъменки Aberraute, Stab Wurk, Schoß = Wurk, Kuttels Rraut, по Француски Auronne mâle ou des jardins; по Италіански, Abbruotano или Abbruotina, по Аглински Southernwood.

ABROTANVM MAS LINI FOLIO ACRI-ORI ODORATO, Авротанумь мась лини фоліо акріори одорато. Смотри Dracunculus elculentus, дракункулусь эскулентусь.

ABROTANVM MASCVLVM, Авротанумы маскулумы. Смощри Abrotanum тав, Аброшанумы масы.

ABRO-

ABROTANVM MINVS, Appomanymb минусь смотри Abrotanum, АбротанумЪ.

13

ABROTANVM MONTANVM, Aspoтанумь монтанумь. Смотри Abrotanum сатрейте, Абропанумъ кампестре.

ABROTANVM NIGRVM, Aspomaнумь нигрумь. Смотри Abrotanum mas, АброшанумЪ масЪ

ABROTANVM PLINII, Aspomanymb Плиніи. Смотри Gupressus herba, КупрессусЪ герба.

ABROTANVM SICVLVM, Aspomanymb cuкулумь. Смотри Abrotanum, Аброшанумъ.

ABROTANVM SYLVESTRE, Appomaнумь сильпестре. Смотри Abrotanum camревте, Аброшанумъ кампестре.

ABROTANVM VULGARE, Aspomaнумь пульгаре. Смотри Abrotanum mas, Аброшанумъ масъ.

ABROTON, Aspomonb. cmompu Cicuta, и Sabina, Цикута и Сабина.

ABRVCA, AFPYKA H

ABRVCATI, Appyxamu. CMompu Avellana, Авеллана.

ABSCELLA, AECHERARA. CMOMPH Agrimonia, Агримоніа.

ABSEI, Авсеи. Смотри Sabina, Сабина. ABSINTHII ANGVSTIFOLII RAMV-LVS FOLIIS SCISSIS, Accumiymb anryетифоліи рамулусь фолінсь сциссись. Смотри Absinthium marinum, АбсинтіумЪ маринумЪ.

ABSINTHIOMENON, AECUHMIOMEHOHb. Смотри Авготапит так, Абротанумъ масъ. ABSINTHION, Ascumionb. Cmompu

Absin thium, АбсинтіумЪ.

ABSINTHIVM Ascunmiymb I. B. Abfinthium) vulgare mas, I. B. Pit. Tournefort. Absinthium Latisolium Dod, Artemisia Abfinthium Linn. XXXII. Полынь, есшь почни во вс вхъ спранахъ Россіи, на камениспыхь мёстахь, близь жила, дорогь и

улицЪ, а особливо около Арзамаса и Оренбурга въмножествъ растущая, довольно извъстная, и сильно распространяющаяся прозимующая права, которая цвътетъ вь исходъ Іюня и вь Іюль мысяцахь. Она имбеть нъсколько бъловатых в выпвистых в. въ аршинъ и въ полпора въ вышину выбъгающих в стеблей; множество зубчатых в, мягкихЪ, душистыхЪ, чернобыльниковымЪ (Artemisia) подобных в и понъскольку вмъств на каждомъ стеблъ сидящихъ дымчаных в лиспыевв, горькаго вкуса; и мълкіе на подобіе звъздки расположенные, и пучками растущіе цвіточки темно - желтаго цвъща, подъ коими находящся маленькія свиячки въ круглованыхъ, струйчаныхъ и чашечкамъ подобныхъ капсуляхъ или съмянодержашельницахЪ. Корень у нее шолспый и жескій почши какь дерево. Она содержишь вы себь много масла и соли и малую часть влажности (Phlegma) согрѣваеть, укръпляеть, разжижаеть, чистить кровь. Листья и цв ты собирающся в в исходъ Іюня мъсяца. Снаружи приложенная въ припаркахъ разбиваетъ опухоли, излъчаеть раны и противудъйствуеть Антонову отню въ соленой водъ вареная. Полынное масло смъшивають съ лавровымъ масломь и прикладывають дътямь на пупъ, от глистовъ и для унятія рвоты. а взрослые могушь оное принималь внутренно на сахаръ въ количествъ отъ трехъ до шести каплей. Трава согрътая въ мъшечкахъ и наложенная на лобъ и виски, возбуждаеть сонь. Для унятія ресты наружнымЪ средствомЪ должно на желудокЪ приложишь полыни, съ уксусомъ или виномъ и съ шершымъ ржанымъ кабомъ. Ошъ глистовъ, надобно положишь на ночь полыни въ водку, и къ пупу приложить теплую, въ два или при раза свернупную и въ оную водку обмоченную пряпку. Приложенная кЪ пятамъ полынь вытягиваеть изъ ногъ опухоль, а смъщенная съ хорошо растершымЪ

15

пымь яичнымь былкомь, прогоняеть синеву оть пебоевь и оть оныхъ произшедшие кровавые рубцы. Листья наливають Французскимъ и виноградным в вином в, и пьюш в по рюмк в передь объдомъ вмъсто горькихъ каплей. пошому, что помогаеть варенію желудка, укръпляеть его, гръеть, возбуждаеть аппстить, гонить мочу и пузырный камень и полезно въ цынгошныхъ бользияхъ. Старые и кЪ параличу склонные люди должны от в полыни воздержаться. Въ клистирахъ упошребленное масло, разгоняеть спершіеся въщры. Въ Апшекахъ имъешся шрава, соль, которая противится внутренной кислошь, густыя мокроты жидить, гонипь мочу, и полезна въ лихорадкахъ Перегонная вода; настоянное съ полынью, и розовымъ листомъ масло смъщанное съ оливковымъ (Oleum de Absinthio compositum;) перегонное сЪ цвътными ея верьхушками и созръвающимъ съмянемъ масло (Oleum destillatum); и густо вареный сокъ или экстракть, которой почитается полезнымь оть трехь и чешырехъ дневныхъ лихорадокъ, желчи и водяной бол взни. Изв полыни двлають также вино; а въ Германіи кладуть ее въ пиво, когда находится въ брожении. Абсинтіумъ происходить от Греческаго слова афіядов и значить не пріятная горькая мрава. Господинъ Линкей полагаеть ee въ XIX классь правь и росадь имвющих в обоеродные цвЕточки, или нЕсколько мужеских в и женских в вм вств, у коих в гвоздки, или коих в мужчинки срослись св нижнею частью тычковой головки (Singenesia Polygamia) а Господинъ Турнефортъ съ Божіимъ деревом в в один в классь но во П родв. По Гречески А'фіндіон Вадинирон; по Арабски Absinthium, также scea или sceha; По НЪмецки Wermuth Men, Wiegenfraut; по Французски Abfinthe, Abfince или Aluine; по Италіански Affenzio; по Аглински Wormwood common.

ABSINTHIVM AEGYPTIACVM. синтічмь Египціакумь. Смотри finthium vulgare, АбсинтіумЪ вульгаре.

ABSINTHIVM ALBVM, Accumiymb Альумь. Смотри Absinthium, Абсинтіумъ.

ABSINTHIVM ALEXANDRINVM, AEсинтіумь Александринумь. Смотри Santoлісит, СантоникумЪ.

ABSINTHIVM ALPINVM, Accumiумь Алпинумь. Смотри Absinthium Pontiсит, АбсинтіумЪ ПонтикумЪ.

ABSINTHIVM ANGVSTIFOLIVM, As. синтіумь Ангустифоліумь и

ABSINTHIVM ANTIQUUM Accuumiумь антикпумь. и

ABSINTHIVM ARBORESCENS AS-

синтіумь арборесценсь и

ABSINTHIVM AVSTRIACVM TENVI-Аустріакумь FOLIVM Авсинтічмь Тенуифоліумь. Смотри Abrotanum mas, Аброшанумъ Масъ.

ABSINTHIVM COMMVNE, Accuemi.

умь Коммуне и

ABSINTHIVM DEL COMASCO, AGсинтумь дель комаско. Смотри Absinthium АбсиншіумЪ.

ABSINTHIVM DVLCE, Accumiymb

дульце. Смотри Anisum, Анисумъ.

ABSINTHIVM FATUUM, AECUHMIYMB фатуумь Смотри Abrotanum mas, Аброта. нумъ масъ.

ABSINTHIVM GALLICVM, Accumin-

умь Галликумь и

ABSINTHIVM GENEZARETHVM, Asсинтіумь Генезаретумь. Смотри Absinthi. um, АбсиншіумЪ.

ABSINTHIVM INODORVM, AECUH-

тіумь Инодорумь и

ABSINTHIVM INSIPIDVM, Accusmi. умь инсипидумь. Смотри Abrotanum mas, Аброшанумъ масъ.

ABSINTHIVM ITALICVM, Accumi умь Италикумь. Смотри Absinthium Ponticum, АбсиншіумЪ ПоншикумЪ.

ABSIN.

ABSINTHIVM MARINVM, Accuumiymb маринумь. Смотри Scriphium, Серифіумь.

ABSINTHIVM MESVES, Авсинтумь Мезиесь. Смотри Santonicum, Сантоникумь,

ABSINTHIVM MINVS, Accumiymb

ABSINTHIVM MONTANVM Авсинтіумь монтанумь. Смотри Abrotanum mas, Абротанумъ масъ.

ABSINTHIVM NABATHAEVM AVI-CENNAE, Авсинтіумь Наватеумь Апиценне. Смотри Absinthium, Абсинтіумь.

ABSINTHIVM NOBILE, Accuminymb

новиле, Смотри

17

ABSINTHIVM PONTICVM, C. B. Asсинтіумь Понтикумь, Artemisia Pontica. Linn. Absinthium Romanum, или Absinthium Ponticum tenuifolium incanum C. B. Pin. IV. Бълая Нефорощь; степная полынь, или У Эколистиенная малая полынь, растеть самовольно во всъхъ полуденныхъ спранахЪ Россіи, а здёсь водишся только въ садахъ. Она имветь короткіе, мілко разрізанные, сЪ низу бълыми шонкими волосками покрышые, и узкіе душистые листочки, стебли, которые покороче простаго, и маленькие круглованые цвъточки. Она содержить въ себъ много масла и соли, душистве простаго, и не столь горька; сущить, выгоняеть желчь чрезъ мочу, умерщвляеть глисты : похваляется Господином В Гофманном в отв чахошки и одышки употребленная вмъсто травнаго чая съ медомъ, а въ прочемъ сходствуеть она дъйствіемь и свойствомь овоимъ съ простымъ. Абсинтіумъ Понтикумъ. ПроисходишЪ отЪ Греческаго слова а почтов, море: какъ бы сказать, трава непріятная, горь. кая и какъ морская вода; по Гречески а Ундыя mourinou; no Hömenku Römisch, oder Pontischer Wermuth или Barten Wermulh; по Француски la petite Absinthe, или Absinthe pontique; по Мпаліански Assenzio pontico, по Аглински Roman или Pontick Wormwood.

Yacma I.

ABSINTHIVM REPENS, Авсинтумь репенсь. Смотри Absinthium, Абсинтумь.

ABSINTHIVM ROMANVM, Авсинтіумь Романумь. Смотри Absinthium Pontiсит, Абсинтіумъ Понтикумъ.

ABSINTHIVM SANTONICVM, Авсинтіумь Сантоникумь. Смотри Santonicum Сантоникумь.

ABSINTHIVM SERIPHIVM, Авсинтіумь Серифіумь. Смощри Seriphium, Серифіумъ.

ABSINTHIVM SVPINVM, Accumiymb Cynunymb. Cmompu Absinthium, Accumiymb.

ABSINTHIVM TENVIFOLIVM, Авсинтіумь Тенупфоліумь. Смощри Absinthium Ponticum, Абсинтіумъ Понтикумъ.

ABSINTHIVM TIBERIADICVM, Ascunmiy mb Tubepiaguxy mb. Cmompu Seriphium, СерифіумЪ.

ABSINTHIVM VMBELLIFERVM, As-

ABSINTHIVM VULGARE, Accumizant Bymb Bynrape. Смощри Absinthium, Абсиншіумь.

ABSINTHIVM XANTONICVM, Авсинтіумь Ксантоникумь. Смотри Santonicum, Сантоникумь.

ABTHIOS, Armioch. Смотри Sedum maius, Седумъ маюсь.

ABTHON, *Автонь*. Смотри Trichomanes, Трихоманесъ.

ABVC, Asykb. Cmompu Hyssopus, Tuc-

ABVFALIA, Абуфалів. Смотри Fraxinus, Фраксинусь.

ABVGAL, Абугаль. Смотри Iuniperus. Юниперусъ.

АВVLASA, Абулаза, есть Африканское, на островъ Мадагаскаръ, растущее дерево, котораго листья настоянные съ виномъ, похваляются отъ жестокаго біенія сердца. по Гречески Авгласа, быбро тё мабауаскар; по Немъзки Явика, Зашт ан Мадазаван,

по Француски Abulala, arbre, qui croit dans l'isle de Madagascar; по Италіански Abulala, albero che nasce nell'isola Madagascar; по Аглински Abulafa, a tree from Madagalker.

ABVNDACATI, Авундакати. Смотри

Avellana, Авеллана.

19

ABVTANON Asymanonb. Cmompu Ab-

rotanum. Аброшанумb.

ABVTILON AVIC. Asymunoub. Dod. Ang. Althæa peregrina. Gefn. Hort. Althæa Theophrasti flore luteo. C. B. Pit. Tournefort. Ibiscus Theophrasti: Dod Gal: XVI. Степной подсолнечникь или Бархатныя проспирки, также грудница, трава растеть въ множествь вы южных в странах в Россіи, а особливо на низских в мъстах в около Урала; а здёсь стють ее вы садахь вы исходъ Апраля масяца. Она имбеть на многія тонкія волокны разділяющійся корень, из в копюраго вырастаеть круглый, крыпкій и вытвистый стебель въ полтора аршина и болъе вышиною; оный стебель окружается широкими, кругловашыми, вершиною оканчивающимися, въ низу по серединъ въ одномъ мъсть вынятыми (Folia cordata), тыквенным в подобными, и по краям в внутрь впалающіе углы им вющими листьями; из в средины коих возвышающся маленькіе, желшые, изъ одного листочка составленные, на подобіе колокольчика расположенные, и почти вовсем в на просвирные (Malua) похожіе цвышы, которые спадая оставляютьсь верьку плоскія, съ низу кругловатыя, полосочками испещренныя и многими черными перепоношными плевами обведенныя капсулы или коробочки, которыя разтворяясь оказывають по четыре и по пяти бурсющих в и видв маленькой почки имвющихъ съмячекъ. Сія права содержишь вь себъ много масла и влажности, но мало соли; умягчаеть, гожишь мочу и зальчиваеть раны. Въ Аптеках в ничего от в нее не им вется. Господин в минией полагаеть ее въ XVI классъ раживый, имвющих в в своем в цвыть двашцать и болбе мужчинок в или гвозднов в (паmina) и одну женочку или пестикЪ (piвмѣстѣ (Polyandria Monogynia) а Господинъ Турнефорть въ I. классъ въ V. родъ правъ съ однолистнымъ, по Ботаникъ одноперымъ (Monopetalus) колокольчиснымъ цвътомъ. По Гречески А'хваја ки-Tonos, По Нъмецки fremde Cibisch Wurg. или gelbe Pappel; по Француски fausse Guimauve, по Ишаліански Buonvisco; по Аглински Mallow the Yellow, или Jellow Marsh: Mallow.

ABVTON, Абутонь. Смотри Abrotanum. АброшанумЪ.

ACABEL, AKGGERA. CMOMPH Enula.

Енула.

ACACALIS AKAKARUCE. CMOMPH Em-

ретиш, ЕмпешрумЪ.

ACACIA AMERICANA ABRUAE FO-LIO, Акація Американа Авруе фоліо. Смотри Gleditschia Triacanthos, Гледишчіа Тріаканшось.

ACACIA AEGYPTIACA, Anauja Eгипціака. Смотри Acacia vera Veterum,

Акація вера вешерумЪ.

ACACIA ALTERA, Акація Алтера. Смотри Acacia Germanica, Акація Германика.

ACACIA DIOSC. Arauis Diock. Cmompu Acache vera veterum, Akania Bepa

ветерумЪ.

ACACIA GERMANICA, Anauin Tepmanuxa. Prunus sylvestris. C. B. Ger. I. B. Dod. Park. Rail. Hift. Pit. Tournes. Spinus Virgilio. XXVIII. Тернь, или дикая слипа, а около Алашыря Торнь есшь маленькое колючее деревцо, растущее самовольно в В Украйнь и вь других в южных в спранах в Россіи , а здёсь не вездё, но больше въ одних в садакъ. Оно првтешъ въ Апрълъ мъсяцъ, а ягоды поспввающь осенью. Дерево крвпко, и сучья им вюшь колючія иголочки. Кора на немъ пепельнаго цевта; листья подобны сливнымь, только меньше, ивжны

21

и не много жески, вяжущаго вкуса: изъ средины оныхъ вырастають маленькіе, изъ пяти листочков в составленные, нажные и как в снъг в бълые цвъточки о нъскольких в гвоздкахь; послё цвётовь оказываются, съ виноградныя величиною, продолгованыя яголы, темно пурпуроваго цввта: коих в твло внутри зеленовато и кисловязательнаго вкуса. Каждая ягода заключаеть въ себъ продолговащую на вишневую похожую косточку. Корень черновать, древесовать, и большую им'веть мочку. Листья и цввты Акаціи укръпляють и унимають какь кровавый, такъ и простой поносъ. Цвъть вареный вЪ пивъ, составляетъ преизящное кровочистительное типье, позываеть нанизь, разбиваеть крогь и почитается полезнымъ оть колотья въ боку. Сушеный, истолченый попомь порошокь и приняшый внушренно въ шепломъ виноградномъ винъ, гонишъ камень и мочу. Кора съ терновых в корней вареная въ водъ или въ кисломъ винъ съ малымъ количествомъ меду и квасцовъ составляеть хорошую воду для полосканія горла. Сушеныя и мълко истолченныя ягоды въ винъ похваляющся отъ почечнаго камия, и образомЪ баненья опъ боли вЪ машкъ. Перегонная съ ягодами вода полезна от всяких в поносов в. Выдавленный изЪ ягодЪ сокЪ унимаетъ рвоту, противодъйствуеть яду и принимается внушренно въ количествъ отъ половины до цълето золошника. Въ украйнъ дълающь изъ ягодъ пишье, или такъ называемую Терновку. которую пригоповляють сабдующимь образомЪ: на зрълыя и нъсколько раздавленныя терновныя ягоды, наливъ простаго вина, ставять въ тепло, чтобы уходилось; послъ чего процъживають напоенное ягоднымъ вкусомъ вино. А когда хошящъ напишокъ сдълать кръпче и лучше, то вмъсто простаго вина употребляють Францускую водку. Многіе настанвають также вино съ ягодами, а иные выжимающъ сокъ и

смъшивають съ виномь или водкою, для своего употребленія. Проспый народь варишь свъжіе цвъты въ молокъ и употребляеть оныя весною для очищенія крови. ВЬ Апшеках в имбешся цвыть, перегонная изЪ нихЪ вода, сыропЪ, спиртЪ и сущеныя ягоды. Акація еспів древнее родовое имя происходящее от Греческого имени акада, острю, потому, что на сучьях в ея находишся множество острых в иголок в ГосподинЪ Линней полагаеть ее во XII. классЪ растъній имъющих вы цвыть своемы двадцань мужчинок в и одну женочку вм вств, и у коихъ цвъточное гуменцо, соединяющее внъшную часть цвъта, и гвоздки съ чашечкою, расширено около зародышка (Germen) кЪ веръху. (Icofandria Monogynia); а Господинъ Турнефортъ въ ХХ классъ во II родъ деревъ и кустарниковъ съ однолистнымъ цвътомъ, котораго пестикъ превращается въ ягоду. По Гречески фурккоиплеа; по Нъмецки Schleh или Schwarbs Dorn, wilde Pflaumen; по Француски Prunier fauvage или Prunellier; по Италіански Acacia или Acazia; по Аглински Acacia the German, a ayume the floe tree man Black Thorn.

ACA

ACACIA GLORIOSA, AKALIA TAO ріоза. Смотри Inimboia, Инимбоя.

ACACIA INDICA, Акація Индика.

Смотри Tamarindus. Тамариндусъ.

ACACIA MATTH. Акація Мат. Смотри Genista spinosa triphyllos, Гениста спиноза трифиллосъ.

ACACIA ORBIS AMERICANI ALTE-RA, Акація орбись Американи алтера. ACACIA ROBINI, AKALIA POENHIL Смотри Pfeudo - Acacia, Псевдо - Акація.

ACACIA SECVNDA MATTH. Axayin секунда Мат. Смотри Acacia vera veterum,

Акація вера ветерумь.

ACACIA SIBIRICA, Акація Сибириxa: (Robinia Linn. Hort. Upsal. 212. Aspalathus, Amman. 210 Caraganna Sibirica Rai

Hort, Ludg. Bat. 537. Горохопое дерепо есть прекрасное, от двух до пяти сажен в вь вышину растушее Сибирское дерево, ко. торое водится здёсь только въ садахъ. Оно покрыто зеленоватою корою и приносині в множество желтых в роговидных в цв втковь, пришомъ же шелуху и свътлозеленые. перистые и на гороховые похожіе листья. Цевшы же раступь иные вверыхв, а другіе висянів опянь подв лисньями, и вв самые ненасшливые годы приносящь полныя стручья. Дерево Акаціи прочно, противится стужв и всякіе три года можно съ него собирать сёмяна въ Августъ мъсяцъ. Плоды его походять на спаржевой горохь, которой обварень будучи въ кипяткъ, очень питателень какь для людей, такь и для скота. Овцы до молодых в отростков в ежегодно от корня его выходящих в чрезвычайно падки и оные имъ такъ полезны. что они въ тъхъ мъстахъ, гдъ сего корму много, вырастають до особливой величины. ГосподинЪ БолошовЪ вЪ экономическомъ своемъ журналъ упоминаетъ, что онь чишаль, будшо бы по предприниманлымъ разнымъ опышамъ оказалось, что изЪ листьевъ сего дерева можно такимъ же образомъ извлекать прекрасную синюю краску, какЪ изЪ Вайда и Крутика. (Indigo). ВЪ прочемъ сте дерево годно къ полишуръ, и хошя легко трескается, однакож в столя. рами употребляется на дъланіе всякой работы (смотри дальнее описание сего дерева вь г помъ прудовь экономическаго общества, покойнымъ Господиномъ ЭклебеномЪ.) ГосподинЪ Линней полагаеть оное въ XVII. класев деревь им вющих в в обоеродном в своемь цвыть десять мужчинокь, яко брашья изЪ двойной на ченыре лапочки раздъленной чашечки произрасшающихъ. (Diadelphia.) По Гречески А'нана Бивирони; по Нъменки Cibirischer Erbsenbaum; по Франдуски Acacia de Sibirie; по Италіански Acazia del Sibiria; по Аглински Sibirifh Acaсія; по Мунгальски Attagana.

ACACIA TRIFOLIA, Акація трифо. nia. Смотри Acacia vera veterum, Akauja вера ветерумъ.

ACACIA VERA VETERVM, Akanja пера петерумь. Mimosa spinis geminatis distinctis foliis duplicato pinnatis Linn. Druпетская Акація или Тернь, есть иглистое въ Аравіи и въ Эгиптъ растущее деревцо, которое имбеть прямо вь ширину распросширающіеся сучья, снабденные по мъспамЪ корошкими оспрыми иглами, и между оными свъто зелеными длинными, нъжными и кудрявыми лиспівями. Цвёты на немЪ круглые почти шаровидные, душистые и желтые; по спаденію оных вырастають темноватые стручья, заключающе въ себъ маленькіе, на лупиновые (волчей бобЪ) похожіе и сладкаго и пріятнаго вкуса бобки, которые выписывають и сажають вь нв. которых В Европейских В садах В, в коих В сіе деревцо вырастаеть кустарникомь, приносящимъ на третей годъ цвъты и стручья. Из в упомянущых в бобков в сказывающь, что приготовляють тоть чистый, густый, чернованый и лоснящійся сокЪ, конорой мы называем в здесь соком в Египешской Аканіи. Оный входинів вы составь Теріака, сушить, прохлаждаеть, снедаеть вредныя мокроты, прошивод виствуеть яду, украпляеть, остановляеть теченіе чечуя и выгоняеть жарь и свербежь изв глазв. Изв цввтовь его двлаюнь румяны. ВЬ Апшекахь употребляет. ся часто, вмъсто соку изъ Египетской Акацін, потому что оный очень рѣдокъ, сокЪ изЪ нашего шерну (Acacia Germanica) По Гречески Ахахіа Нірр. А хаува; по Арабски Alchard, или Schamuth, fchack, Nalepi; по Ивмецки Alegyptischer Schoten-Dorn; по Француски Vrai Acacia d'Egypte; по Италіански Acazia vera d'Egypto; по Аглински Acacia or Egyptian Thorn.

ACACIA VIRGINIANA, ARAUIA Bupтиніана. Смотри Pseudo-Acacia, Псевдо-Акація.

ACAIA, AxaA, Ibanitara Brasiliensibus. Margr. et Pif. Акая, есть большое Индійское в Бразиліи распущее сливное дерево. котораго листья длинные, посредственно широкіе и остроконечные; а цвёты маленькіе, желтые и расположенные на подобіе въточекъ: сливы, которыя онъ приноситъ, походять видомь на наши, сочны, цвъ. томь желные и имъють пріятный вкусь и вапахь: Индіанцы выжимають изь нихь сокъ и дълають кръпкое вино. Листья и кора унимають распаление вы горль, укръпляють желудокь, остановляють понось и унопребляющся въ полосканіяхъ. Сливы унимають рвоту; а молодые оть сучьевь отпрыски укръпляющъ глаза и оспірящь зръміс. По гречески Анаїа, попошила й башавилναΐα της βρατιλίας; πο Η Επεικά Ucaia, или großer Brasilischer Keigenbaum; по Француски Grand Prunier des Indes; а сливы, Prunes de Monbain; по Италіански Acaia gran Pruniere di Brasilia; по Аглински the great Brasilian plum - tree.

АСАГАГВА, Акаянба и

ACAIOU, Akairo. Cmompu Caschou Kamy.

ACAIU, Axaro, mo me

ACAL, Akanb. Смотри Anethum, A-

ACALAPHE, Ananage. u

ACALIPHE, Акалифе. Смотри Атmoniacum, Аммоніакумъ.

ACAMICH, AramuxB. Cmompu Aristo.

lochia longa, Аристолохіа лонга.

ACANTHA, Аканта. Смотри Асасіа Germanica, Аканія Германика и Acanthus, Акантусъ.

ACANTHESTOPIA, Ananmecmonia.

Смотри Acanthus, АкантусЪ.

ACANTHIS AEGYPTIACA, Акантись Египціака и

ACANTHIS ARABICA, Акантись

ACANTHIS HANIQUI, Акантись Ганикии. Смотри Cardopatium, кардопаціумь. ACANTHIVM, Акантіумь. Смотри Spina alba, Спина алба.

ACANTHIVM CORD, Акантіумь кордь. Смотри Carduus benedie, Карду-усь бенедиктусь.

ACANTHIVM ILLYRICVM, Акантіумь Иллирикумь. Смотри Carduus, кардуусь.

ACANTHIVM MATTH. Акантіумь Маттен. Смотри Опорогов, Онопордонь.

ACANTHIVM ONICVM, Акантіумь Оникумь. Смотри Carthamus, Картамусь.

ACANTHIVM PEREGRINVM, Акантіумь перегринумь. Смотри Carduus, Кардуусь.

ACANTHIVM SYLVESTRE, FLORE ALBO, Axanmiymb силнестре флоре альо.

ACANTHIVM VULGARE FLORE AL-BO, Акантіумь пулгаре флоре альо. Смотри Onopordon, Онопордонъ.

ACANTHIVM VULGARE FLORE PVR-PVREO, Акантіумь пулгаре флоре пурпурео. Смотри Cardeus, Кардуусь.

ACANTHVM, Акантумь. Смотри Аттопіасит, Аммоніакумь, и Semen Urticae, Семень Уртице.

ACANTHUS, Aкантусь. Смотри Se

песіо, Сенеціо.

ACANTHUS. MATTH. CORD. IN DI OSC. Akaumych. Acanthus satiuus Linna Acanthus verus Frag. Acanthus fatinus, vel mollis Virgilii. C. B. Pit. Tournef. Branca Vrsina. X. Борща, Роженець, Опаль, Медпежья лапа, а около Курмыша Вонючка есть трава, которая растеть въ лъсахъ, по полямь, на пашенных в бороздахь, держишся для красы въ нѣкошорыхъ садахъ к цвътеть въ Іюль мьсяць. Она имъетъ длинный, красновашый, гладкій, въ длину и ширину въ землъ расшпространяющися ж н Всколькими волокнами окруженный корень не безпріятнаго запаха, из в котораго вырасшающь длинные, широкіе, шучные, вокругь глубоко разръзанные, на медвежым лапу похожіе, по землі распилающієся и

клеисшой сокЪ вЪ себъ содержащіе лисшья темнозеленаго цввта, изв срединв коихв возвышается прямый стебель въ аршинъ и полтора вышиною и въ палецъ толщины, окружающися съ средины до самой вершины маленькими видомЪ на нижніе подобными листочками, и между верхними, бълыми, продолговащыми, и шолько из в одного кв верьху кольцомв завивающагося и вв усть в на три части разръзаннаго листа состоящими цв втами; верьхняя часть коих в занята нъсколькими пычками, поддерживающими маленькіе, лозъ подобные вънчики. Послъ цвъта оказываются съмянодержашельницы, подобныя видомъ дубовому желудю, и содержащія въ двухъ своихъ гивздышках в желтыя, продолговато круглыя съмячки. Сія трава содержить вы себъ мното масла, влажности и малую часть соли. Листья гръють, умягчають, спостышеспвують варенію вь желудив, приводять вь созрълость, понуждають на низъ и употребляются обыкновенно в припарках в и клиспирахъ. Корень сушитъ, тонитъ мочу, разбиваенів, разжижаень и очень полезень для чахоточных в людей употребленный въ пищу. Въ Украйнъ собираютъ листья и корень, квасять ихв св красною свеклою, и варяшъ свой борщь или бураки. Сырой стебель сей травы служить во мнотих в странах в Россіи, особливо около Алатыря и въ низовыхъ мъстахъ простому народу пищею. Многіе сушать и толкуть корень въ порошокъ и присыпають имъ обжогу, также прикладывають свёжій на вывихнупые члены. Размножение сей правы двлается иногда посредствомъ съменъ, а иногда чрезъ корневые отпрыски, также сажають ее и въ горшки и пересаживають вь Марть мьсяць. Высьчка борщеваго лисыа показалась спюль прекрасною, что Римаяне выбрами его для украшенія въ Аржитектуръ канишелей у сполбовъ, Коринескаго ордена или порядка. ВЪ АпшекахЪ

унотребляется одна трава, которая считаепіся вв числв пяти умягчительных в травь. Господинь Линней полагаеть ее вь XIV классь правь им вющих вы цвыть своем в чепырехЪ мужчинокЪ или шычекЪ, изЪкоих в два ближніе дол ве, нежели другіе два. (Didynamia) А ГосподинЪ ТурнефортЪ вЪ III. классь вы I родь травь сь неправильнымъ однолистнымъ къ верьху кольпомъ завивающимся цв втомъ. Акантусъ происходить от Греческаго слова ауп, игла, потому что многіе роды сей травы им вють на вершинь стебля своего коротенькія иголочки, а бранка урсина или медвежья дапа есть Латинское имя, колюрое дано ей по нѣконюрому сходству листа его съ медвежьею распростертою лапою. По Гречески A'нах9оs, A'нах9ло α тіа, тал6s ϵ ω та, μ s=данфиддог; по Нъмецки Barenflau или Barenwurg; по Француски Acante или Branc-Urfine; по Италіански Acanto, или Brancorfina: по Аглински Brank Urfine или Bears - breech.

ACANTHUS GERMANICUS. ARAHтусь Германикусь и

ACANTHUS LEVIS, Axaumycb ne-Huch W

ACANTHUS SATIVA ET MOLLIS VIRGILII, Anahmych camuna эть моллись Bupruniu. Cmompu Acanthus Matth. Akanтусь Мат.

ACANTHUS SYLVESTRIS, OFFIC. PARC. THEAT. 992. Axaumych curueempuch. Acanthus aculeatus. C. B. Pin. 283. Raii Hist. ii. 1325. Hist. Oxon. iii. 624. Boerh. Ind. A. 239. Tourn. Inft. 176. Elem. Bot. 145. Branca urfina spinosa. I. B. Chab. 350. Carduus Acanthus I.B. Борщопикв или дикая опаль права, растенть въ садахъ на сырых в и каменистых в мвстах в и цввтеть вы Іюль мысяць. Она различествуеть ошь вышеупомянушой корнемь своимь, который снаружи черновать, а внутри быть, листомъ, которой меньше и находящимися. на вершинъ спебля ея между маленькими

листочками, корошенькими иголочками. ВЪ Медицинъ употребляется одна трава, сходствующая въ свойствъ своемъ съ борщемъ, сь которою и въ одномъ классъ полагается. По Гречески "Акачвые ауыше; по Нъмецки Bartisch или wilde Barenklau; по Француски Patte d'Ours или Branc-Urfine fauvage: по Ишаліански Brancorfina selvatica; по Аглин. ски Wild, или Prickly Bears - Breech.

ACA

ACANTHUS SYLVESTRIS ALTER. Акантусь силпестрись алтерь. Смотри

Іасеа, яцеа.

ACANTHUS VETERVM, Axanmych Ветерумь. Смотри Acanthus, Акантусъ.

ACANTHUS VULGARIS, Axanmycb пулгарись. Смотри Acanthus, Акантусь.

ACANTHYLLIS APVLEI, AKAHMUNлись Апулеи. Смотри Afparagus, Аспаратусь.

ACANVS OFFIC. Аканусь Оффиц. Смотри Carduus latifolius acinos obsolete purpureos ferens, Кардуусь лашифоліусь, ацинось обсолене пурпуреось ференсь.

ACARACHIE, Anapaxie. Cmompu Tra-

gacantha, mparakanma.

ACARDAL, Akapganb. Cmompu Sinapi, Синапи.

ACARNA FLORE LVTEO PATVLO. С. В. Акарна флоре лутео патуло. Асогna Cael. Carlina lyhuestris minor Dod. Ger Hispanica. Clus. Hist. Pit. Tournes. Carduus Carlina minor syluestris, Clusii, store luteo. I. B. Eryngium Archigenis. Ang. Auxin maлый пухопникь, Волоскій осоть, а по переводу съ Аглинскаго рыбій осоть, есть низенькая, мало употребляемая травка роду пуховника (Carlina) а по мивнию Господина Дала и нъкошорыхъ другихъ роду осотовъ (Carduus). Она производитъ только одинъ тоненькій, и бълымъ мошкомъ покрытый стебель, около четырех верышков в вышиною, который околашивается продолговавыми жеснікими и по краямЪ колючими иглами обсаженными листьями: цвёты вырастають обынвовенно из вершины спебля, желшые

составлены изъ многихъ длинныхъ перышковь и поддерживающся всв двумя чашечками, усажденными вокругь иголочками: свияна у нее продолгованы, гладкія, бълыя и лоснящіяся: корень тонокЪ, красновать и вкусомь прянь. Сія трава растеть въ теплыхъ спранахъ на сухихъ и въ пуств лежащих в мъстахъ, здёсь только въ одних в садахв, и цв в теть в в Гюль м всяцв, но всякій годь увядаеть. Корень понуждаеть на низъ и производить потв. Акарна происходить от Греческаго слова йноруа, колючая трава. Господинъ Турнефортъ полагаешь ее въ XIV. классь во II родь шравъ имъющихъ не правильные перисшые, кЪ низу трубкою распущіе цвѣты. По Гречески Апороа, по Нъмецки Sisch = Diestel Rleine uau wilde Cherwurtzel; no Opannyски Acarna, (ainsi nommée comme qui diroit plante épineuse;) по Итахіански Acarna; по Аглински Fish - Thistle.

ACARNA HVMILI CAVLE FOLIOSO, Акарна гумили капле фолгозо. Смотри Carlina vulgaris, Карлина вулгарисъ.

ACARNA MAIOR, Акарна мајорь.

Смотри Polyacanthus, Поліакантусь.

ACARNA MAIOR CAVLE NON FO-LIOSO, Акарна магорь капле нонь фопіозо. Смотри Lolium, ЛохіумЪ.

ACARNA THEOPHR. Акарна Теофр. Смотри Carlina vulgaris, Карлина вул-

гарисъ.

ACARNA WALERANDI, Aкарна Baперанди. Смотри Carduus, Кардуусь.

ACASIA, Axasia. CMompu Pleudo A-

сакіа, Псевдо - Акаціа.

ACATA, Axama. CMompu Thus, Tych. ACATALID, Axamanugh. Cmompu Iuniperus, Юниперусъ-

ACCIPITRINA, AKHUTUMPUHA. CMO-

три Sophia, Софія.

ACCIPITRINA MINOR, AKLUTUMPUна Минорь Смотри Hieratium, ГіераціумЪ. ACE, Aug. CMOMPH Thymus, THMYCh.

ACE-

ACEDVLA, Auegyna. Cmompu Acetofella, Ацепюзелла.

ACER ACVTIORIBVS FOLIIS, Rai. Syll. ext 49. Auepb akyujopusych poniись. Смотри Acer Platanoides, foliis quinquelobis, Ацерь Платаноидесь фоліись квинквелобисЪ.

ACER AMERICANVM, folio majore, subtus argenteo, supra viridi splendente, floribus multis coccineis, Auepb Американумь, фоліо маюре, субтусь аргентей, супра пириди спленденте, флоривусь мултись кокціненсь. Смотри Acer tri vel quinquelobatis foliis, Ацеръ шри или квинквелобатись фоліись.

ACER CAMPESTRE, Auepb кампестре. Смотри Асег Мајог, Ацеръ Маѓоръ.

ACER CONGENER ALTERA infrequentior. Lob. Adv. 443. Ic. 11 P. 199. F. 1. Ацерь контенерь алтера инфрекленцюрь. Смотри Acer Platanoides, Ацеръ Плашаноидесь.

ACER CRISPVM, Auepb xpucnymb, ACER FLAVUM, Auepb фланумь. Смотри Асег тајог, Ацеръ Мајоръ.

ACER FLORIBVS RVBRIS, Folio maiori superne viridi, subtus argenteo splendente, A. церь флоривусь руврись, фоліо маюри суперне пириди, сувтусь аргентео, спленgeume. CMompie Acer tri vel quinquelobatis foliis, Ацеръ три или квинквелобатисъ фомінсЪ.

ACER FOLIIS PALMATIS ACVTE DENTATIS, floribus corolla speciosis corymbosis. Linn. Hort. Cliff. 143. Auepb poninch палматись, акуте дентатись, флори-Бусь королла спеціозись коримбозись. Линнен. Смотри Acer Platanoides, АцерЪ Платаноидесь.

ACER FOLIIS QVINQVANGVLIS, acutissimis, raro dentatis. Auepb honinch кпинкпангулись, акутиссимись, раро денmamuch. Смотри Acer platanoides, Aueph Плашаноидесь.

ACER FOLIIS QVINQVELOBIS SVB-DENTATIS SVBTVS GLAVCIS, floribus pedunculatis simplicissimis rare aggregatis dioicis. Ацерь фолись кпинкпеловись сувдентатись, сувтусь гланцись, флоривусь педункулатись симплициссимись раре атгрегатись діонцись. Американскій или Красноцвъшный Клень, расшешь въ Америкв и въ Гишпаніи. Онъ имветь желтовашый тладкій пінь; большіе съ верьку шемиозеленые, пяшилапчашые, и глубоко връзанные и каждый тремя красно-желпыми жилками проръзанные, а съ низу лазоревые съ бълыми жилками лиспыя; спебли листочные съ начала желтоваты, а вътвхв мвстахв, гдв насаждаются, листьями, зеленые. Цевть на семь деревь мылкій, кЪ землъ висящій видомЪ Ландышевому подобный, барбарисовато цввта, сидить на длинных в краснованных в черешках в; растеть каждый особо и имъеть два изъ нутри наружу выставившіяся перышка. Американцы изъ соку сего Дерева варяшъ сахарь и сыропь; изв дерева двлають всякіе къ домашнему обиходу нужные сосуды, какъ тарелки, чашки и другія тому подобныя вещи; изъ коры вываривають краску, которая смынанная съ малымъ количествомъ купоросу, дълается темно голубою и употребляется ими на окрашивание въ упомянутую краску холста: также двлають они изЪ коры черкилы. Примвчать надлежить, что сіе дерево бываеть двухь родовь мужескаго и женскаго; из в коих в каждый род в растеть особливо. По Гречески Еферумичов auspinavos nonivois av Jesi; no Abmenku Umericanischer Uhorn = Baum mit roffer Blute; no Француски Erable d'Amerique à fleurs rouges; по Ишаліянски Асего; по Аглински The American Maple tree.

ACER MAIOR DOD. Auepb maiopb Aog. Смотри Acer montanum candidum C. B. Pit. Tournefort, Амерь моншанумь канди думъ.

ACE-

ACERIS PRIMA SPECIES, ANG. Knehb высокое и прямое въ Маїв місяців здъсь зеленъющее дерево, которое однакожь вь полуденных в странахь Россіи бываеть выше и прямые, нежели вы сыверных в. Внушренность сего дерева бъловащая, пънь цвътомъ красноватъ а у старыхъ деревъ земляный или желтосбрый, также какЪ и кора, которая на молодых в деревьях в сладкая, видомъ свъшлодикая, внутри волнисшая, а на старых в шероховащая, на многих в мъстахъ сърымъ мохомъ покрытая и въ доль разщелившаяся. Листья на клену большіе, широкіе, гладкіе, пяшилапочные, мягкіе, и на подобіе виноградных в расположенные; съ глубокими връзами съ верыху темно а съ низу блёдно зеленаго цвёта, съ пролежащими красновашыми, а у иных в дистовь бъловатыми жилками, и сидять на красноватых в стебельках в. Пвёты составлены обыкновенно изЪ пяти большихЪ и столько же маленьких в на подобіе розона расположенных в бъло зеленых в листочков в, Вырасшающь вскорт послт выпуску лисша и ушверждающся на равно длинных в черешкахЪ. ВЪ срединъ упомянущыхЪ цвъщочковъ оназывается круженъ съ блёдно желпиыми лисшочками, между коими означаю. тся бълыя жилки, или пестики превращаю. щіеся в Іюнъ місяць в зеленыя продолгованыя кансулы или сёмянодержанельницы одвухъ или прехъ гнъздахъ съ распростертыми къ концу притупленными крылошками; въ каждомъ изъ оныхъ заключается по одному желповатому, тонкими крылышками снабденному, въ гнъздъ еще другою шонкою красновашою кожуркою покрытому, и по опаденіи листовъ созръвающему съмяни съ померанцовое полщиною, которое и съ гибздомъ своимъ съ дерева въпромъ снесено бываетъ. Оно имъешЬ ломкій, непріяшный и языкЪ вяжущій вкусъ. Кленъ расшетъ въ лъсахъ, въ кустарникахЪ, и любитъ песчаныя и сухія Часть І.

мъста. Онъ содержить въ себъ много соку: впрочемь вь семь деревь болье нежели на других в находится свиловатых в болоней и горбовъ. (Смопри Миллеровъ садовничій Лексиконъ на Аглинскомъ языкъ) Въ садахЪ изЪ молодаго клену для швии насаживають шпалеры, также садятся и вы аллеяхЪ между липами и другими деревьями. Размножение сего дерева двлается отв свмяни и от корней срубленных в деревв, только происходящее от съмяни, расшеть больше и лучше. Дерево разпиливають вЪ доски, и употребляють для прочности и кръпости его на дъланіе столовъ, шкаповь, разныхъ домашнихъ сосудовъ, и биліаршных в кеовь, шакже къ столярной и токарной работв, на снасти, и на мельничныя пальцы, шестерни, спицы въ колесахъ и къ прочимъ тому подобнымъ дъламъ. Кленоваго дерева швнь похваляется, якобы служишь къ человеческому здравію. Молодые его листочки варять въ виноградномъ винъ и припаривають ими глаза, оть воспаленія и разных в флюсовь вы оных в, также варять ихв вв уксусв и употребляють внутренно для унятія реоты и тошноты: а свъжими въ порошокъ истолченными лисшьями присыпають съ пользою воспаленные нарывы. Приложенная на голову зола отв сженой коры намоченная водою, или лучше щелокЪ, изЪ оной прогоняеть съ нее болячки и струпы. Онажь щитается надежнымъ средствомь оть зубной боли, когда сокь изв вареной въ уксусъ держать и полоскать ротъ. ГосподинЪ ДахЪ совъщуетъ толочь въ порошокЪ отрасли от в кленовых в кореньев в, д влать из в нихъ посредствомъ винограднаго вина твсто и прикладывать наружно на то мъсто, вь которомъ чувствуется боль отв печеночных вользней; въ прошчемъ составляють листья его корошій кормь для рогатаго скота, и могуть быть употреблены ко унавоживанію, пошому что легко да и скоро гніють. В вапшеках в ничего не имвет-

B

35

ся. Ацерь есть Лашинское оть Римлянь принятое имя, конораго смыслъ не извъстень. Господинь Линней полагаеть всъ роды сего дерева вЪ XIII. ВлассЪ деревЪ, на коихъ находятся либо мужескіе, либо женскіе, но опідвленно другь оть друга растущіе цвѣты. (Polygamia) а ГосподинЪ Турнефорги В В XXI. класс в в I род в деревь и кустарниковь имфющихь цветь составленный изъ нъсколькихъ на подобіе розона расположеннык в листочков в, и кото раго пестикъ превращается въ многокапсульной плодь. По Гречески офендациос или диую, на горахъ растущій; удейнос на долинахЪ и илеготрохоз желпый не кудрявый Кленъ. По Нъмецки Ивоги или Ивоги Зашт; по Француски Erable; по Италіански Acero; по Аглински the Great Maple - tree или Plane - tree the falle.

ACER MINVS GER. Auepb munycb Tepb. Acer Offic. Acer campestre et minus. C. B. Pit. Tournefort. Opulus campestris vete rum. Jons. Dendr. 132. Малый клень растеть съ упомянутымъ на однихъ мъстахъ, мветень вы маів, а семяна поспераюнь въ Сентябръ мъсяцъ. Онъ не такъ великъ какЪ описанный выше кленЪ, листъя на немЪ меньше и съ маленькою высъчкою, также и семяна его меньше, глаже и бъловашыя. Дерево кръпко, но пришомъ легко, нъжно и охошите употребляется на столирную работу. Абиствіемь и свойствомь своимь сходствуеть онь съ вышеупомянущымъ. По Гречески отбел Замов михров; по Нъмецки Leins Baum unn Klein Aborn & Baum; no Француки petit Erable; по Ишаліански Асето Piccolo по Аглински the Mapletree.

ACER MONTANVM, Auepb monmanymb. Cmompu Acer maius, Auepb maiocb.
ACER NON CRISPVM, Auepb maiocb.
ACER TATARICVM, foliis cordatis indivitis et floribus racemosis Linn. Auepb Ta-

тарикумь. Неклень съ красными серіожками есль примъчанія достойный, ко украшенію свеерных в садовь весьма способный и на изгороды пригодный кустарникЪ, который растеть около Самары и въ самой южной Россіи, хошя не высоко, но на многія сажени распространившись; листья его подобны ИльмовымЪ (Vlmus) круглованые, цвльные и расположены на подобіе сердечка. Весною на немЪ бываетЪ множество бълых в пучками растущих в цв в тов в, а осенью красивыя пленчашыя съмяна, изъ коихъ Калмыки варяшь себъ весьма вяжущій чай. Смотри Академическія извістія. По Гречески офендациоз Тартарию; по Нъмецки Зацая rischer Uhorn-Baum; по Француски Erable de Tartarie; по Ишаліански Acero di Tartaria: по Аглински the Tartarian Maple tree.

ACER PLATANOIDES foliis quinquelobis, acuminatis, acute dentatis glabris, floribus corymbolis. Linn. Flor. svec. 303. 294. врес. 1596. Mill. Dict. Ацерь Платаноидесь фолись киннкпеловись, акуминатись, акуте дентатись глабрись, флорибусь коримбозись. Американскій, Явору подобный. Клене, имветь больше гладкие, кЪ концу острые, пятилапчатые, на длинныхъ зеленыхъ черешкахъ сидящіе, и насъчки почии никакой неимъющие листья, которые имъють съ верьху зеленой съ темновальими, а съ низу лазоревой цв вль съ бёлыми жилками. Цвёть состоить изъ двенаппани желных в концамь зеленых в аисточковъ, посреди коихъ находится кружокъ съ красными жилками, кои прегращаюшся въ прозеленыя съмянныя гивада съ распросперными и по концамЪ оспрыми крыаышками, и такъ вкупъ пучками созръвають. По Гречески офендацию Америанов анветь трых хроматых; по Нъмецки Umericanis scher dem Erelichen gleichender Aborn-Baum mit dreperten farbigten Bluthe; no Opanyaски Erable d'Amerique à fleurs de trois couleurs; по Ишаліански Acero dell' America

con fiori de tre colori; по Аглински the American Maple tree much refembling that of Creet, with threu different colourd flowers.

ACER TENVIFOLIVM, Auepb meny ифолгумь. Смотри Platanus. Плащанусъ.

ACER TRI VEL QVINQVELOBATIS FOLIIS SERRATIS, Subtus glaucis, floribus pedunculatis, simplicibus, confertim aggregatis. Ацерь три пель кпинкпеловатись фолгись, серратись, субтусь глапцись, флорибусь педункулатись, симплицибусь, конфертимь аггрегатись. Американскій жлень съ трехъ лапочнымъ листемъ и красножелным в цввтом в. Сей род в кленовых в деревьев в им вет в тонки пвнь, красноватую, къ верьку желпъющую кору, маленькіе на три, или на пять лапочекъ разръзанные, съ верьху на одной половинъ чернозеленве нежели на другой, а съ низу лазоревые листья съ глубокими връзами, и изъ седми на подобіе звъздки расположенных в листочков в составленные цв вты, внутри желтаго а по концамъ красноватаго цевша, въ срединъ коихъ оказывается такогожъ цвъну кружекъ съ седмью промежду цв в точными листочками наружу выхслящими желшыми гвоздочками. Оные цвышы ушверждающся на корошеньких в черешках в, растуть по нёскольку вмёсть и когда сжимаюшся, то съ наружи имъють бавдно красный цвъть. Съмянодержаниельницы не столь велики, какъ у прочихъ, и заключаюшь вр себр по одному пяши угольному и буреющаго цввта свиячку. По Гречески офечθαμνος 'Αμεςικανός έντρισι πόμμασι των φιλον κηκωμένων πυτρυνοκοκίνε τες ανθες; πο Η Επειμκи. Umericanischer Abornbaum mit röhtlichgelber Bluthe, und kleinen in drey theile gespaltenen Blattern; no Француски Erable d' Amerique à feuilles découpées en trois ou en cinq lobes, et à fleurs Jaunes rougeatres; no Umani. янски Acero dell'America con foglie tagliate in tre, e con fiori gialdi che trie supra il rosso; по Аглински the American Maple tree the upper part of the leav light grun, the under part filver colourd

ACERBAE, Auepse. CMompu Galla. Tanna. ACERIS GENVS OXYPHYLLVM, Fafc. edente Schmidelio P. 15. T. 7. N. 17. Aug. рись генусь оксифиллумь. Смотри Асег minus, АцерЪ минусЪ-

ACERIS SPECIES MONTANA, vulgo Lyabaum Geln. Hort. 289. b. Auepuch cneціесь монтана. Смотри Асег тіпия, АцерЪ минусЪ.

ACERIS SPECIES TERTIA, Auepuch стециесь терціа. Смотри Sambucus, СамбукусЪ.

ACERVUS, Auepuych. Смотри Lupiпиз, Лупинусъ.

ACETABULUM ALTERUM, Auemaвулумь алтерумь. Смощри Fabaria, фаба-

ACETABULUM MARINUM MINUS, Pit. Tournef. Ацетабулумь маринумь munycb. Androfaces chamaconchæ innafcens vel minor, C. R. Vimbilicus marinus Monspelienfis. Cam. Ep. Морской пупь или многолистиенный Морской пуполистникь есть морское произрасштніе растущее по большой части на раковинах в на днв моря около Магалоніи, и состоящее из в наскольких в тоненькихъ, а болъе на волокны похожихъ спебельков в поддерживающих в множество маленьких в листочков в пепельнаго цв впа и солоноватаго вкуса: вторый родъ сего раствнія называется.

ACETABVLVM MARINVM PROCE-RIVS. Pit. Tournef. Ацетабулумь маринумь процеріусь. Androsaces, Math. Andro. faces petræ innascens, vel major. C. B. BONAшій морскій пуполистникь, расшет. В въморяхъ на дикихъ каменьяхъ и различествуеть от перваго въ томъ, чно листья его болве и ширве. Оба рода содержать въ себъ много соли, отворяють, гонять мочу, а употребленные в деконтах в или в в

40

бъломЪ виноградномЪ винъ лиспъя полезны оть водяной бользни. Ацетабулумь есть Латинское, от слова ацетумь, уксусь, происходящее имя, потому что листья морскаго сего растънія, нъсколько видомъ полобны маленькимъ шты кувшинчикамъ. которые въ старину у Римлянъ упопреблялись для кранвнія въ нихъ уксуса. Госполинъ Линией полагаенъ ихъ въ V. Классъ растъній, имъющих вы своемы цвыть пять мущинокъ и одну женочку. (Pentandria monogynia) а ГосподинЪ Турнефортъ въ XVII. классь въ III. родъ морскихъ и ръчныхъ травЪ, им вющих в обыкновенно неизв встный цвъть и плодъ. По Гречески Фаласония онфалоз; по Нъменки Ссе Угаве. «Rraut; по Француски Nombril ou Ecuelles de mer; по Ишаліански Acetabulo; по Аглински Sea Pennywort.

ACETABULUM MAJUS, Allemabyaymb маюсь. Смотри Umbilicus Veneris, Умбили-

кусь Венерисъ.

ACETOSA, Auemosa. Acetosa pratenfis. C. B. Pit. Tournet. Acetofa major vulgatissima. Schiw. Acetosa vulgaris, Oxalis Offic. Lapathum acetosum Linnei. Rumex proprie Hermolao XXIII Щапель, есть не высокорастущая, повсюду извёстная и въ пищу употребляемая трава; она растеть по полямъ и на лугахъ, зеленвешъ во все льто. приносить въ Іюль и Аргусть мъсяцахъ изобильныя стмяна, и краситешь около осени. Стебель у молодаго щавеля низенькій вышиною въ три вершка, а пущаясь въ Іюлъ мвсяцв вь свмяна, возвышается около аршина и выше; листья продолговатые, къ конпу острые, гладкіе, копьевидиме, им'ьють шемно зеленый цввшв и кислый вкусв и расшилающся почши по землъ. Изъ вертины стебля вырастають маленькіе, почти вь два ряда потри вмвств расположенные, внутри нъсколько гвоздковъ имъющіе, и всъ шестилистною чашечкою поддерживающіеся желнованые съ краснымъ смъщанные цвъ. точки, послъ коихъ оказываются треугольныя красноващыя и въ гивздахъ заключающіяся свимчки. Корень деревенвень, длинный, желшый и горькаго вкуса. Всв роды щавеля содержать въ севъ много существенной соли. Лиспъя, корень, который выкапыпывающь весною, и съмя укръпляющь серяце, возбуждають аппетить, противятся гнили, утоляють жажду и полезны оть печеночных в бол взней, и желчных в, шакже заразишельных в лихорадокв, вв кошорых в употревляють съ пользою вареное изъ щавельнаго и Скорзонернаго (права называемая змвевь объвдь) корней пишье, подслащенное барбариснымъ сокомъ. Въ винъ вареная и наподобіе пластыря приложенная права прогоняеть бородавки и разбиваеть желваки. Разшершые и болящему горячкою на пулсъ привязанные листья унимають жаръ. Съмя и съ оленьимъ рогомъ въ водъ вареный корень остонавливають кровавый понось. Траву варять въ молокъ и пьють сдълавшуюся изъ онаго сыворошку, пошому что очень кровочистительна. Правель употребляють также вы похлабкахы, ставять его изготовленной на подобіе теста или кашки (Legume) и Бдять сырой, когда еще молодъ. Въ аптекахъ имъепіся права. свия, корень, перегонная вода, сокв изъ листьевь употребляемый оть цынготных в бол взней, и двлають соль. Ацетоза есть Лашинское, от в слова ацетум в уксусв, происходящее имя, попюму что щавель почти стольже кисель, какь и уксусь. Господинь Линней полагаеть сію таву въ VI. классь правь имьющихь вы цвыть своемы шесть мужчинокЪ и шри женочки (Hexandria Trigynia) а господинь Турнефоршь вы XV. Классь въ І родъ правъ, у коихъ въ цвътъ находящійся пестикЪ превращается вЪ пленчатое съмя. По гречески "Іξαλις; у Галена όξυλαπαθον; a y Δίοςκορα λαπαθον; πο Aрабски у Серапія Нитавть, а у прочих в Авhamad, также Afered и Azadar; по Нъмецки Sauerampfer, Wiesen nan Gemeiner Sauers ame

ampfer; по Француски Grande ofeille, surelle. Vinette; по Италіански Acetola; по Аглин-CKM Common Sorrel.

ACETOSA ARVENSIS LANCEOLATA-Ацетоза ариененсь ланцеолата. Сомири, Acetofa minor, Аценоза минорЪ.

ACETOSA CRISPA, Ayemosa xpucпа. Смотри Acetofa minor, Ацетоза миноръ. ACETOSA HISPANICA, Anemosa Гиспаника. и

ACETOSA HORTENSIS, Auemosa гортенсиев. Смотри Acetola Romana го-

tundifolia, Ацетоза Романа рошундифоліа. ACETOSA LANCEOLATA, Auemosa ланцеолата, Смотри Acerola minor, Ацетоза миноръ.

ACETOSA MAIOR. CAST. Ayemosa

маюрь, Смотри Асетова, Ацетоза:

ACETOSA MINOR. Cast. Aijemo.3a минорь. Acetola syluestris omnium minima Renod. Acetola aruensis lanceolata C. B. Pit. Tournesort, Luiula, Ind. Med. 111. Lapatio. lum Dod. Oxalis minima. Trag. Kucauna. Bas раній щанель или дихій малый щанель, расшеть на поляхь и песчаных в мъ шахъ. Онъ меньше и кислъе всъхъ родовъ щавеля, им веть узкіе, кудреватые и ост оконечные копьецообразные лисшочки, маленькіе на подобіе кисточекъ растущіе цавточки и кажешся на землъ совсъмъ краснымъ, особливо во время созрвлости его свмянь. Свойспвомь своимь вы Медицинь сходспвуеть сь простымь, сь которымь онь и вь одинь классь полагается. Бараньимъ прозванъ онъ потому, что овцы охотно его Бдять. По Гречески обахіс мінра; по Нъмецки flein blats terigter Sauerampfer, Feld und Schaafampfer? по Француски Petite Oseille или Oseille sauvage; по Ишаліански Acetola angulta, по Аглински Sheeps forrel or Field Sorrel.

ACETOSA OVINA, Ацетова опина. Смотри Асетова тіпот, Ацетоза миноръ.

ACETOSA PRIMA, Auemosa при-Ma. n

ACETOSA PRATENSIS, Auemosa пратензись. Смотри Асетова, Аценоза.

ACETOSA ROMANA ROTVNDIFO. LIA. Offic. Munt. Herb. Brit. 224. Auemoза Романа pomyнquoonia: Acetola rotundifolia hortensis. C. B. Pit. Tournes. Acetosa. fabaudica Schw. 214. Oxalis Franca feu Romana et veterum. Dod. unn folio rotundiore repens. Круглолиственный садоный щапель, свется вы садахы и имветь длинные вь шесть вершковь вышиною вырастающіє; тонкіе и приземистые стебли, которые производять бабдно зеленые, почини соесъмъ круглые, сочные и вершиною оканчивающіеся: листья: цвыты и сымяна: такінжь какь у вышеупомянупыхь, а кореньтонкій и косматый. Он в сильные противод виствуеть гнили; но въ прочемъ въ свойствъ: и двиствіи своемь сь нимь сходствуеть. Господа Линней и Турнефорть полагають егоз сь прошымь вь одинь классь: По Гречес-SUNTARA GAROIS NURLOGIDEOT; no HEMERICA Dida misber: Man Garten-Umpfer mit runden Blattern. По Француски Ofeille ronde ou franche :: По Италіански Acetosa ritonda del giardino, по Аглински Garden or French Sorrel!

ACETOSA: ROTVNDIFOLIA, Ayemoза ротундифоліа: Смотри Acetola Romana, Аценюза Романа:

ACETOSA SABAVDICA , Auemosa: савандика. и

ACETOSA SATIVA, Auemosa camu-HQ. H

ACETOSA SCVTATA, Auemosa cxymama. Смотри Acetola Romana, Аценюза: Романа.

ACETOSA: TVBEROSA RADICE, Aueтоза тувероза радице. Смотри Асетова: rotundifolia, Ацетоза ротундифоліа.

ACETOSELLA, Aijemo senna! Cmompu

Oxytriphillon, Окситрифиллонь.

ACHANACA Thevet. Lugd. Axanaxa. есть Индійская вы Азіатском в Королевствь Мели растущая трава, им вющая больше,

темнозеленые, капустным в подобные, но же столь толстые, и жескіе листья, которые покрывають короткій, пюлсный и подв листьями невидный стебель; поддерживаюлцій желтоватый, овальный и куриному яйцу подобный плодь, называемый по ихъ нарвчію Алфардь или Лефахв, имя свойственное сему плоду съ нъкоторымъ родомъ змви . одного св нимъ иввта. Листыя и плодъ съ пользою могушъ употребляемы быть въ декоктахъ отъ воспы, на подобіе Бака тповаго дерева. По Гречески А хачаха аблатию фите»; по Нъмецки 21cha. паса, eine Unrtiche Pflanze; по Француски Achanaca plante des Indes; по Ишаліански Achanaca pianta dell' Asia; по Аглински Achanaca, the Indian Plants.

ACHANE, Axane, Лашть трава мнв неизвъсшна.

ACHAR, Axapb, есть Этипетское, смолистое, иглами обсаженное и стручья приносящее деревцо; роду волчьяго молока (Tithymalus) по Гречечки Ахар хоргос The A'syuttos; no Homenku Alchar eine Egyps lische Etaude по Француски Achar, arbrisseau d'Egypte: no Итахіански Achar, picciol' Albero d'Egypto; по Атлински Achar, an Egyptian Shrub.

ACHARON, Ахаронь, Смотри Соп-

folida maior, Консолида мајоръ.

ACHAVON ARBAT, Axanonb Apвать. Смотпри Іасовава, Якобеа.

ACHECH, Axexb. CMompu Absinthium, АбсиншіумЪ.

ACHEDOTA, Axegoma. Смотри Lunaria, Лунаріа.

ACHENCHARACHA, Axenxapaxa.

Смотри Pyrethrum, ПиретрумЪ.

ACHET, Axemb. Cmompu Absinthium, АбсинтіумЪ.

ACHIA SPICA, Axia спика. Смотри Spica Celtica, Спика Целпика.

ACHILLEA, Axunnea. Cmompu Millesolium, МиллефоліумЪ.

ACHILLEA Foliis pinnatis, foliolis lanceolatis, incisis, serratis, subtus lanigeris Linn. Ахиппеа фолінсь пиннатись, инцизись серратись, субтусь панигерись. Дикая Греча, имъющая зубчатые листья и копьепообразные настченные, пиль подобные и съ низу косматые листочки. По Гречески μυριοφυλλον άγρον τριχοειδές; πο Η ΕΜΕΝΚΗ Achillana, oder wiide Schaafgarbe mit wolligten eingeschnittenen Blattern; по Француски Achillée ou Millefeuille sauvage à feuilles profondement découpées et laineules; no Umaміански Achillea con foglie profuode tagliate: по Аглински Achillis with hairi or downy leaves.

ACHILLIA MONTANA ARTHEMISIAE TENVIFOLIÆ FACIE, Axunnea монтана Артемізіе тенуифоліе фаціе. Смотри Millefolium МиллефоліумЪ.

ACHILLEA MONTANA. Ludg. Tab. Ахиплеа монтана. Сметри Гасовжа Авріпа, Якобеа Алпина.

ACHILLEA NARBONENSIS, Axunnea Нарвоненсись. Смотри Millefolium МиллефоvMb.

ACHILLEA ODORATA, Axunnea ogoрата. Смотри Millefolium nobile, МиллефоліумЪ нобиле.

ACHILLEA PTARMICA, Axunnea Птармика. Смотри Ptarmica, Птармика.

ACHILLEA SIDERITIS, Axunnea Cuдеритись. Смотри Millefolium МиллефоліумЪ.

ACHILLEA TOMENTOSA, Axunnea томентоза. Смотри путешестве Господина Префессора Гмелина по разным в провінціямъ Россіи. Желтая дикая Греча, растетъ вь открытыхь степякь, также и покрышых в твные и ошв воды не далеко онистоящих в м встахв, какв около Самары и на гипсовых в ходмах в позади Илецкой крвпости. Она имветь косматый корень. Спебель ея съ низу до середины красенъ, по томъ зеленъ, нечувствительно космать, и по нъкоторымъ мъстамъ извишьий

вишый. Листья больше и малые такъ какъ у двузубчатаго пысячелистника, и имвють съ низу серебряный цвъшъ. Маленькіе состоять изъ пями, шести и семи паръ съ однимъ не парнымъ лиспомъ; а между зубьями находятся еще как в цвльные так в и зазубренные одинакіе зубчики. Большіе лисшья или поперемънно разны, одинъ другому противъ положены, иногда по три и четыре другь подав другато: стебель кончится на подобіе кисти. Лучевые цевыки прямые и бвлые. Запахв оной піравы ниветь много сходства св запакомъ ромашки (Chamemaelum, По Нъмецки die wollige Achillana mil Silverfarbenen Blats tern; по Француски Achillée cottoneuse à feuilles avgentées; по Италіански Achillea con foglie argentate; по Аглински Achillis with filver colourd downy leaws; по Гречески ииβιοφυλλον άγρυον φύλοις άρχυςοείδέση

ACHILLEA TOMENTOSA, floribus in Fastigio caulis corymbiseris, radio luteo Gmelin. Ахиппеа томентова фпоривусь инь фастигіо канпись коримвиферись, радіо лутео. Желтая дикая Греча расшеть сь упомянутою на однихъ мъстахъ. Она имъеть мяхкій, одинакій и бълою, какъ будто шерстью обростий стебель, и поперемьно разряженные листья съ продолговатыми вдвое или втрое зазубренными зубнами. По Гречески мидюфиллом хургом хитримом тріховібять. По Нъмецки Die wollige gelbe Achilloma; по Француски Achillea bombagina gialda; по Аглински yallois downi Achillis.

ACHILLEA VULGARIS FLORE ALBO,

Ахиплеа пулгарись флоре алью. и АСНИLLЕГА, Ахиплета, и

ACHILLEVM, Axunneymb. w

ACHILLIVM, Ахилліумь. Смотри Millefolium, миллефоліумь.

ACHIMORON, Arumopont. Смотри Hermodactylus, Гермодактились.

ACHIMILLA, Axumunna. Cmompu Al-

ACHIOTL, Axnomab. Cmompu Urucu, Ypyky.

ACHIRATAHA, Ахиратага. Смотри Ругентит, Пиретрумъ.

ACHIREHA, Axupera. Toxb;

ACHORAB, Axopash, Cmompu Allium; Aniymb.

ACHORCHARACHA, Ахорхараха. Смотри Ругентит, Пиретрумъ.

ACHVBAN, Axysanb. Cmompu Matri-caria, Mampukapia.

ACHVMEN, Axymenb. Cmompu lris Il-

lirica, Ирисъ Иллирика.

ACHVPALLA, Ахупалла есть Американское, въ королевствъ Перу растущее и на алое или сабуръ похожее растъніе. По Гречески Ахипалла, фитом тів терв; по Нъмецки; Усфирана, еіпе Дегивіапісфев Сетафі; по Француски Achupalla, plante du Perou; по Италіански Achupalla, pianta del Peru; по Аглински Achupalla a Peruvian plant.

ACHYLLEA, Axunnea. Cmompu Achil-

lea, Ахиллеа.

ACIA, Auja. Смотри Sacharum, Са-

ACIBION, Auutionb. Смотри Chelido-

nium majus, Хелидоніумъ маюсь.

ACICVLA, Ацикула. Смотри Scandix, Скандиксь.

ACIDÆ PALMAE, Ациде палме. Смотри Tamarindus, тамариндусъ.

ACINARIA MARINA, Aninapia ma-

рина. Смотри Sargazo, Саргазо.

ACINARIA PALVSTRIS, Ацінаріа папустрись. Смотри Охісоссит, Оксикоккумъ.

ACINOS, Anunoch. Cmompu Clinopo-

dium, КлиноподіумЪ.

ACMELLA OFFIC. Armena. Akmella, Ahamella, Herm. Mus. Zeyl. 17. Chryfanthemum bidens Zeylanicum Acmella dictum. Breyn. Differt. Bot. 12. Bidens Zeylanicum, flore luteo, lamii folio, Acmella dictum. Eiusd. Cannabina aut bidens urticae folio Indi-

ca lithontriptica. D. Hotton, Act. Philos. Lond. N. 257. p. 365. Senecio Indiae Orientalis Ocymi maioris folio profunde crenato. Pluk. Almag. Ceratocephalus Ballotes foliis Acmella dictus. Act. Reg. Par. it. 1720. pag. 326. Acmellae Verbefinae foliis oppositis lanceolatoovatis petiolatis, serratis pedunculis vnifloris dichotomia caulis. Linn. Акмелла есть Азіапіская на островъ Цейланъ въ множествъ растущая и на траву собачками (Bidens) называемую похожая права, которой листья двузубчащые и съмяна привозящся въ Европу и употребляются въ Медицинъ. Листья возбуждають поть, унимають боли, разжижають мокроты, раздъляють затвердвлыя опухоли, и густую вв ночкахв и пузырв засвещую мокроту, и разбивають и гонянь камень и употребляются въ декокшахь; но примъчашь надлежинь, что настоянные никогда без в прим всу солошковаго корня или сыропа из в просвирных в корней Althaea (Алтеа.) давать не должно. Съмя очень полезно от колики, колотья въ боку и от лихорадокъ. По Гречески акиелла, Zeidavinos хортоs; по Нъмецки Uchmella или iedianisches Sarn-Rraut; по Француски Acmel. la plante de Zeilans; по Италіански Acmella pianta dell' Isola Ceilan, по Аглински Асmella, Athmella, aud Admella plant of Zeilan.

ACODIAL, Anogianh. Cmompu Baccae

Іппірегі, Бакце юнипери.

ACOIBAR, Arontaph. CMcmpu Corian-

drum, КоріандрумЪ.

ACONITIS COGNATA, Aконитись когната. Смощри Апетопе, Анемоне.

ACONITVM ANTHORA, Аконитумь Антора. Смотри Anthora, Антора.

ACONITVM ALTERVM, Аконитумь Алтерумь. Смотри Napellus, Напеллусь.

ACONITVM BACCIFERVM, Аконитумь вакциферумь. Смощри Christophoriana, христофоріана.

ACONITVM BATRACHOIDES, Аконитумь ватрахоідесь. Смотри Ranunculus, Ратункулусь. ACONITVM CAERVLEVM, Аконитумь церупеумь. Смотри Napellus, Напеллусь.

AGONITVM CYNOCTONVM, Аконитумь циноктонумь. Смотри Aconitum lycoctonum Аконимумъ Ликоктонумъ.

ACONITVM HIEMALE, Аконитумь

тіемале. ч

ACONITVM LVTEVM, Аконитумь лутеумь. Смотри Aconitum Lycoctonum, Аконитумь Ликоктонумь.

ACONITVM LYCOCTONVM, ALBIS PALLIDISQUE FLORIBUS, Аконитумь Альнов паплидиские флоривусь. Смотри Асопітит Lycocronum luteum, Аконитумъ Ликоктонумъ лутеумъ.

GENVS, Akohumymb Aukokmohymb aniygb remycb. Cmompu Panax, Панаксъ.

AGONITVM LYCOCTONVM COERV-LEVM, Аконитумь Ликоктонумь церулеумь. Сметри Napellus, Напеллусь.

ACONITYM LYCOCTONYM LYTE-UM С. В. Аконитумь Ликоктонумь луmeymb. Aconitum Pyrenaicum. Linnei Aconitum foliis Platani, flore luteo pallescente. Pit. Tournef. Luparia lutea. Frag. Царь шрава, Тобдъ или Христофорова трава, а по переводу Волчей корень съ бъловащымъ невтомь. растеть въ буеракахъ, на гориспых в мыстахь, и вы великомы множествы въ Сибири въ лъсахъ около Крестецка; на мокрых в мёстах в за Уфою и в в лёсистых в долинах в около Зм виногорской кр впости, цвъщеть въ Маів и Іюнь мъсяцахъ, имъетъ пропивный запахЪ и показывается весною первая. Она имветь маленькій волокнистый корешокЪ, изЪ котораго вырастаеть тоненькій, не много нагнутый, круглый и на многія в точки раздыленный стебель вв двенатцать вершковь вышиною, окружающійся широкими, кругловашыми, вдоль съ низу на нъсколько частей раздъленными (Fol palmatum) и тоненькими волосками

сками покрышыми лиспьями и производящій из вершины своей бледножелтые, из в пяти неравных в листочков в состоящіе цвБшы; послъ коихъ оказываются, пленчатыя и видъ шишечекъ имъющія съмянодержашельницы, заключающія въ себь черныя, углованыя и кЪ поверьхности своей, проходящими чрезъ нихъ жилками уменьшающіяся съмяна. Сія трава содержить въ себъ много остропы и Бакости и для ядовишости своей внутренно не употребляется, но наружно дълають изв нее мази и припарки от в коросты и для прогнанія вшей. Охопники употребляють ее для оправленія волковъ, лисицъ и другихъ вредныхъ звърей. Мокшанцы мъшають ее съ вахтою, (Menyanthes, Меніантесь) и припаривають тв мъста, которыя рдвють, а Башкирцы почитають ее способною унять стрыльбу въ головъ (Смотри Господина Профессора Палласа пушешествіе по разнымЪ провинціямЪ Россіи). Аконишумъ есть Лашинское и какъ сказывають от Аконы Гераклиской гавани произшедшее имя, потому что она въ древнія времяна расла тамъ изобильно; а ЛикоктонумЪ происходитЪ отъ ГреческихЪ словъ Линос, волкъ н хтейш умерщвляю, поелику сія трава умеріцвляєть волковь и протчих в звърей. Господин в Линней полагаеть ее въ XIII. классь раствий, имвющих в двадцать и бол ве мужчинок в съ тремя женочками въ одномъ цвѣтъ, (Роlyandria Trigynia) а Господинъ Турнефорть въ XI. классъ во. II. рый родъ травъ съ неправильнымъ многолисшнымъ цввтомъ, котораго пестикъ превращается въ многотивздную съмянодержащельницу. По Гречески "Акочноч; по Арабски Chanach, Adip, или Adib; по Мокшански ТаргесЪ-шише; по Башкирски Аюкусьше; по Нѣмецки УВо1 6: Burg mit weißlichten Blumen; no Pранцуски Pattelovine ou Etrangle-loup, Aconit, Tue-loup; по Ишаліански Aconito; по Arлински; The carlier whitish Woolfs-bane.

Yacma I.

ACONITYM LYCOCTONYM TER-TIVM, Аконитумь ликоктонумь терціумь. Смотри Ranunculus Ранункулусь.

ACONITVM NAPELLVS, AKOHUMYMB напеллусь. Смотри Napellus, Напеллусъ.

ACONITYM PARDALIANCHES, Axo. нитумь Пардаліанхесь. Смотри Doroniсит, Дороникумъ и Herba Paris, Герба ПарисЪ.

ACONITYM PARDALIANCHES AL-TERVM, Аконитумь Пардаліанхесь ал-

терумь. Смотри Тhora, Тора.

ACONITYM PARDALIANCHES PLINII ЕТ ТНЕОРНК. Аконитумь Пардаліанхесь Плиніи и Теофрасти. Смотри Асоnitum, АконишумЪ.

ACONITVM PONTICVM, AKOHUтумь Понтикумь. Смотри Aconitum Lycoctonum, АконишумЪ ЛикокшонумЪ.

ACONITVM PRIMVM, Aконитумь примумь. Смотри Doronicum, Дороникумъ.

ACONITYM PRIMVM MINVS, AKOинтумь примумь минусь. Смотри Thora, Topa.

ACONITVM QVARTVM. AKOHUтумь кпартумь. Смотри Aconitum, Аконитумь.

ACONITVM RACEMOSVM, AKOHUтумь рацемозумь. Смотри Christophoriana жристюфоріана.

ACONITVM SALVTIFERVM, AKOнитумь салутиферумь. Смотри Anthoга, Антора.

ACONITVM TERTIVM, AKOHUMYMB терціумь. Смотри Ranunculus, Ранункулусь.

ACOPA MORIS, AKOTTA MOPUCE. CMOтри Trifolium aquaticum, Трифоліумъ аквашикумЪ.

ACOPON, Акопонь. Смотри Anagyris. АнагирисЪ.

ACORNA, Aкорна. Смотри Acarna, Акарна.

ACORVM, Aкорумь. Смотри Acorus, АкорусЪ.

ACORVM LEGITIMVM, Anopymb петитимумь. Смотри Acorus verus, Акорусь верусь.

ACORVM SYLVATICVM, AKODYMB силпатикумь. Смопіри Millefolium, Милле-

фоліумЪ.

51

ACORVS ADVLTERINVS, C. B. Axopycb agyamepunycb. Gladiolus luteis liliis. Fuch. Pseudo iris; Pseudo acorus. Kocaтикь, Татарская трапа, Сабельникь меньшій, есть родь желпюцвітнаго косатика, растущаго въ озерахъ, по болошамъ и на влажных в мъстах и цвътущаго в в Маїв мвсяць. Она имвень шишкованый корень, длинные стебли больше круглыя листья и желтый Лилев подобный цввтв, который св Захожденіемь солнца сжимается и сокрывается подъ водою, а при возхожденіи онаго изъ подъ воды показывается и раскрывается. Упомянутый цвёть приносишь черноватыя лоснящіяся съмяна въ шелухв. Корень сушить, разжижаеть, укрвпляеть, разбиваеть и унимаеть понось, мъсячное и бъли. Въ спарину беременныя женщины нашивали его сушеный по суевърію на шев одинь, или св павлиными перьями, какЪ предохранишельное средсшво, шакже и отъ кроваваго поноса. По Гречески Α΄ πορος Ισιδής, "Τρις ένεδρα, ησή Ψευδοίρις; πο Нъмецки gelb Schwerichwurtz, Drachenwurtz, gelbe Lilie; по Француски le faux Acorus; ло Италіански Acoro adulterino; по Аглински Baffard Acorus, Water Flag, Water Flowerdeluce, Segg and Seeg.

ACORVS ASIATICVS Offic. AKOPYCH Asiamuxycb. Acorus verus fiue Calamus Aromaticus Asiaticus radice tenuiore Herm. Cal. Hort. Lugd. Bat. 9. C. Commel. Flor Mal. Boerh. Ind. A Il. 167. Capicatinga aliis jacarecatinga Pis. 241. Calamus Aromaticus Garzae. Bocmoyный Ирь есть благовонный, видомъ и свойствомъ съ нашимъ Иромъ сход твующій, и какъ въ восточной, такъ и западной Индіи растущій корень. По Гречески "Акосос

А отатихоз; по Малабарски Ва Эмбу; на островъ Цеиланъ Вацабу и Вацумъ; въ Бразиліи Капишашинга и Якарекашинга: по Нъмецки Usiatischer Kalmus; по Француски Асоrus Asiatique; по Италіански Acoro dell' Asia: по Аглински Asiatick Sweet - Flag.

ACORVS COMMVNIS, Aropycb rom-

мунись, и

ACORVS FALSVS, Anopych pancych u ACORVS LVTEVS FALSVS, Axoрусь лутеусь фалсусь, и

ACORVS NOSTRAS, Anopycb Hoc-

трась; и

ACORVS PALVSTRIS, Axopycb naпистрись. Смотри Acorus adulterinus, Ако-

русь адулперинусь.

ACORVS VERVS SIVE CALAMVS AROMATICUS OFFICINARUM, Anopych nepych. Typha aromatica claua rugofa. Histor. Oxon iii 246. Ирь, или годяная Райская трава, есть родъ осоки, растущей въ прудахь, близь береговь и на влажныхь мъстахъ въ полтора и два аршина вышиною. Она цвётеть вы Іюль мёсяць, имбеть длинные, узкіе, Ирисовым в подобные, оба края острые и нѣсколько возвышенную середину имъющіе лиспья, на которыхъ съ боку, такъ какъ и на спебляхъ вырастаюшь узорчащые, твердые и на Еловыя шишки похожіє съмянные початки о трехь гивзлахЪ. Цвъшъ на ней не примъшный и сосшвлень изъ шесши маленькихь голыхь листочковъ. Корень ея съ наружи красновать, внушри бѣлЪ, шелщиною въ палецъ, легокъ, составлень изъ множества кольнцовь, покрыть волокнами и имветь произитель. ный и нарочито пріятный запахъ. Онъ содержишь вь себъ много масла и лешучей соли. (fal volatile) сушить, укръпляеть и грвешь желудокь, раздвляешь дурныя мокропы, умерщваяеть глисты, разжижаеть, возбуждаеть аппетить, помогаеть варенію оставших в в желулк в пищв, разгоняеть выпры, гонить мочу, унимаеть колошье

лотье въ боку, поспъществуеть теченію остановленной мъсячной крови, и полезенъ оть судороги, фрянокъ и запоровъ въ селезенив. Въ Сситябръ збирають и варять его въ сахаръ для укръпленія желудка и груди и отв болей вв почкв и селезенкв. Также двлаюшь изв него водку, вв кошоромъ случав берушъ на фунть сего корня, полфунта Анису и померанцовой корки; а въ Нъменкой землъ на при чепверти сущенаго и мълко истолченнаго корня беруть столько же солотковаго дерева и смъшавъ съ бълымъ виннымъ камнемъ и съ сахаромъ, гонять водку. Здёсь растеть онъ ръдко, а болъе сажають его. Въ Апшекахъ им вется сущеный и въ сахаръ вареный корень, масло изъ него, эссенція, сыропъ и ЭлектуаріумЪ діакори или вЪ сахарѣ густо вареный корень, съ сладкимъ миндалемъ, мушкашнымъ оръхомъ, инбиремъ и чернымъ перцомЪ. ГосподинЪ Линней полагаетъ Иръ въ VI классъ расшъній, у коихъ шесть мужчинокъ и одна женочка находятся въ цвътъ вмЪстъ (Hexandria Monogynia) по Гречески А'подос, апрос; по Нъмецки Сания или Ucfer: wurß; по Француски Veritable Acorus; по Италіански Acoro; по Аглински The true fweet smeling Flag, or true Acorus; no Apa6ски Vage, Ugi, также Algeorascem, Oigi.

ACORVS VULGO, Akopych пулго. Смотри Acorus adulterinus, Акорусъ адул-

теринусъ.

ACRIFOLIVM, Anpuponiymb. CMOтри Aquifolium, АквифоліумЪ.

ACROCORION PLINII, AKPOKOPIOHB Плиніи. Смотри Narcissis, Нарциссусь.

ACROSPILVM, AKPOCTURYMB. CMOтри Aegilops, ЭгилопсЪ.

ACROSPILVS, AKPOCTURYCO. CMOTTON Avena, авена.

ACROSTICHVM, Axpocmuxymb. Cmoтри Holostium, Голостіумь.

ACSVO, Ax.3yo. Смотри Corallium rubrum, КоралліумЪ рубрумЪ.

ACTAEA, Armea u

ACTAEA SPICATA, Armea спиката. Смотри Christophoriana, Христофоріана. ACTE, Arme. CMompu Sambucus, CamбукусЪ.

ACTINEN, Aктинень. Смотри Napus, Hanycb.

ACTIS, Armuch. Cmompu Sambucus, СамбукусЪ.

ACTIS TERRENA, Axmuch meppena: Смотпри Ebulus, ЭбулюсЪ.

ACTIVS FLOS, Axuiyeb procb. CMOтри Sambucus, СамбукусЪ.

ACTON HEMERON, ARMOND TEMEронь. Смотри Sambucus, Самбукусъ.

ACTV, Army. CMompu Violaria, Bioларіа.

ACTVO, Актуо. Смотри Corallium rubrum, Коралліумь рубрумь.

ACVLA, Акула. Смотри Acicula, Аци. кула.

ACVLEATA, Акулеата. Смотри Flos Adonis, Флосъ Адонисъ.

ACVS MOSCHATA, Axych mocxama u ACVS PASTORIS, Axycb nacmopucb. Смотри Geranium moschatum, ГераніумЪ мосхашумЪ.

ACVS PASTORIS VULGARIS, Axycb пасториев пулгариев. Смотри Chaerefolium aculeatum. ХерефоліумЪ акулеатумЪ.

ACVTELLA, Акутелла. Смощри Опоnis, ОнонисЪ.

ACVTIA, Акуціа. Смотри Scandix, Скандиксъ.

ACIDOTON, Ацидотонь. Жилинець права.

ACINOS, Anunoch. u

ACINVS SYLVESTRIS, Auunych curпестрись. Смотри Clinopodium, Клиноподі-VMb.

ADABES, Agarech. Смотри Moschata, мосхата.

> ADACHE, Agaze. ? Смотри ADAES, Agecb. \ Mauncb.

ADAHES, Agarecb. Смотри Schoenan-thum, Схенантумъ.

ADALHVB, Aganty bb и

ADALHVBVB, Agantysysb. Смотри Mercurialis, Меркуріались.

ADAM, Agamb. Смотри Asphodelus,

АсфоделусЪ.

ADAMANTA, Адаманта. Смотри Mandragora, Мандрагора.

ADAMANTIS, Agamanmuch n

ADAMENON, Адаменонь. Смотри Hyosciamus, Гіосціамусь.

ADAMI POMVM, Адами помумь, Смотри Pomum Adami, Помумъ Адами.

ADANALEFARA, Аданалефара. Смотри Auricula muris, Аврикула мурисъ.

ADARASCA, Адараска. Смотри Helleborus albus, Геллеборусъ албусъ.

ADARCA, Адарка. Смощри Calamus

aromaticus, Kanamych apomaniukych.

ADELBRE, Agenepe. Chompu Satyrion, Camupionb.

ADELCEM, Agenuemb. Cmompu Allium, Anniymb.

ADERA, Адера. Смотри Asphodelus, Асфоделусь.

ADHATODA, Agramoga. Смощри Nux

Malabarica, НуксЪ Малабарика.

ADHEBER, Agreseph. Смотри ADHECHARIVM, Agrexapiymb и

ADHEHER, Agrereph. Смотри Schoenanthum, Схенаншумъ

ADHIL, Agrunb. Cmompu Euphragia,

Эвфрагіа.

ADIANTHVM ALBVM, Agiaнтумь алгумь. Смотри Ruta muraria, Рута мураріа.

ADIANTHVM ALBVM PLINII ET TERTIVM, Agiaнтумь альумь Плиніп еть терціумь. Смотри Adianthum vulgare. Адіантумь вулгаре.

ADIANTHVM AMERICANVM, Agiантумь Американумь. Смотри Adianthnm Canadenle, Адіанніумъ Канаденсе.

ADIANTHVM AVREVM Tab. Agianmymb anpeymb. Polytrichum aureum Offic. Muscus capillaris. Ger. 1371. Muscus capillaceus maior, pediculo et capitulo crassioribus. T. Inft. 550 Buxb. 219. Булапистый плаўнь. или Кокуликинь лень, есть маленькая травка роду мховъ, которая растеть въ льсахь, на гориспыхь и песчаныхь мъстахь, на пняхъ отъ старыхъ деревъ, и кучками на буграхЪ. Она имъешъ маленькіе желтые и приземистые стебельки въ два верьшка вышиною, которые усаждаются множествомЪ мошистых , перистых в и цъльных желто зеленых в листочков в, и производять на вершинъ своей вмъсто цвъта маленькія головочки или съмянные почашки золошаго цввта объ одномъ желтомъ свиячкв. Она содержить вь себъ нъсколько масла и соли, гонишь пошр и употребляется отв Плерезіи (колошья въ бокахъ или въ груди) въ которой бользни беруть горсть сущеной и истолченой сей травы и наливъ фунтъ горячей воды принимають по рюмкъ. Вареною изъ нея водою моють голову для прогнанія струповь, и чтобь расли волосы. Декоктъ изъ нее многіе употребляють отъ каменной бользни. ВЬ Апшекахъ имвешся сушеная и пучками связання трава съ упомянушыми головками, но рѣдко употребляется. Адіантумъ есть Греческое, отъ слова абіаіны мочу, произходящее имя, потому что сія трава, какЪбы ее ни мочили вЪ водъ, остается всегда суха, а авреумъ прозвана она по золошому цвёту ея головокЪ. ГосподинЪ Линней полагаетъ какЪ сію праву, такЪ и женской волосЪ Adianthum vulgare, Agianmymb вулгаре въ XXIV. классь тайнобрачных раствній (Cryptogamæ) а Господинь Турнефорть въ XVI. классь въ VII. родъ безцевшныхъ шравъ. По Гречески абалтол афиллол по Нъмецки Gulden Wiederthon Gulden Haar; Wein Ropflein; Wolfegerste; по Француски Регсе mousse; по Италіански Adianto aureo; по Аглински The greater Golden Maiden Hair.

ADIANTHVM CANADENSE, Agianmy mb. Kanagence vel Capillus Veneris Canadensis. Cod.

Med.

Med. IIII Adianthum Americanum Raji. Hist. Американскій Кустарный Женской Волось, растеть въ Америкъ, и различествуеть видомъ очень мало отъ женскаго простаго волоса, съ которымъ и однъ своиства имъеть; по Гречески йдіанто тя Канада; по Ньмецки Frauen-Saar aus Canada; по Француски Capillaire de Canada; по Италіански Adianto del Canada; по Аглински The Canada or American Maiden Hair.

мумь кандидумь. Смотри Ruta muraria.

Руша мураріа.

ADIANTHVM FLAVUM, Agiaнтумь флапумь. Смотри Adiantum aureum, Адіаннумь авреумь.

ADIANTHVM FOLIIS CORIANDRI, Agiaнтумь фолінсь коріандри. Смопіри Adianthum vulgare Адіантумь вулгаре.

ADIANTHVM FOLIIS LONGIORIBVS PVLVERVLENTIS PEDICVLO NIGRO, Agianmymb poninch nonriopusych nynue-pynenmuch педикуло нигро. Смотри Ruta muraria, Рута мураріа.

ADIANTHVM MAGNVM, Agianmymb

матнумь. и

ADIANTHVM MAS, Agiaнтунь мась. Смотри Adianthum. Адіантумъ вулгаре.

ADIANTHVM NIGRVM, Agianmymb

нигрумь. и

ADIANTHVM PVLCHERRIMVM, Agiантумь пулхерримумь. Смотри Adiant. hum vulgare, Адіантумъ вулгаре.

ADIANTHVM RVBRVM, Agiaнтумь ругрумь. Смотри Trichomanes, Трихоманесь.

ADIANTHVM SYRIACVM, Agianтумь Сиріакумь. Смотри Adianthum vul-

gare, АдіантумЪ вулгаре.

ADIANTHVM VULGARE, Agianmymb пулгаре. Adianthum. Matth. Fuch. Dod. Foliis coriandri. С В Pit. Tournef. Саpillus Veneris verus. Ger. Красные полоски или Женской полось, есть низенкая, въ стенныхъ расщелинахъ, на каменистыхъ и твнистых в мвстах в растущая трава роду Папорошниковъ, здёсь находяшь ее весьма рѣдко, чего ради и выписывають ее изЪ Нъмецкой земли для употребленія вЪ АптекахЪ. Она производитъ нъсколько тонкихЪ, черновашыхЪ, лосиящихся, и на въточки раздъленных в стеблей в пять вершковъ вышиною, копторые унизаны многими маленькими, одинъ прошивъ другаго на искось по спеблю сидящими, во всю зиму зеленъющими, нъжными, вокругъ зазубреными, душистыми и Кишнецовымъ видомЪ подобными (Coriandrum) листочками довольно пріяшнаго вкуса. Цвётовь на ней не бываешь, а вмъсто оныхъ съмянные початки, кои по примъчаніямъ Господина Турнефорта родятся на самой наружности листочковь, которые загибаясь оные покрывающь. Стмяна столь мълки, что ихъ только чрезъ микроскопъ примѣтить можно. Сія трава содержить вы себь много масла и малую часть соли и влажности разжижаеть, сушить, разбиваеть, нарываеть не много, чистить кровь, возбуждаеть слюну, гонить мъсячное и упопребляется въ декоктахъ отъ кашлю, одышки, желтухи, чахотки, водяной, каменной и грудной бользни и оть лихорадокъ. Лучшій родь сей шравы привозишся сюда изъ Моншпелліера Францускаго города. ВЪ АптекахЪ имъется права и сыропъ. По Гречески абвачточ; по Нъмецки Frauen oder Benusshaar; Wiederthon, Haarzopf; no Француски Capillaire или Adiante; по Ишаліански Adianto или Adiato; по Аглински True Maiden Hair.

ADIBEN, AQUEEND; II

ADIBVE, Agusye. Cmompu Satyrium. Camupiymb.

ADICE, Адице. Смощеи Vrtica major. Уршика мајоръ.

ADILIOS; Aguniocb. Смотри Sanguis Draconis, Сантвисъ Драконисъ.

ADILLVS, Agunnych. CMompu Scylla, Сцилла.

ADINCHARVTH, Agunxapymb. CMO. три Assa foetida, Асса фетида.

ADINTARI, Agunmapu. Смотри Sumach, Cymaxb.

ADIPSA, Agunca; и ADIPSAS, Aguncach; и

ADIPSVM, Aguncymb. Смотри Glyzyrrhiza, Глицирргиза.

ADIPSOS, Aguncoch. Cmompu Satyrium, СапиріумЪ.

ADMIRABILIS PERUVIANA, Agmuравились Перупіана. Смотри Mandragora Theophr. Мандрагора Тесфр.

ADMORSA, Agmopca. Смотри Succifa,

Сукциза.

ADONIS APPENINA, Agonuch Anneнина. Смотри Pseudo Helleborus niger, Псевдо Геллеборусь нигерь.

ADONIS FLORE CITRINO, Agonuch флоре цитрино. Смотри Anemone agrestis, Анемоне агресписъ.

ADONIS FLOS, Agonuch proch. CMO-

mpu Flos Adonis, Флосъ Адонисъ.

ADONIS HORTENSIS, Agonuch rop. тенсись. Смотри Anemone hortenfis, Анемоне торшенсисЪ.

ADONIS LVTEA, Agonuch nymea.

Смотри Flos Adonis, Флосъ Адонисъ.

ADONIS MATTH. SYLVESTRIS, FLO-RE PHOENICEO. Agonuch Mamm. силиестрись, флоре феницео. Смотри Апетопе agrestis, Анемоне агреспись.

ADONIS VERNA, Agonuch перна. Смотри Flos Adonis verna, Флосъ Адонисъ

верна.

ADONIVM CALEPINI, Agoniymb Kaпепини. Смопри Abrotanum Fæmina, Аброшанумъ фемина.

ADONIVM LVTEVM, Agoniymb nyтеумь. Смотри Flos Adonis, Флосъ Адощисъ.

ADOR, Agopb, n. ADOREVM, Agopeymb. Cmompu Zea, 3ea.

ADOXA MOSCHATELLINA, Agorca мосхателлина. Смотри Moschatellina Мосхашеллина.

ADRACHNE Theophrasti. Clus. hist. A. gpaxue. Adrachnes Bellonio. Adrachna Cretensium Hon. Belli. Arbutus solio non serrato. С. В. Pit, Tournef. Нестячокь или по переводу Земляничье Дерено съ цёльнымъ листомь, растеть вь южныхь странахь Россіи на гористых в мъстах в, и приносить вы годы два раза плоды. Оно покрыто гладкою, бълою, лоснящеюся и лътомъ оть суши разщеливающеюся корою, и имбеть однолистный былый колокольчистый цвѣть и земляничнымь подобные листья. Плодъ походить на плодъ земляничнаго дерева (Arbutus, АрбутусЪ.) Свойствомъ своимъ въ Медицинъ сходствуетъ оно съ упомянушымъже деревомъ, но въ АптекахЪ не употребляется. Листья счишающся способными прошивуд виствовать яду. ГосподинЪ ТурнефортЪ полагаетЪ его вЪ XX. Классь въ VIII. Родъ деревъ и кустарниковъ имъющихъ однолистный колокольчистый цввть, котораго пестикв превращается въ мягкій плодъ, толстою кожицею обведенныя съмяна въ себъ содержащій. По Нъмецки Miedriger Erdbeer, Baum; по Француски Adrachne espece d' Arbousier; по Италіански A'batro di Candia; по Аглински The Strawberry - Bay.

ADRACHNES, Адрахнесь. Смотри

Adrachne, Адрахне.

ADRAGVIS, Agpartinch. Cmompa Portulaca, Портулака.

ADRARACI, Agpaparn. Смотри Carthamus, Картамусь.

ADRIASA, Agpiasa. Смотри Schoenanthum, СхенантумЬ.

ADRICA, Смотри Cyclamen. Цикламнев.

ADRICHOSE, Agpuxose. CMompa Polium montanum, Поліумъ монтанумъ.

ADRIOCH, Agpioxb. Cmompu Cyclamen, ADRI-Цикламень.

ADRIVM, Agpiymb. Cmompu Allium, АлліумЪ.

AEGICHVM, Fruxymb u

AEGICON, Эгиконь. Смотри Gramen. ГраменЪ.

AEGILOPS, Эгилопсь. Смотри Festu-

са, Фестука.

61

AEGILOPS BROMOIDES, Frunonch вромопдесь, Смотри Festuca, фестука.

AEGILOPS NARBONENSIS, Grunonch

Нарвоненсись.

AEGILOPS PEREGRINVS, Grunottcb

перегринусь. и

AEGILOPS PLINII, Ernnonch IInn.

нін. Смотри Гевиса, Фестука.

AEGILOPS PRIMA, Ernnonch nou-

ма. Смотри Bromos, Бромосв.

AEGOLETHRON, Fronemponb. CMO

три Dentaria, Дентаріа.

AEGOLETHRON PLINII, Eronemponb Плиніи. Смощри Ranunculus, Ранункулусь.

AEGONICHON, Эгонихонь. Смотри

Milium solis, Muniymb conncb.

AEGOPODIVM, Эгоподіумь. Смотри

Herba Gerhardi, Герба Гергарди.

AEGROCERVS, Erponepych. Cmompu Foenum Graecum, Фенумъ Грекумъ.

AEGROP'RON, Эгропиронь и

AEGROPIRVM. Irponupymb. CMompu Ononis, ОнонисЪ

PENAE, Эгипціака AEGIPTIACA

пене. Смотри Раругия, Папирусъ.

AEGYPTIACA SILIQVA, Эгипціака

силикиа. Смотри Cassia, кассіа.

AELVROPVS, Inyportych. CMompu Hispidala, Гиспидула.

AERA, Aepa. Смотри Lolium, ЛоліумЪ. AERITIS, Aepumuch. Смотри Ana. gallis mas, Anaranauch mach.

AERMA, Aepma. Смотри Afarum,

АзарумЪ.

AERONA, Aepona. Смотри Alarum, АзарумЪ.

AESCHINOMENE, Эсхиномене. Смотри Мітова, Мимоза.

AESCVLVS, Эскулусь. Смотри Евсиlus, Ескулусь.

AETHIOPIS MVLTIS, Imionuch Myr. much. Смотри Aethiopis Offic. Этопис в оффиц.

AETHIOPIS Offic. Ger. 634 3mioπuch Оффиц. Aethiopis foliis sinuosis. C. В Sclarea vulgaris lanuginosa amplissimo folio. Pit. Tourn; Phlomitis. Ad. Lob. Horminum Aethiopicum foliis finuosis Hist. Oxon. Cotonaria quorumdam. X. Клюсь или Муринская трапа также Эфіопскій степной щалфей или съ завивающимся листомЪ, есть лътняя трава им вющая происхождение свое из в Эфіопіи, свемая здвсь шолько вв садахв, и цввшущая въ Іюнъ и вь Іюль мъсяцахъ. Она имветь черный, длинный, сухій, какъ рогь крыпкій, на многія волокны раздыленный, и глубоко въ землю простирающися корень; изЪ котораго вырастаеть четырехЪ гранный, толстый ибылою шерстью покры. шый стебель раздъляющися къ верьху на ньсколько выточекь, производящихь изъ вершинъ своихъ бълые, вдоль по онымъ сидящіе и трубками свитые цв вточки, оставляющие послъ спаденія каждый по одной съмянодержащельницъ о чешырехъ по парно лежащих стмячках . Листья сей правы большіе, широкіе, мяткіе, шерспистые, бёлесованые, на листья Царскаго скипетра (Verbascum) похожіе, по краямВ глубоко врезанные, и лѣжашъ большею частію на землі вокругі стебля. Она содержишь вь себъ много масла и часть соли, полезна от вертлужной боли, а въ винъ вареный корень употребляется от крово. харканія, колопья въ бокахъ и хрипошы. Этіопись происходить оть Эфіоніи земли Африканской, въ которой она растетъ изобильно. Господинъ Турнефортъ полагаетъ ее въ IV. класъ въ III. родъ шравъ съ однолисшнымЪ шрубкою свишымЪ цв в томъ. Сію траву должно держать въ горшкахъ, а зимою въ шеплыхъ сухихъ мъсщахъ. По-Тречески О'рыпусу Евотпису; по Нъмецки Mobs

ren-Rraut unu Hethiepisch Scharlen; no Opanцуски Orvale d' Ethiopie или Herbe à coton d' Afrique; по Ишаліански Herba bombaggina dell' Africa; по Аглински Ethiopian Clary.

AETHIOPS, Этіοπсь. Смотри Sclarea

Склареа.

ATHIOPVM HERBA, Этопумь гер-Ба. Смопри Rolmarinus, Розмаринусъ.

AETHONYCHVM, Этонихумь. Смо-

при Aquilegia, Аквилегіа.

AFEA, Apea, Смотри Lilium album. ЛиліумЪ албумЪ.

AFFANI, Аффани. Смотри Hedera ar-

borea, Гедера арбореа. AFFARIT. Аффарить. Смотри Aloe,

Алое.

AFFED, Аффедь. Смотри Semen Eru сае, Семенъ Еруце.

AFFFHELECCA, Apperenena. CMOтри Mandragora, Мандрагора.

AFFERIAL, Appepianb. CMompu Aloe,

Алое. AFFICHIMON, Аффихимонь. Смотри Epithymum, ЭпишимумЪ.

AFFLASMI, Аффлазми. Смотри Ver-

balcum, ВербаскумЪ. AFFODELVS, Appogennoch. Смотри

Asphodelus, Асфоделусъ.

AFFODILLVS, Аффодиллусь. Смотри Mymphaea alba, Нимфеа алба.

AFFORNAL, Аффорналь. Смотри Суpreffus, Hunpeccycb.

AFFRODISIA, Аффродизіа. Смотри Calamus aromaticus, Каламусъ аромашикусъ. AFFROGVS, Аффротусь. Смотри Sal-

via, Cantia. AFFVM Аффумь. Смотри Iuniperus, юниперусъ.

AFON, Aponb. Смотри Carthamus, КартамусЪ.

AFRICANVS FLOS, Африканусь флось. Смотири Flos Africanus, Флосъ Африканусъ. AFSINTHIVM, АфсиншіумЪ. Смотри

Absinthium, АбсинтіумЪ. AGAGIM, Ararumb u

AGALIL, Arannab. Смотри Lignum aloes, ЛигнумЪ алоесЪ.

AGALLIA, Arannia u

AGALLIVM, Aranniymb. Cmompu Ononis, Ононисъ.

AGALOCHI ARBOR, Aranoxu ap. Борь. Смотри Lignum aloes, Лигнумъ алоесЪ.

AGALLOCHITES, Arannoxumech. Oxaменьлое Сабурное дерено. По Нъмецки Дега steinertes Aloeholtz.

AGALLOCHVM, Aranoxymb. CMO-

три Lignum aloes, ЛигнумЪ алоесЪ.

AGALLOCHVM ALBVM, Arannoxymb Альумь. Смотри Lignum de Neroli, Лигнумъ де Нероли.

AGALLOCHVM FORTE, Arannoxymb форте. Смотри Lignum Rhodii, Лигнумъ Родіи.

AGALLOCHVM OFFICINALE, Aranпохумь оффицинале. и

AGALLOCHVS, Arannoxycb. CMOTTPW Lignum aloes, Aurhymb asoecb.

AGALLOGIN, Arannorumb n AGALOSIA, Aranosia, n

ACALVCHEN, Aranyxenb. CMompa Lignum aloes, ЛигнумЪ алоесЪ.

AGARATHVM, Arapamymb. CMompu Agerathum, Arepamymb.

AGARDEL, Arapgenb. Cmompu Sinapi, Синапи.

AGARICVM, Агарикумь. Смопри Аgaricus, Arapuxych.

AGARICVS AVRICVLAE FORMÆ, Агарикусь априкулае форме. Смотри Auricula Iudae, Аврикула Юде.

AGARICVS CAMPESTRIS, Linn. XVII. Атарикусь кампестрись. Грибь, есть леткое и руклое земное произраствние не имъющее ни цвътовъ, ни съмянъ, проискодящее от вламиной сырости и влажности древесной земли, или других в гнилых вещей и раздъляющееся на земныя и древесныя. Первыя называющся грибами, а вшорыя гувами или гувками. Грибь имвешь по боль-MOIM

12-

шой часны корошкій и шолсный корешокЪ ушверждающійся в земль нъсколькими волокнами, и на ономъ круглую, широкую, либо плоскую, либо кЪ верьку остро окончивающуюся шляпку, которая по различности родовь бываеть или толстая или монкая и разных в цевшовь. Грибы не долго жи**туть** на поверхности земли, ибо въ седмь дней растуть и исчезають, и появляются обыкновенно въ множествъ послъ грома, и отъ сырой умъренной погоды и дождей. Въ Россіи употребляють почти всякіе грибы. выключая поганокъ, и мухоморовъ, копторые почитаются за лакомство въ одной шолько Камчашкъ, гдъ изъ нихъ дълаюшъ водку. Въ лъсистыхъ странахъ грибы и хавбь составляють обыкновенную бъдныхъ крестьянъ, изъ коихъ иные нанизывая на нишки или мочала сушать; а другіе солять. Грибы Бдять здёсь а особливо вЪ постные дни по большой часпи соленые, или сушеные или печеные наугляхЪ, или отварные, или вареные и жа-Реные въ пость съ постнымъ а въ мясоъды съ коровьимъ масломъ и приправленжые съ смящаною; въ числъ употребляемыхь вь Россіи грибовь супь и такіе, копюрые въ другихъ земляхъ, почищая вредными, бросають. Всъ роды грибовь имъють Россійское названіе, и всъ содержать вЪ себъ много масленыхъ и соленыхъ частей, н вкоторые укрвпляють и возбуждають аппетишь, но въ множествъ употребленные причиняють неварение въ желудкъ. По Латынъ называють ихь также Fungus (фунгусь) котпорое имя составлено изЪ двухЪ Латинскихъ словъ, а имянно фунусъ, похороны и ago, аго, причиняю, потому что они многимЪ, которые не знали различать хороших в съ вредными причиняли смерть. Губа не имъетъ кория, расшетъ на пияхъ древесных в и в в пинцу не употребляется, а бояве сущать ее для труду. Господинь Линмей полагаешь всв грибы въ XXIV. классь

Yacma I.

тайно брачных раствай, (Стуртодатіа) а Господин Турнефорть въ XVII. Классь во II родь земных произраствай, коих в пвъть и плодь не извъстны. По Гречески Водіта ў Арадіта; по Арабски Fater и Hatar; по Нъмецки Діве, Діве или Сторфисти; по Француски Champignon или Potiron; по Италіански Fungo; по Аглински the Mushrome, въ множественном в Миshroms или Тоад Stools.

AGARICVS BVI.BOSVS. PALLAS. Araрикусь булбозузь. Шишкопатая Сыровга, расшешь вы рощахы, по глухимы и древесными гнилушками покрышымъ мѣстамъ. Вышиною бываеть она въ два верьшка съ половиною, и имветь къ основанію кувшинчикомъ расположенный, кЪ верьку заощренный цилиндрическій корешокЪ, полщиною болье, нежели въ налецъ; и по мъръ корешка маленькую шляпку сЪ ватнушыми нѣсколько вЪ низЪ краями. а слоечки лежать плотно одинь возлъ другаго, коротки и равны. По Гречески Водгом траидини; по Нъмецки die Sibirische Knols ligte Vilke; по Француски Champignon bul beux; no Италіански Fungo bulboso; no Аглински The bulbuous Mushrome.

AGARICVS CAMPANVLATVS Linn. Агарикусь кампанулатусь. Поганка, растеть вы разныхы льсахы и около жибываеть разных родовь, Она изъ коихъ имъють одни на колпакъ пои половину корня покрывающую хожую шляпку съ наружи оранжеваго, а внутря бълаго цвъта, которая внизу какъ будто перепонками общянуща; другіе имъюшъ щакогожь цвыша шляпку, только меньше, нежели у предвидущихв; а у трешьяго сорта корешокъ бываетъ тоненкій, и на ономЪ пиемно желтаго цебла, съ маленькими внизу проръзами, шляпку съ серебреный полимникъ величиною. Поганка въ пищу не употребляется По Гречески 'Амаνίται κυδωνεθόροι; πο Η Επεικα Wilder Erdich= wamm: no Француски Champignon

fauvage; по Италіански Fungo selvatico; по Аглински the non Edible Mushrome.

AGA

AGARICVS CINAMOMEVS, Linn. Ara. рикусь цинамомеусь. Голжанка грибь имвешь не гладкую шляпу бледножелнаго цевта; растеть большею частію въ Еловых в и сосновых в ласах в и употребляется въ пищу соленая и вареная. По Гречески Rodital RNamoninoi; no HEMERKH Die Blafaelbe Pilgen; по Француски Champignon jaunatre: по Италіански Fungo giallaccio; по Аглин-CKM The Pale Yallow Mushrome.

AGARICVS DELITIOSVS Linn. Araрикусь делиціозусь Линн. Рыжикь грибъ, расшеть по большой части въ сосновыхъ перел всках в и не на самопошных в м всшах в. ОнЪ имветъ шароховатую рудожелтаго цввша шляпку наполненную желшовашымъ сокомЪ, и съ низу нъсколько разръзовъ на подобіе перепонокЪ, и употребляется вЪ пищу свъжій въ жареніе и соленый, по Гречески Водітан убочної; по Нъмецки Севье fife Vilge; по Француски Champignon delicieux; по Италіански Fungo déliciolo; по Аглин-The Sweet Yaillow Mushrome.

AGARICVS DENTATVS Linn. Arapuкусь дентатусь Л. Пестрець, есть твердый грибъ роду Ивишеньевъ, копюрый имъеть опуклый видь и желтоватый цвъть. Молодой сей грибъ вкусенъ, но когда состарвется, то двлается жесткимъ на подобіе березовой тубки. По Гречески Адогла обочrudeis; no Hemenku Die zackigte Pilhe; no Француски Champignon dentelé; по Ишаліански Fungo dentato.

AGARICUS EXTINCTORIUS Linn. Aэкстинкторіусь. Скрипица трибъ распиенъ во всъхъ рощахъ на сухихъ мвстахь. Она имветь нискій корешокь и на ономъ широкую, на груздь похожую и бълаго цевта тляпку, наполненную бълымъ торькимъ сокомъ; и употребляется въ пищу, хотя и ръдко въ соленомъ отваръ, по Гречески Водіта увиріної; по Нъмецки жеібе вістеть Wilke; по Француски Champignon blanc amer; по Ишаліански Fungo amaro bianco; по Аглински The white bitter Mushrome.

AGARICVS FRAGILIS. Linn. Arapuкусь фрагились, Апенки, суть маленькіе тонкій коренюк в им вющіе и множеством в изЪ одного корня вмъстъ сросшись на березовых в пнях в растуще грибы бёложелтаго цвъта, которые употребляются въ пищу, особливо въ пирогахъ. По Гречески βολίτος τριθεροι απαλοί; πο Η ΕΜΕΙΚΗ Rleine gelblichte Gaufewreise wachsende Pilken; no Француски Petits champignons jaunes, qui croiffent par monceaux; по Италіански Fungi piccoli gialdi; по Аглински The small Yallow Mushroms growing in clusters.

AGARICVS GEORGII. Linn. Arapuкусь Георгіи. Грузда, а около Алашыря простымъ народомъ называется Губа. Сей грибЪ растеть на потныхъ мъстахъ и въ глухихь березовых в лвсахв, имветь широкую, склизковащую шляпку бълесоващаго цвъта и на поверьхности оной ямку. Упомянушую шляпку соляшь и употребляють въ пищу. По Гречески Водата Гемруначой; по Нъмецки Beifgraue Ucker-Pilhe; по Аглински

The graii Mushrome.

AGARICVS INTEGER Linn. Arapuкусь Интегерь. Волуй, грибъ растепь въ множествъ въ березовыхъ рощахъ, и имъетъ толстый корешокъ и оный на подобіє коровок в окружающую пвердомясистую шлянку темножелтаго цевта и горьковатаго вкуса; чего ради и въ пищу мало употребляется. По Гречески Водіта анеєаю; по НЕмецки Gehlichen и Leedlinge; по Француски Champignon entier; по Италіански Fungo integro; no Afauhern The whole Mushrome.

AGARICVS LACTEVS. Linn. Arapuкусь Лактеусь. Млечная Сыровга, родишся въ рощахъ. Она бываешъ средственной величины, и вся бълая какъ снъгъ. Шляпка на ней полушаромъ имъешъ цъль-

HEIR2

ныя, внизъ нъсколько загнувшіеся края, намазанные съ верьху білою на подобіе студени слизью. Слоечки бёлые, цёльные, и бывають малые и больше. Корешокь вышиною въ два пальца, видомъ цилиндрическій, заощренный, голый и кЪ шляпкъ щербиноватой. (Смотри Господина Профессора Палласа пушешестве по Россіи.) По Гречески Амагта уалагоды ; по Нъмецки Milchweißer Schwamm; по Француски Cham. pignon blanc comme du lait; по Италіански Fungo bianco; по Аглински The milch. colourd Mushrome.

AGARICVS LACTIFLVVS. Linn. Araрикусь Лактифлуусь. Линн. Белянка грибь, расшеть вы мвлких в березниках в, имветь самый былый цевть, наполнена бълымъ сокомъ, употребляется въ пищу соленая и заготовляется въ прокъ. No Hömenun Weiße, einen milchichten Safft in sich habende Pithe; по Француски Champignon laiteux; no Итахіански Fungo lattolo; по Аганнски The Mushrome containing a milhey juice.

AGARICVS LARICIS, Arapuxycb naрицись. Смотри Agaricus vegetabilis, Ara-Рикусь Вегетабились.

AGARICVS NYCTHEMERVS Linn. Атарикусь никтемерусь. Однононощная Сыровга, расшеть по лъсамь. Сей грибь слабаго сложенія и средственной величины; и имъетъ тонкую, плосковатую, съ верьху пречерную, выпуклую, посереди ямкою и цъльные, широкіе края им вющую шляпку, въ поперешникъ въ палецъ Слоечки подъ оною шляпкою тоненкіе, широкіе, не равные, выбств св тонкимв, длиною вв полшора пальца, ровнымъ голымъ корешкомъ, изЪ съра бълесоващые. (Смощри пущешествие Господина Профессора Палласа по Россіи.) по Гречески Вод по у похвимерной; по Нъмецки Pilhe, die nur eine Nacht dauert; по Француски Champignon d'une nuit; по Ита міански Fungo durando una notte; по Аглинoku The Mushrome offa Night,

AGARICVS PEDIS EQVINI FACIE. Агарикусь педись екпини фаціе. Смотры Quercus, Кверкусъ.

AGARICVS QVINQVEPARTITVS Linn Агарикусь кпинкпепартитусь. Ипишенья грибы раступь кучками на гнилыхъ вязовых в колодах в, мягки, походять видом в на сложенные манжешы, им вюшь былым цвъть и сыроватой, однакожь непротивный запахъ и употребляются въ пищу въ пирогахъ, и разнымъ другимъ образомъ приправленные. По Гречески Войга течта и вреіс; no Hömenku Weiße Pilke, dessen Huth oben funf Falten hat; по Француски Champignon blanc, dont la partie superieure est pliée en cinq parties; по Италіански Fungo bianco spartito in cinque parte; по Аглински The white Mushrome, thu head thireof deviding in 5 parts.

AGARICVS RADIOSVS Gmelin. Araрикусь радіозусь. Блестящая Сыровга. есть особливаго рода грибь, растущій вь Сибирских в ласах в и на песчаных в мвстахъ при ръкъ Ирпышъ. Онъ имъетъ, шонкую, плоскую, изъ свра бълесоващую шляпку, подъ краями которой находятся тоненкіе слоечки, кои изъ подъ низу простираются къ верьху на подобіе листочковъ окружающихъ шляпку и имъющъ черной лосиящійся цвѣтъ. Корешокъ у него длинный, сухій, сложеніем в нъжный. и почти до самой половины стоить вы пескъ. (Смотри Латинское описание сего гриба вЪ I. томъ путешествія Господина Профессора Гмелина). по Гречески Водита иоббыз; no Hömenku Die glanzende Piege mit hohem Stengel; по Француски Champignon radieux; по Италіански Fungo radiofo; по Аглински; The schening Mashrome.

AGARICVS VEGETABILIS, Arapuкусь пететавились. Agaricus leu Fungus Laricis. C. B. Pit. Tournef Agaricum. G. B. Листпеничная туба вырастаеть на пняхъ лиственнипы (Larix) и других в толстых в и старых в деревь на подобіе гриба и бываешь

ваеть черная и бълая, изъ коихъ первая мазывается мужчинкою, а другая женочкою. Мужескаго роду губа желтовата, тверда, тяжела, липка, и въ Медицинъ не употребляется, а женскаго на поверыхности своей съроватия, легка, мягка, внутри бъла, имбеть сперва сладковатый, но потомъ торкій вкусь, и произишельный запахь, и почитается лучшею. Она содержить вы себв много сврных в св лвтучею ем вшанных в часшить, не много влажности м малую часть земли, грветь, сушить, раздвляеть водянистыя мокроны вы мозгв и железахв, и въ особливосни ихв выгожяеть, разбиваеть опухоли, гонить мочу, считается въ числъ сильныхъ проносныхъ ж унотребляется внутренно въ виноградномъ винъ, и вареная вмъсто пишья съ инбиремъ, или гвоздикою въ количествъ отъ половины до цвлаго золошника. Сказывають, что она очень полезна от паралича, естьжи всякое утро жевать ее исподоволь по маленькому кусочку, съ нъсколькими масшиковыми зернышками. ВВ апшекахВ двлають изв нее пилюли, мъщають въ соспавь Теріака и варяпь густый сокь или Экспракть. Красильщики красять черною вубою въ черную краску. Агарикусь есть Ланинское имя происходящее онб Сарманскаго города Агарія; въ окружностяхь кошорато миственницы въ тогдашнее время расли во множесивъ и производили оную тубу. ГосподинЪ Линней полагаеть ее въ **XXIV.** нлассв тайнобрачных в произраствній, ж Гесподинь Турнефорны XVII. классь вы V. родь раствий, коих в цвыть и плодь быванош в обыкновение неизвисшных. По Гречески Микус или рипутея; по Ивмецки Lerchens fcbroamm; по Француски Agaric; по Ишаміански Адагісо; по Аглински Agarick.

AGARICUS VIOLACEUS. Linn. Arcaрикусь Віолацеусь. Сыровшка или Суровишко грибъ расшень въ разныхъ лъсахъ, ко болбе въ березникахъ, имъешъ круглую шляпку внутри съ лощинкою, бываеть трехъ родовь, бъловатая, красноватая и синеватая. ВкусомЪ она не дурна, а особливо опрареная въ кипяткъ съ солью. По Нъменки Віввранне Діве; по Француски Спап:pignon violet; по Италіански Fungo violetto; по Aranheku The Mushrome of a Violet Colourd.

AGASYLLIS, Arasunauch. n

AGASILLVS, Arasunnych. Cmompu Аттопіасит, АммоніакумЪ.

AGATHOIDES, Aramougech. Cmompu Maiorana, Маіорана.

AGEFOS, Arepoch. Cmompu Poconia, Пеоніа.

AGEOMORON, Areomoponb. CMompa Cicuta, Цикуппа.

AGERATHVM ALIVD QVORVNDAM, Агератумь аліудь кпорундамь. Смотри Chrisocome, Хризокоме.

AGERATHVM ALTERVM, Arepaтумь алтерумь. Смотри Agerathum purригеит, Агератумъ пурпуреумъ.

AGERATHVM AVRELIA, Arepamy Mb Апреліа. Смотри Chrylocome, Хризокоме.

AGERATHVM FERVLACEVM, Areратумь ферулацеумь. Смотри Millefolium МиллефоліумЪ.

AGERATHVM FOLIS SERRATIS Атератумь фолись серратись. Смотри Аде. rathum purpureum, Arepamymb пурпуреумъ

AGERATHVM MINVS, Arepamymb минусь. Смотри

AGERATHVM PVRPVREVM LVGD DALECHAMP. I. В. Агератумь пурпуреvmb. Agerathum ferratum Alpinum glabrum flore purpurascente. Pit. Tournefort. VII. Keнишоко трава, или Печеночной Корена растеть вы южных в странах в России, на пористых в мвстахв, а здёсь въ садахви, пвышеть вы Гюнь и вы Гюль мысяцахы. Ока имбешЪ шонкій, желшовашый и волокнистый корень, из в которато вырастают многіе маленкіе, продолгованные, мониноные

и по земай разстилающієся листья св глубожими выръзками; между коими возвышающся маленькіе стебельки производящіе из вершины своей великое число пурпуровых в, разбросанным в колосом в растущих в и из в продолгованых в, на гвоздичные похожих в шишечекъ выходящие цвъты пріятнаго запажа. Послв цввтовь показываются плоскія, продолгованыя, перепонкою обведенныя, и въ двухъ своихъ гивздахъ, мъленькія пуши. стыя съмячки заключающія стмянодержамельницы. Есть еще другой родъ сей правы съ желиыми цввтами. (Achillea lutea Agerati folio longiore, Ахиллеа лютеа Areраши фоліо лонгіоре.) Она содержишь въ себъ много масла и соли, разжижаеть, чистить, отворяеть, укрыпляеть желудокь, прошивишся гнили, разбиваеть опухоли, и полезна от печеночных в бол взней. Отв глистовь совытують пить по утрамь на тощакъ, въ буліонъ вареную или въ виноградномъ винъ настоянную траву съ цвъмами, или одно съмя; то же дъиствіе производить и перегонное съ ея цвътами масло, естьли обмочинь въ него кусокъ хлопчатой бумаги и приложишь на пупь. ВЪ АптекахЪ имбется сыропЪ, пилюли и экстракть. Агератумъ есть Греческое имя происходящее от слова акупсая, старый, какЪ бы сказать трава, которая не старвешся; понюму что есть нвиоторый родь сей травы, котораго цвёны долгое время сохраняющся, не увядая и не тряя цвъть свой. Господинь Линней полагаеть ее вь XIX классь раствній имвющихь много мужеских в и женских в цевтов в вм вств. (Syngenefia.) а ГосподинЪ ТурнефоршЪ ВЪ XI классь вы 1 роды правы сымноголиспиымы неправильнымъ цвъщомъ. По Гречески А'улgarov; no H'Emenku Leber oder Rieiner Costen= Balsam или Kunigund-Kraut; по Француски Ageratum comme qui diroit Plante qui ne viellit point. по Ишаліански Agerato; по ATAUHCKU Maudlin; or purple sweet Maudlin.

AGE

AGIAHALID AEGYPTIVM. Alpin. MAW Lycio affinis Aegyptiaca. C. B. Ariarangh, есть иглами обсаженное, и всколько суковащое, вышиною на дикую грушу, а видомъ на Придорожную иголку (Rhamnus catharticus, Paмнусь кашаршикусь) похожее дерево; кошорое расшеть вы Африкъ вы Эсіопіи и вы Эгиппъ, и имъенъ широкіе, темно зеленые и буковымЪ подобные лиспыя: бълые на Гіациншы похожіе цвішы; и по спаденію оных в маленькія, созравая, чернающія ягоды пришорнаго вкуса. Аистья укрѣпляющь и умерщиляющь глисны. По Гречески Αγιαγάληδ, δένδρον τθ Έγυστε: πο Η Επεμκη 21 αία= halid, oder Aegyptischer Bürdorn; no Opanyycku Agiahalid ou Bouis épineux d'Egypte; no Mmaліански Agiahalid o Bucco spinoso d'Egypto; по Аглински Agiahalid, an Egyptian tree.

AGILEVM, Aruneymb. CMompu Avel

Іапа, Авеллана.

AGLAOFORES, Arnaopopech. w. AGLAOPHORES, Arnaopopech. M AGLAOPHOTIS, Arnaopomuch. CMOтри Ресопіа, Пеоніа.

AGLOSSA ATROCCO. CMOMPH Asphode-

lus, Асфоделусъ.

AGNIL, Arnuab. Chompu Anil, Annab. AGNITIA, Arnunia. CMompu Buglos-

fum, БуглоссумЪ,

AGNVS CASTVS. Gesn. Hort. Arstych naemych. Vitex. Linn. falix amerina Matth. Vitex foliis angustioribus camabis modo dispositis. C. B. Pit Tournes. Elæagnom Theophrasti. Adv. Lob. IV. Bepsa Umanianская, по переводу Бирань Непорочный или Апрамоно дерено, есть кустарник или маленькое зъщвистое деревно растущее въ Ішаліи и во Франціи нарычных берегахь но въ Германіи и здівсь въ одних в полько садахв, а зимою вы оранжерсяхы. Оно бываеть двухь родовь большое и маленькое. Большое вырастаеть до нарочиной вышины, походишь на верьбу и приносинь пурпуровые съ бълымъ омбинание и коло-COME

сомЪ распущіе цвѣты. Маленькое остается низкимъ куспарникомъ и имъетъ совсъмъ пурпуровые или багряные цвѣты. Оба покрышы пепелнаго цввта корою, производяшь множесшео тибкихь сучьевь, и на оных В длинные, узкіе, остроконечные, шерспистые, на пяпь лапочек на подобіе пальцовъ раздъленные, съ верьку зеленые, а съ низу пепельнаго цвъта и на конопляные похожіе листья, которые всякую осень спадающь. Бъ Іюнъ мѣсяцъ раскрығаются находящіяся не вершинках в в вточекЪ почки, и оказывають цветь, после коего появляющся маленькія, черноватыя зернышки, прянаго вкуса и величиною сЪ кишнецовые (Coriandrum, Коріандрумь). Размножение сего куспіарника д'влается не изъ съмяни, но чрезъ коренные оппрыски или сломленные въщочки. Онъ содержишь въ себъ много масла и малую часть влажмости. Съмя или зерно разбиваеть, поспъшествуеть теченію місячнаго, уменьшаеть свия, тонить мочу, разгоняеть вътры, раздробляеть затвердълости въ печенкъ, и употребляется съ пользою отъ каменной боли вЪ миндальномЪ молокъ вареное. ВЪ АптекахЪ имъется одно съмя. Бараном в непорочным в или Агнус в Кастус в прозвано сіе деревцо потому, что упіверждають, будто бы съмя его унимало охоту жь любострастію; по которой причинь вь АвинахЪ, многія знашныя женщины, по повъствованію Плинія, клали листья его въ свои постели и сыпали на оныхъ, дабы жить въ безпрестанной безпорочности; но Господа Медики еще и по сіе время не согласующся въ разсуждении особливато сего свойства. ГосподинЪ Линней полагаетъ его въ XIV. классъ раствній имбющихъ въ цвътъ своемъ четыре тычка или мужчинки. изъ коихъ два длинные и два короткіе (Didynamia) а ГосподинЪ ТурнефортЪ вЪ XX классъ въ III. родъ деревъ и кустарниковь сь одно лисшнымь цвыномь; по

AGI

Гречески йугос хурос; по Нъмецки Кеціф: Baum или Schaafsmullen; по Француски Agnus castus; или Agneau chaste; по Ишаліански Agno casto, по Аглински The Chast Tree.

AGNVS DEI Arnych Zen. CMompu Ace-

tofella. Аценозелла.

AGNVS SCYTHICVS Offic. Armycb cumuxycb. Agnus Tartaricus. Act. Philes. Lond. N. 247. p. 461. Agnus Scythicus vegetabilis Borametz dictus ex Museo Breyniano. Eiusd. N. 90. Frutex Tartaricus C. B. 512. Баранець или золотой мохь, есть плодъ растущій въ Татаріи на границахъ Персіи и въ Китав, и есть родъ продолгований дыни съ человъческій кулакъ толщиною, которая вырастаеть на толстомь и длинном в стебл в в осмнатцать вершков вышиною, и покрывается желтою, кудреватою, длинною и нѣжною шерспью, копторую Китайцы прикладывають на раны для унятія крови, вмісто наших в паушинь. Я за излишнее почитаю, упомянуть здёсь о баснословных в описаніях в сего плода Дурешом в Скалигером в и многих в других в и довольствуюсь сказашь; что многіе увбряють, будто бы онъ всякую въ близи его растущую траву объ-Бдаеть, что весьма статься можеть, потому чино мы видимъ многія растьнія, которыя истребляють, а особливо корнемь своимь. всв около ихв споящія правы. Свия покодить на дынное, только что не такъ продолговато, и употребляется истолченое внутренно въ количествъщести гранъ отъ кровохарканія. По Гречески А'учос дпуос Тартаряиос; по Нъмецки Ecuthisch oder Zartarisch Lamm: по Француски Се Zoophyte est une espéce de Melon appellé Agnus Scythicus; no Umaліански Agno Scythico, frutto della Tartaria: по Аглински The Scythian or Tartarian Lamb.

AGON, Aront. CMompu Semen Cynae, СеменЪ Цине.

AGONON, Aronont. Cmompu Ruscus, РускусЪ.

AGRAMEN, Arpamenb x

AGRAMNIS Arpamench. CMompu Cardopatium, КардопаціумЪ.

AGRESTA, Arpecma. CMompu Vitis,

ВишисЪ.

AGRESTEOS ALTER VM GENVS, Arpeстеось алтерумь генусь. Смотри Gramen и Phalaris, Граменъ и Фаларисъ.

AGRIFOLIVM, Arpuponiymb. Cmo-

три Aquifolium, АквифоліумЪ.

AGRIFOLIVM SEPTENTRIONIS, Aтрифоліумь септентріонись. Смотри Адиіfolium, АквифоліумЪ-

AGRIKKOMELEA, Arpunkomenea. Смотри Acacia Germanica, Акаціа Германика.

AGRIMOLATVM, Arpumonamymb. Смотри Огуга, Ориза.

AGRIMONIA, Arpumonia. Verbena, Вербена и Anserina, Ансерина.

AGRIMONIA, Arpumonia, feu Eupatorium I. B. Agrimonia Eupatoria. Linn. Agrimonia officinarum. Pit. Tournef. Eupatorium veterum. C. B. VI Penuxb, Penuxb, Peпяшникь, въ каширъ Совачки; а въ Украйнъ Колика права, растепъ вълъсахъ. возли дорогь, на невспаханных в поляхь и вь деревняхь, и цевшешь вь Іюнь мьсяць. Она имфеть черноватый, длинный, посредственно толстый, древесоватый и на многія зазубрины разділенный корень без в запаху, но горькаго и вязашелнаго вкуса; и продолгованые, мягкіе, мохнаные, зубчатые, и сугубо растущіе блёдно зеленые листья сладковатаго вкуса. В в исходъ Маія мъсяца вырастають обынирвенно изъ кория два дереввнеющіе, длинные и мошкомъ опушенные сшебля въ двенадцашь и чепырнадцать веръшков вышиною, которые окружающся съ половины до самаго верька многими маленькими, звъздовидными, пяшилисточными, и душистыми ба в дножелтыми цевточками; по спаденію коих в показываюшся маленькіе, продолговатые и игодчатые репейки, которые какъ и обыкновенный репейникъ пристають къ платью; и наполнены мъленкими, бълыми, сладкими

съмячками. Сія трава содержить вы себъ много масла, часть соли и нъсколько влажности, гръеть, сушить, чистить. укрвпляеть, отворяеть, унимаеть понось, остонавляеть всякое кровотеченіе, противится гнили, уменьшает в остропы внутренных в соковь, полезна от в бол взней вы печенкъ и селезенкъ, и от воспаленія горла, чистить кровь и употребляется внутренно вЪ декоктахЪ, а наружно образомъ баненія. Свъжая трава раздробленная и приложенная, исц вляет в ужаленіе эмен и гніющія раны; а вареною в уксус в или въ виноградномъ винъ припариваютъ распалившіяся м'єсна ядерь, (Inflam. tesstium) въ порошокъ исполченное съмя или права. приняшыя на ночь въ красномъ винъ, полезны для твхв, кои во снв мочу держать не могуть. Исходящіе изъ сей правы по упрамъ пары причиняють круженіе головы и могушЪ человъка сильно усыплять. Агримонія есть Греческое имя происходящее от слова иніс, острое, ибо репейки ея окружены иглами; а Эвпаторіумь оть имяни Короля Эвпатора, который первый ввель сію праву вь употребленіе. ВЪ АпшекахЪ имбешся одна шолько шрава и перегонная съ нею вода, шолько ръдко. Господинь Линней полагаеть ее въ XI. классъ растъній, имъющихъ обоеродный цвъть и въ ономъ от двенадцати до девятнадцаши мужчинок в и дв в женочки; а ГосподинЪ Турнефортъвъ VI. классъ въ III. родъ травъ съ расположеннымъ на подобіе розона цввтомв, из в котораго чашечка превращается въ съмянодержательницу. Гречески Ентаторог; по Арабски Gnaphat или Gnatzfat; по Нъмецки Odermennig, Agermennig, Leber-Riette; по Француски Aigremoine; по Ишаліански Agrimonia; по Атлински Agrimony.

AGRIMONIA AQVATICA, Arpumoнія акпатика. Смотри Bidens, Биденсь.

AGRIMONIA EVPATORIA, Arpumoпія Еппаторіа. Смотри

AGRI-

AGRIMONIA OFFICINARVM, Arpu. моніа оффицинарумь. Смотри Agrimonia, Агримонія.

AGRIMONIA SYLVESTRIS, Aronмоніа силпестрись. Смотри Potentilla, Потеншилла.

AGRIMONIVM, Arpumoniymb. Cmomon Agrimonia, Arpumonia.

AGRIO CARDANVM, Arpio kapganymb. Cmompu Nasturtium aquaticum, Hacmypпіумь аквашикумь.

AGRIOCASTANVM, Arpioracmany mb. Смотри Bulbocastanum, БулбокастанумЪ.

AGRIOCINARIA, Arpiouunapia. Cmoтри Carduus Mariae, Кардуусъ Маріе.

AGRIOCONELLA, Arpioxonenna. Cmoтри Асасіа, Акаціа.

AGRIOMELANTHIVM, Arpiomeranтумь Смотри Nigellastrum, Нигелластрумъ. AGRIOMENA, Arpiomena. Cmonipu

Serpyllum, СерпиллумЪ.

AGRIONARDVM, Агріонардумь. Смотри Valeriana, Валеріана.

AGRIOPHILLON, Arpiopunnoub. Cmoтри Peucedanum, ПевцеданумЪ.

AGRIORIGANVM, Arpuopuranymb.

Смотри Origanum, ОриганумЪ.

AGRIOTTA, Arpiomma. CMompu Ceзава, Цераза.

AGRIPALMA, Aгрипалма. Смотри Cardiaca, Kapaiaka.

AGRON, Агронь. Смотри Scylla, Сцилла. AGRORVM VENTI SPICA, Arpopymb спика; Смотри Gramen Arundi. Retimu пассит Граменъ Арундинацеумъ.

AGROSTEMMA, Arpocmemma. CMompu

Lychnis, ЛихнисЪ.

AGROSTIS. Arpocmuch. Cmompu Graтеп, Грамен в.

AGRVSICHI. Arpy 3uxu; Cmompu Cucumis Afininus, Кукумись Азининусь.

AGVACATE, Агуакате. есть Перуанскій да маленкую пыкву похожій плодъ, кошорый расшеть на нъкотогомъ высокомъ

деревв, кругловать, имветь зеленый цввть. и покрыть тонкою и съ наружи лосиящеюся желтоватою корою. Перуанцы употребляють его вы пищу сыгый и вареный съ солью. По Гречески Ауванать, нартос тус Ивря. по Нъмецки Uguacate, eine Pernanische Frucht; по Француски Aguacate, Fruit de Perou; по Ишаліански Aguacate.

dell Perou; по Аглински Aguavate.

AGVL. I. B Aryab. Hedyfarum Alhagi Linn. Alhagi Maurorum Rauwolf. et Pit. Tournes. Itin. Genista spartium spinosum foliis Polygoni. C. B. XXII. Калмыцкія Шилы: Копишникь: Коплая или Щетинная права. еснь маленькая, колкая и около Астрахани. Урала, Царицына, также въ близь Персіи лежащихъ спранахъ, кустомъ растущая трава, которая имветь множество углова. шыхв, и на многія в точки раздвленных в стеблей; длинные, ПодорожниковымЪ (Роlygonum, ПолигонумЪ) подобные и по парно сидящія листья; красные перистые цвъ. мы; и длинные узскіе, прямые и плоскіе стручья съ возвышеннымъ краемъ и заключающія вы себь маленкія, четыреугольныя, видомъ маленкой почкъ подобныя и гороховой вкусь имвющія свиячки Корень у нее длинный, волокнисный, и багряноцевшный. Поупрамъ находянъ на листьяхъ родъ манны одного вкуса съ обыкновенною, которая растаиваеть, какъ скоро солнце оные освящаеть. Листья слабять, а съмя укръпляеть. Сію траву лошади довольно знають, и такъ ее боятся, что и ночью оть оной удаляются, дабы не поколоть ноги; вмъсто того что верблюды ъдять ее охошно по пріяшному ея вкусу. ВЪ Аптекахъ ничего не имбется. Агулъ и Алгаги сушь оба Арабскія имена. Господинъ Линней, полагаеть ее въ XVII. классъ расшвній, имвющих вы обоеродном в своем в цвёть десять мущинокь изв двойнаго основанія выходящих (Diadelphia Decandria). Господинь Турнефорть въ XXII. класов

классь въ IX. родъ деревь и кустарниковь, у коихъ цвъть не правильный; нижній листокъ выпуклистой, верхній прямой, а сторонніе сидять особливо. Flos Papilionaceus; по Гречески Аува, Витог быбригог; по Нъмецки Peltichen unit Wegetritts Blättern; по Француски Agul plante épineule; по Италіански Agul pianta spinola; по Аглински ап prickly plant; по Калмыцки чатеракъ.

AHO

AHALSEINER, Aransennept. Смотри

Folia Sennae, Фолія Сенне.

AHARIB, Агарибь. Смотри Нурегісит, ГиперикумЪ.

AITIAHI, Ariaru. Смотри Nymphaez,

Нимфеа.

AHOUAI NERII FOLIO. Plum. et Pit. Tournef. Aryan Hepin ponio. Ahouai Yccotli. Hernand. 443. II. Aryan или Молошное дерено, растеть въ Америкъ, походишь узкими своими листьями на Сибирское черногрибомъ (Rhododendron) называсмое деревцо и содерживть въ себъ много молошнато соку, чего ради и прозвано молошнымЪ. Цвѣшы на немЪ большіе, желтые, и въ верьку сплошные. Плодъ подобенъ грушъ, и заключаетъ въ себъ треугольную косточку, раздъленную внутри на два мѣстечка, въ коихъ находятся два на миндаль похожія ядрышка. Индіанцы собирають сіи косточки и привязывають ихъ къ своимъ поясамъ и подвязкамъ, потому, чию он в стучась другь об в друга производящь звукъ. Всво семъ деревъ писавшіе Авшоры приписываюнь ему ядовиное свойсню, хоня ГосподинЪ ПашерЪ ЛабашЪ вЪ III. томъ своихЪ путеществій совсѣмЪ прошивное тому утверждаеть. Господинь Турнефорть полагаешь сіе дерево вь XI классь деревь съ неправильным в многолисшным в цвв помв, котораго пестикъ превращается въ плодъ обЪ одной капсулъ. По гречески 'Ахвау быδρόν άμες ιπάνον; πο Η Επεικα Αβουαί, είπ 23 αυπ in Sud-America; по Француски Ahouai, arbre de l'Amerique méridionale; no Mmani-Yacmb I.

ански Ahouai, albero dell' America meridionale; по Аглински Ahouai an American tree.

AHVMIC, Агумикь. Смотри Agnus Castus, Агнусъ кастусъ.

AIRA, Апра. Смотри Gramen, Грамень.

AIRANISI, Апраниси. Смотри Суста: men, Цикламень.

AIVGA, Anra, H

AIVGA REPTANS, Anna Penmanch.
CMompu Chamaepythis, Xamenumuch.

AIZOE, Ausoe. Cmompu Sedum maius, Ceaymb maiocb.

AIZOIDES, Ausongech. Смотри Ficoides, Фикоидесь.

AIZOON ACRE, Анзоонь акре. Смотри Illecebra, Илленебра.

AIZOON AGRIVM, Ansoonb Arpiymb.

Смощем Гавагіа, Фабаріа.

AIZOON HAEMATOIDES, Ansoonb Temamongecb. Cmompn Sedum minus, Ceaymb munycb.

AIZOON MAIVS, Аизоонь маюсь. Смотри Sedum maius, Седумъ маюсъ.

AIZOON MINVS, Ausoonb munycb. u AIZOON MINVS FOEMINA, Auso-

онь минусь фемина. и

AIZOON MINVS LVTEVM FOLIO ACVTO, Ausoonb munycb nymeymb ponio axymo. Cmompu Sedum minus, СедумЪ минусъ.

AIZOON PALVSTRE. I. В. Аизоонь палустре. Aloe quarta feu palustris. С. В. Stratiates sine palustris Ad. Lob. Stratiotes aquatica Lugd Stratiotes potamios. Dod. Pempt IV. Ядрорьзь, Рьзь, и Воинская или Присножинотная трана, есть водяная, по ръкамъ, болошамъ и мокрымъ мъсшамъ растущая и всегда зеленъющая трава, которая видомъ походить нъсколько на Сабуръ. (Aloe, Алое) кремъ того только, что листъя ея меньше и по краямъ колючъе: изъ средунны оныхъ возвышается родъ стволиковъ расположенныхъ на подобе раковыхъ кле-

щей, которые из вершины своей производяшь былые, шремя лисшочками окруженные и внутри нъсколько желтых волосков в им Бющіе цв Бты; корни ея составляются из Б бълесованых волокив Она содержить въ себъ много масла и малую часть соли, прохлаждаеть, унимаеть кровь н полезна от одышки. В В Аптеках в иичего изъ нее не дълается. Аизоонь есть Греческое имя, значущее всегда зелен вощую праву. По Гречески авідшог; по Нъмецки Жапег Вань в Жигь; по Француски Аі zoon; по Ишаліански Aizonne; по Аглин ски Seagreen.

AIZ

AIZOON SERRATUM, Ausoonb Cepратумь. Смотри Sedum maius, Седумъ

маюсъ.

AIZOON VRENS, Ausoonb ypench. Смотри Perficaria viens, Персикаріа уренсъ.

ACADE, Akage. Смотри Polium montanum, Поліум'в монтанум'в.

ACALIPHI, Axanupu. Cmompu Vrtica maior , Уршика маiорЪ.

ACANTHA, Axanma. Cmompu Acacia

уста, Акаціа вера. AKANTHISTOPIA, Axahmucmonia.

Смотри Acanthus, АкантусЪ. AKANTHION , Axanmionb. Смотри

Carduus, Кардуусъ.

AKANTHOS, Ananmoch. Cmompu Acanthus, АкантусЪ.

AKARNA, Акарна. Смотри Acarna, Акарна.

AKKABICCA Axxaeuxxa. Cmompu Gummi Arabicum, Румми АрабикумЪ.

AKONITON, Anonumonb. Cmompu Aconitum, АконишумЪ.

ACORVS, Akopych, Cmompu Acorus, АкорусЪ.

ACRIMIA, Axpumia, Cmompu Lignum Aloes, лигнумЪ АлоесЪ,

AKTE, Akme. CMompu Sambucus, Cam-

ALAAGEN, Angarenb. Cmompu Violaria, Bioxapia.

ALAASACH, Алаазахь. Смотри Сеп. taurium minus, ЦентавріумЪ минусЪ.

84

ALABASTRITES , Алабастритесь. Смощри Dentaria, Дентаріа.

ALABEL, Anabenh. Cmompu Iuniperus, Юниперусъ.

ALABELFARON, Anasendaponb. CMO. три Diplacus, Дипсакусь.

ALABVL, Anaty nb. CMonipu luniperus, Юниперусъ.

ALACABEL, Anakasenb. Смотри Теrebinthina, Теребиншина.

ALACHASCHEC, Anaxacxerb. CMO. mpu Tribulus aquaticus, Трибулусь акваши. кусЪ.

ALACHOEN, Anaxoenb. n

ALACOEN, Anaxoenb. Cmompu Matricaria, Mampurapia,

ALACROBI, Aлакроби. Смотри Ceterach. Hemepaxb.

ALADEATOMON, Anageamomonb. Смотри Pulegium, Пулегіумъ и Diplacus, ДипсакусЪ.

ALAFANCA, Anapanka. Cmompu Menthastrum, Меншаструмь.

ALAGION, Anarionb. Cmompu Adian. thum, АдіаншумЪ.

ALAIBIDIS, Anauenqueb. Смотри Репtaphyllon, ПентафиллонЪ.

ALAION, Anaionb. Cmompu Adianthum, АдіанпіумЪ.

ALAM, Anamb, CMONIPH Enula, EHYNA. ALAMVTES, Azamymbi, cymb poAb чернослива, расшущаго на нѣкоторомъ иглистомь деревь вы Мадагаскарь; которые заключають вы себь вывсто косточки отв девяни до двенадцани плоских в зерень; обведенных в шелухою. По Гречески Адарятес, нартос тв Мабауатнар; по Нъмецки Mamutes, eine Art schwarzer Pflaumen in Madagascar; по Фраацуски Alamutes, sont une espèce de Prunes noires de Madagascar по Италіански Alamutes, forte di Prune del Madagascar; по Аглински Alamutes.

ALAN

ALAN, Ananb. Cmompu Anisum, Anucymb.

ALANGISIFF, Anahrucusts. Cmompu Enula, Inyaa.

ALANGLANC, Алангланкь. Смотри Всеп, Беень.

ALANIDEN, Ananugenb. Смотри Тог. dylium, Тордиліумь.

ALAOLFAR, Annongaph. Cmompu Di-

placus, Дипсакусъ.

ALARFIN, Аларфинь. Смотри Enula,

ALAS, Алась. Смотри Lactuca, Лак-

ALASACHEL, Алазахель. Смотри Spiса Celtica, Спика Целтика.

ALASASEOSOBAR, Апасасеосоварь. Смотри Diplacus, Дипсакусь.

ALASCEAN, Аласцеань. Смотри Атmoniacum, Аммонгакумь.

ALASEK, Anasekb. Cmomph Thymus, Tumycb.

ALASSACH, Anaccaxb. Смотри Ammoniacum, Аммоніакумь.

ALATERNOIDES AFRICANA, Anaтерноидесь Африкана. Смотри Apalachine, Апалахине.

ALATERNVS, Clus. Hisp. Pit Tournes. Spina bourgi Monspeliensium. I. B. Philica ela tior. C. B. Rhannus Alaternus. Linn. VI. Алатернь или Каменная липа, есть всегда зеленъющій и здъсь въ однихъ шолько садахь, а зимою вь оранжереяхь, растущій иностранный кустарникЪ, который бываетЪ двух в родовь, и цв в тем в в начах в весны, а иногда ужь вы исходъ зимы. Первый родь вырастаеть до нарочитой вышины, пожодишь на кружину (Ligustrum, Aurycmpynb), покрывается двойною корою, из в коих в наружная бёло зеленаго, а исподняя желтоващаго цввта; и имветь длинные, не очень шолстые но гибкіе прутья или сучья; которые окружающся маленькими, шемнозелеными, къ концу продолговащыми, вокругъ не много зазубренными и по одинача къ вдоль по сучьямъ одинъ прошивъ другато сидящими лисшьями, коихъ края сходятся выбств, такв что внутренніе закаючающся во внёшнихв. Цвёшы баёднозеленые, пахучіе, разширяющся къ верьху на подобіе воронки, вырасшають на длинных в черешках возл в основанія листьевь, и висять по нъскольку вмёсть на подобіе листочковь: послв цввтовь оказываются черноватыя, мягкія, сочныя и на бузиновыя (Sambucus Camбykycb) покожія ягоды, заключающія вы себь каждая по три краями выбсшв соединенныя круглыя свиячка. Корень большую имвешь мочку. Вторый родъ сего кустарника растеть гораздо ниже: имветь сучья покороче перваго и покрышь бёло зеленою корою съ пурпуровою смъсью; листья свътлозеленые, зазубристъе и меньше; цвъпы видомъ сходствують во всвив св'предвидущими, кромв пюго пюлько, что больше и зеленье. Размножають его посредствомъ съмяни или однолъшнихъ въпочекъ. Оно содержинъ въ себъ много масла и влажности; лисныя очищають внупренное, укръпляють, прохлаждають и упошребляющся въ горло полоскащельныхъ водахъ от воспаленія горла и рта. Алатернусъ есть Латинское имя, происходящее сть слова алтерно, потому что листья его сидять по сучьямь на искось одинь прошивъ другаго. Господинъ Линней полагаеть его вь V. классь растеній, вь обоеродномъ цвътъ коихъ находятся пять мущинокъ и одна женочка. (Pentandria Monogynia) а Господинъ Турнефортъ въ XX. классывы III. роды деревы и кустарниковы сы однолисшнымъ цвъшомъ, кошораго песшикъ превращается въ ягоду, заключающую въ себ в обведенныя пленкою свияна. По Гречески Адатеров, импроч бенброн; по Нъмецки Maternus-Baum, Immergrun; по Француски Alaterne; no Италіански Alaterno; no Ar-ANHERN Evergreen Privet or fruitless Privet. ALA-

ALATERNVS ALTER, Anamepuych аптерь; и

ALATERNVS CLVSII, Anamepsych

Клузии; и

ALATERNUS HUMILIOR, Anamepstycb rymuniopb. Смотри Alaternus, Anaтернусь.

ALATERNVS LATIFOLIA, Asamepнусь патифоліа. Смотри Celastrus, Цела-

ALATERNVS MAIOR, Aramephych

maiopb; u

ALATERNUS MINOR, Anameprych

munopt; u

ALATERNVS Offic. Anamephych of-Duly. W

ALATERNVS PLINII, Алатер-

нусь Плиніи; и

ALATERNVS TVRETI, Anamephych Турети. Смошри Alaternus, Алашернусъ.

ALATINE, Anamune. Cmompu Ammi,

Амми.

ALATORNON, Anamophoub. Cmompu Diplacus, Дипсакусъ.

ALAVRA, Anaypa, Смотри Pulegium

ПулегіумЪ.

ALAZAR, Anasaph. Cmompu Hystopus,

Гиссопусъ.

ALBABASAC, Antarasant. Cmompu Centaurium minus, Центауріумъ минусъ.

ALBADENGE, Areagenre. CMompu Cu-

ситія, Кукумисъ.

ALBARABASSIS. Assapasaccuch. CMOтри Септациит тіпць, Центавріумъ минусъ.

ALBASAL, Antasanh. Cmompu Cepa,

Hena.

ALBATECH, Antomexb; u

ALBATEG, Ansamerb. CMompu Melo,

Мело.

ALBATEGI, Angameru. CMOMPU Citrullus, Ципруллусь.

ALBATIM, Альатимь. Смотри Tere-

binthina', Теребиншина.

ALBEA, Альеа. Смотри Verbena, Вербена.

ALBEDARAGI, Antegaparu. Смотри Melissa, Meaucca.

ALBEDORAC, Antegopant; n

ALBEDORAT, Antegopanib. Cmompn

Malua, Mana.

ALBEFARAGEL, Ansechaparent. CMOтри Cydonia, Цидоніа.

ALBEHADHAR, Anterograph. CMompu

Anacardium, АнакардіумЪ.

ALBEHENGESIFF, Албегенгезиффь.

Смотри Arthemisia, Артемизіа.

ALBEL, Anbenb. Cmompu Ebulus, Ebyaycb. ALBEMESACH, Angemesaxb. CMompu Ricinus, Рицинусъ.

ALBEN, Artenb. Смощри Pimpinella alba, Пимпинелла алба.

ALBENCI, ATECHTH; H

ALBENSA, Antensa. Cmompu Hioscya.

mus, Fiocniamych.

ALBERAS ARABVM, Azzepach Apa. тумь. Смотри Staphylagria, Стафисагріа.

ALBERBYTIMO, Antepfymumo. CMO-

три Terebinthina, Теребинтина-

ALBEREGA, Antepera, M

ALBERAGI, Anbepern. CMompu Cupres-

lus, КупрессусЪ.

ALBERENGESIFF, Алберенгезиффь.

Смощри Abrotanum, АбротанумЪ.

ALBETADA, Альетада. и

ALBEZOARD, Ansesoapgb. Chompu Galbanum, ГалбанумЪ.

ALBIN, Aseuub. Cmompu Marrubium, МаррубіумЪ.

ALBISBESACH, Aneucresand. CMO-

шри Macis, МацисЪ.

ALBOLESCEN, Antonecuent. n

ALBOLESTEN, Antonecment. CMompu Carpobalfamum, Карпобалзамумъ.

ALBORA, Antopa. u

ALBOTAI, Antoman. CMompu Terebinthina, Теребиницина.

ALBRACHIM, Asspanumb. u ALBRAHIM, Ansparumb. W

ALBRAHVNC, Antparyend. CMOMPH Genista, Гениста.

ALBREATI, Anspeamu. Смотри Furfur, Dyppypb.

AL

ALBV CARAM, Альукарамь. Смотри Zedoaria, Segoapia.

ALBVCVM, Ansyxymb. CMOTHPH Alphodelus, Асфоделусъ.

ALBVGERICH, Ansyrepuxb. CMompu Myrrha, Muppra.

ALBVM OLVS, Ansymb onycb. Cmo-

mpu Valerianella, Валеріанелла.

ALBVDACHAN, Arrygaxanb, n ALBVNDACA, Aлбундака, и

ALBUNGA, Antyhra. Cmompu Avellaпа, Авеллана.

ALCABAN, Ankabanb. CMompu Terebinthina, Теребинтина.

ALCABRAN, Arkaspanb. Cmompu Ebu-Інь, Эбулусь.

ALCACHER, Anxaxepb. CMompu Cynoglossa, Hиноглосса.

ALCAD, Ankagh. CMompu Allium, АлліумЪ.

ALCADA, Anxaga. CMompu Lilium album, *Лиліум* в албумъ.

ALCAHELFI, Ankarenou. Смотри Vrtica, Уршина.

ALCALIPHE, ARKANIDE. CMOMPH VItica major, Уршика мајорЪ.

ALCAMPHOR, Anxampoph. Cmompu Camphora, Камфора.

ALCANDORA, Anxangopa. Смотри Olibanum, ОлибанумЪ.

ALCANNA, Ankanna. Cmompu Anchufa , Анхуза.

ALCANNÆRADIX, Ankanne pagukeb. Смотри Ligustram Indicum, ЛигуструмЪ ИндикумЪ.

ALCANZVD, Ankansygb. Смотри Camphora, Kampopa.

ALCARAPSE, Ankapance. Смотри Аріum, AniyMb.

ALCARIA RADIX, Anxapia paquecb.

Смотри Ligustrum Indicum, Лигуструмъ ИнликумЪ.

ALCARICH, Ankapuxb. Cmompu Hyрегісит, ГиперикумЪ.

ALCARIFAR, Anxapupaph. CMompu Camphora, Камфора.

ALCARISIM, Annapusumb. Cmompu Satureja, Camppes.

ALCARME, Anxapme. Cmonipu Hedera, Гедера.

ALCASEN, Arkasenb. CMompu Meum, МеумЪ.

ALCASIM, Annasumb. Cmompu Enula, Энула.

ALCAST, Anxacmb. CMompu Costus, Kocmycb.

ALCEA AEGYPTIACA, Anyea Grunціака. Смотри Кеттіа, Кетміа.

ALCEA AEGYPTIACA VILLOSA. Алцеа Эгипціака пиллоза. Смотри Ватіа moschata, Bamia mocxama.

ALCEA AMERICANA, Angea Ameрикана. Смотри Sabdariffa, Сабдариффа.

ALCEA AMERICANA ANNVA FLORE ALBO MAXIMO, FRUCTU PYRAMIDALI SVLCATO, Алцеа Американа аннуа, флоре альо максимо, фрукту пирамидали сул-Ramo. Cmompu Ketmia Brasiliensis, Kemmia БразиліенсисЪ.

ALCEA ARBORESCENS IAPONICA, PAMPINEIS FOLIIS, FLORE MVTABILI-SIVE COLORE MVTANTE, Angea appoресценсь Японика, пампиненсь фолінсь, флоре мутабили, сипе колоре мутанте. Смотри Ketmia Sinensis siructu rotundo, Kem міа СиненсисЪ фрукту ропіундо.

ALCEA VESICARIA, Anuea пезика-

ріа. Смотри Кеттіа, Кетміа.

ALCEA VULGARIS, I B. Dod. Anuea uyarapuch. Alcea vulgaris maior, flore ex rubro roseo. C. B. Pit. Tourn. Alcea Rolea Linn. Алцеа или Дикая Проспирка. есть прозимующая, вышиною около аршина растущая и вь садахь вь Іюнь месяць

E 3

цвитущая трава, которая имветь воло сками покрышые, жесткіе и ноздреватою жидкостію наполненные стебли, производящіе темнозеленые, большіе, на длинвых в черешках в сидящие мохнатые и на иять или на шесть частей глубоко врезанные листья, также аленькіе выпуклистые и из Б двойной шестилисточной чашечки выходящіе цв вточки; которые по спаденію оставляють многія былыя капсулы, заклю чающія вы себв по одному черному, и капусному подобному съмячку. Корень ея походишЪ на корень осокори и тонокЪ. Она содержишь вь себь много масла, и влажноспи и малую часть соли, умягчаеть, помогаеть варенію желудка, гонить мочу и упопребляется какЪ внутренно такЪ и наружно въ припаркахъ и клистирахъ. Въ Апшеках в им вюшся коренья, но редко. Алцеа есть Греческое от слова «хий, авкарство, происходящее имя. Господинъ Линней полагаеть ее вы XVI. классь раствий, вы коихы цебть дватцать и болбе мужчиновъ съ женочкою вывств и вырастають яко братья изъ одного основанія (Monadelphia Polyandria) а Господинъ Турнефорть въ 1. классъ вь III. родь правь имвющихь однолистный колокольчистый цввть, котораго нестикь превращается въ съмянодержательницу. По Гречески Адміа; по Нѣменки Диден-Дарpeln, Fell-Rif; Wetterrößtein, Siegmars Burk: по Француски Alcee или Mauve fauvage: по Италіански Alcea или Malua selvatica; по Аглински Vervain Mallow.

ALCHADBER, Anxageepb. Смотри

Cynoglosium, ЦиноглоссумЪ.

ALCHAHASSIS, Anxaraccuch. CMompa Centaurium minus, Центавріумъ минусъ.

ALCHAKE, Anxane. Cmompu Lactuca,

Лактука.

ALCHALSE, Anxanse. CMompu Vrtica тајог, Урника мајоръ.

ALCHANDARO, Anxangapo. CMomun Gummi olibani, Гумми одибани.

ALCHANNA, Алханна. Смотри Galanga, Галанга.

ALCHANTAMVM, Anxanmamymb,

Смотри Diplacus, Дипсакусъ.

ALCHARD, Anxapgb. Cmompu Acacia vera veterum, Акація вера вешерумъ.

ALCHARFAS, Anxappach. CMompu Tamariscus, Tamapuckycb.

ALCHARFOS, Anxappoch. CMompu Apium, Aniymb.

ALCHARINTA, Anxapunma. Cmompu

Cyclamen, ЦикламенЪ.

ALCHARTAMA, Алхартама. Смотри Eryngium, ЭрингіумЪ.

ALCHEA, Anxed. CMompu Verbena,

Вербена.

ALCHECHINGI, Anxexuntu, CMompu Alkekengi, Алкекенги.

ALCHELIALAC, Anxenianakb, u ALCHELIALAMELECH, Anxenianaмелехь, и

ALCHELIALAMELETA, Anxenianamerema, n

ALCHELIALETHA, Anxenianema. Cmoпри Melilotus, Мелилоппусъ.

ALCHELIGES, Anxenurech. CMompu Rolmarinus, РозмаринусЪ.

ALCHELIMELECH, Anxenumenexb. Смотри Melilotus, Мелилотусь.

ALCHEME, Aaxeme. CMonipu Acetofa, Ацетоза.

ALCHERATIB, Anxepamueb. Cmompu Tragopogon, ТрагоногонЪ.

ALCHETORACHA, Anxemopaxa. CMOпіри Pyrethrum, ПиретрумЪ.

ALCHILIS, Anxunuch. CMompu

ALCHIMA, Anxuma. Cmompu Hermodactylus, Гермодантилусь.

ALCHIMILLA MAIOR VULGARIS, Алхимилла майорь пулгарись. Смотри А. chimilla Offic. Алхимилла Оффиц.

ALCHIMILLA MONTANA MINIMA, Алхимилла монтана минима. Смотря Percepier, Перпепіерь.

ALCHI-

ALCHIMILLA Offic. Ger. AAXHMUAAG Оффиц. Alchimilla vulgaris. Linn. С. В. Clus. Hist. Pit. Tournefort. Pes Leonis. Brunf. Cast. Lugd. Leontopodium или Patta Leonis. Dod. Pfiadium Diolcoridis. Drofera n Drofium Cord. in Hist. XIII. Annuno копыто; вЪ КаширскомЪ увздъ Манжетка, Язычки спиные или Льпиная лапа, есть низенкая трава, растущая кусточками въ огородахъ, по выгонамъ, на травянистыхъ сырыхъ м встахь и на лугахь, свемая въ садахъ и цевпущая въ Маів и Іюнв мвсяцахъ. Она имъетъ снаружи чернованые, внутри желпые, древесованые, волокнисные, и вЪ земль далеко поперегь разпространяющеся коренья, въ палецъ длины и горькаго вкуса; изъ коихъ вырасшають на длинныхъ и жестких в черешках в, широкіе, круглые, нъсколько згибовъ имъющіе, мохноватые, сь верьху блёдно, а съ низу желпюзеленые листья съ мълкою высъчкою и съ разръзанными на девящь или десящь часшей на подобіе звъздки краями. Между лисшьями вырастають тоненкіе коленчатые и на нъсколько вёшочек в раздёляющеся стебли, въ пять съ половиною вершковъ вышиною, имъющіе на кол вицах в по одному маленькому и большимЪ видомЪ вовсемЪ подобному листочку, и производящіе из вершинок в своих в маленькіе желтозеленые, и кучками растущіе цвьточки, которые выходять изв осми лапачной и къ верьху на подобіе прубки разширенной чашечки. Послъ цвътовъ оказывающся въ Іюль мвсяць мьленкія желшыя и на маковыя похожія съмячки. Примінанія достойно, что сія трава бываеть гладкая и желтозеленая, естьли вырасшаеть на сужих в опирыпных в м встажв, но зеленая пушистая на влажной земль. Листья ся имвють предъ другими шу ошмънность, что роса и при солнечномъ сіяніи долго на нихъ остается. Она содержить вы себы много влажносши, и всколько масла и малую часть соли, сгущаеть соки, синягиваеть или вяжеть, унимаешь крови, чистипь, сущить, украпляеть, и

прохлаждаеть. Вареная въ виноградномъ винъ трава употребляется внутренно отъ нарывовь въ легкомь, для исправления внупреннихъ соковъ и удержанія бълей; а въ водъ гареную пьють отв рань. Наружно распаривающь ее и припаривающь мягкія и обыслыя груди, которыя утверждаеть. Выжатый изв нее свёжий сокв залечиваеть болячки, полезень от падучей бользни и оть цынги. Перегонная съ листвями вода полезна от рань и разныхъ внушренных в повреждений, и употребляется наружно въ примочкахъ опъ спарыхъ ранъ ж фистуловь или не болящихь тугихь опухолей: права исполченная въ порошокъ и употребленная вЪ упомянущой водъ лечищъ у дъщей килы, и грыжу, и дълаеть, по увъреніямъ многих в женщин в к в беременности удобн в йшими: также и просто присыпается кЪ ранамЪ для валечиванія оных В. В В Апшеках в имбешся права и перегонная изъ нее вода. Алхимилла есть Латинское родовое имя, которое по переводу на нашъ пюлкъ значить, роса налисшьяхь; а Леоншоподіумь есть Греческое οπό словь λέων, левь и ποίς, лапа происходящее имя, которым в прозвана она попюму, что дистья ея имъють подобіе львовой лапы. ТосподинЪ распростертой Линней полагаеть ее въ IV. классъ расшения им вющих в четыре мущинки и одну женочку въ своемъ цвътъ, котораго чашечка превращается в съмянодержательницу (Теtrandria Monogynia) а ГосподинЪ Турнефорть въ XV. классь въ VIII, родъ травъ сь неправильнымъ цвъщомъ. По Гречески деочтонивом; по Нъмецки Gunau, Lowen-Fuß; Marien-Mantel; по Француски Piedde Lion; no Ишаліански Piede del Lione, или Sanicola maggiore; по Аглински Ladies Mantle Lions - Foot; Great Sanicle.

ALCHIMILLA PERENNIS VIRIDIS. MAIOR, Алхимилла переннись пиридись магорь. и

ALCHIMILLA VULGARIS, ARXIMURпа пулгарись. Смотри Alchimilla offic. Ал-ALCHI химилла оффиц.

ALCHISITA, Anxusuma u

ALCHIZITUS, Anxusumych. Cmompu Tragacantha, Tparakanma.

ALCHOAR, Anxoaph. CMonipu Enula, Энула.

ALCHORFENA, Anxoppena. Смотри Orobus, Opobycb.

ALCIBIACVM, Angusiaxy mb. Cmompu

Echium, DxiyMb.

ALCIBIADA, Anyubiaga. Cmompu Stoe

chas Arabica, СтехасЪ Арабика.

ALCIBIADIACVM, Anuusiagianymb. ALCIBIADION, Anyusiagionb. u

ALCIBIADON, Anyutiagonb. Cmompu Buglossa, Eyrnocca.

ALCIDIS, Anyugueb. Comompu Cete-

rach, Hemepaxb.

ALCISELEOS, Anyuseneoch. Cmompu

Sefeli Creticum, Сезели КретикумЪ.

ALCOA ARBOR, Ankoa apsopb. CMOmpu Ebenus viridis, Эбенусь виридись.

ALCOBEIS, Anxoneuch. CMompu Malua,

Малва.

ALCODA, Arkoga. CMompu Lilium album, ЛиліумЪ албумЪ.

ALCOGOAR, Anxoroaph. Смотри Myr-

tha, Muppa.

ALCOHEN, Annotemb. Cmompu Tere-

binthina, Теребинпина.

ALCOSADAR, Annosagaph. Смотри Coriandrum, КоріандрумЪ.

ALCOSAN, Aaxosanb, n] Cmompu Lulium al-ALCOSTA, Ankocma. bum, Am ALCOSTAIN, Annocmaunb ліум в ал-ALCOSTEN, Annocment. Ј бумЪ.

ALKOTON, Ankomoub. Cmompu Bom-

вах, Бомбаксв. ALCOZADAR, Annosagaph. Смотри

Coriandrum, Kopianapymb.

ALCVLBA, Ankynsa. Cmompu Feenum

Græсит; ФенумЪ ГрекумЪ.

ALCUNDEX, Anxyngench. CMompu Helleborus, Геллеборусь.

ALCVRAT, Anxytamb. CMompu Vrtica major, Уршика мајоръ.

ALCVRMESIT, Anxypmesumt. CMO-

три Tamarindus, Татариндусь.

ALCYONIVM, Anyioniymb. CMompu Spongia, Chouria.

ALDEL, Angenb. Cmompu Sinapi, Cunanu. ALDERVM, Angepymb. Cmompu Gummi Mastichis, Гумми Мастихисъ.

ALDON, Angonb. Cmomen Scylla. Сцилла.

ALEBRAS, Anespach. Cmompu Staphifagria, Cmaфисагріа.

ALEC, Алекь. Смотри Halec, Галекъ. ALECEID, Aneueugh. Cmompu Camphoта, Камфора.

ALECHE, Anexe. CMompu Siligo, Cuauro. ALECTOROLOPHOS, Anexmopono. Doch. CMompu Crista Galli, Rpucma Галли.

ALECTOROLOPPOS ALPINVS MAIOR. Алекторолофось Алпинусь магорь. Смотри Filipendula montana, Филипендула монтана.

ALECTOROLOPHOS PRIMVS, Aneжторолофось примусь. Смощри Filipendula montana, Филипендула монтана-

ALECTOROLOPHOS P RPVREA. Алекторолофось туртуреа. Сметри Стіва galli altera, Криста галли алтера.

ALECTOROLOPHOS TERTIVM GE-NVS, Алекторолофось терціумь тенусь. Смотри Crifta Galli, Криста Галли.

ALEDANA, Anegana Cmompu Ladanum, Ладанумь.

ALELO, Aneno. Смотри Solanum, Coланум в.

ALENHINAR, Anenimaph. Chomph Balaustia, Banasconia.

ALEPHIPHALON, Aregugaroub. Cmoтри Confolida maior, Консолида мајорь.

Алепофиллонь. ALEPOPHYLLON, «Смотри Buglossum, Буглоссумь.

ALESTV Arecmy. CMOTTEN Phyllium, Псилліум в.

ALE-

ALETEN, Anemenb. Смотри Mandragora, Мандрагора.

ALF

ALETHELI, Anemenu. Смотри Тата-

riscus, Тамарискусь.

ALEXANDRINA, Александрина. Смотри Agnus castus, Агнусъ кастусъ.

ALEXANDRVM, Anexcanapymb. Cmo-

три Leuisticum, ЛевистикумЪ.

ALFAC, Angarb. Cmompu Agnus caflus, Агнусъ кастусъ.

ALFANCA, Алфанка. Смотри Меп. thaftrum, Ментаструмь.

ALFARD, Алфардь. Смотри Achanaca, Аканака.

ALFARISICON, Andapucukoub. CMOmpи Euphrasia, Эвфразіа.

ALFATA FRANGI, Angama Opan-

ти. Смощри Asphodelus, Асфоделусъ.

ALFELAIE, Andenae ecms Erunemckin плодъ, который имъетъ душицъ (Origanum, ОриганумЪ.) подобный вкусъ. По Гречески AAQEAaie 'Aiyuwianos napros; по Нъмеции Ulfelaie, eine Egyptische Frucht; no Француски Alfelaie, fruit d' Egypte; по Италіански Alfelaie, frutto dell' Egypto; по Аглински Alfelaie, an Egyptian fruit.

ALFEGELIFF, Angerenuggb a

ALFEGELENGES, Andereneurech. Cmoтри Abrotanum, АбротанумЪ.

ALFEL, Angleab. CMompu Sambucus.

СамбукусЪ.

ALFELENGIA, Angeneuria. Смотри Basilicum, БазиликумЪ.

ALFIGEL, Andurenb. CMompu Salix. СаликсЪ.

ALFINA . Anguna. Chompu Plantago. Плантаго.

ALFOLA, Алфола. Смотри Scylla, Сцилла. ALFOR, Angoph. CMompu Carthamus, КартамусЪ.

ALFORNA, Алфорна Смотри Еріthymum, ЭпишимумЪ.

ALFOROC FRVCTVS , Andoponto Opykmych. Cmompu Pistachia, Hucmaxia. Yacma I.

ALFOSOLA, Angocona. CMompu Scylla , Сиилла.

ALFRANKEN, Алфранкень. Смотри

Dulcamara, Дулкамара.

ALGA ANGVSTIFOLIA VITRARI-ORVM C. B. Pit. Tournef. Anra antycmuponia numpapiopymb. Fucus marinus primus. Ang. Alga marina. Lob. Icon. Mopckin II pocmb или по Славенски Лучица есть морская, вдоль по берегамь средиземнаго и других в морей вы множествъ растущая трава, которая производишь длинные, узкіе, мягкіе и цвътомь темнозеленые лиспъя въ принапидать и осмнатцапь верьшковъ вышиною. Живущіе около средиземнаго моря крестьяне сущать и употребляють ее ко унавоживанію своихь полей; а торгующие благовонными вещами обверпывають ею свои бутылки; также делають изв нее зеленое стекло. Она содержить въ себъ много соли, сушить, слабить полезна оть ранъ и считается способною умерщвлять блох в и клопов в. Алга или Пороств по вод в составляють И. классь или порядокь растеній; им вюшь корень, листь и стебель вь одномъ мъстъ и весьма ръдко годятся въ пищу, потому что многіе изв нихв слабять. Алга есть Латинское от Римлянъ принятос имя. ГосподинЪ Линней полагаетъ всъ поросты въ XXIV классъ тайнобрачных в растеній (Cryptogamia.) а ГосподинЪ ТурнефоршЪ въ XVII. классъ во II. родъ морскихъ и ръч. ных в правв, коих в цвыть и плодь бывають обыкновенно не извъсшны По Гречески финос валасточ; по Нъмецки Meer, или Gee-Gras; по Француски Algue; по Италіански Aliga; по Аглински Graff-Wrack или Sea Wrack, такme Sea Weed.

ALGA CITRINA, Arra цитрина, Смотри Corallina, Кораллина.

ALGA CORNV CERVI DIVISVRA, Алга корну церпи дипизура. Смотри Fucus offic. Фукусъ оффиц.

ALGA MARINA GRAMINEA, Anta Марина граминеа; Сиотри Alga angustifolia, Алга ангустифоліа. ALGA-

ALGA MARINA LATIFOLIA, Anra Mapuna namuhonia. Смотри Fucus Marinus, Фукусъ Маринусъ.

ALGA MEMBRANACEA PVRPVREA PARVA, Алга мемрванацеа пурпуреа париа. Смотри Fucus Offic Фукусъ Оффиц.

ALGA PALVSTRIS, Алга палустрись. Смотри Nymphaea, Нимфеа.

ALGA PRIMA, Arra прима. Смотри Millefolium, МиллефоліумЪ.

ALGA TINCTORIA, Алга тинкторіа. Смотри Fucus Offic. Фукусь Оффиц.

ALGAFOR ALABIAT, Алгафоралавіamb. Смотри Behen album, Бегенъ албумь. ALGARAB, Алгаравь. Смотри Siliqua dulcis-, Силикра дулцисъ.

ALGARDEONE, Алгардеоне. Смотри Vincetoxicum, ВинцетоксикумЪ.

ALGARIA, Anrapia. Смотри Метси-

rialis, Меркуріалисъ.
ALGAZAR, Алгазарь. Смотри Равіпаса, Пастинака

ALGEDOAR, Anregoaph. Смотри Folia sennae, Фоліа Сенне.

ALGEIL, Anreunb. Cmompu Cynoglossa, Hunoracca.

ALGEORASCEM, Anreopacuemb. W. ALGEOROFEN, Anreopagenb. Смотри Acorus, Акорусъ.

ALGINGIATHI Arrunriamu. Смотри Cassia lignea, Kaccia лигнеа.

ALGIOS, Arrioch. Смотри Agnus caflus, Arrych кастусь.

ALGNARDA, Anthapga. Смотри Rofa, Posa.

ALGON, Алгонь. Смотри Capillus Veneris, Капиллусь Венерись.

ALGORAB, Алгорабь. Смотри Siliqua dulcis, Силиква дулцисъ.

ALGORICA, Алгорика. Смощри Мапdragora, Мандрагора.

ALGVARDA, Anryapga. Смотри Ro. fa, Роза.

ALGVARDAGON, Anryapgaronb. Смотри Chelidonium maius, Хелидоніумъ маюсъ. ALGVASAT, Annyacamb. Смотри Аттопіасит, АммоніакумЪ.

ALGVELAGVEN SIDERITIDIS FOLIO MAGNO, FLORE SVBCOERVLEO, Anrye патуень сидеритидись фолю магно, флоре субцерулео, или просто Алге Лагень, есть маленькое в В Америк в В Королевств В Хили вдоль по ръчнымъ берегамъ растущее деревцо. которое возвышается въ два аршина, им веть довольно длинные, искривленные, попереть въ земав распространяющеся, на многія віточки разділенные и пюнкими сь наружи шемными, а внушри бълесовашыми волокнами окруженные коренья; и прямый, суковатый, древесоватый, железнаго цебпа покрышый стебель, который кЪ корню бываеть въ палецъ толщины; и раздъляется на многія из в под влистков в раждающіяся и попарно другь прошивь друга наискось расположенныя в в тви; которыя безчерешными, зубчаными, окружаются объимъ концамъ острыми, немного жесткими и налистья полевой Шандры (Sideritis Сидериппись) похожими листьями, попарно также прошивоположены другь прошивь друга, шакь что одна пара оть другой не далье отстоить какь на вершокЪ; самые больше листья имъютъ полнора верьшка въ длину и три линеи въ ширину. При основании или началъ каждаго листа, а особливо верыхних вырастаеть по одному свытло голубому, однолисточному, и на подобіє цвёта травы, называемой Дигитались или Наперстокь, расположенному цввту, котораго передняя часть разръзана на двъ части, на подобіе двухъ устьевъ, изъ коихъ верьхняя, которая короче, выпуклиста, а нижняя закруглена: въугланъже находишся на каждой сморонъ по маленькой вырвзкв или поодному зубчику. Сей цвѣть заключаеть вь себѣ пестикъ о четырех в черных в стмичках в и выходить изЪ маленькой шемнозеленой и на пяшь кЪ концу острых в лапочек в глубоко врвзанной чашечашечки. Слово Апте на Индейскомъ языкъ значить Діавола; и я со всемъ моимъ стараніем в не могь открыть, для чего всв сіи народы придали сему деревцу такое дурное имя; но чрезвычайно острый его вкусъ подаетъ мнъ причину думать, что по оному она можетъ быть и прозвана такимъ названіємъ, Смотри журналъ ФизическихЪ, МатематическихЪ и БотаническихЪ изслёдываній Людвига Фелліе, на францускомъ языкъ. По Гречески "Ахує хаує инхрог δένδρον 'Αμερικάνον μικρόν δένδρον; πο Η ΕΜΕЦΚИ 211que Laguen, ein Americanisches Baumchen; no Opanцуски Algue Laguen arbriffeau de l'Amerique; по Ишаліански Algue Laguen, piccioll' albero dell' America; по Аглински Algue Laguen, an American thrub.

ALHABACHACH, Anrabaxaxb. Cmo-

три Basilicum, БазиликумЪ.

ALHAGI, Алгаги. Смотри Alkeltengi, Алкекенги.

ALHAGI MAVRORVM, Алгаги мапрорумь. Смотри Agul, Агулъ.

ALHAMAD, Алгамадь. Смотри Асс-

това, Ащешоза.

ALHARIB, Алгаривь. Смотри Нірегісит, Гиперикумъ.

ALHARLAIB, Anrapnausb. Смотри Absinthium, Абсинтијумъ.

ALHAS, Arrach. Смотри Thymus, Тимусъ.

ALHAURIB, Алгауривь. Смотри Нуpericum, Гиперикумъ.

ALHELAGEL, Antenarenb. Cmompu Aconitum, Akohumymb.

fa, Ahxysa. Anremie. Cmompu Anchu-

ALHENGE, Алгенге. Смощри Hyoscyamus, Гіоспіамусь.

ALHENIA, Алгеніа. Смотри Vrtica maior, Уртика маїорь.

ALHIMIA, Алтиміа. Смотри Anchu-

ALHORF, Antopob. Cmompu Nasturtium, Hacmypujymb.

ALHOSELENI, Алгозелени. Смотри Scilla, Сцилла.

ALIAB, Aniarb. Cmompu Balaustia, Ba-

ALIABRA, Aniaspa. Смотри

ALIABSILLOS, Aniabeunnoch. Cmompu Alkekengi, Ankekenra.

ALIBLEB, Алиблевь. Смотри Mercuria-

lis. МеркуріалисЪ.

ALICA, Anuxa. Cmompu Zea, 3ea, r. Borrago, Fopparo.

ALICA; Полба, род в простой пшеницы. ALICACABVM, Аликакавумы, и ALICACAFOS, Аликакафосы и ALICACTANVS, Аликактанусы и ALICAD, Аликады. Смотри Alkekengi, Алкекенги.

ALICIDA, Алицида. Смотри Огуга;

Ориза.

ALICIDI, Алициди. Смотри Ceterach, Цетерахъ

ALIDICEN, Алидицень. Смотри Міlium folis, Миліумъ солисъ.

ALILFOS, Anundoch. Cmompu Pæonia, Reonia.

ALIMARIA, Anumapia. Смотри Melo, Мело.

ALIMAZIC, Aлимазикь. Смотри Маfliche, Мастике

ALIMENTVM SATVRNI, Алиментумь Сатурын. Смотри Equifetum, Эквизетумъ.

ALIMON, Апимонь. Смотри Aron Аронь.

ALINAYA, Алиная. Смотри Lavendula, Лавендула.

ALIPODVS, Anunogych. u

ALIPOODOS, Алипоодось. Смотри Соссодпіdium, Коккогнидіумь.

ALIPPODVS, Anutitogych. M

ALIPPOS, Алиппось. Смотри Chamomilla, Хамомилла.

ALISFOS, Аписфось. Смотри Росопіа, Пеоніа.

ALI-

ALISIM, Anusumb. Cmompu Auricula muris, Аврикула мурисъ.

ALI

ALISINA, Annsuna. Cmompu Hellebo.

rine . Геллеборине.

ALISMA, Anusma. Cmompu Mentha Saracenica, Мента Сараценика и Saponaria, Сапонаріа.

ALISMA ALPINVM, Anucha Annuнумь. Смотри Arnica и Saponaria, Арника

и Сапонаріа

ALISMA CIMBALIANTHEMONE. Алисма цимбаліантемоне. Смотри Helle-

borine, Геллеборине.

ALISMA. Matth. Annema. Plantagomontana ejusdem. Arnica seu Betonica montana. Doronicum plantaginis folio alterum C. В. Pit. Tournef. Баранья трапа, а по переводу Горная Букпица, есть права роду Дороники (Doronica) или дикой козы корень, расшеть на гористых в мбстах в и цевшешь вь Маів мёсяць. Она имвешь красноващый и на многія ЧемеришнымЪ подобныя волокиы разд вленный корень прянаго экуса; изъ копюраго вырастають многіе черенястые толстые, мохнатые, жилками испещренные, по землъ расшилающиеся и ПопушниковымЪ подобные лисшья, коижЪ оба края внутрь согнуты или свернуты (Fol: involuta) из в средины коих в возвышаешся круглый, зеленый и маленькими, видомъ на нижніе похожими лисшочками окружающійся стебель, въ шесть и въ десять вершковъ вышиною, из вершины которато вырастаеть свыпложелный, вь низу трубкою расположенный и изъ прехъ периспыхъ лиспочковь составленный цвыть, покидающій послв спаденія продолговатыя, бълымь нушистымь вынчикомь окруженные, и нарочито пріятный запахв и острый вкусв иміющія съмяна. Она содержишь въ себъ иного соли и масла, разжижаеть, чистить, тонишь пошь и мочу, возбуждаеть рвошу и разбиваеть згустиничеся кровь. Наружно можно ее употреблять образомъ баненія для поспвинеспинованія остановленной місячной кроги. Алисма есль Греческое omb слова адьора, тошнота, происходящее имя, потому что сія права причиняеть тошноту. ГосподинЪ Линней полагаетъ ее въ VI. классь шести-тычковых в растыній (Нехапdria) а ГосподинЪ Турнефортъ въ XIV. классь вь V. родь травь сь перистымъ и трубкою расположенным в цвытом в. По Гречески «хора; по Нъмецки Ungarische Gemsen = Wurß; по Француски Bétoine des montagnes или Doronic d'Hongrie; по Италіански Doronica del Hongaria, o Betonica di montagne; по Аглински German Leo.

pardsbane.

ALISMA NATANS, Annema namaneb. Plantago Aquatica Offic. Водяный Попутникь, а около Камы Пупопникь права растеть въ Сибири и других в мъстахъ Россіи, въ болошинахв, и влажныхв мвстахв, и цввмешь вы Іюнь мьсяць. Она имьешь большіе, широкіе, тонкіе жиловатые, и каждый на особливом в гладком в черешив, сидящіе листья, из в средины коих вырастаюшь вы Іюнь и вы Іюль мысяцахы одинь или нъсколько зеленыхъ стеблей съ маленькими прехъ листочными, бълыми или пълеснаго цв вта цв в почками, оставляющими въ своей чашечкъ но одному мъленькому съмячку. Сія трава содержить вь себъ много масла и влажносни и малую часть соли, унимаеть понось и шеченіе крови, и прошивишся гнилосши. Лисшья наружно приложенные исц вляющь раны, и похваляются от укушенія бішеных собакь, а вазеный изъ нихъ густый сокъ, принятый внутренно полезень оть желчи и изгаги. Господинъ Линней полагаеть ее съ бараньей правою в водин в классв. По Гречески Άλισμα ύδατωδης; πο Η Εмецки Waffer Wegerich; по Француски Plantain d'Eau; по Ишаліански Piantagine aquatica: по Аглински Water Plantain.

ALISMA PRATORVM, Anucha npaторумь. Смотри Primula veris, Примула ALIверисЪ.

ALISMA PVSILLVM, Алиста пузиллумь. Смотри Damasonium, Дамазоніумь.

ALI

ALISMA TENVIFOLIVM, Аписма Тенунфоліумь. Смотри Helleborine, Гелаеборине.

ALISMA TRAGI, Anucha mparu. Cmompu Costus Hortorum, Kocmych Popmopymb.

ALISTOS, Anuemoch. Смотри Milium folis. МиліумЪ солисЪ,

ALISVS, Anusych. Смотри Cyanus, Ціанусь.

ALITHIMVM, Алитимумь. Смотри Scecahul, Сцекагуль.

ALKADES, Алкадесь. Смотри Viola-

ALKALEIA, Алкалея. Смотри Aquilegia, Аквилегіа.

ALKALI, Алкали. Смотри Kali spinofum, Кали спинозумЪ.

ALKALSEINER, Алкалзеннерь. Смотри Folia sennae, Фоліа сенне.

ALKANNA, Алканна. Смощри Anchufa, Анкуза.

ALKANTABOTES, Алкантаботесь. Смотри Nepeta, Непета.

ALKARICH, Алкарихв. Смотри Нуpericum, Гиперикумъ.

ALKAROA, Алкароа. Смотри Ricinus, Рицинусъ.

ALKARSVM, Алкарсумь. Смотри Sangvis Draconis, Сангвись Драконись.

ALKARZET, Ankapsemb. u

ALKARZETI, Anxapsemu. Смощри Nasturtium, Настурніумъ.

ALKAS, Алкась. Смотри Lactuca,

ALKEDAR, Annegaph. n

ALKEDED, Алкедедь. Смотри Citrullus, Цитрулаусь.

ALKEDIDI, Ankegugu. Смотри Sumach, СумахЪ.

ALKEFANDARV, Алкефандару. Смошри Diplacus, Динсакусъ.

ALKEKENGI. Lon, Ankerenru. Alkekengi Officinarum. Pit. Tournef. Solanum veficarium C. B. Solanum halicacabum vulgare. C. B. Halicacabum vesicarium Can. Saxifraga rubra et 4: Brunsf. Vesicaria vulgaris. Dod. Physalis Alkekengi. Linn. X. Maxyhaka ягода или Жидопскія пишни, есть маленькое, здёсь въ однижъ полько оранжереяхъ растущее деревцо отъ шести до девяни верынковъ вышиною, конторое цвътеть вы Іюнь и приносить ягоды вы Августъ мъсяцъ. Оно имъетъ бълые, длинные и тонкіе коренья и красноватые круглые тонкіе, и на многія вѣтви раздѣляющіеся прушья или стебли, окружающіеся зелеными, широкими, продолговаппыми, остроконечными и мягкими листьями, между коими вырастають вы Іюнь мьсяць бълые однолистные и на подобіе розончиков в расположенные цевшочки, послъ коих в чашечки превращающся в пленчапые пузырики съ маленькой лъсной оръхъ геличиною, которые сперва бывають зеленые, но созръвая получающь блёдно красной цевшь и заключають вы себь на див красныя видомъ и величиною вишнямъ подобныя ягоды, наполненныя былою гусстою влажностью и маленькими плосковашыми и бъложелшыми съмячками. Сіє расшвніе любишь швнисшыя мвста и частую поливку. Размножение его дълается чрез в коренья; ягоды собираются в в Августв мвсяцв, содержать въ себв много влажноспи, соли и масла, гоняпь камень и мочу, прохлаждающь, чистять кровь, унимають рвзъ въ живошъ, раздъляющъ дурныя мокропны и полезны от всяких в бользней вы почках в и пузыр в, в в которых в употребляеть ся перегнатая съ ягодами вода. Въ Аптеках в ягоды нын в редко употребляются, а въ прежнія времяна держали гоненую воду и соль. Алкекенти есть Аравское, а Галикака-Бумь Греческое, от в словь аль, море и хана Вос, судно, происходящее имя; ибо древние YTE-

ученые находили н вкоторое сходство между ягодною чашечкою съ мореходнымъ судномъ. Господинъ Линней полагаетъ сіе деревцо въ V. классъ растеній, коихъ обоеродный цвѣть содержить вь себѣ пять мужчинокъ и одну женочку. (Pentandria Monogynia) а ГосподинЪ Турнефортъ во II. классъ вь III. родь расшеній съ однолисшнымь цвътомъ, котораго пестикъ превращается въ мягкую ягоду. По Гречески Угрихио жду Στρύχνος άλικακαβως; по Арабски Kekengi и Alkakengi; no Homenku Juden-Ririchen, 230= borellen или Juden-Docflein; по Француски Coqueret или Coquerelles, marke Alkekenges, по Италіански Alcachengio; по Аглински Winter-Cherry, или Alkekengi.

ALKEKENGI MEXICANVM, Ankekehru Mekcukanymb. Cmounpu Solanum som-

niferum, СоланумЪ сомниферумЪ.

ALKEKENGI VIRGINIANVM, FRVCTV LVTEO, VULGO CAPVLI, Anxerentu Виргиніанумь, фрукту лутео, обыкнопенно капули. Желтые Жидопскія пишни, есть въ Виргиніи растущее и съ великимъ спараніемъ въ Перуанскомъ Королевствъ размножаемое дерегцо, которое сходствуеть совершенно съ вышеписан нымЪ, кромъ своего плода, который бываеть желтаго цевта Извонаго двлають консерву кислаго, прохлаждающато вкуса, которая съ пользою употреблена быть можетъ для возстановленія охоты кЪ пищъ у Στρύχνος της Гречески больныхЪ. По Bupynvias no Homenku Gelbe Virginische Jus den Rirschen; по Француски Coquerelles de Virginie; no Ишаліански Alcachengio della Virginia; по Аглински The Virginian Winter Cherry.

ALKEKENGI VULGARE, Ankekehru nyarape. Cmompu Alkekengi, Ankekehru.

ALKELILGEBEL, Алкелилгевель.
ALKELILGELEB, Алкелилгелевь. Смопри Rosmarinus, Розмаринусь.

ALKEM, Ankemb. u

ALKERI, Алкери. Смощри Corallium, КоралліумЪ.

ALKERMES, Annepmect. Смотри Kermes, Кермесь.

ALKIDABAT, Алкидавать. Смотри Terebinthina, Теребинтина.

ALKIKIL, Алкикиль. Смотри Мугоbolani, Мироболани.

ALKILILEMELITH, Алкилипемелить. Смотри Melilotus, Мелилотусь.

ALKIMA MATER, Алкима матерь. Смопри Маггивінт, Маррубіумъ.

ALKISTIS, Anxuemuch. u

ALKISTVS, Annuemych. Cmompu Papaver hortensis, Папаверъ горшенсисъ.

ALCOSOR, Алкозорь. Смотри Сатphora, Камфора.

ALLAPODIO, Annanogio. Смотри Роlypodium, ПолиподіумЪ.

ALLEGIA, Anneria. Смотри Bistorta, Бисториа.

ALLELVIA OFFICINARVM, Аллепуя оффицинарумь. Смотри Oxytriphyllon. Окситрифиллонь.

ALLELMECHIAHEL, Аппелмехіатель. Смотри Melilotus, Мелилотусь.

ALLEOTIS, Аллеотись. Смотри Gentiana", Генціана.

ALLESCIVS, Annecuiveb. Chomph Psyllium, Псилліумь.

ALLETICA, Аллетика. Смотри Азаrum, Азарумъ.

ALLIARIA Dod. Trag. Anniepia, Alliastrum, Gesn. Hort. Hesperis allium redolens. Moriss. Alliaris. Dod. Thlaspidium cornutum. IX. Авсной чеснокь; Чесношная трапа или Ослиная нога расшеть по полямь, на лугахь, въ болошистых в лъсах и въ множествъ въ Сибирн по берегамъ ръки Уфы и цвъщеть въ Іюнъ и въ Іюлъ мъсяцахъ. Она имъетъ широкіе, кругловатые, зеленые, мелкими зубчиками окруженные и на подобіе Мелиссиных в гладкіе листья, окружающія тоненкіе и въ поль аршинавыщиною растущіе стебельки, производящіе

IIO

изЪ вершины своей маленькіе, бълые, изЪ чепырехЪ листочковЪ состояще и внупри шесть желпованых в молопочков в имвюще цвъточки, которые оставляють послъ спаденія маленькіе рожки, и въ оныхъ по четыре стмичка чернаго цвита; корень у нее бълый, длинный, и жесткій. Въ рукахъ разтертая трава даеть оть себя чесношный запахЪ, и имветъ онагожъ вкусъ, который однакожь слабве и пріятиве. Сія права содержишь въ себъ много соли и масла, жидишЪ, отворяетЪ, разбиваетЪ, проти вудъйствуеть яду и гнилости, унимаеть теченіе съмини, чистить вонючіе нарывы, и полезна от в застарблаго кашля. Корень истолченный въ порощокъ и употребленный внушренно, раздъляеть дурныя мокроты причиняеть на низь и поспышествуеть варенію пищи въжелудкъ. Въклистирахъ унимаеть онъ всякія внутренніе боли, разгоняеть вътры и очень полезень от рвза вь животь и от почечной бользни. Лиспыя приложенныя свъжія, лечапъ Антоновъ огонь и боль въ лядвеяхъ; праву варять въ горшкъ съ водою, съ Грудною травою (Scabiola, Скабіоза) съ Исопомъ (Нуябория Гисопусь) съ Вероникою (Veronica) съ Девясилевымъ корнемЪ (Radix Helenii. РадиксЪ Геленіи) и сЪ грудными ягодками (Іпіньае Ююбе) прибавляющь къ сему денокщу двв споловыя лошки патоки и пьють по нъскольку стакановь вь день отв застарвлаго кашлю, ошь одышки и густой грудной мокропы; ошр Уншонова огня, и гничиру набрывовр чыталь я следующее средство: должно въ Апрълъ или въ Маїв місяців набращь сей тавы, выжать изв нее сокв, налипь на оной чистаго деревяннаго масла, и спрятать въ хорошо закупореныхъ склянкахъ ко унотребленію. Въ порошокъ истолченое и въ количествъ дватцати гранъ принятое съмя, отворяеть засорение въ почкахъ и машкв, гонишь глисты, полезно отв желчи и водяной бользни и унимаеть сухошку дъщей. Оный порошокъ буду-

чи нюханъ или вшянушь въ ноздри, причиняеть чиханіе и очищаеть мозгь. Алліаріа есть Лапинское от в слова алліум в неснокъ происходящее имя, потому что сія права имбеть чесношный запахъ и вкусь. Господинь Линней полагаеть ее въ VI классъ расшеній, имѣющихъ въ своемъ певшв шесшь мужчинокв и одну женочку (Hexandria Monogynia) а ГосподинЪ Турнефорть въ VI. классь въ III. родъ травъ съ кресто-образнымъ цвътомъ, котораго пестикъ превращаения въ стручковатую двум встную свиянодержательницу. По Гречески Ухоробой ауриой; по Нъмецки Япоэ blauch, Lauchel, unn Saß-Rraut; no Ppanпуски Alliaire или Herbe des aulx; по Италіански Alliaria; по Аглински Iack-by-the Hedge или Sawce alone.

ALLIARIS, Anniapuch. u

ALLIASTRVM, Anniacmpy Mb. CMOmpu Alliaria, Anniapia.

ALLIORIVM, Anniopiymb. Scordium, СкордіумЪ.

ALLIPIODES, Annuniogech. CMompu Mezereum, МезереумЪ.

ALLIPORRVM, Annunoppymb. CMO. три Scorodoprasum, СкородопразумЪ.

ALLIVM ALPINVM, AnniyMb Anпинумь. Смотри Victorialis, Викторіались.

ALLIVM ALTAICVM, Annivmb Anтанкумь. Бутунь или Каменный Лукь, есть родь чесноку растущаго въ Сибири на высоких в горах в, а особливо на верьшинах в Алшайских в и цветешь вы Іюнь мысяць. ВкусомЪ подобенЪ онЪ обыкновенному, сЪ которымъ чаятельно и свойствами своими сходствуеть. По Гречески Уновобой Увреной; по Нъмецки Alltaischer Knoblauch, или Stein= Lauch; по Француски Ail de Siberie; по Италіански Aglio della Sibiria; по Аглински Sibirish Garlick.

ALLIVM ANGVINVM, AnniyMb AHгпинумь. и

ALLIVM COLVBRINVM, Arriymb KOлубринумь. Смотри Victorialis Викторіались.

ALLIVM foliis radicalibus petiolatis, flo ribus umbellatis. Roy. pr. 39. Gmel. lib. Tom. 1. р. 49. Алліумь фолінсь радикаливусь пеціолатись флоривусь умвеллатись. Черемица или Поленой Чеснокв, расшеть въ Сибири и въ нъкоторыхъ странахъ Камчашки, гав собирають его и высуща на солнцв ирошеной берегушь на зиму, а зимою варять его вы водь, и всквася упопребляють вмвсто ботвины называемой у нихЪ щами; шакже почишается Черемша превосходным в лъкарством в отв цынги. Смопіри Крашенинниково описаніе сей земли. По Гречески Ехоробой одеми; по Нъмецки Wilder Anoblauch; по Француски Ail Sauwage: по Италіански Aglio selvatico; по Аглински Wild or Crow Garlick.

ALLIVM HORTENSE, Алліумь Гортенсе. Смощри Allium vulgare, Алліумь

Вулгаре.

ALLIVM MONTANVM LATIFOLIVM MACVLATVM, Anniymb monmanymb namuфоліуmb макулатумь. Смотри Victorialis, Викторіались.

ALLIVM NON BVLBOSVM, Алліумь нонь булбозумь. Смотри Alliaria, Алліаріа.

ALLIVM NVTANS, Anniymb нутансь. Лизунь, есть родь чесноку растущаго на травянистых выстах около Угаль ских в горь. По Гречески Σπόςοδον πλειώδης по Нъмецки Utalifther Rneblaud; по Француски Ail qui croit autour du mont Vral; по Италіански Aglio di montagna del'Vral;

ALLIVM OPHIOSCORODON, An-

піумь офіоскородонь. и

ALLIVM RADICE OBLONGA, An-

піумь радице облонга. и

ALLIVM RETICVLATVM, Anniymb ретикулатумь. Смотри Victorialis, Викнюріались

ALLIVM SATIVUM Ainn, Anniymb camunymb. Allium. Brunsf. Trag. Dod. Allium hortense. Fuch. Allium vulgare. I. B. Allium sativum multifidum. Cord. Hist.

XXXVII Чеснокь, извъсшенъ почти во всей Россіи; его садяшь вь огородахь, вь которых в онв цевтеть вы Іюнв мвсяцв, и употребляють въ пищу, а особливо простый народъ называющій зеленые его листья Ботнемь. Чеснок в имбеть длинныя, ПырейнымЪ (Gramen, ГраменЪ) подобные. и съ объихъ спюронъ острые лиспыя, обвивающіе круглый, гладкій и врутри пустый сиволъ или трубку въ полъ аршина и бол ве вышиною : на вершин в которой вырастаеть толстая и круглая головка обведенная былою перепонкою, которая созрывь трескается и оказываеть бъловатые, пучками растущіе, и на подобіе Лилей, изв шесни листочковъ состоящие цвъточки. покидающие послъ спаденія, преугольныя, прехъгнъздныя и кругловапыя съмячки въ себ в заключающія свмяно держашельницы: корень его составляеть кругловатую луковицу состоящую из в былых в тонких в перепонок в, одна въ другую заключащихся и покрывающих в мясистыя, и продолговатыя чесновочки, острогорькаго вкуса и произительнаго запака. Около луковицы находяшся многія волокны, ушверждающія еевь земав. ВЪ Медицинъ употребляють чесношныя головки и корень. Чеснокъ содержить въ себъ много соли и малую часть масла и влажности, грвень желудокь, сушинь, првизводинь нанизь, разгоняеть выпры, разжижаеть, помогаенть варенію желудка, прошивод виствуеть яду и отравамь; возбуждаеть жажду и аппенить, причиняеть жарь, гонить поть имочу, и полезень оть каменной бользни, лихорадокЪ, отъ глистовъ, ужаленія или уязвленія ядовишыми гадами и св уксусомв ошь моровой язвы и другихь придипчивыхь новѣщрій. ДорожнымЪ людямЪ, и на полъ или вь авсакь, также вь других в пижких в работахъ трудящимся и употребляющимъ много сукаго хавба и не чистой и не здоровой воды, чеснок в очень полезен в по чему и называется ошь многия в деревенским в Феріаком в на прошивЪ

пивь того горячаго сложен я люди и беременныя женщины должны от в онаго воздержаться. Вареным вы вод в чесноком в сов в тують мазать по упрамь и вечерамь опухлые ноги, по тому что опухоли разбиваеть. Наружно употребляюпів его вв вышягивашельных припаркахв; также толкуть и прикладывають тьмь, у коих в отнялись какіе нибудь члены на твль, и на мозоли, которыя раздробляеть. Съ тестомъ кЪ пятамъ приложенный унимаеть боль въ голо въ, ивынимаеть жарь. По утрамъ натощакъ сь медомь или вареный вь молокъ внутренно упопребленный умерщвляеть глиспы и гонить поть. Солдаты, естьми хошять имъть бавдный и болезненный цв в ты в Б лицв, впыкають, сь позволеніем в писать, одну только чесноковку вЪ задній проходЪ. Естьли положить чесноку вь бочку вина, то оное превращается вь уксусь. ВпрочемЪ сгоняетъ у курицъ шипунъ, естьми оной им в попрешь, и упопребляется коновалами от в разных в лошадиных в припадков в. Алліумь есть Латинское от Римлянь принятое имя. ВЬ АпшекахЪ дёлается СыропЪ, пластырь (Emplastrum ex allio) и во время мороваго повъщрія ЭликсирЪ. ГосподинЪ Линней полатаеть его вь VI. классь растений, им вющих в в цв в своем в шесть мужчинок в и одну женочку (Hexandria Monogynia) а Господинь Турнефорть вы IX классь, вы IV от дъленіе, в В XII род в трав в им вющих в расположенный на подобіе лилей цвѣшь. По Гречески Укодобом; по Арабски Chaum и Cairin; по Нъмецки Knoblauch также Gieg = 2Burk; по Француски Ail; по Италіански Aglio; по Аглински Garlick.

ALL

ALLIVM SCORODOPRASSVM, Anniумь Скородопрассумь. Смотри Scorodo-

ргавит, СкородопрассумЪ.

ALLIVM SERPENTINVM, AnniyMb Серпентинумь. Смотри Victorialis, Викто-РіалисЪ.

ALLIVM SPHOERICEO CAPITE, Anniумь сферицео капите. Смотри Scorodoprassum, Скородопрассумъ.

Yacma I.

ALLIVM SYLVESTRE, Annivab curпестре. Смотри Сера Iuncifolia minor, Цепа Юнцифоліа минорь.

ALLIVM VICTORIALIS, Anniyab 1140

жторгались. и

ALLIVM VIPERINVM, Anniymb nuперинумь и

ALLIVM VRSINVM, Anniymb ypcuнумь. Смотри Victorialis, викторіались.

ALLIVM VULGARE, Arniymb 11yxrape. cmompu ALLIVM SATIVUM, Anniумь сашивумь.

ALLOBROGVM, Annosporymb. CMOтри Chamoerhododendron, Хамергододендронь.

ALLVLVIA, ARRYRYA. CMOMPH Oxi-

triphyllon, ОкситрифиллонЪ.

ALMA, Алма. Смотри Iambos, Ямбосъ. ALMACHARAB, Annaxapasb. Cmoтри Gummi Arabicum, Гумми АрабикумЪ.

ALMARAGO, Armaparo u ALMARGAL, Anmopranb u ALMARGEL, Annaprent u

ALMARGEN, Annaprenb. Смотри

Corallium, Kopanniymb.

ALMAROSEKIM, Aлморозеримь. Смотри Мајогана, Мајорана.

ALMARV, Annapy. Cmompu Marrubium album, Маррубіумъ албумъ.

ALMASTIC, Armacmukb. x

ALMASTICHE, Armacmuxe. Cmompu Mastix, МастиксЪ.

ALMEA, Annea. Cmompu Plantago, Планшаго.

ALMELAS, Anmenach. CMompu Nasturtium, Hacmypuiymb.

ALMELMA, Anmenma. Cmompu Sabina, Сабина.

ALMENESIM, Armenesumb. Cmompin Menthastrum, МентаструмЪ.

ALMEASESSVM, Anneaseccymb. w ALLESVM, Annesymb. Cmompu Nasturtium, Hacmypujymb.

ALME-

ALMESERON, Anneseponb. Смотри Mezereum, МезереумЪ.

ALM

ALMIMIRAM, Aлмимирамь. Смотри Chelidonium maius, Xenngoniymb manoch.

ALMODO, Anmogo. Cmompu Bdellium, БделліумЪ.

ALMOR, Anmopb. Cmompu Myrrha,

ALMOSAFAR, Алмозафарь. и

ALMOSAFAT, Алмозафать. Смотри Tamarindus, Тамариндусь.

ALMOSORA, Алмозора. Смотри Chamaedrys, Xameapucb.

ALMOZASAR, Anmosacaph. Смотри

Tamarindus, Тамариндусъ.

ALMVCAM, Anmykamb. Cmompu Chelidonium Maius, ХелидоніумЪ маюсЪ.

ALMVRIA, Armypia. Смотри Arum, АрумЪ.

ALMVSCA, Anmycka. Cmompu Macis,

Мацисъ. ALNAZID, Annasugh. Cmompu Sarcocolla, Саркоколла.

ALNANZE, Алнанзе. Смотри Ammi,

Амми.

ALNEREGIE, Anneperie. Смотри Мо-

schata, Mocxama.

ALNI EFFIGIE LANATO FOLIO MI-NOR, Ални еффигіе ланато фоліо минорь. Смотри Diospyros, Діоспирось.

ALNI FRVCTV, MORIFOLIA ARBOR, FLORE PENTAPETALO, Ann ppykmy, Морифоліа арворь, флоре Пентапетадо. Смотри Theobroma, Теоброма.

ALNVS BACCIFERA, Annych Бакци-

фера. и

ALNVS NIGRA BACCIFERA, Annych нигра вакцифера. Смотри Frangula, Франтула.

ALNVS ROTVNDIFOLIA GLVTINO-SA VIRIDIS, Annych pomynguponia rny-

тиноза пиричись. Смотри

ALNVS VULGARIS. Cluf. Hift. I. B. Annych nyarapuch. Alnus rotundifolia glutinosa viridis. C. B. Pit. Tournesort. Amedanus Crescent. IV. Олька или Олькопникь дерево, расшеть на низменныхъ, болотиспыхв, зыбкихв и мокрыхв мвстахв, по ръкамъ и въ нъкоторыхъ холодныхъ странахъ Россіи на песчаныхъ горахъ, и бываеть двухь родовь, изь коихь растущій на мокрых в называется черною, а на сухихЪ мѣстахЪ бѣлою ольхою. Черная больше былой, имветь темнозеленые, тучные, гладкіе, круглые, толстые и липкіе листья, вырастаеть очень высоко и прямо, бываеть посредственной толщины и покрывается съроватою, темножелтыми крапинками изпещренною и въ старости шероховаштьющею и мохомъ обрастающею корою. Белая Ольха имвешь свёшлозеленые оръховымъ подобные, остроконечные, мягкіе, какЪ бы складками складывающіеся и н всколько шероховашые листья, расшеть нетакъ высоко какъ черная, тонъе оной, и покрывается сперва зеленою, потомъ съръющею и въ старости бълвющею корою, также и цввтв и шишки ея меньше. Посл'в лисша оказывающся длинныя, от в шести до семи вм вств висящія, чрезъ всю зиму на деревъ остающіяся, но весною въ желпую и на землю опадающую пыль превращающіяся зеленые съ красною смісью кисточки; между коими вырастаеть цвъть или маленькія, шемныя и на дерев всегда остающієся пучечки, из в коих в в исходв Сентября мъсяца родятся желтоватыя, въ длину полвершка и подобіе яица имъющія шишечки, которыя въ Октябръ мъсяць получають съроватый цвыть, сохнушь и оказываюшь вь промежушкахь своих в по разстворении телухи плоскія, красныя, крылошками снабденные, никакого вкуса не им вющія и при в в пр с дерев в слетающія съмячки, которыми охотно питаются чижики, которые по сей причинъ остаются здёсь почти во всю зиму, и собирающся кучами, гдъ сего корму много. Ольховое дерево полезние всякаго другаго какого лъсу на плошины и строение въ ръкахъ

и болотахь: ибо будучи безпрестанно покрыто водою, не гніеть и бываеть почти непільнное, также можно дылать изв него городьбы; для мягкости своей годень онь на дъланіе разныхъ домашнихъ потребностей, какЪ то чашекЪ, торълокЪ корытецЪ и прочаго къ столярной работъ надлежащаго, и естьли прикроется лакомЪ, то не уступаетЪ никакому другому дереву. Также двлають изъ него трубы, рубять въ дрова, и жгуть хорошія уголья. Шляпники и кожевники употребляють ольховую кору на крашение шляпь и кож въ черную краску; а сапожники мочуть ее въ водъ, въ которую кладуть не много стараго жельза. Понеже ольховые листья, начинающіе уже тнить, чернять жоть самую чистую воду, то не должно тихъ сажать возав прудовь, а стараться какЪ можно искоренять. ВЪ Декабръ иливЪ Январъ місяць кормять овець упомянушыми лисшьями и узнавающь по сему корму, которыя здоровы, и которыя нёть; потому что въ перьвомъ случав овца съ жадностію и охопно оные Бсть станеть вмвсто того, что больная не скоро за нихв примишся. Сказываюшь будшо бы лисшья прогоняють блохь, которыя по усыпании оными комнаны, на них в вст вскакивають, такъ что ихъ съ оными вымъсть можно. Свиньи очень падки до молодых в ся отпрысковь. ВЪ описаніи л'Есовъ растущих въ свверных В Россійских в странах в, читал в, что здёсь вы Россіи на такихы містахы, тав по усмотренію издревле миожество черной ольхи сшояло, и на корнъ исчезло, обывашели берушь верьхнюю землю и жгушь изъ нее желъзо. Въ прочемъ содержитъ въ себъ Олька много масла и соли. Лисшья вяжушЪ, разбиваюшЪ опухоли, унимаюшЪ остроту внутренних в соков в, укръпляють и полезны от рань. Кора вяжеть, прогоняеть лихоратки и приложенная хороша отв распаленія. Цвёшь укрёпляешь, прохлаждаеть, и употребляется оть воспаленія горла вь колосканьяхь. Господинь Даль приписываеть

AIN

листьямъ свойство унимать усталость. Въ Аптекахъ ничего изъ нее не имъется. Алнусь есть Ламинское от Римлянъ принятое имя, котораго смыслЪ неизвъстенЪ. ГоснодинЪ Линней полагаеть ее въ XXI. классъ растеній, им вющих в на одном в и том в же корн в цвёты и мужескіе и женскіе и въ мужескомъ три тычка (Monoecia Triandria); а ГосподинЪ Турнефорть вь XIX. классь въ III отдъленіе, въ VI. родъ деревъ съ составленнымъ нзъ многих в маленьких в пвыпочков в цвыпом в. по Нъмецки Erlen-Baum или Ellern-Baum, Erle; по Француски Aune arbre; по Ишаліански Alno или Ulno, albero; no Аглински The Alder tree; по Камчашски, гдв она расшешь вы множествъ Сыкытъ; по Корятски Ныкыліонъ; по Курильски АксЪ. (Смотри Господина Крашенинникова описаніе Камчашки.)

ALOA, Anoa. CMompu Lignum Aloез, лигнумъ Алоесъ.

ALOARAS, Anoapach. Cmompu Iunipeтиз, Юниперусъ.

ALOB, Anosb. Cmompu Gentiana, Tenціана.

ALOCRABI, Алокраби. Смотри Ceteгасћ, ЦеперахЪ.

ALOCTIS, Anoxmuch. Смотри Gen-

tiana, Генинана.

ALOE. I. B. Pit. Tournefort, Anoe. Dod. Pempt. Aloe vulgaris. C. B. XXXVIII. Ca-*Бурь* или Горькоглинная трава, есть изъ встхъ чужихъ и иноспіранныхъ ствній примвчанія достоинвишая, и растеть здёсь только въ оранжереяхъ. Она имъсть длинный, волокнистый и кривый корень, из в котораго вырастають длинные, широкіе, толспые, мясистые, сочные и у нъкошорых в родовъ по краямъ колючими иглами обсаженные лиспия, пиемно, а иногда бявднозеленаго цввта; изъ средины коихъ возвышается долгій и толсный стебель, производящій изъ вершины своей большіе, из в одного на шесть частей разръзаннаго листа состоящіе либо желтые, либо бълые

и на подобіе Лилейных в расположенные пвины о нискольких в молошочках в. опаденію цвътовь, чашечки ихъ преврашаются у иныхъ въ стручечки, а у других в в продолговащыя, и на при гивада попереть раздаленныя самянодержащельницы или капсулы, заключающія въ себъ плоскія стмячки. Сабурь бываеть многихь и различных в родовь, изв коихв опишу я завсь нёсколько изв главныхв, а одейстеји и свойствъ ихъ упомяну въ описаніи Сункотринскаго (Aloe syccotrina, Алое Суккотрина). Алоэсь, есть Греческое, оть слова аль море, происходящее имя, которое получиль онь чаящельно оть горести своей и понеже въ Индіи растепъ на приморекихЪ каменистыхЪ берегахЪ. ГосподинЪ Линней полагаеть его въ VI. Классь растеній, имъющих в в своем в цвыть шесть мужчинокъ и одну женочку (Hexandria Monogynia) а ГосподинЪ Турнефортъ въ IX классъ, во II отдъление въ VII. Родъ правъ съ однолистнымъ, на шесть частей разръзаннымъ и Аилейному подобнымъ цвѣтомъ, которато чашечка превращается у нѣкопюрыхъ родовъ въ плодъ, а у другихъ въ капсулю. По Гречески "Ахоп; по Арабски Cebar; по Нъменки Aloe: oder Meer-Haus Laub; по Француски Aloé; по Ишаліански Aloé; по Аглински Aloës; въ Бразилій Caraguata; а по Малабарски Kadanaku или Catevala.

ALO

ALOES ALTERVM GENVS, Anoech алтерумь генусь. Смотри Aloe Americana.

Алое Американа.

ALOE ÆGYPTIACA. Linn. Anoe Frunціака. Эгипетскій Сабурь, походить на Американскій, но не споль великь, ибо стебель его возвышается только въ артинъ, и окружается многими узкими, къ концу заощренными, по краямъ колючими, и прямо къ верьку споящими бълесоващыми и зелеными листьями В темными крапин ками. Онъ не распространяется какъ Американскій, но остается маленькимъ, и есным присмотрь за нимь хорошь, то и

ивфиешь гораздо ранве; пошому чио приносить уже на осьмомъ и девятомъ году оть двенатцани до звапцани темных в цвъшовь, кошорые меньше нежели на другихъ соршахъ По Гречески "Адой түз Асуиштв: по Нъмецки Die Egyptische Ulve; по Франнуски Aloe d'Egypte; по Ишаліански Aloe dell'Egypto; по Аглински Egyptian Aloe.

ALOE AFRICANA Linn. Anoe Appuкана. Смотри Aloe Aegyptiaca, Алое Эгип-

щіака.

ALOE AMERICANA, Anoe Amepuкана. Agave Americana Linn. Американской Сабурь, есть главныйший и наиболь. шій изъ всёхь сортовь. Онь имъсть длинные, шолсшые, кЪ концу острые, по краямъ колючими иглами обсаженные, сокомъ наполненные и посредспвенно изЪ корня вырастающие лиспыя бавднозеленаго цввта. Стебель возвышающися из в средины оных в, вырастаеть очень высоко, бываеть нарочишой шолщины, и производишь по бокамь почки, изъ коихъ выходящь, на подобіе поникадила во кругъ стебля къ верьху растущія вътви, раздъляющіяся на многія другія въщочки, кои украшающся желшовашыми и зелеными, видомъ на Туберозные имищовим бхапак инникірп и имижохоп цевшами, послъ коихъ оказывающся маленькіе стручья, заключающіе въ себъ св. мячки, которые однакожь рёдко у нась созрѣваюшь. Изъ корня ся Американцы, какъ сказывають выжимають гино; а листья употребляють они троякимь образомЪ. 1.) Самые лисшья на покрышку своихЪ домовъ или лучше сказать своихъ хижинь. 2) Находящіяся по краямь ихь иголки на дъланіе булавокъ, и 3) внутреннія листовыя волоти, вмёсто льна на пряжу. ИзЪ стебля, естьми его молодаго проколешь булавкою, вышекаеть сладкая и для пишья годная вода, из в кошорой варя ее умфренно, можно двлать вино, которое будучи высшавлено на солнце прегращается Bb

въ уксусъ, а чрезъ сильное варение въ медь, и наконець вь сахарь. Молодые цвьпы можно варишь вЪ сахаръ. СокомЪ Американцы лечать Фрянки. По Гречески Ахоп 'Auseinarn; no Hemenku die Americanische Alloe; по Француски Aloe de l'Amerique; по Ишаліански Aloe dell America; по Аглински The Americanish Aloe.

ALOE ARABICA, Anoe Аравика. Смотри Aloe Succotrina, Алое Суккотрина.

ALOE ARACHNOIDEA, Anoe Apaxноидеа. Смотри Aloe Africana, Алое Афри-

ALOE ASIATICA, Anoe Asiamuka. Смотри Aloe succotrina, Алое Суккотрина.

ALOE BARBADENSIS, Ande Eapeaденсись. Смотри Aloe Americana, Алое Американа.

ALOE CABALLINA, Ande кабаплина. Аошадиный Сабурь, есть самый послъдній или худый соршь, котораго сокъ черень, нечисть и употребляется только коновалами от лошадиных в припадков в и болъзней. По Гречески A'hon intrinn; по Нъмецки Эгов-211ое; по Француски Аюе caballin; по Ишаліански Aloe Cavallino; по Аглински Horle Aloes.

ALOE FOLIO IN OBLONGVM ACV-LEVM ABEVNTE, Anoe ponio unb obron тумь акулеумь абеунте. Смотри Aloe Americana, Aлое Американа.

ALOE FOLIO MVCRONATO. Lob. Алое фоліо мукронато. Смопіри Aloe Americana, Алое Американа.

ALOE GALBRA, Алое гальра. и

ALOE GALLICA, Ande Tannuka. CMO-

три Gentiana, Генціана.

ALOE GRÆCA, Алое грека. Греческій Сивурь котя и сходствуеть нѣсколь. ко съ Американскимъ, но гораздо меньше, имветь круглованые, былесованые лиспыя и маленькія иголочки, и приносищь цевшы свои на двашцанюмъ году, а иногда, но очень ръдко и ранъе. По Гречески "Алоп уруший. по Ивмецки Осіефіфе Шоез по

Француски Aloe Greca; по Италіански Aloe della Grecia; no Arauncku the Greek Aloes.

ALOE GINEENSIS CABALLINA YUL-GARI SIMILIS, SED TOTA MACVLATA. Алое Гинеензись кабаллина пулгари симились, седь тота макулата. Смотры

Aloe Caballina, Алое Кабаллина.

ALOE HEPATICA, Anoe renamuka. Печеночной Сабурь, потому что сокъ его имбеть цвъть печеночной. Онъ чище и лучше Лошадинаго. По Гречески Alon уружий; по Нъмецки Leber-2110e; Француски Aloe hépatique; по Ищаліански Aloe Epatico; по Аглински Ordinary Aloes.

ALOE IN PISANO VIRETO, Anoe unb пизано пирето. и

ALOE INDICA, Anoe индика. и

ALOE LOTA; Anoe noma. u

ALOE LVCIDA, Anoe nyuuga. u ALOE MVRCIATA, Asoe мурціата.

Смощри Aloe Succotrina, Алое Суккотрина. ALOE PALVSTRIS, Anoe manyстрись. и

ALOE QUARTA, Anoe Knapma. CMOтри Aizoon, АизоонЪ.

ALOE ROSATA, Anoe posama. H ALOE SOCOTRINA, Anoe conomрина. и

SPINOSA, Алое спиноза. ALOE

Смотри

ALOE SVCCOTRINA. Offic. Anoe Суккотрина. Aloe Succotrina angustifolia spinosa, flore purpureo, Breyn. Prod. II. 12 Aloe Indiae Orientalis ferrata five Succotrina vera, floribus phoeniceis. Hort. Beaum 5. Aloe Americana Anonæ foliis, floribus siauerubentibus, ex codice Bentingiano. P. P. Tab. 240. Fig. 4. Алое или Сабирь изъ Азіатскаго острова Суккотры. Онв имветь не высоко растущій, круглый, и въ срединв красноващый сшебель, длинные узкіе круглые, корошенкими иголочнами обсаженные, и другь от друга не много отстояще

бълозеленые лисшья, и множество пурпуровыхв, а у иныхв сортовь сейже Алой бълых в цвътовь, которые имъющь нарочито пріятный запахЪ, но не долбе продолжаются, какъ двъ недъли. У насъ цвътешь онь на шестомь и седмомь, а вь шеплых в странах в уже на третьем в и четвертомъ году. Прежде сего думали будто бы СабурЪ цвѣтетЪ только всякіе сто лъть, чего ради и почитали за великое диво, естьли онъ гдвнибудь начиналъ цвъсти; но нынъ научились уже приводищь и Американскій вь двапіцапь пяпь ліпь къ цвъту, чрезъ прилъжное и старатель. ное за нимъ хождение и искусство. Листья толкуть, выжимають извнихь сокь, который заваря присылають кь намь Печеночный въ пустыхъ вычищенныхъ тыквенныхъ коркахъ, а Соккопринскій, наибол ве въ Медицинъ употребляемый, сущеный въ пластинкахЪ. ВЪ АпшекахЪ по получении очищающЪ и вымывають его либо въ розовой, либо въ фіалковой водв и двлають изв него горькій бальсамЪ, пилюли и горькій желудочный порошокЪ, называемый Hiera Picra Galeni, Гіера Пикра Галени. ОнЪ чиститЪ желчь, вяжеть, слабить, укрыпляеть жехудокъ, поспъществуеть мъсячной крови, отворяеть чечуи, разбиваеть тустыя дурныя мокропы, умерщвляеть глисты, прошивишся гнили, очень полезенъ ошъ всяких в ранв, и унимаеть кровь. Когда Сабурнаго соку приложишь не на долгое время на пупъ, то слабить онъ и умерщвляеть глисты. Въ Парижъ приготовляютъ глазную воду, вь которую мъщають также и Сабуру, ибо берушЪ, вЪ порошокЪ истолченнаго Сабуру, приготовленной Тупіи и ледениу, каждаго по три драхмы или золотника, бѣлаго купоросу одинЪ скрупель или трешью часть золошника, и по шести унщій или 16 лотовь розовой, феникольной и съ травою Очная помощь или (Euphrafia. Эвфразіа) называемою гоненой воды. По Гречески 'Алоń очнотринани; по Нъмецки die Ost-Indische vder Aloe aus der Insul Succotra; по Француски Aloes des Indes Orientales, ou Aloes Succotrin; по Италіански Aloe dell' Isola Succotra; по Аглински Succotrine Aloes.

ALOE VIOLATA, Aлое піолата. Смотри Aloe Succotrina, Алое Суккотрина. ALOE VULGARIS, Алое пулгарись. Смотри Aloe, Алое.

ALOES, Anoech. CMompu Aloe, Anoe. ALOESTIS, Anoecmuch. CMompu Gentiana, Fenuiana.

ALOIDES, Anongech. Cmompu Stratiotes, Cmpamiomech.

ALOINA, Алонна. Смотри Absinthium, Абсинтіумъ.

ALONONE, Anonone. Cmompu Arum. Apymb.

ALOPECVRVS OFFIC. Anonexypych. Ger. 81. Alopecuros genuine Park. Theat. 1166. Hift. Oxon. iii. 191. Gramen Alopecuros spica breui I. B. ii 474. Chat. 186. Rail. Hist. ii. 1265. Alopecurus pratensis Linn. Gramen spicatum tomentosum longissimis aristis donatum. Tourn. Inst. 517. II. No nepeводу Лисій хпость права, растеть въ Южных в странах в Россіи и цевтеть въ Іюнь и въ Іюнь мьсяцахь. Она имьеть тонкій, и изъ толстыхъ бѣлыхъ волотей состоящій корень, производящій много вы соко растущих в стеблей, окружающихся до самой половины длинными, узкими и трубкою свернушыми лисшьями, и украшающихся на вершинъ своей множествомъ пурпуровыхв, однолисшочныхв, колосочками расположенных в по нескольку вместь кучками растущих в цв вточков в. В в Медицин в и въ Апшекахъ сія трава нынѣ рѣдко употребляется. Листимь хпостомь прозвана она потому, что кучками растущіе ея цввты составляють подобіе лисьяго квоста. ГосподинЪ Линней полагаеть ее въ III. классъ расшеній, имъющих в въ своемъ цввшв шри

мужчинки и двъ женочки вмъстъ (Triandria Mo nogynia) а ГосподинЪ Турнефортъ въ XV. классь, въ III отдъленіе, въ VIII. родъ травъ съ однолисшнымъ колоскомъ расположеннымъ цвътомъ. По Гречески Алотенвроѕ или Утелефаpos; по Нъмецки Doffenstert или Fuchs Swant; по Француски Queue de Renard: по Ишаліански Coda del volpe, herba; по Аглински Foxtail grass

ALOPECVRVS ALTER, Anonexy-

русь алтерь. и

ALOPECVRVS LONGA SPICA, Ano.

пекурусь лонга спика. и

ALOPECVRVS MAIOR, Anonexyрусь магорь. и

ALOPECVRVS PLINII, Anonexypych

Плинии. и

ALOPECVRVS THEOPHRASTI, Ano-

пекурусь Теофрасти. и

ALOPECVRVS TOMENTOSVS VE-RVS, Алопекурусь томентозусь перусь. Смотри Alopecurus Offic. Алопекурусь Оффиц.

ALORAS, Anopach. Смотри Атуд-

dalus, Aмигдалусь.

ALORON, Алоронь. Смотри Огуга, Ориза.

ALOSAS, Anosach. Cmompu Scylla.

ALOSCORDON, Aлоскордонь. Смо-

mpu Capparis, КаппарисЪ.

ALOVD, Anoyab. Смопри Lignum aloes, Лигнумъ алоесъ.

ALOZA, Anosu. Cmompu Amygdalus, АмигдалусЪ.

ALPHESTERA, Алфестера. Смотри

Bryonia, Bpionia.

ALPHITIA HERACLEA, Angunia Гераклеа. Смотри Ruta hortensis, Рута гортенсисъ.

ALPHITVM, Алфитумь. Смотри Ног-

deum, ГордеумЪ.

ALQVOSEN, ARKHOSEHB. Смотри Foeniculum, ФеникулумЪ.

ALROTAP, Anpomants. Смотри Dactilus, Дакшилусь.

ALSARON, Ansaponb. Cmompu Enula,

Энула.

ALSEGELENGES, Ancereneurech. CMO. три Abrotanum, АбротанумЪ.

ALSELEB, Ansenebb. Cmompu Ruta hor-

tensis, Pyma ropmencuch.

ALSENICVM, Ancenuxymb Olfenicum, ОлсеникумЪ.

ALS INDICVS, Anch Ungunych. CMO-

шри Sacharum, СахарумЪ.

ALSINANTHEMOS, Ancuhahmemoch, Смотри Herba Trientalis, герба Тріентались. ALSINANTHEMVM, Ancuhanmeмумь. тожь.

ALSINA, Ancuna. Cmompu Alfine,

Алсине.

ALSINE, C. B. (Ancune). Media Linn. Pit. Tournefort Alfine minor Dod. Alfine vul. garis, fine Morfus Gallinae. I. B. Hippia minor. Cord. Hist. XXV. Мокрица или Курячын Черены трава растеть вездь по садамъ, по полямъ, на півниспыхъ и мокрых в мъстах в, по улицам в, и в в огородахъ, гдъ ее выпалывають, чтобъ не заглушала другія посаженныя овощи. Она цвътеть въ Марть, Апрыль и Майь мъсяцах в и им веть маленькіе, волокнистые и нъжные корешки, изъ которыхъ вырастаеть множество круглыхь, тонкихь, мягкихЪ, сочныхЪ и обыкновенно приземистыхЪ сшеблей окружающихся небольшими, кругловашыми, другъ подав друга немного остроконечными и внизу по срединъ немного выняшыми лисшьями, между коими вырасшаюшь маленькіе, бъленькіе, на тоненьких в черешкахЪ сидящіе, пяпилисточную чашечку имъющіе и изъ пяпижъ на два перышка каждый раздъленных в листочков в состоящіе цвъточки, послъ которых в показывающся стручечки, заключающие въ себъ жел тованые съмячки. Она содержить въ себъ много масла и влажности, прохлаждаеть

лаеть, унимаеть течение чечуя, утоляеть происходящую оть онаго боль, и вареная в в похлебках в полезна чахотным в и бол взнію в влегком в спірадающим в людям в. В в Маїв Мівсяців гоненая св нею вода, составляеть превосходное прохладительное вь внутренном в жару, вы лихорадках в, и горячкахь; а наружно ошь жару вь глазахь; сокь изь сей правы дають двтямь для укрощенія ворчанія вЪ животь. Нъкоторый издащель Экономического журнала пишеть, что родильницы им вють обыкновение класть зеленую траву подъ мышки, буде хотять унять молоко; а иныя варять ее въ козъемь молокь или вы водъ и припаривающь ею груди. Всв вв кавшкахв сидящія пшички очень ее любять, чего ради и привъшивають ее обыкновенно къ кавткамъ. ВЪ АпшекахЪ нынъ нивочто ее не употребляють. Алсине есть Греческое от слова Ахоос лугь, произходящее имя, пошому чио по большой части растеть на лугахь. ГооподинЪ Линней полагаешЪ ее вЪ V. классЪ расшеній, имвющих в в цввтв своем в пяшь мужчинокъ и пять женочекъ вмъстъ (Pentandria Pentagynia) а Господинъ Турнефорть вь VI. Классь, во II отделение, въ VIII. родь правь съ составленнымъ изъ мнотихъ и на два верьшка каждый раздъленных в листочков в цвыпомв. По Гречески "Adown rown; no Hemenku Huncrbif, Logels Rraut; Sendel-Rraut, по Француски Morgeline или Mouron des petits oiseaux; no Ишаліански Pizzagallina, forte d'herba picciola; по Аглински Chickweed.

ALS

ALSINE AFFINIS ANDROSACE DIC-ТА MAIOR, Алсине аффинись Андрозаце дикта магорь. Смотри Androsace,

Андрозаце.

ALSINE ALPINA, Ancune annuna. Смотри Herba Trientalis, Герба тріентались.

ALSINE ALTERA FOLIO SERRATO,

Алсине алтера фоліо серрато. и

ALSINE ALTISSIMA NEMORVM, Аленне автиссима неморумь, и

ALSINE AQVATICA MAIOR, ET магорь и MEDIA, Аленне акпатика медіа. Смотри Авпе, Алсине.

ALSINE AQVATICA MINOR FLVITANS, Алсине акпатика минорь

эть флуитансь. и

ALSINE CHAMÆDRIFOLIA FLOS-CVLIS PEDICVLATIS OBLONGIS INSI-DENTIBUS, Алсине Хамедрифоліа флоскулись педикулатись облонгись инсидентибусь. Смотри Авте Алсине.

ALSINE CORNICVLATA, Ancune корникулата. Смотри Alfine Media, Ал-

сине медіа.

ALSINE CRISPA ET MAIOR, Ancuне криста эть магорь. Смотри Malva,

ALSINE DALECHAMPII VERNA, Алсине далехампін перна. Смотри Но-

lostium . Toxocmiymb.

ALSINE FLVVIATILIS, Ancune Daymiamunich. CMompu Alfine aquatica, Anсине акващика.

ALSINE FOETIDA, Ancune pemuga.

Смотри Аросупит, АпоцимумЪ.

ALSINE FOLIIS TRISSAGINIS, Anсине фолись Триссатинись. Смотри Сhamaedrys, ХамедрисЪ.

ALSINE FOLIIS VERONICAE, Anсине фолись перонице. Смотри Veronica

Оббіс. Вероника Оффиц.

ALSINE FONTANA, Ancune ponтана. Смотри Alfine, Алсине.

ALSINE GENVINA, Ancune Tenyuna.

Смотри Alfine, Алсине.

ALSINE HEDERACEA, Ancune reдерацеа. Смотри Alfine media, Алсине медіа.

ALSINE HEDERVLA ALTERA, ARсине гедерула алтера. Смотри Lamium, ЛаміумЪ

ALSINE HIRSVTA, Ancune rupcy-

ma. Смошри Alfine, Алсине.

GLABRA, ALSINE HOLOSTEA, FOLIO GRAMINEO, FLORE MAIORE, Ancus-

Алсине голоства, глабра, фоліо граминео, флоре магоре. Смотри Gramen Leucanthemon, Граменъ Левканшемонъ.

ALSINE LVTEA, Ancune Aymea.

ALS

Смотри Alfine, Алсине.

ALSINE MAIOR, Ancune maiopb. Смотри Centunculus, Центункулусь.

ALSINE MARINA, Ancune Mapuna. Смотри Alfine aquatica, Алсине акватика.

ALSINE MAXIMA FRVCTV NIGRO, Алсине максима фрукту нигро. Смотри Cucubalus, Кукубалусь.

ALSINE MEDIA, Ancune megia. Cmo-

mpu Alfine, Aлсине.

ALSINE MINIMVM, Arcune muhuмумь. и

ALSINE MINIMA LINI CAPITULO. Алсине минима лини капитуло. Смотри Alfine, Arcune.

ALSINE MINIMA SVFFRVTICIS IN-STAR, Алсине минима суффрутицись

инстарь. и

ALSINE MINOR, Ancune минорь и ALSINE MORSVS GALLINAE, Anсине морсусь галлине. Смотри Alline, Алсине.

ALSINE MYOSOTIS, Ancune miocomucb. Смотри Auricula muris, Аврикула мурисЪ.

ALSINE PALVSTRIS, Ancune Trany-

стрись и

ALSINE PARVA RECTA, Ancune

парпа ректа. и

ALSINE PETRAEA MINIMA ET RV-BRA, Алсине петреа минима еть руъра. Смотри Alsine media, Алсине медia.

ALSINE PRATENSIS, GRAMINEO FOLIO AMPLIORE, Ancune пратензись, граминео фоліо ампліоре. Смотри Leucanthemum, ЛевканшемумЪ.

ALSINE PVRPVREA, Ancune пурпуреа. Смотри Lychnis syluestris, Лихнисъ

сильестоисЪ.

ALSINE RECTA, Ancune perma. Смощ и Altine media, Алсине медia. Часть І.

ALSINE REPENS, Ancune periench. 18 ALSINE SCANDENS BACCIFERA. Алсине сканденсь вакцифера. Смотри Сиcubalus, КукубалусЪ.

ALSINE SYLVESTRIS, Ancune curi пестрись. Смотри Panicum Syluestre, Па-

никумЪ силвестре.

ALSINE SPERGVLA DICTA, Ancua не спертула дикта. Смотри Spergula Спергула.

ALSINE SPVRIA, Ancune стуріа и ALSINE TERTIA MEDIA, ARCHHE

терціа медіа, и

ALSINE TRIPHILLOS COERVLEA

Алсине трифиллось церулеа. и

ALSINE VULGARIS, Arcune Hynтарись. Смотри Авіпе, Алсине.

ALSINELLA, Ancunenna. CMompu Al-

fine. Алсине.

ALSVCHARAM, Ancyxapamb. Cmoтри Cicuta, Цикута.

ALTAFOR, Annapopb. Cmompu Cam. phora, Камфора.

ALTAHVT, Anmarymb. Смотри Am-

топіасит, АммоніакумЪ.

ALTALISAFER, Anmanusagepb. Cmo. птри Масів, МацисЪ.

ALTANABOTES, Anmahabomech

Смотри Calamintha, Каламинта.

ALTANVM, Anmanymb. Смотри No. peta, Henema.

ALTARAXACON, Anmaparcaronb Смотри Тагахасоп, ТараксаконЪ.

ALTERCVLVM, Anmepkynymb. & ALTERCVM, Anmepkymb. CMompu

Hyoscyamus, Гіосціамусь.

ALTHAHVT, Anmarymb. Ammoniacum, АммоніакумЪ.

ALTHAEA Bruns. Matth. Anmed. Althaea officinalis. Althaea Dioscoridis. Breyn. et Plinii C. B. Malua syluestris prima Cas. Ibiscus. Lugd. Cast. Bilmalua Ger. Maluauiscus Ang. Bifmalua Offic. XIV Дикая или полепая Рожа,

Рожи, Проскурняко или Слизо, есть прозимующая и высоко растущая нрава роду малвы, которая растеть вы садахь на сы рыхь и на тучных в мъстах в и цвттеть въ Іюль мьсяць. Она имьеть длинные, кругловатые, жирные, въ палець толстые и внутри бълые корни, производящие круглые, мошкомъ обложенные, пусные, и въ одинъ и полтора аршина въ вышину вырастающе стебли, окружающіеся білесоватыми, можнаными, остроконечными, мяткими, какЪ бы складками складывающимися, поперемвино другь прошивь друга сидящими, и на просвирные похожими лиспъями, и между оными, однолисточными, съ верьху досамаго низу на пять полосочков раздиленными и на колокольчики похожими цв в почками твлеснато цввта, которые опадая, оставляють многіе съмянные сосудцы, объ одномЪ только съмячкъ представляющемЪ видЪ маленькой почки. Съмя собираютъ осенью, а траву и корень весною. Сія трава содержить вы себы много масла и влажности, умягчаеть, разбиваеть, отворяеть, унимаеть боли, приводить нарывы и чиры вы созрвлость, исцвляеть раны, утоляеть рвзъ въ животъ, очень полезна отъ бользней въ пузырь, от вдкой остроты вв мочи и упопребляется, а особливо корень, въ горлополоскащельных водах в и на подобіе травнаго чая, от в кашлю и грудной боли и ечитается въ числъ пяти мягчитель. пых в правь. В в Апшеках в им вется права, цввшы, коренья и свия, и двлающь сивопъ, пластыри, мазь и такъ называемую дъвиные кожу изъ корней сей правы, сажару и яичнаго бълка (Pafta de Althea). Алтеа, есть Греческое отв глагола алтаг. умощоп , кми ээцикдохоноп ашинах , чак чно уже и въ древнія времена, счипали сію траву лечебною и полезною отв разныхв бол взней Господинь Линней полагаеть ее вы XVI. классы расшений, вы цвыть коихы жва шнашь и болье мужчинок вырастають

ALT

съ одною женочкою изъ одного основанія. (Monadelphia Polyandria) а Господинь Турнефорть вы I. классь, вы VI. от дъление, во II. родъ правъ съ однолистнымъ выпуклистымъ цвътомъ. По Гречески "Ахваја, и Твіонов, или Έβίσκος; πο Αραδοκи Chitini, Chateni, и Rosa Zameni; а Серій называеть ее Alfam; по Нъмецки Eibische Wurt, Althea, или weisse Pappeln; по Француски Guimauve ordinaire; по Италіански Buonvisco или Althea; по Аглински Marth Mallow, или Mallow the Marth.

ALTHEA AEGYPT'ACA MOSCHATA Алтеа Эгипціака мосхата. Смотри Semen Molchi, СеменЪ мосхи.

ALTEA ALTERA, Anmea anmepa,

Смотри Abutilon, АбуппилонЪ.

ALTHEA ARBORESCENS VEL AR-BOREA, Алтеа арборесценов, пель ар. вореа. Смотри Кеттіа, Кетміа.

ALTEA DIOSC. Anmea Liock. CMO.

mpu Althea, Anmea.

ALTHEA FRVTESCENS, Anmed

фрутесценсь. и

ALTHAEA FRUTICANS HISPANICA. Алтеа фрутикансь Гиспаника. Смотри Ketmia, Kemmia.

ALTHAEA HORTENSIS, Anmea rop-

mencuch. Cmompu Althaea, Amea.

ALTHAEA LIGNOSA DALECHAMPII, Алтеа лигноза Далешампін. Смотри Кетmia, Kemmia.

ALTHAEA LVTEA, Anmed Aymed.

Смотри Abutilon, АбупилонЪ.

ALTHAEA PALVSTRIS, Anmea naпустрись. Смотри Althaea, Алтеа.

ALTHAEA PEREGRINA, Anmea ne-

регрина. и

THEOPHRASTI, Anmed ALTHAEA

Теофрасти. и

ALTHAEA VULGARIS, Anmed HYRO

rapuch. Смотри Althaea, Алтеа.

ALTIT, Armumb. CMompu Asa foetida, Aca фетида и Liquiritia, Ликвириціа.

AL

ALTOMI, Anmonn. Cmompu Vincetoхісит, ЕинценюксикумЪ.

ALTORFILI, Алторфили. Смотри

Сагиі, Карви.

ALTRALEB, Aлтралевь. Смотри Satyrium, СаширіумЪ.

ALTVBVB, Anmyeyeb. Cmompu Mer-

curialis, Меркуріались.

ALVCEBREM, Anymespemb. Смотри Ceterach, Hemepaxb.

ALVF, Anyob. Смотри Bistorta, Бистор-

ma.

133

ALVILIMAR, Anunumaph. CMomph

Balaustia, Балавстіа.

ALVINDOBADOSTER, Antingotaдостерь. Смотри Leuisticum, Левистикумъ.

ALVISE ARABVM, Annuse Apasymb. Смотри Abrotanum, АбротанумЪ.

ALVM, Anymb. n

ALVM GALLICVM, Anymb Tannuкумь. Смотри Consolida maior, Консолида мајорЪ.

ALVM PLINII, Anymb IInuniu. u ALVS, Anych. CMompu Symphitum, СимфишумЪ. deputerel. Emoning Marion ordi

ALYBION, Anutionb. Cmompu Eryngium, Epuhrivmb.

ALYPVM, Anunymb. Cmompu Hippo. glossum, Гиппоглоссумь.

ALYSDO, Anucgo. Смотри Sedum

maius, СедумЪ маюсЪ.

ALYSMA, Anucma. Cmompu Arnica, Арника.

ALISMA SYLVESTRE, Annema Cunпестре. Смотри Primula veris, Примула верисЪ.

ALYSSOIDES, Anuccougech. Смотри Thlaspi, Taacnu.

ALYSSON DICTVM CAMPESTRE, Алиссонь диктумь кампестре. Смотри Thlaspi, Thachu.

ALYSSON FRVTICANS, Anneconb Фрутикансь. Смотри Cytilcus, Цитисусъ.

ALYSSON GALENI, Anneconb Taneжи. Смотри Матгивіцт, МаррубіумЪ.

ALYSSON GERMANICVM ECHOI-DES, Алиссонь Германикумь Эхіондесь. Смотри Aparine Aspera, Апарине Аспера.

ALYSSON INCANVM MONTANVM LVTEVM. P. Tournefort. Anneconb инканумь монтанумь лутеумь. Thlaspi montanum luteum. I. B. Alysfum montanum. Linn. XIII. Икомная трапа или Горная Торица со звъздчашыми листьями, есть весенняя, на горисшых в мъстах в и в в Сибири по каменистымъ рачнымъ берегамъ, около Омска, и въ песчаныхъ степяхъ по сю сторону Иртыша растущая и въ Іюль и въ Августъ мъсяцахъ цвъщущая шрава; которая имветь продолгованые сь исподи бълесованые, и изъ длиннато и деревенъю. шаго кория вырасшающие лисшья: изъ срелины коих возвышающся пепельнаго цввта стебельки въ седьмь вершковъ вышиною, унизанные многими четырелисточными, крестообразно расположенными, и по нъскольку вм вств кучками расшущими цввточками, прекраснаго желшаго цввша; послв коихъ оказывающся маленькія, на подобіе коробочки возвышенныя, плосковатыя и на два гивзда съ мвленькими кругловашыми свиячками, вдоль раздвленныя свиянодержашельницы или капсулы. Съ медомъ растершая трава прогоняеть веснушки и другія пяшна на штав, а въ прочемъ счишается полезною от бышенства и побуждаеть на низь. Въ Аптекахъ ни къ чему ее не употребляють. Алиссонь есть Греческое от слова ахии, унимаю бышенство, происходящее имя. Господинъ Линней полагаешь ее въ XV. классь расшеній, у коих выпрыты шесть мужчинок в или тычков в изъ коихъ четыре длиннъе другихъ двухъ. (Tetradynamia). а ГосподинЪ ТурнефоршЪ вЪ V классь, въ III отделение, въ 1 родъ травъ имьющихь изь чешырехь равныхь и на подобіе креста расположенных в листочков в составленный цвьть По Гречески "Адиотом, или 'Адиотось, тодюч; по Нъмецки Riein Schildbefem-Rraut, Berufswart, Kein Berufs

ruts Rraut; по Француски Alysson ou Thlaspi jaune des montagnes; по Италіански Alissone; по Аглински Small Mad-wort.

ALYSSON ITALORVM; Anneconb

Италорумь. и

ALYSSON MINIMVM, Anncconb mu-

нимумь. Смотри Тhlаspi, Тласпи.

ALYSSON PLINII, Алиссонь Плиніи. Смотри Нератіса stellata, Гепатика стелла-та.

ALYSSON QVARTVM ARVENSE. MALYSSON SEGETVM, Annocomb Ceremymb. Cmompu Asperula vera, Achepy-Aa Bepa.

ALYSSON VERTICILLATVM FOLIIS PROFVNDE INCISIS. Алиссонь Вертициплатумь фолінсь профунде инцизись. Смотри Alysson incanum. Алиссонь инкамумь.

ALYSSOS, Anuccocb. Смотри Нераtiса stellata, Гепатика Стеллата.

ALYSSVM, Anuccymb. CMompu Alysson,

АLYSSVM COLYCINVM, Алиссумь колицинумь. Торица растеть на буграхь и гориспыхь мъстахь около Самары, и на каменистыхь мъстахь, и почти ни во что въ медицинъ не употребляется. По Гречески Алиотос; по Нъмецки Шубеп, Вегибъ Ктаит; по Француски Alysfon; по Италіански Alisfone; по Аглински Madwort, или Shepherds-pouch.

ALYSVS, Anneyeb. Cmompu Cyanus,

Ціанусь.

ALZABRACHEN, Ansaspanenb. Cmo-

mpu Dactylus, Дакшилусь.

ALZVZVRA, Алэуэура. Смотри Carduus Mariae, Кардуусь Маріе.

AMAIORICA, Amaiopuna. Смотри Satureia, Camppeia.

AMALOCIA, Амалоціа. Смотри Cha-

momilla . Хамомилла.

AMANAGO, Аманато. Смотри Cichorium syluestre, Цихоріумъ сильестре.

АМАNCAES, Аманхаесь. есть Перуанскій, желтый из в четырех в листочков в состоящій, и на подобіе колокольчика расположенный, и ни какого запаха не им выощій цв втв. По Гречески Аманхає, « « Эоз тіз Перв; по Нъмецки Ятапсаев, еіпе Дегиапі сре Дінте; по Француски Атапсаев, fior del Perou; по Аглински Атапсаев, an Peruvian Flover.

AMANITAE, Amanume. Cmompu Fun-gus, Oynrycb.

AMANTINA, Aмантина. Смотри Ar-

AMARACVS, Amapanych. Cmomph

Maiorana, Маіорана.

AMARACVS FOETIDA, Амаракусь фетида. Смотри Cotula foetida, Котула фетида.

AMARACVS GALENICA, Амаракусь Галеника, тожь.

AMARACVS MAIOR, Амаракусь маіорь. Смотри Маіогапа, Маіорана.

AMARACVS SERPENS, Амаракусь серпенсь. Смотри Магит оffic. Марумъ оффиц.

AMARACVS SYLVESTRIS ANNVA;

AMARACVS VULGATIOR, Амаракусь пултатіорь. Смотри Maiorana, Маіорана.

AMARA DVLCIS, Амара дулцись. Смотри Dulcamara, Дулкамара.

AMARAGO, Amaparo. Cmompu Cicho-

rium syluestre, Цихоріумь силвестре.

АМАКАNGA, Амаранга, есть высокое, въ Азін на островъ Цейланъ растущее дерево, котораго кора, жевана будучи, почитается тамъ върнымъ средствомъ отъ жабы. Rob. Kox. по Гречески Ама́дагуа, уєїлачиот бетброт; по Нъмецки Ятаганда, Зашт ін Ссиюн; по Француски Атаганда, arbre de Ceylon; по Италіански Атаганда Albero di Zeilan; по Аглински Атаганда the Ceylan-tree.

AMA-

AMARANTHOIDES, Amapan:nongech. Смотри Amaranthus, Амарантусъ.

AMARANTHVS, Amapanmych. CMoтри Absinthium, АбсиншіумЪ.

AMARANTHUS, Amapanmych. Paruus. Cam. Amaranthus. Plinii minor. Gesn. Hort. Amaranthus communis minor. Ecd. Col. Amaranthus spicatus Eyst. Amaranthus purpureus. Fuch. Tur. Amaranthus simplici panicula C. B. Amaranthus angustifolius. Lugd. Circaea Trag. Flos amoris. Gern. XXX. Бархатець, Бархатникь, Не умирающій цпвть или Амаранть малый, расшеть вы садахы, и самовольно около Царицына и въ другихъ теплых в странах в Россіи, цв втетв вв Іюль и Августь мьсяцахь и бываеть многихъ родовъ или сортовъ, какъ то одинакій, или простый, мохровый, малый, большій и прямо споящій, или кЪ низу висящимъ колоскомъ растущій, свътло и темно красный, пурпуровый, или багряный, желтоватый, огневидный, зеленый, красный съ желшымъ, пурпуровый съ шемнымъ, зеленый съ желшымъ, трехъ цвътный, то есть желтый, красный и зеленый, и проч. Онъ имъешъ красный сшебель въ десяпь вершковъ вышиною, копорый окружается гладкими, остроконечными, сизозелеными, а по краямъ краснъющимися и на листья Бросовой травы (Blitum БлитумЪ) похожими листьями и производить изв вершины своей прекрасные мохровые, разбросаннымь, а иногда вмвств сжатымь колосомъ расположенные и изъ многихъ листочковь составленные алые цевты, вь срединъ коихъ вырасшають маленькія круглыя, перепонками обведенныя, и изъ средины пополамъ раскрывающіяся шишечки или съмянодержательницы, каждая объ одномЪ кругловатомЪ, бълесоватомЪ съмячкъ. Корень толстый, сочный и цвътомъ блъднокрасный. Двиствіемь и свойствомь сходсшвуеть онь сь петушьимь гребешкомь,

(Amaranthus Cristatus Амаранияусъ Криспапусь) съ которымъ и въ одинъ жлассъ полагается. По Гречески Амарачтос мирос ; по Нъменки Cammet Blume; Zausendschon, Moramor; по Француски Amarante; Paffevelours ими Fleur de jalousie; по Италіански Amaranto или Fior veluto; По Аглински The leffer Flover gentle, или Leffer Velvet Flover, makke Lowe Flover.

AMARANTHUS ANGUSTIFOLIUS, Амарантусь Ангустифоліусь. Смотри Amaranthus, Амаранпусъ.

AMARANTHUS AVREVS, Amapanmycb Aupeycb. Смошри Chrysocome, Хрисокоме.

AMARANTHUS BACCIFER INDICUS, VESLING. Амарантусь Бакциферь Инquxycb. Blitum Peruvianum racemosum maхітит, Новт. III. Индіанской Амаранть, расшеть здёсь только въ оранжереяхъ, и имъешь шолстый и сочный корень, производящій ежегодно много больших в и внутри пустых в стеблей, раздвляющихся каждый на при въпочки, на проежь опяпь раздълънныя. Между сими въщочками вырастають цввты пучечками, и оставляють послв спаденія плоскія, сперва зеленыя, но потомъ чернъющія, пурпуровымъ сокомъ наполненныя и сёмячки в в себ заключающія нгоды. Зимою поливать его не должно, по тому что скоро гність и портится. По Гречески Амарантов Тиблев; по Нъмецки Эпо dianischer Amaranth mit Beeren; no Opanцуски Amarante des Indes; по Италіански Amaranto dell' India; по Аглински The Indian Flovergentle.

AMARANTHUS CITRINUS, Amaрантусь Цитринусь. Смотри Stoechas citrina, Стехасъ цитрина.

AMARANTHVS CRISTATVS, Amaрантусь Кристатусь. Amaranthus maximus C. B. Amaranthus Blitum Linn. Matth Amaranthus major floribus panniculofis, spica五39

tis purpureis Lob. XIII. Bonhmon Amaранть, Петушей гребешокь или Тысячная Красота, есть прекрасный, изЪ многих в листочков в составленный, на высокомв и почии безлистномв зеленомв стебав вырастающий, и густымв не много къ низу наклоненнымъ колосомъ росположенный, темно пурпуровый цв втв; Онв растеть автомь вы садахы, а зимою держать его вь оранжереяхь, самають вь торшки и спавять для красоны цвёта его на окошки. Цвъты на немъ и мужескіе и женскіе; первые им вюшь изъ трехь или пяти листочков в составленную и три или пящь шычекъ въ себъ заключающую чаше. чку; а вторые трехъ или пятижъ лиственную чашечку, но въ оной три пестика превращающіяся вь капсулы обь одномь свиячкв. Оба сорпа прохлаждающь, умятчають, вяжуть, унимають кровавой понось и сильное шеченіе мъсячной крови и умножають вь кормилицахь молоко, но вь Медицинъ ръдко употребляются, чего ради мвЪ АпшекахЪ ничего изЪ нихЪ не дълается. въ Бранденбургъ въ Нъмецкои землъ живущіе крестьяне собирають съмяна его и нихЪ кашу, которую варяшь мзъ вдять вмвсто проса. Амарантусь есть Греческое, от словь абос, цввть, и масайм, увядаю, происходящее имя, значущее не увядаемый. Петушьимъ Гребешкомъ прозвань сей сорыв по тому, что цввть его имветь подобіе петушьяго гребня. Господинъ Линней полагаетъ Амаранты въ XXI. классъ расшеній, у коихъ на одномъ и пюмже корив цввшы и мужескіе и женскіе (Monoecia) а ГосподинЪ Турнефортъ въ VI. классь, въ І опидъленіе, въ І. родь правъ имъющих в изв многих в листочков в составленный цввив, комораго песшикв превращается въ капсулю По Гречески Амасач-TOS MEYAS; 110 HEMEURU Großer Umaranth. Hahnen Kamm, nau großer Mener, no Opanпуски Grande Amarante; по Италіански

Fior veluto purpureo, una del giardino; no Аглински The great Flower gentle, of which in this Chapter; MAN Amaranth the Globe, marke Amaranthus Cocks Comb.

AMARANTHVS FOLIO VARIEGATO, Амарантусь фоліо парістато. Смотри Symphonia, Симфоніа.

AMARANTHVS GALENI, Amapanтусь Галени. Смотри Stoechas citrina, Стехасъ цитрина.

AMARANTHVS GLOBOSVS, Amaрантусь глобозусь. Смотри Amaranthoides, Амаран тоидесь.

AMARANTHVS HOLOSERICVS, Amaрантусь голосерикусь. Смотри Amaranthus Cristatus, Амарантусь кристатусь.

AMARANTHVS LVTEVS, Amapanтусь лутеусь. Смотри Elichrisum, ЭлихривумЪ.

AMARANTHUS MAIOR, Amapanтусь магорь. Смотри Blitum, Блитумъ.

AMARANTHVS MAIOR, FLORIBVS PANNICVLOSIS SPICATIS, PVRPVREIS, Амирантусь магорь, флоривусь панникулозись, спикатись, пурпуренсь. Смотри Amaranthus Cristatus, Амарантусь кристатусъ.

AMARANTHVS MAXIMVS, Amapanmycl makeumych. Смотри Amaranthus Criflatus, Амарантусъ Кристатусъ:

AMARANTHUS MINOR, Amapanтусь минорь. Смотри Amaranthus, Ама-

AMARANTHVS PANICVLA CONGLO-MERATA, Амарантусь паникула конь-**І**ломерата, и

AMARANTHVS PANICVLA INCVR-VA, Амарантусь паникула инкурна. п

AMARANTHUS PANICULA SPARSA. Амарантусь паникула спарса. Смотри Amaranthus cristatus, Амарантусь статусЪ.

AMARANTHUS PARVUS, Aмарантусь париусь. Смотри Amaranthus, Амарантпусъ.

AMARANTHUS PICTUS, Amapanmycb пиктусь. Смотри Amaranthus purpureus, Амарантусъ пурпуреусъ.

AMARANTHUS PICTUS PRIMUS, Амарантусь пиктусь примусь. Смотри. Steechas citrina, Стехасъ цитрина

AMARANTHVS PVRPVREVS, Amaрантусь пуртуреусь. Смотри Amaranthus Cristatus, АмарантусЪ кристатусъ.

AMARANTHVS SPICATVS RAMOSIS SPICIS HERBACEIS, SEV HERBACEO FLORE, Амарантусь спикатусь рамозись спицись гербаценсь, сепь гербацео флоре. Х. Зеленоцивтный Амаранть. По Гречески Анадачтос захипрос по Нъменки: Amaranth mit grünen Blumen; no Opanцуски Amarante a fleurs verds; по Ишаліански Amaranto con flori verdi; по Аглински-Indian Flowergentle:

AMARANTHVS TRICOLOR, Amaрантусь триколорь. Смотри Symphonia.

AMARANTIVM, Amapanuiymb. Cmoтри Arthemisia, Артемизіа.

AMARANTON, Amapanmonb. CMOтри Sempervivum minus, СемпервивумЪ минусъ.

AMARELLA, Amapenna. Cmompu i Armeniaca malus, Apmeniaka manych. 2 Polygala, Полигала и 3 Arthemisia, Артемизіа.

AMARI MONTIS, Amapu monmuch. Смотри Tragoselinum, Трагозелинумъ; и Pimpinella faxifraga, Пимпинелла Саксифрага.

AMARVM DVLCE, Amapymb gynue. Смощри Dulcamara, Дулкамара...

AMARVS, Amapych Cmompu Calamus verus, Каламусъ верусъ.

AMAR VSCA, Amapyera. Cmompu Artheтіба, Арптемизіа.

AMARYLLIS ATAMASCA, Amapunance Amamacka. Cmompu Lilio Narcissus Indicus pumilus monanthus albus, Aurio Hap-Индикусь пумилусь писечсЪ монаншусЪ албусЪ.

AMARYLLIS BELLADONNA, Ama-

риллись Белладонна. и

AMARYLLIS FORMOSISSIMA, Amaриллись формозиссима- Смотри Lilio Narciffus Iacobaeus Flore sanguineo, Лиліо НарциссусЪ ЯкобеусЪ флоре сангвинео; и

AMARYLLIS SARNIENSIS, Amapunпись Сарніенсись. Смотри Narcissus Iaponicus flore rutilo, Наримссусъ Японикусъ флоре рушило.

AMAXITIS, Amaxcumucb. Cmompu

Gramen "ГраменЪ...

AMBARE INDICA. Gary. Acofta, Frag. Амбаре Индика: Ambares. Caft. Arbor Indica, foliis juglandis, fructus nucis magnitus dine. Амбаре есть большое и толстое Индіанское дерево, котпораго листья подобны ор Бховым в, испещрены жилками, и им вють свытозеленый цвыть : цвыты былые и маленькіе! плодь величиною сь простой оржив, бываешь съ начала зеленовашь, крЕпкій запахЪ и припорный вкусЪ, но когда созрвешЪ, то получаетъ желшый цвёшь, нарочито пріяпный запахь и кисловатый не безпріятный вкусВ; его варянь съ солью, шакже кладунь и въ уксусЪ. Сему дереву для того дано названіе Амбаре, что плодъ его созрывь имъешь пріянный на Амбру похожій запахь. По Гречески Аμβάρε, δένδρον Ινδικόν; по НЪмецки Ambare, Baum in Indien; по Француски Ambare, arbre des Indes; по Иппаліански Ambare, albero dell'India; по Аглински. Ambare the Indian-tree...

AMBARES, Ambupech. Chompu Ambare, Амбаре

AMBARVATSIS, Ambapuamench, ecms иностранное, Шильной травъ (Genista Генисша)) почти вовсъмъ подобное расшение вырасшающее вышиною съ маленькое вишенное деревцо: Шелковые червечки охоппно на

ней водятся и вдять ея листья. По Гречески "Αμβαρβάτσης ξένον φυτόν; πο ΗΈмецки Almarwatsis, eine Ausländische Bflange; по Француски Ambaruatsis, plante étrangere; по Ишаліански Ambaruatsis pianta forastiera; по Аглински Ambaruatsis.

AMB

AMBEGI, AMBETH. CMOMPH Myroba. lani, Миробалани.

AMBELA, AMBERA. CMOMPH Charamais, ХарамаисЪ-

AMBERBOI, Амбербои. Смошри Суаnus, Ціанусъ.

AMBA, AMEG. M.

AMBO, Амбо. Смотри Mangas, МангасЪ. AMBRA LIQVIDA, Амьра ликпида. Смотри Liquidambra, Ликвидамбра.

AMBRA SPIRANS, Амьра спирансь. Смотри Frutex Africanus, Фрутексъ АфриканусЪ,

AMBRETTA, Ambremma. CMOIIIPH Cyanus moschatus. Ціанусь москатусь.

AMBROSIA, Амброзіа. Смотри 1. Tanacetum, ТанацетумЪ; II. Arthemisia, Арпемизія; III. Botrys, Ботрись. IV Abrotanum, Аброшанумъ. V. Coronopus, Koронопусъ.

AMBROSIA. Dod. Pit Tournef. Amsposia. Ambrosia maritima. Linn. C. B. Ambrosia sativa hortensis. Dod Connyza Hyppocratis. Ang. Arthemisia monoclonos. Col. Herba vinosa. Gesn IV. Козыль трана; Дикое Вожіе дерено или Безсмертная трапа, расшеть въ садахь и цвъщеть въ Іюлъ мёсяцё. Она производить только одинь стебель вы шесть вершковы вышиною, который по бокамь раздылется на многія выточки, окружающіяся зубчатыми, блёднозелеными и на дубовые похожими лиспъями: пвыты бльдножелтые, и сидянь по ивскольку вмість на подобіе листочковь также какъ и съмяна вдоль по стеблю: корень у нее длинный, тонкій и древесоватый Между цвъщами въ нъкошоромъ отъ них вырасшають стинныя

шишечки заключающія въ себъ каждая по одному черноватому и остроконечному съмячку. Все распеніе смолисто, им веть пронзительный, однакожь не безпріятный запахЪ и горьковатый вкусЪ и содержить вЪ себъ много масла и малую часть соли, укръпляеть сердце, разбиваеть и очень полезна от всякой простуды, колодных в грудных в бол взней, продолжительнаго кашлю, и запоровъ въ почкахъ, печенкъ и маткв, по которой причинв гонють съ нею, когда она въ цвъту, воду. Сушеную траву кладуть вы сундуки и вы шкафы между плапьями, потому что сохраняеть оныя оть моли, и придаеть имъ хорошій запахЪ. Амброзіа есть Греческое имя, происходящее от в словь Вршиа, пища и Deòs, Богь, какъ бы сказать божеская пища, потому что прежде сего в фрили, будто бы боги употребляли Амброзію въ пищу. ГосподинЪ Линней полагаеть ее въ XXI. классъ растеній имѣющихъ на одномъ и томъже корнъ цвъпы и мужескіе и женскіе (Мопоссіа) Мужескіе цвіты сей травы иміють обыкновенно однолисточную чашечку, и однолистный, на три части расщепленный и къ верьху на подобіе воронки разширенный цвътъ, (королла), у котораго гуменцо безлисшное; а у женскихъ чашечка сосшавлена изъ одного цъльнаго и впадинъ не имъющаго листочка, и без в короллы. Господин в Турнефорть считаеть ее въ XII. классь въ I. отдъление, во II. родъ травъ имъющихъ изъ многих в вм вств соединенных в цв в точков в составленный безплодный цвёть. По Гречески Аμβρωσια ήμερα; по Нъмецки Umbrofien или Erauben-Rraut; по Француски Ambrosie; Ишаліански Ambrofita; по Аглински Oak of Cappadocia; Wood fage.

AMBROSIA CAMPESTRIS. Amprosia кампестрись. Смотри Coronopus Ruelii Коронопусь Руслай.

AMBROSIA CAPPADOCIA, AMEDOзіа Каппадоціа. Смотри Вотгуз, Ботрись. AM-

AMBROSIA HORTENSIS, Ameposia гортенсись. Смотри Атьгова, Амброзіа.

AMBROSIA MARITIMA, AMEPOSIA маритима. Смотри Атьгова, Амброзіа.

AMBROSIANA, Амьрозіана. Смотри Salvia agrestis, Caneia arpecmuch.

AMBROSIA PRIMA, Αμεροзία πρи-

ма. Смотри Согопория, Коронопусъ.

AMBROSIA QVIBVSDAM DICTA, ARTEMISIÆ FORTE SPECIES, AMEDOSIA кпибусдамь дикта, Артемизіе форте спеціесь. Смотри Согопория, Коронопусь.

AMBROSIA SATIVA, Амброзіи са-

типа. Смотри Атогова, Амброзіа.

AMBROSIA SPONTANEA STRIGO-SIOR, Амърозіа спонтанеа стригозіорь. Смотри Согопория, Коронопусь.

AMBROSIA TENVIFOLIA, AMEDOзіа тенуифоліа. Смотри Abrotanum mas,

Аброшанумъ масъ.

AMBROSIAE ALTERA SPECIES, CV-IVS SEMEN AMOMVM OFFIC. QVIBVS-ДАМ, Амьрозіе алтера спецієсь, куюсь семень амомумь Оффиц. кпитусдамь. Смотри Pseudoambrosia, Псевдоамброзіа.

AMBROSION, Амьрозіонь. Смотри

Sedum, СедумЪ.

AMBVBEIA, AMEYEEA. W

AMBVGIA, AMEYTIA. CMOMPH Cicho.

rium Sylvestre, Цихоріумъ силвестре.

AMBVTON, Ambymoub, ecms maленькая Африканская піравка растущая на островъ Мадагаскаръ по лугамъ, и имъющая прошивный горькій вкусь. Жишели упомянушаго острова ъдять и жують ее вмъстю бетеля, чтобъ здълать зубы, десны и губы свои черными, и чтобъ подучинь пріятный запах в из в рта. По Гречески Αμβέτον, χορτος τε μαδαγασκάρ; πο Нъмецки Umburon, ein fleines Rraut auf Madagascar; по Француски Ambuton, реtite plante de Madagascar; по Ишаліански Ambuton, pianta picciola del Madagascar; по Аглински Ambuton, plant of Madagaicar.

Часть. 1.

AMEDANVS, Ameganych. Смопіри Alnus, АлнусЪ.

AMELANCHIER, Amenanxiept. CMO-

три Mespilus, Меспилусъ. AMELLVS, Amennych. Cmompu After Atticus, Acmeph Ammunych.

AMELLUS MONTANUS, Amennych

монтанусь. Смотри Сопіга, Кониза.

AMELLUS VIRGILII, Amennych Bupтилін. Смотри Eryngium, ЭрингіумЪ; и After Atticus, Астерь Аттикусь.

AMENTACEVS FLOS, Amenmayeych

флось. и

AMENTVM, Amenmymb. Cmompu Flos Amentaceus, флось Аменшацеусъ.

AMERINA SALIX, Америна саликсь. Смотри Agnus Castus, Агнусъ кастусъ.

AMI, Ами. Смотри Ammi, Амми.

AMICA SOLIS, Amuxa conuch. CMCтри Cichorium sylvestre, Цихоріум в силвестре. AMEDEA, Amegea. Cmompu Zea, Bea. AMINEA MYRRHA, Amunea muppea.

Смопіри Апіте Аниме.

AMINE GVMMI, Amune Tymmu. Смотри Апіте, Аниме.

AMMIOS, Ammioch. u

AMMIVM, Ammiymb. Cmompu Ammi. Амми.

AMMANIA PALVSTRIS Linn. Bozomная Амманіа, есть Американское на островъ Ямайкъ въ болотакъ растущее растеніе. ГосподинЪ Линней полагаеть ее въ IV. классъ расшеній, у коихъ въ цвѣшъ IV. тычка и одинъ пестикъ. (Tetrandria Monogynia). Πο Γρεчески Αμμανία έλεια, Амеріначоѕ хортов; по Нъмецки Die in Gums pfen wachsende Ammania in Jamaica; no Француски Ammania des marais piante de la Iamaique; по Ишаліански Ammania paludola, pianta che nasce nell'Isola Iamaica; no Аглински Ammania, an Iamaica plant.

AMMARI MONTIS, Ammapu монmucb. Смотри Pimpinella faxifraga, Пимпи-

нелла саксифрага.

AMMEOS, Ammeoch. Смотри Ammi, AMMU.

147

AMMI, AMMU. CMOMPU Cuminum, КуминумЪ.

AMMI ALTERVM SEMINE APII. Амми алтерумь семине апіи. и

AMMI APVLVM, AMMU апулумь. Смопіри Атті verum, Амми верумЪ.

AMMI COMMVNE. Ammu kommyне. Смотри Ammi vulgare, Амми вулгаре. AMMI DALECHAMPII, Ammu ganeхампін. Смотри Crithmum, КришмумЪ.

AMMI MAIVS, Ammu marocb. Cmoтри Ammi vulgare, Амми вулгаре.

AMMI ODORE ORIGANI, Ammu oдоре оригани. и

AMMIOSELINVM, Ammiocenunymb.

Смотри Атті verum, Амми верумЪ.

AMMI PARVUM, Ammu парпумь.

Смотри Fæniculum, ФеникулумЪ.

AMMI VERVM, Offic. Ammu перумь. Ammi Creticum Ger. 881. Ammi alterum semine Apii, C. B. Pin. 159. Ammi odore Origani, I. B. iii. 295. Chab. 385. Foeniculum annuum origani odore. Tourn. Cuminum Aethiopicum. V. Тминь Кандійскій, есть маленькое, кругловатое, дорожчатое или не глубокими полосочками испещренное и видомъ на шиманъ похожее съмя чернотемнаго цевта, прянаго вкуса и Душицъ (Origanum, ОриганумЪ) подобнаго запаха: аучшее привозится кЪ намЪ изЪ Эгипта и из в острова Кандіи, в в которых в м встах в оно производить довольно высокое и въщвистое растеніе, называемое Амміозелинумь, которато стебель тонкій, листья нъжные и подобны укропнымЪ, а цевшы маленькіе, бълые, составленные изъ многихъ емъстъ соединенных в цвыточковь, и сидяще на черешкахЪ, вЪ одну чашечку соединяющихся. Посав навтовь чашечки превращающся въ два съмячка. Корень маль, тонокь, и бъль. Съмя считаемое въ числъ четырехъ малых в гръющих в или теплых в съмянъ, оодержишь вы себь много масла и льшучей

соли, разбиваеть, отворяеть, сущить, жидишь, гонишь мочу, камень, и поть, разгоняеть вытры, укрыляеть машку, прошивод виствуеть яду, унимаеть боли, посившествуеть теченію остановленной мъсячной крови, дълаешь женщинъ кЪ беременности удобивишими и считается полезнымъ ошъ ръзу въ живошъ и вспучиванія онаго. Амми есть Греческое отБ слова аинос, песокъ, происходящее имя. потому что сіе съмя величиною походить на песчаныя зерны. ВЪ АптекахЪ держатЪ съмя, привозимое сюда изъ Венеціи, гдъ достають его изъ Александріи. Оно вхолишь въ составъ Теріака. Господинь Линней полагаеть Тминь Кандійскій вь V. классъ расшеній, содержащих в в обоеродном в своем в цвв пв пять пычков в и два песпика (Pentandria Digynia) А Господинъ Турнефорть въ VI. классъ, въ І. отдъленіе, въ І. родь правь им вющих в соспавленный из в многих в вывств соединенных в цввточков в черенястый цвъть. По Гречески Адил и Адмюч; по Арабски Hanochach, Anazave, Nacachau Nacachave; по Нѣмецки Ummi; wahrer oder Cretischer Ummen; no Ppangyски Ammi de Candie, по Италіански Ammi di Candia; по Аглински True Bishopsweed unu Aromatick Bishops - weed of Candia.

AMMI VULGARE, Offic. Ger. 881. Амми пулгаре оффиц. Ammi maius. C. B. Ami, Ammi, Amium et Ammium, Chab. 285. Аменикь или простый Тимонь Эвіопскій, свешся вы садахы, и цвышешь въ Іюнъ и въ Іюль мъсяцахъ. Онъ имъетъ бълый и многими тонкими волокнами окруженный корень, который потолще верьху описаннаго; длинные, глубоко връзанные и на пастарнаковые похожіе листья; маленкій, круглый и зеленый стебель, и изъ вершины онаго коронками вырастающе маленькіе, звіздкою расположенные цвіточки, оставляющие послъ спадения меленькия и на непрушечныя похожія съмячки, перцу подобна-

добнаго вкуса. ВЪ АптекахЪ часто употребляють сіе съмя вмъсто Кандійскаго настоящаго; по Гречески "Аммой хамой, по Нъмецки Ветсіпет Аттен; по Француски Атті соттип; по Италіански Атті сотmune, по Аглински Bishops Weed Common; Herb - William; Bullwort.

AMMI VULGARE MAIVS LATIORI-BVS FOLIIS, SEMINE MINVS ODORATO. I. В. Амми пулгаре маюсь лаціорибусь фолінсь, семине минусь одорато. Смотри Ammi vulgare, Амми вулгаре.

AMMIOS, Ammiocb u

AMMIVM, Ammiymb. Cmompu Ammi vulgare, Амми вулгаре.

AMMIVM ADVLTERINVM. Ammi. умь адултеринумь, пожь.

AMMIVM ALEXANDRINVM, Ammiум Александринумь. п

AMMIVM CRETICVM, Ammiymb

Кретикумь и

AMMIVM ITALICVM, Ammiymb Италикумь. Смотри Атті verum, Амми верумъ.

AMMIVM MAIORIBVS ET SERRA-TIS FOLIIS, SEMINE APII, Ammiymb магорибусь еть серратись фолись, семине Апіи. Смотри Ammi vulgare, Амми Вулгаре.

AMMIVM PERPVSILLVM, Ammiymb

перпузиллумь. и

AMMIVM ROMANVM, Ammiymb Романумь. и

AMMIVM SYRIACVM, Ammiymb Cuріакумь. и

AMMIVM VERVM, CMompu Ammi verum, Амми верумъ.

AMMOMIS, Аммомись. Смотри Согопория, Коронопусь.

АММОМУМ, Аммомумь. Смотри Атотит, АмомумЪ.

AMMONIACVM GVMMI, AMMOнічкумь гумми. Смотри Gummi Ammoniасит, гумми АммоніакумЪ.

AMMONIACYM IN GRANIS, Amмонгакумь инь гранись. и

AMMONIACYM IN GVTTIS, Amмонгакумь инь гуттись. и

AMMONIACVM THYMIAMA, Am-

моніакумь Тиміама. и

AMMONIACVM VULGARE, Ammoніакумь пулгаре. Смотри Ситті Аттопіасит, Гумми АммоніакумЪ.

AMOMI ANGLORVM, AMOMU AHглорумь. Смотри Атотит, Амомумъ.

AMOMI FRUCTUS, Amomu ppykтусь. Смотри Сивевае, Кубебе.

AMOMIS, Amomuch. Cmompu Caryo-

philli, Каріофилли.

AMOMIS DIOSCOR, Anomuch Aiоскор. Смотри Rola Hiericontea, Роза Гіериконтеа.

AMOMVM, Amonymb. Cmompu Stry-

chnodendros, СтрихнодендросЪ.

AMOMVM GENVINVM, Amomymb

Генуинумь и

AMOMVM NOVUM CARDAMOMI VULGARIS FACIE, SIVE INDICUS RA-CEMUS. I. В. Амомумь нопумь Карда. моми пулгарись фаціе, сипе Индикусь рацемусь и

AMOMUM OFFICINARUM, Amonymb оффицинарумь. Смотри Атотит гасето-

lum, АмомумЪ рацемозумЪ.

AMOMUM PLINII, Amomymb IInuнін, Смотри Solanum Fruticosum, СоланумЪ фруппикозумЪ.

AMOMUM QVORUMDAM ODORE CARYOPHYLLI, Amonymb кпорумдамь одоре Каріофилли. Смотри Атотит га-

сетовит, Амомумъ рацемозумъ.

AMOMVM RACEMOSVM, C. B. Pin. 413. Ions. D. Elettari I Hort. Mal. XI. 9. Tab. 5. Myrthus arborea, aromatica foliis laurinis. Si-Ion Amomum Linn. Ормушь, Гпоздичной Перець или Шипь Ерихонскій, есть плодъ н в которато высокато Индіанскато в в Азіни на Аглинскомъ островъ Ямайкъ при подощвахъ ISI

горь, и на пънистых влажных в, въпрамъ не подверженных в мъстах в растущаго и вь Іюнь и вь Іюль мьсяцахь цвыпущаго дерева, которое вышиною отв трехв дочетырехь саженей, толщиною вь охвать, покрываения гладкою сврованною корою, и выпускаеть на всв стороны ввтви, окружающіяся зелеными, длинными, широкими, кЪ концамЪ завостренными, гладкими, лоснянцимися и на давровые похожими лиспьями, коих в края другь друга покрывающь; цевпы бвлые, многолисшные, имвють внутри късколько зеленых в молоточков в н выходять горбками на концъ каждой вътви; а послъ оныхъ показывающся зеленою кръпкою кожицею покрышыя зерны, не много крупнъе можжевеловыхъ. Сперва они бываошь мълки и зеленовашы, но созръвая становятся черны и лосиящіеся. Сей плодъ енимають сь дерева еще зеленый, и кладушь на солнце, пока онь не пошемивешь. Онъ имъетъ съ гвоздикою, можжевеловыми этодами, корицею и перцомъ сходствующій вкусь и запажь, содержить вь себв много лъшучей соли и масла, прошиводъйствуеть яду, укрвпляеть желудокь, возбуждаеть аппенить, разбиваеть выпры, пособляеть варенію пищи, поствиествуеть мъсячной крови, умножаеть движение крови и употребляется для приправы вЪ кушаніяхь. Вь Апшекахь имвешся свия. Амомумь есть Греческое название, котораго смыслъ не извъсшенъ. Господинъ Линней полагаеть его вь I. классь расшеній, имъмощих в в в своем в цввив один в гвоздок в и одинъ песшикъ (Monandria Monogynia); а господинь Турнефорть вь XI классь леревъ съ неправильнымъ многолисшнымъ мвВтомЪ, котораго пестикЪ превращается въ мягкій плодъ по гречески "Амомос; по Арабски Натапа; по Индіански Hern; по Bomennu Wehlriechender Myrten-Baum mit Lorbeer-Blattern; a naogb Jamaica Pfeffer, West Indianischer Pfeffer, Juden oder Wuns дет Увенет; по Француски Атоте еп grap-

ре; по Италіански Amomo in graspa; по Аглински True Amomum; Smaid - Peper, или The Fruit of the Clove Berry-tree.

AMOMUM SPURIUM FOLIOSUM, Амомумь спуріумь фоліозумь. Смотри Gummi Ammoniacum, Гумми АммоніакумЪ.

AMOMUM ZINGIBER, Amomymb Зингиберь. Смотри Zingiber, Зингиберь.

AMORIS POMUM, Amopueb nomymb. Смотри Lycoperficon, ЛикоперсиконЪ.

AMORIS TUBA, Amopueb Смотри Corona folis, Корона солисъ.

AMORISABETH, Amopucatemb. Cmo-

три Folia Sennae, Фоліа Сенне.

AMORPHA FRUTICOSA. Linn. Sp. I. (Аморфа фрутикоза.) Ложный Крутихь есть Американское растение, котораго листья подобны листьямЪ Виргинской Акаціи; цвъты на немь маленькіе, расположены колоскомЪ пурпуроваго и на КрутикЪ (Indigo, Индиго) похожаго цвѣта, но всв скоро опадають и не оставляють послѣ себя сѣмяни, чего ради почитаю я их в мужескими. Пересадка двлаения всякіе два года въ корошей земль; льтомъ можеть сіе дерево снести здвшній вольный воздухв, но зимою должно его ставить вв оранжереи на нижній спеллажь. Господинь Линней полагаеть оное въ XVII классъ растеній, у коих в в цввтв десять мужчинокЪ, которые выходять изъ двойнаго основанія и изъ двойной машки (Diadelphia Decandria). По Гречески Аморва Дамийть Ausginaror Outor; no Homenku Falscher Ine digo; по Француски Inde faux; по Италіански Indico falfo; по Аглински Indigo the falle.

AMOTES, Amomech. CMompu Batatas Нібрапогит, Батапась Гиспанорумь.

AMPALANTANGH - VARI, AMTIONAL тангь - пари, есть большое Африканское, на островъ Мадагаскаръ растущее дерево, копораго листья, естьли до нихъ дотро. нешся, сжимающся. По Гречески Ампадач-

7 06 Was

τανγβάρη δένδρον τε Μαδαγασπάρ; πο Η Εмецka Ampalantangh wari, Baum in Madagas= car; по Француски Apmpalantangh - vari arbre de Madagascar; по Италіански Атраlantangh-vari albero dell' Isola Madagascar; по Аглински Ampalantangh-vari Madagafcar tree.

АМРАМВЕ, Ампамье, есть родь высокорастущаго проса въ Мадагаскаръ, копторое служить тамощнимь жителямь вь пищу. По Гречески Аμπαμβέ, Αφρικανόν θυτόν; по Ивмецки Атратве, Hirsen-Art in Madagas car; по Француски Ampambe, espéce de Millet de Madagascar; по Ишаліански Ampambe sorte di miglio del Madagascar; по Аглински Атратbe, plantof Madagascar.

AMPELOPRASSVM, Ампелопрассумь. Смотри Scorodopraffum, СкородопрассумЪ.

AMPELOSLEVCE, AMTHE AOCAEY14e. CMO-

mpu Bryonia, Epionia.

AMPVFVTCHI, Αμπγφγηκα, есшь большое Мадагаскарское дерево роду Американскаго такъ называемаго Махауть. Жипиели сего острова дълають изъ него канапы; также превосходно оно предъ всъми прочими деревьями своею легкостью. По Τρεчески Αμπυθέτχη δένδρον τε μαδαγασκάρ; по Ивмецки Umpufuschi, Baum in Madagascar; по Француски Ampufutchi, arbre du Madagascar; по Италіански Ampufutchi, albero del Madagascar; по Аглински Атрибитchi Madagascar-tree.

AMPVLI, Ампули есть Мадагаскарская трава, корень которой будучи варенъ въ водъ считается преизящнымъ среддствомъ от сильнаго біенія сердца. По Гречески Аμπέλη, Φυτόν της μαδαγασκάρ; по Ивмецки Ampuli, ein Kraut in Madas gascar; по Француски Ampuli, herbe de Madagascar; по Италіански Ampuli herba di Madagascar; по Аглински Ampuli, plant of Madagascar.

AMPVLLA, Ампулла. Смотри Cichorium fylvestre, Цихоріумъ силвестре.

AMVRA, Amypa. Chompu Chamædrys, Хамедрисъ.

AMYDVM, Amugymb. Cmompu Zea, Зеа

AMYGDALA, Amurgana. w AMYGDALVM, Amurganymb.

шри

AMYGDALVS, Chab. 12. Ger. 1256. Emac. 1445. Amurganych. Amygdalus communis Linn. Amygdalus Amara, et Dulcis, C. B. Pit. Tournefort. Amygdalus fativa. Pin. 441. VI. Миндальное дерепо, растеть только въ теплыхъ странахъ, какъ въ Гишпаніи, Италін, во Франціи, и въ Нъмецкой землъ около Маина и Реина, а въ Россіи въ Астраханской, и Азовской Губерніяхь, но вь прочихь спіраняхь сего Государства в оранжереях в, и цв в теш в весною, а плоды поспъвають въ Іюдъ и Августъ мъсяцахъ. Сіе дерево бываетъ нарочитой величины, имветь крънкій и шероховатою корою покрытый пънь, и весьма походитъ на Персиковое дерево, кромъ шого только что листья его уже. Оно кореньями своими не очень распроспраняется и имветь обыкновенно только одинъ толстый и глубоко въ землъ лежащій корень Листья на нем' длинные, узкіе, ПерсиковымЪ подобные, и оканчивающсу вершиною; цвѣть бѣлый съ пурпуровымь мало смынанный, многолиспиый, и походить также на Персиковой, только не слабишь: послъ цвъта вырастаеть продолгованый и кръпкою желпою ноздреваною шелухою покрышый орбхв, заключающій вв себъ долговатое, бълое, плоское и тонкою кожицею обведенное зерно или миндаль, который хотя бываеть двухь родовь, сладкій и горькій, но одинакой величины. Сладкіе миндали содержать вы себы много масла и не много соли, умягчающь, укръпляють, утоляють боли, унимають острону соковь, чистять и жидять оные, возбуждающь сонь, и почищающся полез-HEIMIT

ными от сухотки и нарывов в в почках в. Горькіе содержать въ себъ много масла и болбе соли, нежели сладкіе, раздбляють, разбивають опуходи и густыя грудныя мокрешы, гоняшь мочу, умерщваяють глиспы, пропивятся хм влю или піянству, поспъществують остановленной мъсячной крови, дълающь кожу чистою и полезны оть укушенія бішеныхь звірей. Славный ХимикЪ ГосподинЪ НейманЪ пишетЪ, что горькій миндаль умерщвляеть всёхь слёпорожденных в живошных в, которыя онаго набдятся. Его жують и прикладывають ко лбу от в жестокой головной боли. Выжатое как в изв горьких в так в и сладких в миндалей масло размягчаеть, утоляеть рѣзъ и ворчание въ живошъ, приводишъ въ созрѣлость чирьи и нарывы, унимаеть почечуйную боль, понуждаеть на низь, и возбуждаеть у дъшей рвошу. Сладкое миндальное масло прошивуд Биствуеть яду, есшь надежное средство от отравь, крытких слабительныхъ и рвошныхъ, но за неимъніемъ онаго и деревянное или льняное масло, шакже и топленое коровье молоко мъсто его заступишь могушь. Нъсколько капель сего миндальнаго масла приняшы будучи на леденцъ унимають кашель и хрипоту, а двъ или три ложки онаго въ горячій похлёбкь помогають страдающимъ почечнымъ камнемъ, и женщинамъ отъ остановленія місячнаго. Въ прочемъ употребляють его вы кушаньяхь. а особливо во время постовъ. Масло изъ горьких в миндалей упомребляется наружно оть звуку вь ушахь, глухоты, судороги въ членахъ и отъ каменной боли. Изъ сладких в миндалей, двлають также молоко, употребляемое вм всто снимокъ или модока въ кушаньяхъ и въ чав и кофев. почитается хорошимъ средствомъ возстановлять потерянныя силы, и утолять жарЪ въ горячкахъ и другихъ бользияхъ. Масло изъ сладкаго употребляють въ Медицинъ наружно въ пластыряхъ и въ промыващель-

ных в и размягчающих в припарках в, а внутренно въ разныхъ припадкахъ новорожденных в младенцовъ. Сухой сладкой миндаль Вдяшь для лакомства, жаряшь его и дълають изъ объихъ сортовъ миндальное и другое пирожное, разные конфекцы обсыпають сахаромь и кладуть вь соусы и другія кушанья. ВЪ АптекахЪ имъется горькій миндаль, тисками выжатое изЪ него масло, сладкій сырый и сахаромЪ облишый миндаль; масло из в него, и конфекть (Confectio Amygdalarum, Конфекціо Амигдаларумь). Амигдалусь есть Греческое имя. ВЪ МиллеровомЪ садовничьемЪ Лексиконъ чишалъ я, что Миндальное дерево, естьми вЪ цвъту своемЪ производитъ болбе листовь, нежели цввту, означаеть будущую свою неплодовитость. ГосподинЪ Линией полагаеть сіе дерево во XII. классь дерев в им вющих в в в своем в цв в т дватцать и болве шычковь и одинь песшикь (Icolandria Monogynia) а ГосподинЪ Турнефортъ вЪ XXI. классь, въ VII. отдъление, въ І. родь деревь съ многолистнымъ цвѣтомъ, кошораго пестикъ превращается въ плодъ обведенный крвпкою скорлупою. По Гречески Aurydals derdoor; no Homenku Mandel-Baum; а плодъ Mandeln; по Француски Атапdier, плодъ Amandes; по Италіански Amandola, Mandolo или Mandorlo, albero, плодъ Amandola, или Mandola, frutto noto; по Аглински Almond tree; плодъ an Almono.

AMYGDALVS AMARA, Amurganych

амара. и

AMYGDALVS DVLCIS, Amurganych дулцись. Смотри Amygdalus, Амигдалусь.

AMYGDALVS FOLIIS PETIOLATIS, BASI ATTENVATIS. Linn. Amurganych фолінсь пеціолатись, вази аттенуаmuch. Смотри Amygdalus Nana, Амигдалусь Нана.

AMYGDALVS NANA. Linn. Amurgaлусь нана. Amygdalus pumila. Mor. H. R. Bles. Amygdalus Nana. Munt. Hist. 34. Bo-BOIL-

вопникь, поленой Персикь; а при ръкъ Ирпышь Калмыцкие орвхи есть кустарник В растущій въ Казанской, Воронежской и Пензенской ГуберніяхЪ, между ръками Березенской и Глубокой, вЪ АстраханскихЪ степяхъ, при Болгъ и Донъ и около Азова, на подобіе Россійских виних вишенъ на шри аршина вышиною, и имъющій прекрасные розовые цвъты и темнозеленые длииные, на черешках в сидящіе и къ сшеблю. Узкіе листья. Имя бобовникЪ происходишЪ от волосами покрытаго плода, съ малою бобовою шелухою; изъ плода сего дерева, до нынъ весьма мало употребленнаго, получиль Господинь Пасторь Лаксмань, чрезьвыдавливание масло. доброшою весьма мало миндальному усшупающее. Жишели упомянущых в странв. употребляють сего дерева плодь вы пищу. Масло изъ него умягчаеть сухія становыя жилы (Tendines). Смотри о семв деревв въ прудахъ Экономическаго вольнаго общества. По Гречески Аμιγδάλε Ασιατικόν: по Нъмецки Der Asiatische Zwergmandel-Baum; по Француски Amandier nain d'Asie; по Ишаліански Mandolo nano dell' Asia; по Аглински The dwarf Afiatick Almond tree.

AMYGDALVS PVMILA, пусь пумила. Смотри Amygdalus nana,

Амигдалусь нана.

AMYGDALUS SATIVA, Amurganych сатипа. Смотри Amygdalus, Амигдалусь.

AMYLEUM FRUMENTUM, Amuneymb фрументумь. Смотри Zea, Зеа.

AMYLETVM, Amunemymb. Смотри Zea, 3ea.

AMYLOS, Amunoch. H

AMYLVM, Amnnymb. Cmompu Zea, Зеа.

AMYRBERIS, Ampreju:b. Berberis, Берберись

ANABASIS, Анавазись. Смотри Ерhaedra. Эфедра; и Equiletum. Эквизетумъ.

ANABASIS APHYLLA Linnei Анавазись афилла. Безлистный Карагазинь или везлистная кислая трапа, расшеть въ множествь кустами около Царицына и Астрахани, и въ сухихъ и песчаныхъ степяхъ при Ураль и въ Крымской Таппаріи, и цвъпешь въ Іюль мьсяць. Она имвешь пяши. листочные и изъ маленькой на три лапочки разлёленной чашечки вырастающіе цвёточки, осшавляющие послъ спаденія маленькія красноващыя ягодки объ одномъ зернышкъ. Коренья у нее толстые и жескіе. Сказывають, что вь Крымской Татаріи, изцъляются отв проказы взваромв сей травы. Когда весною она еще молода и мягка, то коровы обыкновенно вдять ее для соленаго ея вкуса, и послъ шого шолсшъюшь. Она жЪ во всякое время служишЪ керблюдамъ пріятнымъ кормомъ; смотри путешеспивіе Господиня Палласа по Россіи. ВЪ Апшекахъ и въ Медицинъ здъсь ее не употребляють. Господинь Линней полагаеть всв роды сей травы въ V. классъ расшений имбющих , въ цвътъ своемъ пяпь пычковъ или мужчинокъ и двъженочки или пестика (Pentandria Digynia) по Гречески 'Ανάβασις άφυλης; по Нъмецки Anabasis ohne Blatter, oder der Staudige Roß-Schwank ohne Blatter; по Франпуски Anabasis sans seuilles plante de la Siberie; по Ип:аліански Anabasis senza foglie, pianta della Sibiria; по Аглински Anabasis; а Sibirian plant without liaves.

ANABASIS BELLON, Anabacuch ben-

лонь. Смотри Ephædra Эфедра.

ANABASIS CRETACEA, Anabasich кретацеа. Южопникь, Кислая трава растеть вы великомы множествы на мыловыхы холмах В Ичконских В, и на горах В лежащих В на Калмыцкой степи; и цвѣтепъ осенью. Она имбешь шолешый и козій стволь или стебель, идущій вь землю древесоватымь, прямымъ и долгими волокнами или плешьми окруженнымъ корнемъ, который раздъ-

АЯещСЯ

аяеніся у старых в растеній на многія части, поверьх в земли плосковашь, а по опаденію •днол виних в опраслей бываент былесовапыми кубышечками бородавчатой. Отрасли произрасшающь кучею, стоящь прямо, раздъляющся на равные члены, разрушающся весьма скоро почленно, и бывають длиною въ полтора и два пальца. Члены продолговатпообразные, съ низу тупые, а съ верьху аля пом'вщенія сл'вдующаго члена лунковашые, окружающся шонкими краями съ двумя пропивоположенными, и крестообразно между собою на членахЪ перемъняющимися зубчиками. Сложеніем в сіи члены жестковашые, сочные, цв в том в зеленые, но на позднемъ растеніи, также и молодыми концами красные, и сверьх в того малым в облачным в цввтом в прикрывающиеся; поверьхность их вся испещрена скрывающимися будто желесками. Отрасли бывають обыкновенно одноцвённыя, и пюлько нёкоторыя изъ нихъ съ плодомъ. Чашечныя чешуйки красновашыя, испещряющся щоненкими. вдоль по поверьхности их в проведенными и другь другу прошивоположенными борозджами и сжимающся около плода полукругомЪ такъ что нижнія двъ менше, а верьхнія больше. Зародышь обремененный свменемь лежить прямо кь отрасли, полукруглый, прижатый, цвътомъ желтый и приземиетою верькушкою съ конца назначающися. Съмя особенно покрывается кожицею и содержить въ себъ много влажности, а сердечко извивается въ кругъ, и имбетъ на двое раздъляющееся и въ средину свершывающееся перышко. Господинъ Палласъ пишеть, что цвътовь на ней не видаль, ко что превеликое скодетво плода ея со плодомъ безлистнаго Карагазина заставляеть думань, что и цевты по крайней мъръ нъсколько полобны цв вшкам в оной шравы. На Карагазинъ цвъты раждаются при всякомъ члеяв ввточекв, противополагаясь. Когда растеніе цвътеть, по вмісто околоцвітія

бывають три едва видные края, и на мъсто цавта по пяти маленьких в зубчиков в окружающих в вмъстилище тычков в и пъстиковЪ, но на южовникъ сіи зубчики или не бывають, или покрайней мъръ не распуть со плодомЪ, но стираются. По опаденіи цвЪта, пычки или мужчинки вянуть и увеличившись зубчики сжимаются поверьх в зародыша; посав чего края моло по малу произрастають вь три больше, подволочные и разпвъченные листочки, и изъ пяти чиковь, три симь соотвышствующе скрывающся и пристающь съ низу на подобіе чешуекь кь основанію подволочныхь листочковь, чего на южовникъ нъть. Вкусом в южовник в солоноватый, из в чего видно. что сіе растеніе наполнено извістными частицами (из В Латинскаго прибавленія Господина Падласа кЪ своему Пушеществію по разнымъ провинціамъ Россіи). По Гречески "Анаваоня филодия; по Нъменки Die auf Kreide Bergen in Siberien wachsende Unabasis; по Француски Anabasis, qui croit fur les montagnes de craye en Siberie; no Италіански Anabasis, che cresce supra li montagne de crede in Sibiria; по Аглински Anabasis plant growing on Chaul hills in Sibiria.

ANABASIS FOLIOSA, Linn Anabasuch фоліоза. Многолистпенный Карагазинь, расшешь на самыхь соленыхь мъсшахь около Колмыковой крвпости, и подобень по всвмъ частямъ плода своего и по всему виду травъ Качиму (Salfola Cancona). Die vielblätterigte Alnas Нѣмецки basis: по Француски Anabasis feuilluë: по Ишаліански Anabasis fogliosa o con molti foglii; по Аглински Anabasis mit many liaves.

ANABLATVM, Анавлатумь. Смотри Dentaria Дентаріа.

ANACAMPSEROS, Aнакампсерось. Смотри Crassula. Крассула.

ANACAMPSEROS RADICE ROSAM SPIRANTE, Анакампсерось радице розамь спиранте. Смотри Rhodia radix. Родіа Радиксь.

ANACARDIVM, Acostel. Camil. Anarapgiymb. d. 39 Anacardium Orientale Linn. Arbor Indica Fructu conoideo, cortice pulvinato nucleum unicum, nullo officulo, tectum, Claudente Raii. Hist. 1566. II. Анакардіумь, а по переводу Слонопая пошь, есть плодъ величиною съ каштанъ, который представляеть видь птичьяго сердца, имветь черноватый лосиящися цввть, и заключаеть вь себь былую миндалинку. Онъ расшеть на нъкоемъ Индіанскомъ дерев в В Азіатских Б Королествах В Камбав, Кананорв, Каликутв и Деканв, котораго листья темнозеленые, и бывають длиною въ шесть вершковъ; цвъты маленькіе, бълые и составленные из в многихв, на пять перышков в каждый разд вленных в листочков в. Плодъ содержишь въ себъ много масла и соли, раздъляеть водянистыя тустыя мокроты, въ особливости ихъ выгоняетъ и ужрвпляеть тамянь: Находящися между кожею и штомъ такій сокъ раздробляешь опухоли и прогоняеть бородавки. Въ Аптеках в имбешся Электуаріум в или Конфекщіо, то есть тустовареный сокв и сущеный плодЪ; а въ старину употребляли также двлаемый изв него медв. Имя Анакардіумь происходишь от Греческого слова жасбіа, сердце, потому что сей плодъ имвешь подобіе, маленькаго сердца. ГосподинЪ Линней полагаетъ дерево въ Х. Классъ расшеній им Бющих в в своем в цв в пъ десять тычков и один в пестик (Decandria monogynia). По Генески Аναπάρδιέμ, й xhea edelarinh no Hemenku Flephantenlaus Die Frucht eines Brientalischen Baums; no Француски Anacarde, Fruit d'un arbre des Indes Orientales; по Итахіански Anacardio, Frutto d'un albero dell' India Orientale; no Аглински Anacardium or Bean of Malacca, Asiatick fruit; по Арабски Balador; по Малабарски Осрата, Эпаша.

ANACARDIVM ORIENTALE, Анакардіумь Оріентале. Смотри Anacardium, Анакардіумь.

ANACARDIVM OCCIDENTALE, Aнакардіумь Окцидентале. Смотри Сајон, Каїу.

ANACARDVS, Анакардусь. Смотри Апасаrdium, Анакардіумъ.

ANACAV, Анакау, есть Мадагаскарское, Кипарисному дереву подобное дерево, растущее тамъ на морскихъ берегахъ.
На ономъ водится особливый родъ телковыхъ червячковъ, дълающихъ на немъ домики свои, изъ коихъ приготовляють тонкій и кръпкій телкъ. По Гречески Анакая
быбром тё Мадауастар; по Нъмецки Ипасац,
еіп Зант ан вет Зпри Мададарсаг; по
Француски Апасац arbre de Madagalcar;
по Италіански Апасац, albero del Madagalcar
che l'affimiglia al Cypreffo; по Аглински
Апасац, Madagalcar - tree.

АNACOMPTIS. Анакомптись, есть высокое Мадагаскарское дерево, имъющее грушевнымъ подобные листья, и приносящее на Финикъ похожій плодъ, который покрывается темноватою, бъльми пятнытиками испещренною кожею и наполненъ сладкимъ молоку подобнымъ сокомъ, отъ котораго коровье молоко скисаетъ. По Гречески Анасомртия, безброг тё Мадауаскар; по Нъмецки Апасотртів, Ваит ац Мадазабат; по Француски Апасотртів, arbre dans Madagascar; по Италіански Апасотртів, albero del Madagascar; по Аглински Апасотртів, Madagascar-tree.

ANACTARIOS, Anakmapioch u ANACTOREA, Anakmopea. Cmompu Arthemisia, Apmemusia.

ANACTORION, Анакторіонь. Смотри Acorus, Акорусь.

ANACET, Анацеть. Смотри Iuiubæ, Ююбе.

ANAFRIGOS, Anappuroch. w

ANAFRITICATOS, Анафритикатось. Смотри Аsparagus, Аспаратусь.

ANAGALLIRIS, Анаталлирись. Смотри Confolida maior, Консолида маіорЪ.

ANAGALLIS AQVATICA, Анаталлись акпатика, Смотри Sium, Сіумъ; Silymbrium aquaticum, Сизимбріумъ акватикумъ и Вессавинда, Беккабунга.

ANAGALLIS AQVATICA FOLIO RO. TVNDO, Анаталлись акнатика фоліо ротундо. Смотри Samolus, Самолусь.

ANAGALLIS ARVENSIS. Linn. Ana-Tannuch apnencuch. Cmompu Anagallis prima. Анагаллись прима.

ANAGALLIS CAPENSIS, Анагаллись капенсись. Смощри Anagallis, Анагаллись.

ANAGALLIS COERVLEA, Anarannuch uepynea. Cmompu Anagallis secunda, Anarannuch cenyuga.

ANAGALLIS COMMUNIS, Anaranauch коммунись. Смотри Herba Gerhardi, Герба Герарди.

ANAGALLIS FLAVO FLORE, Andrannuch флано флоре. Смотри Anagallis prima, Анагаллись прима.

ANAGALLIS FOEMINA, Анагалинсь фемина. Смотри Anagallis secunda, Анагалинсь секунда.

ANAGALLIS LATIFOLIA. Linn. Aнаталлись патифоліа. Смощри Anagallis foemina, Анагаллись фемина

ANAGALLIS LUTEA NEMORUM, Анагаллись лутеа неморумь. Смотри: Anagallis tertia, Анагаллись терціа.

ANAGALLIS MAS, Anarannuch mach.
Cmompu Anagallis prima, Anarannuch mpuma.
ANAGALLIS PHOENICEA, Anaran-

ANAGALLIS PUNICEA MAS, Anaran-

ANAGALLIS PRIMA SEV MAS Dod!

Anaranneb прима или мась. Anagalis

Phoeniceo flore C. B. Pit. Tournef. Anagal-

lis terrestris mas. Thal. Corchorus Cratevae. Theophr et Nicand. Ang. Corallina offic. VIII Kypo. слеть; Красноциетная порченная помощь, умь и разумь или Очный цивть трава, растеть на поляхь и полугамь и цвъщеть въ Іюнь мъсяць и во есе льто. Она имбеть воложнистый бёлый корешокь, производящій нѣжные, зеленые, на члены раздъляющіеся и обыкновенно приземистые стебельки, у коих в при каждом в членъ вырастають по два мисточка, которые маленькіе, цёльные, съ низу пяшнышками попещренные, и кругловатые; при основаніи коих в раждаются алые, однолистные, круглые, на подобіе розона расположенные, и на длинных в тонких в черешках в сидящіе цвітпочки, покидающіе послі спаденія круглованыя жалыя, шелухою покрыныя капсулы, наполненныя маленькими желповашыми съмячками. Свойство и употребленіс ея въ Медицинъ опишу я въ сабдующей главь о другомь сорыв сей правы, съ которою вмвств и въ одинъ классъ полагается. Анагаплись есть Греческое, отъ словь "Ага и уаллы, то есть Фригійской рвки Галлись происходящее имя, пошому что сія трава въ древнія времена при упомянутой ръкъ расла въ множествъ. По Гречески 'Αναγαλλίς ποκίνοις ανθέσι; πο Αραδικи Xantala: по Нъмецки Gaucheil mit rothen Blumen oder Mannlein, Logel-Rraut nau rother Meyrich; по Француски Mouron mâle; по Ишаліански Anagallide, Morgelina, o Morone con fiori rossi; по Аглински The Male Pimpernel, or Pimpernel red Flowered.

ANAGALLIS PURPUREA, Anaran-

ANAGALLIS RUBRA, Анагаллиев рубра. Смошри Anagallis prima, Анагаллись прима.

ANAGALLIS SECUNDA SEV FOEMI-NA. Dod. Anagallis terrestris, Offic. Anagallis coeruleo flore C. B. Pit. Tournes. Cunequem-

TES

ная порченная помощь, расшеть вы садахЪ, по полямъ и на лугахЪ, пвѣтетъ вь Іюнь місяць, и различествуеть оть перьой лисшьями своими, кошорые больше двойные или пройные, и цвѣпюмЪ, копорый голубой, а иногда котя и весьма ръдко бёлый. Всё сін сорпы содержать въ се-65 много соли, влажности, и посредственную часть масла. Листья и цвъть чистять кровь, полезны оть рань и оть укушенія бішеной собаки. Въ поханбках Б упстребляемая трава помогаеть чахоточнымь и бользнями въ легкомъ спраждущимъ людямъ. Наружно употребляютъ ее въ припаркахъ, и образомъ баненія отъ лому въ ногахъ. Вода и сокъ ея возбуждають чиханіе. Въ Аптекахь имвется права и перегониая изъ нее вода, но весьма рвдко. Она принадлежить къ солнечнымъ расшеніямъ, ибо въ уреченное время, що есть по утру обыкновенно въ осьмомъ часу раскрывается, и въ вечеру при захожденіи солнца опять сокрывается. Многіе доводять смысль названія Анагаллись не оть Галлись ръки Фригійской, но оть слова анагаллео, аухухдовы, смъюся, по тому что она автомъ всякое утро, какъ бы снова оживаяется. Господинь Линней полагаеть всв роды ея вь V. классь растеній имбющих в в своем в цв в пяпь мужчинокъ и двъ женочки (Pentandria Monogynia) а ГосподинЪ Турнефорть въ VI. классъ, во II. отдъление въ VI. родъ травъ съ плоскимъ и не на трубкъ сидящимъ цвътомъ, котораго пестикъ превращается въ сухій плодъ. По Гречески 'Αναγαλλίς πυανέις ανθεσι; по Арабски Cardabella; по Нѣмецки Вlau Gauchheil oder Weiblein; по Француски Моron femelle; по Италіански Centtone или Morone foemina o con fiori cerulei; no Aглински the Female Pimpernel or Pimpernel blew Flowered.

ANAGALLIS SERPILLIFOLIA, Анагаллись серпиллифоліа. Смощри Вессавинда, Беккабунга. ANAGALLIS TERRESTRIS MAS ET FOEMINA, Анагаллись террестрись мась эть фемина. Смотри Anagallis prima et secunda. Анагаллись прима и секунда.

ANAGALLIS TERTIA, LVTFA. LobTab. Anaranneb Tepuia nymea, Nummularia Syluatica fiue mas. Geln. Желтая мокрица или желтоцивтная порченная
помоща растеть съ упомянутыми на однихъ мъстахъ и дъйствемъ своимъ съ
оными сходствуетъ. По Гречески Агауалліс
ирохобя ствог; по Нъмецки Gauchheil mit
gelben Blumen; по Француски Mouron я
fleurs jaunes; по Италіански Morone con
fiori gialdi; по Аглински Pimpernel yellow
Floweed.

ANAGLA, Анагла. Смотри Auricula muris. Аврикула мурисъ.

ANAGODAN, CMompu Sumach, Cy-

ANAGYRIS ALPINA. C. B. Anaru-

ANAGYRIS ALTERA, Anarupuch an-

ANAGYRIS ANGVSTIFOLIA, Анагирись ангустифоліа. Смотри Laburnum, ЛабурнумЪ.

ANARYGIS ARBORESCENS, Anaru-

рись аркоресценсь. Смопіри

АNAGYRIS FOETIDA. Linn. Анагирись фетида. С. В. Ріт. Тоигпея. Anagyгіз vera foetida І. В. І. 364. Асороп. DioscVII. Вонючее дерепо есшь маленькое, въшвистое, въ теплыхъ только странахъ
особливо въ Италіи растущее и противный
запахъ имъющее деревцо, которое цвътетъ въ Маїв и Іюнъ мъсяцахъ, и назиму должно быть внесено въ теплицы.
Оно имъетъ блъдножелтое дерево, покрывается черножелтоватью корою и производитъ продолговатые, къ концу заощренные, и по три вмъстъ въ кружекъ на вътеляхъ сидящіе листья сверьху зеленаго, а
съ низу темнаго цвъта и произительнаго,

и голову занимающаго запаха. Цвёшы желшые, и оспавляють послъ спаденія шемно зеленые, и длиною въ палецъ бывающее стручья, заключающіе въ себъ обыкновенно по ченыре бобка, конюрые сперва бълые, потомъ пурпуровые или багряновидные, а напосавдокъ становятся черноватыми. Размножение сего кустарника двлается либо изЪ съмяни, либо чрезЪ боковые корневые отпрыски. Листья его разбивають, гонять мъсто, и поспъществують родинамь; толченые прикладывающь на опухоли, кои разбивають. Съмя причиняеть рвоту, а изъ корня выдавленный сокъ раздъляеть и приводишь въ созрълость. Господинь Линней полагаеть оное въ Х. классъ растеній, имвющих в в обоеродном в своем в цввив десять тычковъ и одинъ пестикъ (Decandria Monogynia) а господинЪ Турнефортъ въ XXII. классъ, во И. отдъление въ І. родъ кустарниковъ съ стручковатымъ плодомъ. По Гречески 'Avayueis; по Нъмецки Ctinckender Bohnen= Ваит, Ваит Вовнен; по Француски Воіз puant; по Ишаліански Anagyri o Legno Ipusfendo; по Аглински Anagyris, or Bean Trefoil, which is stinking.

ANAGYRIS LATIFOLIA, Анагирись катифоліа. Сметри Laburnum, Лабурнумь.

ANAGYRIS NON FOETIDA, Анатирись нонь фетида. Смотри Laburnum, Лабурнумъ.

ANAGYRIS PRIMA, Анагирись прима. Смотри Laburnum. Лабурнумъ.

ANAGYRIS VERA, Анагирись пера. Смотри Ападугія foetida, Анагирись фетида. ANAHALON PLINII, Анагалонь Плиніи. Смотри Filipendula, Филипендула, ANANAS. ACOST. LVGD. Ананась. Апапав Aculeatus, fructu ovato Plum. et Pit. Tournef. Bromelia Ananas Linn. XIII. Ананась или Кудряный Волчець съ Сабурнымь листомь, есть Американское, здёсь только въ теплых в оранжереях в растущее, продъс въй ка третьемь, четвертомь

или пятомъ году приносящее расшение бывающее многих в родов в. Оно им веть составленный из многих толстых темнованых волоянь корень, производящий свёпло зеленые, иногда съ пурпуровымъ смъшанные, крвикіе, колючіе, ошь двенащиапи до осмнапиати вершков в длинные, жолобками сверых в идущие и на простинные (Arundo , Арундо) похожіе листья; изЪ средины коихЪ возвышается крыткій сшволь въ паленъ толщиною, который окружается нъсколькими маленькими и нижнымЪ во всемЪ подобными лисшьями и поддерживаеть на вершинь своей розону подобный цввть, составленный изъ многихъ корошеньких в и остроконечных в листочков в вишневаго цвъта, и покрывающий зараждающійся плодЪ, который мало по малу толстветь, принимаеть видь сосновой шишки, двлается продолговатымв и покрывается, когда еще зелень красно фіолето выми или синевашыми однолисшными и на подобіє воронки кЪ верьху разширяющимися цвѣточками, ушверждающимися на треугольных в, вид в чешуек в им вющих в и кв верьху обращенных в шишечках в. плодъ созръваеть, то цвъты на немь вянуть и онь получаеть какь внутри, такъ снаружи желповащый цвЕть, и отменно пріятный вкусь и запахь. Съ верьху украшается онв прекрасным в тохолком в или изЪ многихЪ сине или шемно зеленыхЪ листовь составленнымь пучкомь, который будучи выняшь и посажень въ землю з принимается и производить новую расаду. Съмяна находятся внутри плода, красновашы, и величиною съ сочевицу. Ананась наполненъ пріяпно кислымъ, прохладишель нымь, но зубы вяжущимь сокомь, из в котораго приготовляють вкусное, и ни вы чемЪ такЪ называемому Малвазіеруне уступающее вино. ВЪ прочемЪ укръпляетЪ оно сердце, гонишь мочу и ушоляеть тошноту; но беременныя женщины должны от ли-HHA.

шняго его употребленія воздержаться, по тому что преждо времяни плодъ выгоняеть. Сокъ не созрвлаго Ананаса от в каменной болъзни за особенное почитается лекарство. ГосподинЪ Линней полагаеть всъ шы Ананасовъ въ VI. классъ расшений, у коих в в цввт шесть пычков в и одинь пестикъ. (Hexandria monogynia) а Господинъ Турнефорть вь X. классь, во И. отделение вь V. родЪ расшеній сЪ однолисшнымЪ неправильнымЪ цвътомъ. По Гречески Агагая картоя: The auspinns; no Homenku Unanas eine Umeris eanische Frucht; no Француски Ananas plante & Fruit de l'Amerique; по Италіански Ananasa, pianta & frutto dell' America; no Arлински Ananas, an American Fruight. По Гишпански Pinas; въ Бразили Нана, а на островъ Гиспаніоль Яяма.

ANANAS ACVLEATVS, FRVCTV OVATO CARNE ALBIDA. Plum. Pil. Tourпев. Больший бълый Ананась имветь часто от в осьми до десяти дюимовь вы окружносии своей, и бываешь въ пяшнашцашь дюймовь вышиною. Онъ продолговащокруглый, созръвая получаеть желтый цвъть, который съ одной стороны темиве, а съ другой имбеть былое тыло и весьма пріяшный запахь, но вкусомь хуже вышеупомянушаго, дёлаешь на зубахь оскомину и причиняеть теченіе крови изь деснь. Стебель сего сорша шенве уже описаннаго, а листья цввтомь блёднье, и смвшанны внутри съ голубымъ, также и на поверьхности плода вырастающій пучекь ширте и многолистиве: По Гречески Аνανάς μεγάλευκον: по Ивмецки Die Grosse weiße Ananas; по Француски Le gros Ananas blanc; по Итаміански Ananas bianca groffa; по Аглински: The white great Ananas.

ANANAS ACVLEATVS FRVCTV OVATO, CARNE AVREA. Plum. Mannin продолгонатый Ананась или такъ называемое Ренеттопое явлоко, есть изЪ жевхв соршовы меньше, но и всяхь вкусные. Онъ имъетъ золото - желтое тъло, и Ренепшовой вкусь и запахь, чего ради и прозванъ упомянущымъ названіемъ. По Гречески Ананая преас кехриоториено; по Нъмецun Die Rleine tanglichte Unanas mit Golds gelben Fleisch oder der sogenannte Renett-Apfel; по Француски Ananas dit Pomme de Rénette; по Италіански Ananas con forma do ove; по Аглински the long Ananas with à yallov frui.

ANANAS ACVLEATVS, FRVCTV PYRAMIDATO CARNE AVREA. Plum. Pil. Tourn. Ананась акулеатусь, фрукту тирамидато карне апреа: Смотри: Ananas, АнанасЪ.

ANANAS ACVLEATVS, MAXIMO FRVCTV CONICO: PLVM. Ananach A. кулеатусь, максимо фрукту конико. Ananas fructu Pyramidato Linn. Ananach u. меющій подобіє сахарной голопы или пидь пирамидальной. Листья его длиннъе и уже описанных в плодъ больше и не такъ желтъ и вкусомъ пріяшенъ. Сокъ его причиняешъ шакже шеченіе крови изЪ деснъ. По Гречески Ауауас нартос пирацоводис, по НВменки Die als eine Pyramide gestellte Ananas; no Француски Ananas dit Pain de fucre; по Ишаліански: Ananas con forma Pyramidale o il pano di Sucro; по Аглински. Ananas in Shape of Piramidale:

ANANAS FOLIO NON SERRATO Ananas non spinola. M. B. Ananach ch neколючимь листомь, различествуеть отБ прочих в листом в своим в, который не окружен в иглами. По Гречески Алага с алагового по Ивмецки. Die Ananas, ohne Stacheln; по Француски L'Ananas pitte, по Италіански Ananas con foglie: fenza: fpine; по А-

глински Ananas without prickels.

ANANAS FOLIO STRIATO, Ananach фолю стргато. Пестролистный Ананась. Πο Γρεчески Ανανάς φύλλω διαφόςας χρωμασι πο Нъмецки Unanas mit bunt-gestreiften. Blattern 3; по Француски l'Ananas à fevilles panachées ; по Италіански Ananas con foglie variegate по Аглински Wariated Leav'd Ananas.

ANANAS FOLIO VIX SERRATO. Boerh. Ind. att. P. 11. p. 83. Красный Ананась, имветь толстый черно-пурпуровый стебель; снаружи зеленые, а внутри от стебля до половины красные и изрѣдка по мѣстамъ иглами окруженные лисшья и краснаго на киноварь похожаго, но при эрвлости блёднёющаго цвёта плодь, изъ котораго вырастаеть маленькій изъ зеленых в листочков в съ красными вершинками составленный кохолокЪ. Внутри плодЪ желповать и имбеть весьма пріятный подобный лучшей Бухарки и Абрикосу вкусЪ. По Гречески Ачачая бридом; по Нъмецки Die rothe Unanas; по Француски Ananas rouge; по Италіански Ananas Rossa; по Аглински Red Ananas.

ANANAS LVCIDE VIRENS, Aнанась луциде пиренсь. Смощри Ananas folio vix ferrato, Ананась фоліо виксь серрашо.

ANANAS FRVCTV CARNE RVBRA, Ananach prykmy kaphe pyspa: Kpachomerahbin Ananach. По Гречески 'Avavás преаснойного по Нъмецки Unanas, mit Fleis schrother Frucht; по Француски Ananas rouge en dedans; по Италіански Ananas con carne ross; по Аглински Ananas the Inside red.

ANANAS FRVCTV OVATO, CARNE ALBIDA, Ананась фрукту опато, карне альида. Смотри Апапаз aculeatus, fructu ovato, carne albida, Ананасъ акулеатусъ, фрукту овато, карне албида.

ANANAS FRYCTV PYRAMIDATO, Ананась фрукту пирамидато. Смотри Ananas aculeatus maximo fructu conico, Ананась акулеатусь максимо фрукту конико.

ANANAS NON ACVLEATVS, PIT-TA DICTVS, Ananach nonh akyzeamych, numma qukmych. Cmompu

ANANAS NON SPINOSA, Ananach нонь спиноза. Смотри Ananas folio non ferrato, Ананасъ фоліо нонъ серрато.

ANANASA, Ананаса. Смотри Ananas, Ананась.

ANANDRIA, Анандріа. Смотри Tusfilago, Туссилаго.

ANANGALVS, Anantanych. Смотри Bruscus, Брускусь.

ANANGEL, Anantenb; moxb.

ANANNAMVNDA, Ананнамунда. и ANANTEA, Анантеа. Смотри Са-ryophyllata, Каріофиллата.

ANAPELLUS, Ananennych. Cmompu

Opuntia, Опунціа.

ANAPHITON, Анафитонь. Смотри Helleborus albus, Геллеборусь албусь.

ANAPODOPHYLLON. II. Анаподофиллонь. Утиная нога трана; по НВмецки Ман Upfel.

ANAROCIVM, Анароціумь. Смотри

Cynosbatos, ЦиносбатосЪ.

ANARRHINVN, Anapprunymb. Cmo-

три Antirrhinum, АнтирргинумЪ.

ANASE, Аназе, есть Мадагарское къ верьху на подобіе пирамиды растущее дерево, приносящее, величиною и видомъ на Тыкву похожый плодъ, имъющій внушри бълое, кръпкое и креморъ Таршари (изъ виннаго камия приготовляємая кислая соль) подобный вкусъ, и заключающій въ себъ много кръпкихъ косточекъ. По Гречески Άνασε, δένδρον τε Μαδαγασκάρ; по Нъмецки Япабе, еіп Зашт іп Мададабсаг; по Француски Anafe, albero del Madagafcar; по Аглински Anafe, tree from Madagafcar, или an Madagafcar-tree.

ANASONAPHI, Анасонафи. Смотри

Buglossum, БуглоссумЪ.

ANASPHORA, Anachopa. Cmomps

Polypodium, ПолиподіумЪ.

ANATOLICON, Анатоликонь. Смотри Aristolochia longa, Аристолохіа лонга. ANAXYRIS, Анаксирись. Смотри

Асетова, Аценоза.

ANBLATVM, Англатумь, Смотри Dentaria Orobanche и Lathraa, Дентаріа Оробанхе и Латреа,

ANCATA, Ahkama. Смотри Nafturtium, Hacmytuiymb.

ANCHEMON, Anxemonb. Cmempu An-Ierina, Ансерина.

ANCHILOPS, Anxunotich u

ANCHINOPS, Anxunonch. CMonipu Рьсепіх, Фениксь.

ANCHVSA ALCIBIADION, Anxy3a Алцивіадіонь. Смотри Anchusa Officinalis, Анхуза ОффициналисЪ.

ANCHVSA ALTERA, Anxysa an-

тера. и

ANCHVSA ARVENSIS ALBA, AHXY. за арпензись альа. Смотри Anchula Offi. cinalis, Анхуза Оффицинались.

ANCHVSA BVGLOSSA, AHXY30 BYглосса. Смотри Bugloffa, Буглосса.

ANCHVSA DEGENER, Anxyaa ge-

тенерь. и

ANCHVSA ECHII EOLIO ET FLORE. Анхуза Эхін фоліо эть флоре. Смотри Anchusa Officinalis, Анхуза Оффицинались.

ANCHVSA LVTEA, Anxy3a nymea. Смотри Coniza media, Кониза медia.

ANCHVSA MINOR, Anxy3a Muнорь. и

ANCHVSA MONSPELIANA, Anxysa

Монспелиана. Смотри

ANCHVSA OFFICINALIS. Linn. Anхуза Оффицинались. Anchusa puniceis floribus. C. B. Buglossa rubra. Lin. Buglossum radice rubra five vulgatior, Tournef. VII. Черпяница трапа, Красный корень, Ослопыя уста. Обраски или красный бычачій языкь трава растеть вы теплыхы странах в на песчаных в мъстах в и на полевых в межах в, и цевшешь в в вы м Августв мъсяцахъ. Она имъетъ древесовашый, съ наружи кровокрасный, внутри бълый и никакого запаха не имъющій корень в палець толщиною, и вяжущаго грубаго вкуса, который производить нъсколько стеблей, покрытых в мошистым в пушкомЪ, и обсаженныхЪ маленькими почши

не примъшными иголочками и наклоняющихся верьхушками кЪ земав: листья зеленые длинные, узкіе, жескими волосками покрышые и остроконечные: цвъты пурпуровые, вырасшають на вершинь стеблей, и имъющь видъ воронки. Послъ сихъ цвъ. товь оказываются вь цввтныхь чашечкахъ чепыре, видомъ на змъиную головку похожія съмячки пепельнаго цвъта. Хотя сія трава и растеть здісь ві нікоторыхь странахъ, но въ разсуждении способности къ крашенію не столь почитается хорошею, какъ привозимая къ намъ изъ Франціи, гав расшеть она вы окружностяхь Монть-Пелліера въ Прованскои Провинціи и изъ Ишаліи. Иногда привозять къ намъ изъ Леванта родъ сего корня называемаго Цареградскимъ: оный почни столь же великъ и толсть какь рука, но видь имветь особливый; потому что кажется быть на подобіе табаку составленным в изв многихв вмъстъ скатанныхъ разноцвъпныхъ стовь; изъ коихъ большая часть темнокрасные съ нъжновіодешовымъ смъщанные; а на верьху онаго показываемся родъ бълосиневатой плесни, внутрижь его находится сердце, которое есть тоненкая на подобіе корицы свернутая кора, съ наружи свътлокрасная, а внутри бълая; думать должно что сей корень не натуральный, но совсвыв шрыв крашенное имв получаеть цвёть гораздо нашихь превосходнёе. Должно его выбирать недавно сущеный, тнущійся, и съ наружи темно краснаго, а внутри бълаго цвъта. Онъ содержить въ себъ много масла и малую часть соли, укръпляеть, унимаеть понось будучи употреблень вь декокшахь и лечишь молошницу у дътей: наружно онъ сушить и чистить застарблыя раны и нарывы. Красильщики: сушать корень на солице и красять имъ въ красную краску; а въ Апшекахъ употребляють его для полкрашиванія водки зверобойнаго (Oleum Hypericum ОлеумЪ Гипери-

перикумЪ) и Безоардова масла (Ol. bezoard. Wedelii, Ол. Безоард. Ределіи) помады и розовой красной мази (Vnguent. Pomadin. Rubr. Унгвентумъ помади нумъ рубрумъ) Эгиптяне двлають изв него свои румяны. Анхуза происходишь от Греческого слова Анхузинь, замарать, которое имя дано ей, въ разсужденіи красильнаго ея корня. Госполинъ Линней полагаеть ее въ V. классъ расшеній, им вющих в в в своем в цв в тв четыре мужчинки и одну женочку, (Pentandria Monogynia) а Господинъ Турнефортъ во II. классъ вь IV. отдъление въ II. родъ травъ съ однолисшнымь, на подобіе воронки къ верьху разширеннымъ цв В томъ; по Гречески Аухвоа; по Нъмецки Rothe Ochiene Зипде или Noth Karber Kraut; по Француски Orcanette; по Италіански Orba o Ancufa Herba; по Аглински Alkanet, или the lesser Alkanet, with purple Flowers; по Арабски Таbaisir.

ANCHVSA ONOCHILES, Анхуза Онохилесь. Смотри Anchusa Officinalis, Ан-

хуза Оффицинались.

АNCHVSA ORIENTALIS. Linn. Ан. хуза Оріентались. Восточная черияница трава, растеть вы Сибири, и имъеть сначала желтые, но напослъдокь Червецу подобную краску получающіе цвыты. По Гречески "Аухвоа акатолий; по Нъмецки Дав Drientalische Rioth Färber-Kraut; по Француски L'Orcanette Orientale; по Италіански Ancusa Orientale; по Аглински Oriental Alkanet.

ANCHVSA PARVA, Анхуза парна. и ANCHVSA PVNICEIS FLORIBVS, Анхуза пуниценсь флоривусь. Смотри Anchusa Officinalis, Анхуза Оффицинались.

ANCHVSA VNDVLATA. Linn. Анжуза ундулата. Волнисто цивтная черияница расшеть вы нёкоторых в странах в Сибири имветь бёлой волнистый - а иногда свётло-голубой цвёть. По Гречески "Аухзса тахиха Вящобля по Нёмецки Эгого Sarber Rraut mit Weltensweiß gestaltenen Blus men; по Француски Orcanette à slurs blanches ondécs; по Италіански Ancusa con siori bianchi ondati.

ANCHVSA VIRGINIANA. Linn. Anxy3a пиргиніана. Виргинская Черпяница съ тладкимъ стеблемъ, и разбросаннымъ колосомъ растущимъ краснымъ цвътомъ. По Гречески "Аухвоа тиз Вірумая
по Нъмецки Дав Дікдіпівре ДовъбавречаЯкані; по Француски Orcanette de Virginie;
по Италіански Ancula della Virginia; по
Аглински Virginian Alkanet.

ANCHVSA VULGATIOR, Анхуза пулгаціорь. Смотри Anchusa Officinalis,

Анхуза Оффициналисъ.

ANDA. G. Plfon. Анда есть Бразильское дерево, имъющее длинные остроко. нечные, и шемнозеленые лисшья съ лежащими по нимъ жилами и большій желтый цввть; и приносящее свроватою скорлупою и подъ нею еще кожуркою покрышый орбхъ, въ которомъ заключаются два каштаннаго вкуса зерна. Внупренное качество дерева ноздреватое и легкое. Орбховая скорлупа почитается способною унимать поносы: естьми ее бросинь въ прудъ, то умерщвляеть встхъ вь немь находящихся рыбъ. Орбховыя зерны, как в сказывають, слабять и производять рвоту, а выдавленное изъ них в масло укрвпляеть жилы. По Гречески Ανδα, δένδρον της Βρασιλίας; πο Η ΕΜΕΙΙΚΙΝ Unda, Baum in Brasilien; по Француски Anda, arbre du Brésil; no Италіански Anda, albero della Brasilia; по Аглински Anda, an Brasilian tree.

ANDACHOCHA, Андахоха. Смотря Trifolium acutum, ТрифоліумЪ акутумЪ.

ANDALE, Андале. Смотри Colocinthis, Колоциниись.

ANDECHOA, Андехов. Смотри Satu-

ANDIAN BVLOHA, Андіань булота. есть Мадагаскарскій, на Морских в тахв

,

тахЪ раступцій кустарникЪ, имѣющій листьямь травы Собачьей головки (Cynoglossa, Циноглосса) подобные лисшья и кусточками растущія из в свра бълесоватыя свмяна. По Гречески 'Ανδιαν βελοα μιπρόν δενδρον τέ μαδαγαоная; по Ивмецки Andian Bulbha, Baum in Madagascar; по Француски Andian-Buloha, arbriffeau de Madagascar; по Италіански Andian-buloha piccioll'albero del Madagascar; no Аглински Andian-Buloha a Madagaskar shrub.

AND

ANDILLITZKA, Aндиллицка. Смо-

при Angelica, Ангелика.

ANDIRA, SIVE ANGELYN. G. Pifon. Андира, есть въ Бразили растущее дерево, покрышое пепельнаго цвъща корою, и им вющее маленькіе сизо - зеленые и на-Лавровые похожіе лисшья, и множество душистыхЪ, по нёскольку вмёстё растущихЪ и изъ черновашыхъ почекъ вырастающихъ пурпурово-синеващых в цв в шов в. Плодв его весьма горекЪ, имѣепіЪ видЪ и величину куринаго яица, съ начала зеленаго, но потомъ чернъющаго цавта, и обведенъ съ одной стороны какЪ будто швомЪ, покрывается крынкою кожицею и заключаеть въ себъ желшое горьковашое зерно или миндаль, которой толкуть въ поронокъ и принимають от глистовь, но количество пріема должно бышь менте скрупеля или прешьей части золотника, по тому что еспьли оно принято будеть болье, то легко превращиться можеть вь ядь. Внутренное качество дерева бываеть было, токмо потомъ скоро краснъеть, а какъ станеть сухо, то потемяветь кора; дерево и плодъ такъ горекъ, какъ Сабуръ, и симъ то различествуеть оно оть другаго, во всемь ему подобнаго и шакже Андирою называемаго дерева, котторое никакого вкуса не им веть. Дикіе звъри вдять жадно плодъ его и от в того толствють. По Гречески 'Ауδίζα, δένδρον της Βρασηλίας; πο Η Επεικί 211= dira, Baum in Brasilien; по Француски Andira arbre du Brésil; по Италіански An-Часть, Л.

dira, albero della Brafilia; по Аглински Andira, an Brasilian - tree.

ANDRACHNE, Angpaxue.

Portulaca, Портулака.

ANDRACHNE AGRESTIS, Angraxue arpecmuch. Смотри Soldanella, Солданелла.

ANDRACACARA, Андракакара. Смошри Sempervivum maius, Семпервивумъ маюсъ.

ANDRAFASIS, Андрафазись. Смотри

Atriplex, АтриплексЪ.

ANDRAGINOS, Angparunoch. Cmompu Nymphaea, Нимфея.

ANDRAGNE, Angparne. CMompu Por-

tulaca, Портулака.

ANDRAGO, Angparo. Chompu Portu-Іаса, Портулака, и Воггадо, Борраго.

ANDRAHAXIS, Angparaxeneb. Cmo-

три Atriplex, АтриплексЪ.

ANDRAPHASIS, Андрафазись тожь. ANDRARANE, Angpapane. CMompu Sempervivum maius, Семпервивум в маюсь.

ANDRASINOS, Angpasunoch. Смотри

Nymphaea, Нимфея.

ANDROMEDA ARBOREA. Linn. Auдромеда арбореа. Безплодный болотный кусть, расшеть въ разныхъ странахъ Россіи, но ни во что не употребляется. ГосподинЪ Линней полагаешЪ всъ роды сей травы вb X. классb травь имѣющих b вb цвътъ своемъ десять тычковъ и одинъ пеетикъ (Decandria Monogynia) по Гречески 'Ανδρομέδα δενδρική; πο Η Επεικи die Staudigte Uns dromeda; по Француски Andromeda qui croit en arbrisseau; по Ишаліански Andromeda arboreggianda; по Аглински The bushy; Andromeda.

ANDROMEDA COERVLEA. Адромеда церулеа. Синецпътный Безплодный болотный кусть имвешь мылкіе плоскіе, и къ концу пришупленные листья. По Гречески Андромева уахава; по Нъмецки Undromeda mit blauen Biumen; по Француски Andromeda bleuë; по Ишаліански Andromeda cœrulea; по Аглински

The blue Andromeda,

ANDROMEDA CALYCVLATA Linn. Андромеда Каликулата. Чашечная Андромеда трава, имветь наискось другь противь друга сидяще копьецообразные и маленьке листья.

ANDROMEDA FOLIIS OVATIS VENOSIS. Gmel. Lib. Андромеда фолінсь опатись пенозись. Смотри Rhododendron Chryfanthum, Рододендронъ Хризантумъ.

ANDROMEDA HYPNOIDES. Linn. Андромеда Гипнопдесь Молиистая Андромеда, имъетъ на подобіе колокольчика расположенный цвъть, и въ нъсколько рядовь попарно по стеблю сидящіе, тупые, загибающіеся, и другь друга покрывающіе листья По Гречески А'юбромеба мястий; по Нъмецки Діє торідіє Апдготеда; по Француски Andromeda mouffuë; по Италіански Andromeda muscola; по Аглински The mossys Andromeda.

ANDROMEDA LAVRIFOLIA SEMPER VIRENS FLORIBVS DILVTE CARNEIS, PVRPVREIS MACVLIS NOTATIS, Андромеда лаприфоліа семперь пиренсь, флоривуєь дилуте карненсь, пурпуренсь макулись нотатись. Смотри Ledum floribus bullatis confertim in fummi caulibus nascentibus, Ледумь флорибуєь буллатись конфертимь инъсумми кавлибуєь насцентибуєь.

ANDROMEDA PANICVLATA Linn. Андромеда паникулата. Цпътоносная Андромеда съ продолговатыми и другъ противъ друга сидящими жолобоватыми листьями. По Гречески Андромеба анбофорбоа; по Нъмецки Die blühende Undromeda; по Француски Andromeda fleurissante; по Италіански Andromeda florenda; по Аглински The Flowring Andromeda.

ANDROMEDA RACEMOSA Linnei, Андромеда рацемоза Смотри Andromeda, Андромеда.

ANDROPOGON, Андропотонь. Смошри Schoenanthum, Схенаншумъ и Іссноетоп, Исхемонъ.

ANDROSACE ALTERA MATTH. Cluf. Hift. I. В. Андрозаце алтера. Androface villola Linn. Androlace vulgaris latifolia annua. Pit. Tournef Alfine affinis Andraface dicta maior I. B. VI. Лапа мужеская, Резуха скалная, Роса каменная и IIeрелойная трапа, расшешь на каменисшых в и песчаных в мъстах в и цвътеть въ Апрвав мвсяцв. Она имветь тонкій волокнистый корень, из в котораго вырастает в н всколько мохнашых в стебельков в около трехъ вершковъ вышиною, которые на вершинъ своей раздъляются на шесть или на седмь къ верьху споящихъ и видъ маленкой шляпки составляющих в въточек в; и окружающся длинными, широкими, многими жилами испещренными, зубчапыми, по земав вкругь разспилающимися и попутниковымъ (Plantago, плантаго) подобными листьями; цвъты на немъ маленкіе, бъ лые и составлены изъ одного къ верьху раз ширяющагося и на пяшь зубцовъ разръзаннаго листа: послъ цвъта показывается малень кій, круглый плодъ или капсула съ горошину величиною и содержащая въ себъ нъсколько продолгованых в, бавднокрасных в свинчекв. Она содержишь вр себр много соми и вр вино. градномъ винъ употребленная почитается полезною от водяной бользни, и задер жанія мочи, а приложенная от лому въ косшяхь и особливо оть подагры. Андрозаце есль Греческое, от в слов в схорь схоров, андрось, человыть и очинов, сакось щишь происходящее имя; а ГосподинЪ Лемери дово дить оное оть словь агорі, апос фервоа, значущих в отв водяной бользни и подагры полезная. Господинъ Линней полагаетъ ее въ V. классЪ растеній им вющих в в в своем в цвв. ть пяшь мущинокь, и одну женочку; (Pentandria Monogynia) а Господинъ Турнефортъ во II классь, во II отдъление въ I родъ правъ съ однолисшнымъ на подобіе воронки расположен. ным в пяти зубчатым в цв втом в. По Грече ски Агбросатов; по Нъмецки Маппев Багпівсь;

по Француски Androface; по Италіански Androface; по Аглински Summer Navel - wort.

ANDROSACE CARNEA. Linn. Angpoзаце карнеа. Резуха скальная съ гладкими и шилу подобными лисшьями. По Гречески Алброгатов преатобые; по Нъмецки Мапияparnisch mit glatten, und als Pfriemen gestellten Blättern; по Француски Androsace, à
feuilles unies et terminées en poinçon; по
Италіански Androsace con soglie glabre; по
Аглински Summer Navel wort with plain leavs.

ANDROSACE MAXIMA, Андрозаце максима. Смощри Androsace altera, Андро-

заце алтера.

ANDROSACE SEPTENTRIONALIS. Linn. Angrosaue cemmenmpionanuch. Ctomernan или въ Съверныхъ странахъ растущая Перелойная трана съ зубчатыми, и гладкими листьями. По Гречески Агброгатов архибол ; по Нъмецки Дет in Nordlichen Gegenden wachsende Madnes - Harnisch; по Француски Androsace septentrional; по Италіански Androsace septentrionale; по Аглински The northly Summer Nawel-wort.

ANDROSACE VILLOSA, Андрозаце пиллоза. Смотри Androsace altera, Андро-

заце алпера.

ANDROSACES, Angposauech. Cmompu

Culcuta, Kyckyma.

ANDROSACES CHAMAECONCHAE INNASCENS, Андрозацесь хамеконхе иннасценсь. Смотри Androface, Андрозаце.

ANDROSACES SESAMOIDES, Angrosauecb cecamongecb. Cmompu Sesamoides, Cecamongecb.

ANDROSAEMVM ALBVM, Angpoce.

мумь альумь. и

ANDROSAEMVM ALTERVM. Андроземумь алтерумь. Смощри Androsæmum maximum frutescens, Андроземумъ максимумъ фрутеспенсъ.

ANDROSAEMVM ALTERVM FOLIIS HYPERICI, Андроземумь алтерумь фолись гиперици. Смотри Нурегісит, Гиперикумь.

ANDROSAEMVM ASCYRVM DIC-TVM, Андроземумь Асцирумь диктумь. Смотри Нурегісит Авсугоп, Гиперикумъ Асциронъ.

ANDROSAEMVM MAIVS, Angpose-

мумь маюсь. Смотри

ANDROSAEMVM MAXIMVM FRV. TESCENS. C. B. Pit. Tournefort. Alymenum. Ang. Gesn. Siciliana. Ges. Hort. Herba Ciciliana. Tab. Clymenum Italorum Ger. 435. Emac. 543. Hyperienm Androsaemum. Linn. III. Кропаные Колокольчики или зперобой Сибирскій расшешь въ Сибири по островамь, на поляхь и на пашняхъ, а здъсь въ садахъ и цвътетъ въ Іюль и Августь мъсяцахь. Она имъеть длинный и деревънъющий корень; красновашые, круглые, полосочками испещренные жескіе, а особливо внизу древесоващые и по мъстамъ колънцами перехваченные стебли въ двенатцать и осмънатцать вершковъ вышиною, и продолгованые, подва изЪ каждаго колънца растущие, другь противъ друга сидящие и въ началъ весны сизо-зеленый, а осенью шемно-красный цвъшь имъющіе листья, которые видомъ подобны звъробойнымЪ (Hypericum, ГиперикумЪ) кромв того полько что вв трое или четверо больше. ИзЪ дали кажушся они бышь совсъмъ пропоченными на многія маленькія дирочки, но естьми разсмотришь въ близи, то оказываются вмёсто проточинь, свётлымЪ балсамическимЪ сокомЪ наполненные пузырики. Цвёты его родятся на вершинахЪ стеблей, имъють многолистную чашечку, составлены изъ пяти желтыхъ въ кружекъ расположенныхъ листочковъ, и гораздо больше, и красиве зввробойных в; послъ цвътовъ оказываются маленькія красныя, но созръвая черньющія ягодки наполненныя мізаенкими шемными сімячками: вст части сей травы имтють смолистый вкусъ и содержащъ въ себъ много масла, и посредственную часть соли и влажности. ВЪ

ВЪ Медицинъ употребляють цвъть, листья и свия, которыя разбивають, сущать, выгоняющь глисны, противется гнилости, гоняшь камень, полезны от рань и въ Антеках в употребляются в разных в деконшахъ, балсамахъ, и мазяхъ. Андроземумь есть Греческое опів словь 'Агір, А'гбеос, мужь, человыкь и агла, кровь происходящее какъ бы сказашь человъчья кровь, пошому чшо въ рукахъ расшершые лисшья, дълають ихь красными, или что древними такЪ называемая права содержала вЪ себъ кровокрасный сокЪ. ГосподинЪ Линней полагаеть ихь въ XVIII. классь растеній имінщих вы своем прына пяпь пычковы изЪ пройнаго и болбе вмвстилищъ выходящихъ. (Polyadelphia Pentandria) а Господинъ Турнефорть въ VI. классъ въ XVII. родъ травъ съ многолистнымъ цветюмъ, конораго пестикъ превращается въ ягоду. По Гречески Агброгация ; по Нъмецки Manne-Blut unn Groß, Beeren tragend Jos hannis-Rraut, Grundheil; по Француски Тоиte saine; по Ишаліански Androsino или Tota fana: по Аглински Tutfan or Park-Leaves.

ANDROSAEMVM MINVS, Aндроземумь минусь. Смотри Нурегісит, Гипе-

рикумЪ.

ANDROSAEMVM VULGARE, Angpoземумь пулгаре. Смотри Androsæmum maximum Frutescens, АндроземумЪ максимумЪ фрушесценсъ.

ANDRYALA, Angpiana. Cmompu Son-

chus, Conxycb.

ANEASCE, Aneacye. Cmompu Confolida major, Консолида мајоръ.

ANEBLATVM, AHEBRAMYMB. CMOTHPH Squamaria, Сквамаріа.

ANEKETHON, Ameremond. CMOMPIN

Anethum, АнетумЪ.

ANEMONE, Anemone. LXIII. Bampeвыщи, Одномвсячникь вылокь, или Анемоне есть прасивый, много различных в сортов в и разных цвв товь бывающій цвв ть, кото-

раго находянь совстмв бълые, желные, Віолетовые, голубые, пурпуровые или багряновидные, красные, свётплопурпуровые сЪ бълымъ гуменцомъ, широколиственные съ желиым в гуменцом в, шемные, швлесные, съ зеленымъ, бълые съ красными полосами и голубымъ гуменцомъ, разноцвѣшные одинакіе или простые, мохровые, и многіє другіе. Баугиній считаеть оныхь шесть. десянъ три, а другіе полтора ста сортовь. Я опишу здёсь только нёкоторые изъ Анемоне есть Греческое отъ главныхЪ. аченов, вытерь, происходящее имя, пошому что сей цвёть оть вётра раскрывается или родится на мъстахъ вътру подверженных в. Господинъ Линней полагаеть ихь встхв въ XIII. классъ растеній, им вющих в в в своем в цв в дватцашь и болбе мужчинок в и ибсколько женочекъ (Polyandria Polyginia) а Господинъ Турнефорть вь VI. классь вь VII. отделеніе вы І, роды правы сы миоголистнымы цвытомы, конюраго пестикъ превращается въ плодъ или головку изъ многихъ пушистыхъ сѣмянъ составленную. По Гречески Аугрийм बंग्रं नह बंग्ह्महः, по Нक्षलासम Unemone, Winde Roslein unu Unemonene Roslein; no Opanityски Апетопе; по Италіански Апетопе и Anemonia; по Аглински Wind-Flower Anemony, or Phea fants-etye.

ANEMONE ACONITI FOLIO, AHE-

моне аконити фоліо. и

ANEMONE ACVLEATA PLINII, AHEмоне акулеата Плиніи. Смотри Апетопе

ANEMONE AGRESTIS Trag. Anemone Поленая Вётреница или агрестись. красная ромашка. По Гречески 'Ауемого тебий; по Нъмецки Гей Ипстопе; по Франпуски Anemone des champs; по Италіански Anemone di campe; по Аглински Narrow Leav'd Anemone fingle Flower'd.

ANEMONE ALPINA. Linn. AHEMOHE

алпина. Горная петреница.

ANEMONE ALTERA, Анемоне алтера. Смотри Апетопе, Анемоне.

ANEMONE ANGVSTIFOLIA MVLTI-PLEX RVBRA, Анемоне ангустифоліа мултиплексь ругра. Узколистиенная

самокрасная Вътреница.

ANEMONE APENNINA Linn. Ane. моне Апеннина. Апеннинская пътреница, им веш в копьевидные, многочисленные цв втные, и глубоко връзанные стебельные листочки, и остроконечныя съмячки. По Гре 'Анемин орин; по Нъмецки Діе Иреппіпія Упетопе; по Француски Апеmone des Apennins; по Ишаліански Anemone dell'Apennino; по Аглински The Apennian Anemone.

ANEMONE BYLBOSA RADICE, Aneмоне булбоза радице. Вътреница съ ШишковашымЪ корнемЪ.

ANEMONE BYZANTINA, Anemone

Бизантина. и

ANEMONE CHALCEDONICA, Aneмоне Халцедоника. и

ANEMONE COCCINEA MVLTIPLEX;

Анемоне кокцинеа мултингексь. и

ANEMONE CONSTANTINOPOLI-TANA, Анемоне Константинополитана. Смотри Anemone maxima, Анемоне максима.

ANEMONE CORALLINA VIOLACEA ET ALBA, Анемоне караплина піолацев

еть альа. и

ANEMONE CORIANDRI FOLIO FLO. RE PVLSATILLÆ, CAPITVLIS HIRSV-TIS MINOR, Анемоне каріандри фоліо флоре пулсатилле, капитулись гирсутись минорь. Смонири Апетопе, Анемоне.

ANEMONE CORONARIA Linn. Asse. моне коронаріа. Смотри Anemone Horten-

fis , Анемоне гортенсисъ.

ANEMONE DACTYLITIS, AHEMORE Дактилипись. и

ANEMONE FLORE CANDIDO, Aneмоне флоре кандидо, и

ANEMONE FLORE MVLTIPLICATO COCCINEO, Анемоне флоре мултипликато кокцинео. и

ANEMONE FLORE POLYPHYLLO TENVIFOLIO, Анемоне флоре полифил. по тенуифоліо. Смотри Апетопе, Анемоне.

ANEMONE FOLIIS TERNATIS, FO. LIOLIS CVNEIFORMIBVS, APICE SER-RATIS, SCAPO SVBVNIFOLIO VNI FLORE, Kranz. Torts. d. Grönl. Hift. p. 286. Анемоне фоліись тернатись, фоліолись кунеиформинусь, апице серратись, скапо субунифоліо унифлоре. Смотри Dryas anemonoides, Дріась анемоноидесь.

ANEMONE FOLIO GERANII RVPER-TIANI CÆRVLEO, AN DIOSCORIDIS! Анемоне фоліо Гераній Руперціани це-

pyneo. H

ANEMONE GERANIFOLIA, Anemone

Геринифоліа. и

ANEMONE GERANII FOLIO, RADI-CE TVBEROSA, FLORE CÆRVLEO ET АГВО, Анемоне гераніи фоліо, радице тубероза, флоре церулео еть албо. Смотри Anemone hortensis, Анемоне гортенсисЪ.

ANEMONE HEPATICA Linnei. Aneмоне гепатика. Смонри Нератіса, Гепатика.

ANEMONE HORTENSIS. Linn. Aneмоне гортенсись. Anemone hortensis tenui folia. Trag. Садопая Вътреница, растетъ въ садахъ, и имъетъ какъ и прочіе волокнистый и на нъсколько звенышковъ раздёляющійся корень, производящій зубчатые, почти круглые, на подобіе пальцовъ връзанные, у иныхъ сорцювъ на листья травы Цикламень свиной хльбь а у других в на Малву или Просвирняк в, Саникуля или Журавлинаго ушина (Geranium, ГераніумЪ) похожіе, и у всёхЪ на черешкахЪ сидящіе листья, изъ средины коихъ возвышаются маленькіе, съ низу до половины безлистные, а от половины до верыху

мъстами по при кружкомъ расположенныхъ листочка имъющіе стебельки, коихъ верукрашаются прекраснымЪ, крушины глымЪ, широкимЪ, изЪ многихЪ на подобіе розона расположенных в лиспочков в составленнымъ, и иногда мохровымъ листовымъ пучкомъ украшеннымъ цвътомъ, бывающимъ по различности родовъ и разных в цввтовь; послв сего цввта родится на его мъстъ продолгованая шишечка, покрытая многими маленькими и пушистымъ вънчикомъ окруженными съмячками: Всъ Анемоны содержать въ себъ много соли и масла, чистять, разбивають, отворяють, сушать и полезны от рань, но внутренно ръдко употребляются, а по большой части только наружно вь мазяхь от глазныхъ опухолей: Есшьли корень брашь по утру на тощакъ въ ротъ, и жевать исподоволь, то разбиваеть густыя, и клейкія мокроты. По Гречески Аугишин интгити; по Нъменки Carten Unemone; по Француски Anemone ou Coquelourde des jardins; по Италіански Anemone del giardino; по Аглински Garden Wind-Flower or Anemony.

ANE

ANEMONE LATIFOLIA, AHEMOHE

патифоліа: и

ANEMONE LATIFOLIA FLORE MVL-TIPLICI, Анемоне патифоліа флоре мултипелици. и

ANEMONE LATIFOLIA FOLIIS TAN-TVM SERRATIS, Anemone namuponia

фолінсь тантумь серратись. и

ANEMONE LATIFOLIA MAXIMA VERSICOLOR, Анемоне патифоліа максима персиколорь. и

ANEMONE LATIFOLIA POLYPHYL-LO FLORE, Анемоне патифоліа поли-

филло флоре. Смонгри

ANEMONE LATIFOLIA PRIMA. Clus. Lob. Анемоне латифоліа прима. Широколистпенная или Португальская ивтреница. По Гречески 'Ανεμώνη πλατύφιλλη; по Нъмецки Breitblatterichte Unemone; по

Француски Anemone à feuilles larges; по Италіански Anemone con foglie larghe; по Аглински Broad Leav'd Anemony or Anemone.

ANEMONE LIMONIA, AHEMOHE TUмоніа. Смотри Pulsatilla, Пулсатилла.

ANEMONE LVTEA, AHEMOHE TYMEG.

Смотри Апетопе, Анемоне.

ANEMONE MAIOR ALBA, AHEMOHE магорь алба. Смотри Anemone maxima polyanthos Chalcedonica, Анемоне максима поліантось халцедоника.

ANEMONE MATTHIOLI, Anemone mammionu. Смотри Anemone sylvestris,

Анемоне силвестрисЪ.

ANEMONE MAXIMA POLYANTHOS CHALCEDONICA. Lob. Анемоне максима поліантось халцедоника. Цареградская Багряноцпътная Вътреница По Гречески Анемин Конзантиотобития; по Нъмецки Синfrantinopolitanische Unemone; по Француски Anemone orientale; по Италіански Anemone orientale, по Аглински Purple Wind-Flower or the first Flower are white and Purple.

ANEMONE MINOR, Anemone Muнорв. Смотри Chamomilla, Хамомилла.

ANEMONE MONTANA, AHEMOHE монтана. Смотри Anemone sylvestris. Анемоне силвестрисъ.

ANEMONE MONTANA LVTEA, AHE-

моне монтана лутеа. и

ANEMONE MONTANA QVÆDAM, Анемоне монтана кпедамь. Смотри Ranunculus, Ранункулусь.

ANEMONE MVLTIPLEX RVBRA, Анемоне мултиплексь рубра. Смотри

Апетопе, Анемоне.

ANEMONE NARBONENSIS MAIOR CORNICVLATA. Lob. AHEMOHE Happonenзись магорь корникулата. Смотри Рарач ver erraticum alterum, Папаверъ еррашикумЪ алшерумЪ.

ANEMONE NARCISSI FLORE Linn. Вътреница Анемоне наринсси флоре.

съ расположеннымъ на подобіе нарцисса цвътомъ имъетъ голыя, сплюснуто продолговапыя съмяна. По Гречески Алериим мариого авдов; по Ивмецки Unemone mit Narcissen= Blumen; по Француски Anemone à fleurs de Narcisse; по Ишаліански Anemone confiori del Narcifo; по Аглински An Anemony ressembling a Narcisse.

ANEMONE NEMOROSA LINN. AHEмоне немороза, Anemonoides offic. Лъсный Одномвсячникь, растеть въ льсахъ, и на гористых в мъстах в, цвътеть въ Апрыт мысяць и имыеть разрызные листья, большій б'блый или желпый двенашцати листочный цвъть, и остроконечныя съмяна. По Гречески Америм прибы ; по Нъмецки Wald Wind-Blume, Wald-Unemone; по Француски Anemone des bois; по Италіански Anemone di bosci; по Аглински Wood-Anemony.

ANEMONE NEMOROSA FLORE MA-IORE, Анемоне немороза флоре магоре. и

ANEMONE NEMORVM AHEMOHE HEморумь. Смотри Anemome nemorola, Анемоне немороза.

ANEMONE OENANTHES FOLIIS, FLO-RE VIOLACEO HEXAPHYLLO, AHEMOHE энантесь фолінсь, флоре піолацео гексафилло. Смотри Апетопе, Анемоне.

ANEMONE PALMATA Linn. AHEмоне Палмата. Смотри Апетопе, Анемоне.

ANEMONE PANNONICA. Dod. Ane. моне Панноника. Смотри Anemone Sylveftris, Анемоне силвестрись.

ANEMONE PAPAVERACEA, Aneмоне Папаперацеа. Смотри Апетопе, Анемоне.

ANEMONE PAPAVERACEA QVINTA, Анемоне папаперацеа кпинта. Смотри Ranunculus candidus Trag. РанункулусЪ кандидусь.

ANEMONE PATENS. Linn. Anemone патенсь. Одномъсячникь, расшеть въ Множеств в около раки Самары и въ Сибири,

почии на всъхъ поляхъ отъ Челябинска. до Иртиша. Сія трава обыкновенно цевтемъ въ сихъ странахъ весною, и имъетъ разный цвѣть, а имянно голубый, лазоревый, синій, совсѣмъ бълый, но ръдко свѣтложелный. Изъ синихъ цвътовъ вареныхъ съ Серпукою (Serpyllum, Серпиллумъ) и квасцами, выходить превосходная зеленая красча для употребленія вЪ живописи. помянущых в м встах в срывають ее молодые мужики свъжую и истолча прикладывають на разныя мъста шъла, дабы нашянула пузыри, превращающиеся потом в в нарывы, а сіе дълають они для того, чтобь не бышь выбраннымЪ при осмотръ въ рекрупы. Сіи нарывы могуть однакожь скоро быть зальчены приложеніем в на них воску. В в Сибири варять из в сей правы воду и дають двтямь оть родимчика. Одном всячником в прозвана она потому, что цвъть ея бываеть видънь только вь Апръ лъ мъсяцъ. Мужики нанизавъ цвъщы на очищенную розгу обыкновенно впыкають выизбахЪ для украшенія. Смотри І. ТомЪ путешествія. Господина Профессора Палласа. По-Гречески 'Ауемыму вос муюс; по Нъмецки Die offene Sibirische oder monathe Anemone: по Француски Anemone d'un moi de Siberie; по Италіански Anemone d'un mese; по Аглински The Monthly Anemony.

ANEMONE PRATENSIS, Anemone пратенсись. Смотри Anemone agrestis, Анемоне агресписЪ.

ANEMONE PVLSATILLA. Linn. Aneмоне пулсатилла. Смотри Pulfatilla, Пулсашилла.

ANEMONE QUARTA Matth. Aneмоне кпарта. Смотри Апетопе, Анемоне.

ANEMONE QVINQVEFOLIA. Linn. Анемоне кпинкпефоліа. Пятилистпен. ная петреница, имветь по пяти вмвств охоло стебля сидящіе, продолговатые, и пил'в подобные листья и по одному шолько цвъшку производящій стебель. По Гречески 'Альмый пытафилля; по Нъмецки Die

Die Kunfolatterige Unemone; по Француски Anemone à cinq feuilles; по Италіански Anemone con cinque foglie; по Аглински The five leav'd Anemony.

ANE

ANEMONE QVINTA. Dod. Anemone

жинта. и

ANEMONE RAMOSA LVTEA, AHE-

моне рамоза лутеа. и

ANEMONE RAMOSA PVRPVREA. Тав. Анемоне рамоза пурпуреа. Смотри Anemone петогоfa, Анемоне немороза.

ANEMONE RANVNCVLOIDES. Linn. Анемоне ранункулоидесь. Смотри Ranunculoides, Ранункулоидесь.

ANEMONE RAPACEA. Anemone pa-

пацеа. Смотри Апетопе, Анемоне.

ANEMONE RVPERTIANA. Tab. Aнемоне руперціана. Смотри Anemone fecunda Dodon. Анемоне секунда Додон.

ANEMONE SECVNDA DODON, Ane. моне секунда Додон. Смотри Апетопе

hortenfis, Anemone roomencuch.

ANEMONE SECVNDA MATTH. AHEмоне секунда Матт. Вътреница, которой лисшья подобны лисшьямъ желшаго водчья корня (Aconitum, Аконишумъ). По Тречески Άνεμώνη φύχχοις απονιτοις; по Нѣмецки Anemone mit Wolfswurkel, oder Gifenhuth Biattern; по Француски Anemone à feuilles d Agonit; по Италіански Anemone con toglie d' Aconito, no Аглински Anemony with leaves ressembling wolfsbane.

ANEMONE SEXTA, Anemone cercma.

Смотри Ranunculus. РанункулусЪ.

ANEMONE SYLVESTRIS. Linn. Atteмоне силпестрись. Anemone magna alba, plurima parte anni florens. I. B. iii. 411. Анкая вольшая велоцпетная петреница, имветь продолговатыя мохнатымь пунжомъ обведенныя съмяна. По Гречески Амеμώνη μεγίστη αγρυόχενκος; πο Η Επεμκи Θυοβε weiße wilde Unemone; по Француски Anemone, ou Passe sleur sauvage; no Umanian. ски Anemony selvatica: по Аглински Wild Anemone or Wind-Flower.

ANEMONE SYLVESTRIS ALBA MA-IOR. С. В. Анемоне силпестрись альа мајорь. Смотри Anemone syluestris. Анемоне силвестрисъ.

ANEMONE SYLVESTRIS VULGARIS LVTEA, Анемоне силпестрись пулгаpucb nymea. Смотри Ranunculus, ранунку-

лусЪ.

ANEMONE TENVIFOLIA, Anemone тенуифоліа. Малая Вітреница съ Кишнецовыми лиспъями. По Гречески Аледифия φυλλοις ποριανδρε; πο Ηπωεικи Rlein gehörnte Unemone; по Француски Petite Anemone à feuilles de Coriandre; по Италіански Anemone piccola con foglie del coriandolo; no Аглински Anemony with leaves ressembling Coriander.

ANEMONE TENVIFOLIA ALTERA, Анемоне тенуифоліа алтера. и

ANEMONE TENVIFOLIA FLORE MVL TIPLICI, Анемоне тенуифоліа флоре мулmutianilu M

ANEMONE TENVIFOLIA FLORERV-BENTE DVPLICI, Anemone menyngonia флоре рубенте дуплици. Смотри Анемоне tenuifolia, Анемоне тенуифоліа.

ANEMONE THALICTROIDES. Linn. Анемоне Таликтроидесь. Смотри Thalic-

trum, ТаликшрумЪ.

ANEMONE TRIEOLIA LINN. AHEмоне трифоліа. Смотри Апетопе, Анемоне.

ANEMONE TVBEROSA BVLBOCAS-TANI RADICE, Анемоне тубероза бул. вокастани радице. и

ANEMONE TVBEROSA GERANII FO-LIO. Lob. Анемоне тубероза гераніи фо-720. W

ANEMONE TVBEROSA RADICE, Анемоне тубероза радице. Смотри Апеmone secunda Dodon. Анемоне секунда Додон.

ANEMONE VERNALIS. Linn. Aneмоне пернались. Смотри Апетопе, Анемоне.

ANE:

ANEMONE VIRGINIANA Linn. Anemone Bupruniana. Buprunckas Buppenuya. По Гречески Аменския год Вірунка; по Нъмецки Dirginische Inemone; по Француски
Anemone de la Virginia; по Италіански
Anemone della Virginia; по Аглински The
Virginian Anemony.

ANEMONOIDES FLORE ALBO BO-ERH. In A. 36. VI. Anemonougech prope

а гво. и

ANEMONOIDES FLORE MAIORE. Dill. Cat. Giff. Anemonougech prope maiope. Cmompu Anemone nemorofa, Анемоне немороза.

ANEMONOSPERMOS AFRICANA, FOLIO PLANTAGINIS, FLORE SVLPHV-REO. Comm. rar. 35. t. 35. Anemonocnepmoch Appukana ponio nnanmarunuch, prope cyndypeo. Cmompu Arctotis, Aprimomuch.

ANEMOSPHORON, Anemochopoub.

Смотри Napus, Напусъ.

ANEPSA, Анепса. Смотри Helleborus albus, Геллеборусь албусь.

ANESA, Anesa. W

ANESVM, Anesymb. Смотри Anethum, Анетумъ.

ANERANTIVM, Анеранціумь. Смо-

три Aurantium, Авраниіумь.

ANETHUM CANINUM, АнетумЪ КанинумЪ. Смотри Cotula foetida, Котула фетида.

ANETHVM CIMICARVM, Анетумь инмикарумь Смотри Coriandrum, Коріан-АРУМЪ.

Часть 1.

ANETHVM COELESTE, Анетумъ целесте. Смотри Peucedanum, Певцеданумъ.

ANETHVM FOENICVLVM. Linn. А-нетумь феникулумь. Смотри Foeniculum,

феникулумЪ.

ANETHVM GRAVEOLENS Linn. Aнетумь грапеоленсь. Anethum Dod. I. B. Pit. Tournef. Anethum hortenfe. C. B. III. Укропь или Коперь, есть довольно извъстная, въ садахъ, на пъниспыхъ мъспахъ свемая и въ кушаніяхъ часто употребляемая права, въ полпора аршина вышиною, которая цвътеть въ Іюль мъсяць и имъеть жескій, волокнами окруженный корень, круглые спіебли, темнозеленые, маленькіе, душистые и на многія перышки разръзанные лисшья; и желшые, по нъскольку вмв. ств на вершинахъ ввтвей кружкомъ растущіе, черенястые и каждый из пяти на подобіе звъздки расположенных в листочков в составленные цввты: послв коихв оказываются маленькія, плоскія капсулы составленныя из в двух в продолгованых в, тоненкихъ, но широкихъ, плоскихъ и на глубокія полосочки раздъленных в зеренв или съмянь прянаго, на Феникольный похожаго, но не столь пріятнаго вкуса, и желповащаго цввта. Укропь, а особливо съмя содержить въ себъ много масла и соли, разбиваеть вътры, возбуждаеть сонь, унимаеть икоту, помогаеть варенію въ желудкъ, умножаеть въ кормилицахъ молоко, умягчаетъ, гръеть, гоннть мочу, приводить нарывы въ созрвлость, и полезно от вапору въ маткъ и ошь воспаленія почекь; а наружно употребляють траву вы клистирахы и припаркахЪ. Многіе ушверждаюнгЪ, будшо бы частое употребление варенаго укропа вредишь зрвнію и прогоняеть охоту кь любострастію. Укропные съмянные пучки употребляють при соленіи огурцовь, а съмяна и праву въ разныхъ кушаніяхъ, а особливо послъднюю съ сметаною въ рыбныхъ и другихъ соусахъ. Въ Апшекахъ имвеш-M CA

си права, вареное съ нею масло, перегонная съ нею вода, съмя, и перегонное масло. Анетумь если Греческое отв словь παρά το άναβέειν, Бвгать, происходящее имя, потому что укропъ выходить очень скоро из в земли. Господинъ Линней полагаешъ его въ V. классъ расшеній, укоих в в цввшв, пять мужчинок в и двв женочки (Pentandria Di. gynia) а господинЪ Турнефортъвъ VII. классъ, въ IV. отдъление въ III. родъ травъ съ многолистнымъ пучкомъ растущимъ цвътомъ. По Гречески агуху Уог или "Агувог; по Арабски Zebet и Sebet; по Нъмецки Dille, Gar= tens Dille, Hoch Rraut; по Француски Anet; по Италіански Aneto; по Аглински Dill or Garden - dill, of which in this Chapter.

ANETHVM HORTENSE. C. B. Ane. тумь гортенсе. Смотри Anethum graueolens. Анешумъ гравеоленсъ.

ANETHVM SYLVESTRE, Anemy mb силпестре. Смотри Мент, МеумЪ.

ANETHVM TORTVOSVM, AHEMYMB Тортуозумь. и

ANETHVM VRSINVM, Anemymb

Урсинумь. Смотри Meum, Меумъ.

ANGELICA AQVATICA, AHTERNKA акпатика. Смотри Angelica syluestris, Антелика силвестрисЪ.

ANGELICA ARCHANGELICA Linn. Ангелика. Angelica sativa C. B. Angelica Offic. Chab. 400. P. Parad. 529. Imperatotia latiua. Tourn. Inft. 317. Elem. Bot. 267. XII. Дягель, Дягильникь, Коропникь, Корополиникь, Корень называется Яполо; а шолсшая дудка Коропка. Сія шрава бываemb двухb годовb, дикая (lyluestris, силвестрись и садовая hortenfis, гортенсись) или fatiua camива; изЪ коихЪ первая раздъляется опянь на два сорша на большую (maior, мајоръ и маленкую minor, миноръ.) Она расшетъ въ льсахъ и кустарникахъ, на жирной земль. возлъ источниковъ и на сырыхъ мъстахъ. Оба рода цвышушь вы Іюль мысяць, и походять на снитную траву, кромъ того молько, чию цвещомь шемнее; они име-

юшь, какъ крень, кръпкій, длинными волокнами окруженный, снаружи черновашый, внутри бълый и на многія боковыя отрасли раздъляющійся корень, производящій толсплую красно - зеленую, особливо внизу, внупіри пустую, пахучую, въ аршинъ вырастающую и на многіе узлы или колънца раздёляющуюся дудку или стебель, выпускающій по бокам в многія в в тви, окружающіяся большими, зубчатыми, на длинных в черешках в сидящими, далеко распроспраняющимися шемно зелеными лисшьями, которые у дикой копьевидные и на подобіе пилы зазубренные. Цвины былые, вырастають на вершинах вып. вей коронками или пучками на подобіе подсолнешника (Parefol), составлены каждой изЪ пяши листочковъ при самой наружности чашечки и оставляють посль спаденія, плоскія, по два вмість соединенныя продоль говашыя, на поверьхносши дорожками испещренныя и видъ сочевицы имъющія съмячки, поспъвающія въ Августъ мъсяць. Всятрава имветь аромапическій вкусь и запахЪ; содержишЪ вЪ себъ много масла и летучей соли, грветь, сущить, отворяеть, разжижаеть, укръпляеть сердце, гонить мъсячное, потъ и мочу, жидитъ, возстанованеть аппенить или охоту къ пищъ. прошивинися хм ваю, прошивод виствует в яду, выгоняеть плодь, лечить внутренные нарывы и употребляется съ пользою отъ язвы, ядовишых в бол взней, заразишельных в ликорадок в, от вынги и укушентя бъщеной собаки. Простый народъ употребляеть автомь толстую дудку вы пищу- корень выкапывается и собирается въ начажь Весны: полезень вводышкв, мокромь кашлв, коликъ и ръзъ отъ вътровъ, лихорадкахъ перемъжающихся; а Эссенція въ зубной бользни на хлопчатой бумагв приложенная. Ангелика принадлежишЪ кЪ двулѣшнимЪ растеніямь и получаеть свое имя полезности и превосходности своей вЪ Медицинъ, яко бы Ангельская права. ВЪ Апшеках в имбешся корень, сущеный и вареныи

ный въ сахаръ; перетонная изъ него вода; эссенція и экстракть или изв корня выжатый и густо свареный сокв. Господинь Линней полагаеть ее вь V. классь растеній, имвющихъ въ сроемъ цевше пяше мужчинокъи одну женочку (Pentandria Monogynia) А ГосподинЪ Турнефортъ въ VI. классъ, во II. от деленіе, въ IV. родъ шравъ съ многолистнымЪ, и кЪ верьху коронкою рисположенным в цв в помв. По Гречески Ауувата; по Ивмецки Engel = Wurg; Beilig. Geift-Wurg, Luft = Wurg; Garten oder Wilde Angelica; no Француски Angelique des jardins & fauvage; по Ишаліански Angelica domestica e seluatica; по Агмински Angelica or the Garden an the Wild Angelica, Goutwort.

ANGELICA ATROPVRPVREA, AHTEлика Атропурпуреа. Смотри Angelica Archangelica, Ангелика Архангелика.

ANGELICA BACCIFERA, Антелика

вакцифера. Смотри Aralia, Араліа.

ANGELICA CANADENSIS, TENVI-FOLIA, ASPHODELI RADICE. TOVRNEF. Канадскій узколистиенный никь съ подобнымъ золошарнику корнемъ. По Гречески Аγγελική τη Καναδά λετστοϊς φυdois; no Homenun Canadische Schmalbiat terigte Angelica mit Apphodell-Wurkel; no Француски Angelique de Canada dont la racine ressemble a celle de l'Asphodele; no Ишаліански Angelica della Canada, radice della quale s'assimiglia alla radice dell'Assodillo; по Аглински The Canadian Angelica.

ANGELICA ERRATICA, Антелика эрра. тика. Смотри Herba Gerhardi, Герба Герарди. ANGELICA ITALICA, Антелика И.

талика. и

ANGELICA LVCIDA. Linn. AHTERIKA муцида. Смотри Angelica Archangelica, Ангелика Архангелика.

ANGELICA MAGNA FOEMINA, Антелика матна фемина. Смотри Laserpitium verum, ЛазерпиціумЪ верумЪ.

ANGELICA MAIOR, AHTERUKA MAiopb. Смотри Angelica, Ангелика.

ANGELICA MINOR AQVATICA, Ангелика минорь акпатика. и

ANGELICA MINOR MONTANA, AHтелика минорь монтана. и

ANGELICA MINOR SYLVESTRIS, Ангелика минорь силиестрись. Смотри Angelica Archangelica, Ангелика Архангелика.

ANGELICA MONTANA, PERENNIS, AQVILEGIÆ FOLIO Tournef. AHTERNKA монтана, переннись, Акпилетіе фоліо. Смотри Libanotis latifolia, Aquilegiae folio, ЛибанописЪ лапифоліа, Аквилегіе фоліо.

ANGELICA MONTANA, PERENNIS, PALVDAPIS FOLIO. Tournefort. Anreлика монтана, переынись, палудапись фолю. Смотри Ligusticum vulgare, foliis Аріі, ЛигустикумЪ вулгаре, фоліисЪ Апіи.

ANGELICA ODORATA, AHTENIKA ogopama. Cmompu Angelica Archangelica,

Ангелика Архангелика.

ANGELICA PRATENSIS APII FO. LIO. Tournefort. Ангелика пратенсись Апін фоліо. Смотри Seleli pratenle, Silaus forte Plinio. С. В. Сезели прашенсе, Силаусь сорше Плиній.

ANGELICA PRIMA. Boerh. Hift. Plant. 84. Ангелика прима. Смотри Angelica Archangelica, Антелика Архангелика.

ANGELICA PRIMA SATIVA, AHreлика прима сатина. Смотри Rumex aqua. ticus, Руменсь акваникусь.

ANGELICA PODAGRARIA DICTA. Mor. Vmbiq. Ангелика подаграріа дикта Смотри Podagraria, Подаграріа.

ANGELICA SCANDIACA, Ангелика

Скандіака. и

ANGELICA SYLVESTRIS. Linn. An. телика силпестрись. Смоніри Angelica Archangelica, Ангелика Архангелика.

ANGELICA SYLVESTRIS MINOR, SEV ERRATICA. C. B. Pin. 155. Raii Hift. I. 435. Synop. III. 208. Boerh. Ind. A-53. Tourn, Inft. 313. Element. Bot. 262. Anтелика силпестрись минорь, сепь ерра. тика M 2

тика. Смотри Herba Gerardi, Герба Герарди. ANGELICA SEV ARCHANGELICA TABERNÆMONTANI, SEV SCANDIACA, Herm. Prælect. Ангелика cenb Архангелика Табернемонтани, сепь Скандіака. Смотри Archangelica. Apxantexuka.

ANG

ANGELICA VERA, Антелика пера. и ANGELICA VULGARIS, AHTERIKA nyarapueb. Cmompu Angelica Archangelica, Ангелика Архангелика.

ANGELVT, Aurenymb. CMompu Sarco-

colla, Саркоколла.

ANGELYN, AHTERUHB. CMONIPER Andira, Андира.

ANGENIPA, Anrenuna. Смотри Ge-

піра, Генипа.

ANGHIVE, AHTUNE, ecms Magaraекарскій кустарникь, приносящій краснаго. пвъта плодъ, съ крыжовникъ величиною, и пріятнаго вкуса. В вод вареный его. корень унимаешЪ каменную боль и рѣзЪ вЪ пузырномъ проходъ. По Гречески Агува, мирон δενδρόν του μαδαγασκάρ; πο Η Εмеции Unghine, eine Ctaude in Madagascar; по Француски Anghiue, petit arbrisseau du Madagascar; no Umaniански Anghiue, piccioll'albero del Madagascar; по Аглински Anghiue an Madagascar shrub.

ANGINA LINI, Антина лини. Смо.

три Сисина, Кускута.

ANGIRMONIA, AHrupmonia. CMompus

Sarcocolla, Саркоколла.

ANGSANA OFFIC. Ангзана оффиц: и ANGSAVA, Ephem. Germ. Anno XIII. five Decur. 11. Anno XIII. p. 107. AHTBARA, Смотри Draco arbor Indica siliquosa, Populi folio, Драко арборЪ Индика силиквоза, попули фолто.

ANGVINA LINN AHTHUHO MUH.

Смотри Trichosanthes, Трихозантесь.

ANGVINA, Anthuna. CMompn Cuситет, кукумерь..

ANGVINA AQVATICA. Lob. AHTIM-

па акпатика. И

ANGVINA DRACONTIA, AHTHINHO

Араконціа. Смотри Dracunculus aquaticus, Дракункулусь акватикусь,

ANGVLVS, AHLYAYCE W

ANGVRIA, Anrypia. CMompu Citrullus, Ilumpyaaych.

ANHANDEL, Ангандель. Смотри Соlocynthis, Колоциншись.

ANHVIBA, AHTYUEA. H.

ANHVYPITANGA. Pis. 146. Anryuпитанга. Смотри Laurus foliis integris trilobisque. Lin. Лаврусь фоліись интегрись трилобискве.

ANICETHVM, Аницетумь. Смотри,

Anethum, Aнеmymb.

ANICETVM, Anunemymb. Смотри

Апівіт, АнисумЪ.

ANIL. Garz. Acost. Annab. Agnil. Fragos. Colutea Indica Herbacea, ex qua Indigo. Herm. Catalog. Nil. Cam. Gali five Nil, Herba Rorismarini facie. Linsc. 4. part. Ind. Orient. Herba Anil, five Enger. 4. part. Ind. Orient. III. Аниль есть Американское пь Бразиліи около деенапіцати вершковъ вышиною растущее и на Росмаринъ похожее расшеніе, которое им вешь маленькіе, круглые, ДоннымЪ (Melilotus, МелилошусЪ) подобные и нарочино толстые листыя и красноващые, гороховым в подобные цвв шы, посль коих вырастають длинные, назаль загнутые и на двухъ своихъ концахь продолгованыя сёмяна вы себь заключающія стручья, оливковаго цв вта. Вся права имбеть горькій и острый вкусь. ИзЪ листъевъ и стебля ея приготовляютъ крупикъ (Lidigo, Индиго) или густый сокъ шемно-дазореваго цвъта, который къ намъ привозится сущеный въ пластинкахъ, а инстда на подобіє сухаго теста из В Америки и восточной Иидіи. Крутика бывають многіе соршы, но за лучшій почищается такъ называемый Серквескій по деревнъ, гдв его двлають. Онь плосокь, нарочито толств, чиств, скоро возгарается, плаваеть по водь, и имветь лазоревый цвБшь.

цевшь. Обыкновенно стирающь и мвшаюшь. его съ другими красками, какъ на примъръ сь шифервейсомь, чтобь завлать его свътате, и красить имъ въ Лазоревую, а сь шиштилемъ въ зеленую краску и съ. многими другими упошребляется же онЪ живописцами, красильщиками, и прачками ем тсто крухмала для синенія шелковых в чулокъ и шонкаго бълья. Муншингъ въ Голландском в своем в правник в приписует в сей правъ способность унимать головную боль и Антоновъ огонь, когда будетъ истолчена и приложена ко лбу или въ послъднемъ случавкъ спраждущим в членамъ, также и изцвлять раны и чистить застарьдыя чирья присыпая ихъ ее порошкомъ. Въ виноградномъ винъ вареный изъ нес сокъ, дълаеть волосы черными. Господинъ Линией полагаеть ее въ XVII. классъ растения имъющих въ своемъ цвъщъ пяшь мужчинокъ изъ деойнаго основанія, яко изъ двойной матки выходящих b (Diadelphia Pentandria) a Господинъ Турнефорть въ XI. классъ расшеній съ многолисшнымъ цвёшомъ. По Гречески Анд, φυτόν της βρασυλιάς, εκιων φύλ. λων αν τέ ποιείται το ποίπον πο Η Επιεμκα 2 mil oder die Indigo-Pflange; по Француски Anil. plante du Bréfil, dont on tire l'Inde et l'In. digo; по Ишаліански Anil, pianta della Brafilia, по Аглински The Brafilian Anil plant ;; по Арабски Enger; по Индейски; Coachira.

ANIME GVMMI, Annme Tymmu. Смотри Gummi Anime, Гумми Аниме. ANISETVM, Anusemy Mb. CMOMPH

ANISVM, Annaymb. 1. B. vulgare. Clus. Pimpinella Anisum Lin. Apium Anisum dictum, semine suave olente. Pitt. Tournes. Анись есть однольшняя, въ садахъ въ Марть мъсяцъ, особливо въ Украйнъ, въ жирную землю свемая и въ Іюль цвышущая права, которая имфеть круглый, внутри пустый, мохнатый, и на многія цвъточки раздъляющийся стебель оть шести: до двенапиании вершков вышиною, конорый: окружаенся ббловашыми, душисшыми, глу-

боко гръзанными и видомъ на Петрушечные похожими лиспъями, полько что болве и кругаве оныхв; на вершинв стебля и ввточекъ вырастають вь Іюль мвсяць маленкіе, бабдно-зеленые и бълые, многолисточные, на Бедренцовые (Pimpinella Пимиинелла) похожіе, и широкими пучками или коронками растущие цвъты сладкаго и меду нъсколько подобнаго запаха. Съмя оказывающееся посав цввта маленькое, продолгова-тое испещренное дорожками или полосочками , темнаго цвета съ зеленою смесью , пріншнаго запаха и прянаго или из в сладкаго. кислаго и горькаго смѣщаннаго вкуса. Луч-шее должно бышь шолешо, чисшо, и корошо высушено; корешки у нее шоненкіе.. Анисовое сфия содержишь въ себъ не малую часть масла и нёсколько соли, разжижаеть, гонить мочу и поть, раздъляеть, выпры, унимаеть рызь вь животь, пользуеть оть кашлю, возбуждаеть сонь, умножаеть вы кормилицахы молоко, укръ-пляеть глаза, прегоняеть худый запахь. изъ гта, полезно въ чахоткъ и болъзни въ легкомъ. Изъ него гоняшь также водку ... которая грветь и укрвпляеть желудокь, для сего кладушь и запекаюшь вы хавбы. Впрочемъ употребляють его также въ кушаніяхь. Вь Апшекахь имбешся свия перегонная вода и масло, коппорымъ мажуть двтямь животь для разбиванія вътровъ, и которое прогоняетъ площицъ, умерщиляеть голубей, ежели нъсколько капель вь рошь имь положить, и намазать голову в конфекть, водка и сахаромъ обведенное: съмял Анисъ есть Греческое отъ словал ачось, не прапильные, происходящее имя, пошому , что Анись имветь неправильные или разноподобные листья. Господинъ Линней полагаеть его вы V. классь растеній,, им вющих в в в своем в цввшв пяшь мужчинокъ и двъ женочки (Pentandria Digynia) ал ГосподинЪ Турнефорть въ VII. классъ въ I. от в деление вы II родь шравь съ многолисшным в:

въ кружекъ расположеннымъ цвътомъ, котораго чащечка превращается въ два маленькія дорожчатыя съмячка. По Гречески Алісом или Алісом, по Нъмецки Апів или Епів; по Француски Апів или le petit Anіs; по Италіански Апісе, и Anіlo; по Аглински Anile, the Common, of which, wefhall Treat in this Chapter.

ANISVM CANADENSE, Annaymb

канаденсе. и

ANISVM CHINÆ, Анизумь Хине. Смотри Anisum stellatum, Анизумъ стеллатумъ.

ANISVM HERBARIIS SEMINE MA-IORI VEL MINORI C. B. Pin. 159. Annsymb rentapineb cemune maiopu nenb munopu. Cmompu Anisum, Anusymb.

ANISVM PHILIPPINARVM INSVLA. RVM, Anusymb Qunuππинарумь инсу-

парумь. и

ANISVM STBERIÆ, Анизумь Сиберіе.

дашумв.

ANISVM STELLATVM Linn. Annсумь стеллатумь. Peregrinum. С. В. Аnisum Sinense. Cod Med. X. Zingi fructus stellatus sive Anisum Indicum. C. B. 1. 586. Fæniculum Sinense Rhedi Exper. Nat. 172. Evonymo affinis, Philippinarum Insularum, Anisum spirans, nuculas la capsulis stelliformiter congettis proferens. Pluk. Alm. II. Бадьянь или зпездочный Анись есть зерно или съмя привозимое къ намъ изъ Кишая и великой Ташаріи, и бывающее немного больше нежели проспый, но запахомъ его кръпче, и вкусомъ слаще. Оно им веть темноватый, лосиящийся цввть и продолговащый видь и содержищся въ щолстомъ и кръпкомъ гнъздъ или капсулъ составляющей видъ семиугольной звъздки, оть которой и называется звыздочнымь, и заключающей во всяком в уголкв по одно. му зерну. Звъздочный Анисъ кладушъ въ вареный медь, которому придаеть онь

ошмвнно пріяшный вкусь, а многіє упофто піфон или све би от в фтонковорт грудных вользней. Восточные народы и живущіе въ Азін Голландцы мъщаюшь ето съ Сорбенюмъ попримъру Кишанцовъ, для приданія ему лучшаго вкуса; впрочемъ онъ разбиваеть въпры, украпляеть сердце и желудокъ, дълаетъ хороній запахъ изъ рша, полезенъ ошъ удущія. Кишайцы Бдяшь его ошь каменной бользни. Приносящее сіе съмя дерево имбеть запахЪ Анисовой, и по сей причинъ называють оное Анисовымь. Во Аптекахь держашь свия и двлающь Эссенцію. По Гречески Альбол авролюм; по Нъмецки Есепя Unis, Badian; 40 Opanyeku Anis étoilé, Anis de la Chine et de Siberie, ou la Badiane; no Ишаліански Aniso stellato; no Aглински The starrys Anile, Headet of Clusius growing in China, andother parts of the East - Indies.

ANISVM VETERIBVS I. B. Part. 2.

92. Анизумь петерибусь.

ANISVM VVLGARE, Cluf. Hist. ccii. Anu. 39 mb пулгаре. Смонри Anisum, Ани-сумъ.

ANIADEN, Аніадень. Смотри Автагкос, Асмартокъ.

ANLICECATI, Анлицекати. Смотри Anisum, Анисумъ.

АNВЕВ, Анбесть. Смотри Ініпьж, Ююбе. ANNONA ASIATICA. LINN. VII. Аннона Азіатика Линн. Сметайное ястоко или Азіатская Аннона, есть Азіатское растеніе, имівощее коньевидные тладкіе, сі верьху темно а сі исподи світло зеленые и многими жилками испещренные листья, больтіе, білые, рнизу изітести разновидных листові составленные, а ві средині кружекі изіт малепьких и на нижніе похожих листочкові, и желтое гуменцо имівощіе и изіт трехіт на липочной чащечки выходящіе цвіты, и продоловатье, огурцу видоміт подобные, желто-

зеленые, съ верьку до низу разръзъ имъющіе и по два на шолстомъ безлистномъ стеблъ внизъ къ земль висящіе плоды, заключающіе въ срединъ своей оть осьми до десяти кругловатыхъ, толстою кожуркою обведенныхъ и прътомъ черноватокрасныхъ бобковъ. Господинъ Линней полагаеть оное въ XIII. классъ растеній имъющихъ въ своемъ прътномъ вмъстилищъ дващивть и болье жимисть нам мужимисть

дващиать и болбе тычков или мужчинок и и всколько пестиков или женочек в. (Роуапатіа Polyginia) по Гречески Амоха тує абота
ас фотом; по Ивмецки Япопа обси Ябація вет варобів вашт; по Француски Аппопа, Plante d'Ase; по Италіански Аппопа Ріапта вев Аба; по Аглински Аппопа, Абатіск

Plant.

АNNONA AFRICANA LINN. Аннона Африкана. Африканская Аннона, имъетъ копьевидные и пушистымъ мохомъ покрытые листья. По Гречески 'Аучоча туѕ А'фрийз'; по Нъмецки Die Utricanische Unnona; по Француски Annona de l'Afrique; по Италіански Аппопа dell' Africa; по Аглински Аппопа об Авгіса

ANNONA AMERICANA Аннона Американа. Смотри Annona foliis ovatis acutis,

Аннона фоліись овашись акушись.

ANNONA GLABRA Linn. Аннона тлавра. Аннона съ копьевиднымъ полукругловатымъ листомъ и гладкимъ, съ низу широкимъ, а съ веръху остроожанчивающимся или конусовиднымъ плодомъ. По Гречески 'Аччо́ча филамод'; по Нъмецки Unnona mit lanzenförmigen nnd långlichtrunden Blåttern; по Француски Аппопа a feuilles ovales & terminées en Pointe; по по Ишаліански Annona

ANNONA FRVCTV LVTESCENTE; Аннона фрукту путесценте. Смотри Ап-

nona Afiatica, Аннона Азіатика.

ANNONA FOLIIS OVATIS ACVTIS, FLORE ALBIDO VNGVE PVRPVREO, FRVCTV CONIFORMI TVBFROSO NIGRI CANTE, Annona poninch onamuch akymuch, prope arengo ynthe hyphypeo, ppykmy konnpopmu myseposo nurpukan-

me. Смощри Gnanabanus Perseae folio, Гнанабанусъ Персее фоліо.

ANNONA MVRICATA. Linn. Аннона муриката. Аннона съ кругловатыми, копьещообразными, гладкими и плоскими листьями, и съ треугольнымъ, вершиною окончивающимся плодомъ.

ANNONA SCVAMOSA Linn. Аннона скнамоза. Смотри Guanabanus Perfeae folio.

ГванабанусЪ Персее фоліо.

ANONA, Анона. Смощри Аппопа, Аннона.

ANONIS, Анонись. Смотри Ononis, Ононисъ.

ANONIS CAROLINIANA, PERENNIS NON SPINOSA, FLORIBVS IN THYRSO CANDIDIS. Anonuch kaponiniana, nepennuch nonh chunosa, propusych unb
mupco kanguguch. Cmompu Crotalaria feliis
ternatis, lanceolato-ovatis, Kromanapia фоліись тернатись, ланцеолато оватись.

ANONIS MITIS FLORE LVTEO, Anonuch mumuch prope nymeo. n.

ANONIS PRIMA MINOR, Anonneb

прима минорь и

ANONIS PVRPVREA SPINIS CA.
RENS, Anonuch пурпуресь спинись каренсь и

ANONIS SINE SPINIS LV FEA, Ano-

нись сине спинись лутеа. и

ANONIS SPINOSA FLORE PVRPV-REO, Анснись спиноза флоре пурпурео

ANONIS VISCOSA, SPINIS CARENS LYTEA MAIOR, Anonuch пискоза спинись каренсь лутва магорь. и

ANONIVM ALBYM, Anoniymb an-

BYMb. II

ANONIVM LVTEVM, Anoniymb my-meymb. Cmompu Ononis, ononucb.

ANONYMOS, Anomimoch. Cmompu

Evonimus, Эвонимусъ.

ANONYMOS TENUIFOLIVS, Анонимогь тенуифоліусь. Смощри Linaria, линаріа.

ANOPIVM, Anoniymb. Cmompu Galeopsis, Taneoncuch ANO-

ANOTO, Аното. Смотри Mitella, Мителла.

АNRAMITACO, Анрамитако, есть Мадагаскарская, въ два аршина вышиною растущая трава, которая производить на поверхностяхь листовь своихь красный или желтый цветь, или пустый внутри плодь, на подобіе сосудца имеютраго свою крышечку и наполняющагося во время дождя водою. По Гречески Άνράμπάνο, Φύτόν τὸν μαδαγασκάρ; по Немецки Unramitaco Managascar; по Италіански Anramitaco pianta del' Madagascar; по Аглински Anramitaco Madagascar - plant.

ANSERINA, Ансерина. Смотри Poten-

tilla, Пошеншилла.

ANSICVS, Ancurych. Cmompu Flores

Sambuci, ФлоресЪ Самбуци.

ANTAES, Anmaech. ecms poab Magarackapckuxb бобовь по Ивмецки Untaes, eine Urt Bohnen in Madagascar; по Француски Antaes, sont une espèce de Féves à Madagascar; по Италіански Antaes, sorte di Fave del Madagascar; по Аглински Antaes

ANTHEDON, Anmegonb. Смотри

Azarolus, АзаролусЪ.

ANTHEMIDA, Антемида. Смотри Chamomilla, Хамомилла. и Anserina, Ансерина.

ANTHEMIS, Aumemuch. Cmompu Cha-

momilla, Хамомилла.

ANTHEMIS COTVLA Linn. Anmemuch котуга. Смотри Cotula fœtida, Ko-

тула фетида.

ANTHEMIS CHRYSANTHEMOS HER-BARIORVM, Антемись хризантемось тербаріорумь. Смощри Chamomilla, Хамомилла.

ANTHEMIS ERANTHEMOS. Aumemuch Epaumemoch Cmomu Consolida media.

ANTHEMIS LEVCANTHEMIS ANGLO.
RVM FLORE MVLTIPLICI. Anmenuch neu-

кантемись Англорумь флоре мултип-

ANTHEMIS LEVCANTHEMIS ODO-RATA, Anmenuch neukanmenuch ogopa.

та. и

ANTHEMIS LEVCANTHEMOS, Антемись пенкантемось. Смощри Chamomilla, Хамомилла.

ANTHEMIS TINCTORIA. Linn. Антемись тинкторіа. Смощри Вирагранит,

БуфпалмумЪ.

ANTHEMIS VERA, Anmenuch nepa.
ANTHEMIS VULGATIOR, Anmenuch
nyaranioph. u

ANTHEMISIVM, Aumemusiymb. u ANTHEMIVM, Aumemiymb. Cmompa Chamomilla, Xamomuzaa.

ANTHEMIVM THEOPHR. Aumeniymb

Теофр. Смотри Nigella, Нигелла.

ANTHERICVM Linn. Антерикумь Смотри Phalangium foliis canaliculatis, Фогангіумъ фоліисъ каналикулатисъ.

ANTHEVPHORBIVM, Антепфоры

умь. Смотри Cacalia, Какаліа.

ANTHIMVS, Антимусь. Смотри Chamomilla, Хамомилла.

ANTHIOCVM, Anmioxymb. CMOMPH

Flores Sambuci, Флоресъ самбуци.

АNTHOCEROS Linn. Антоперосы есть иностранное, мало извъстное распеніе бывающее двухь родовь, мужеское и женское: у мужескаго цвъть выходить изъ цилиндрической, цъльной и къ землъ обрищенной чашечки, и имъеть длинную шилу подобную таковую головку; (Anthera Автера) а у женскаго чашечка раздълена на шесть лапочекь, и заключаеть въ себтри съмячка. По Гречески "Алтобер'я формаров, сіпе цизіть рісфе Рубапье; по Француски Аптносегов, ріапте etrangere, по Италіански Аптносегов, ріапта foraftiera.

ANTHOCEROS LÆVIS, Linn. Aumo

церось лепись. и

ANTHO

держишь въ себъ много масла и соли, прошиво-

двиствуеть яду и бъщенству, укръпляеть

сердце, разжижаеть, разбиваеть густыя мо-

ANTHOCEROS MVLTIFIDVS Linn.

ANT

Антоцерось мултифидусь. и

ANTHOCEROS PVNCTATVS, AHтоцерось пунктатусь. Смотри Anthoceгоз, АнтоцеросЪ.

ANTHOLYZA Linn. Aнтолиза. Смо-

шри Cunonia, Кунонia.

ANTHOMIS, Ammonuch. CMompu Chamomilla, Хамомилла.

ANTHOPHYLLI, Антофилли. Смощри Caryophylli aromatici, Каріофилли ароматици

ANTHORA, Anmopa. Ad Lob. Dod. Matth. Gel. Hor. Aconitum salutiferum. C. B. Pit. Tournef. Napellus Moysis, Avicennae. Antithora flore luteo Aconiti. I. B. Aconitum Anthora. Linn. II. Желтый Волчей корень или Вороней глазь права, расшешь большею частію въ теплыхъ странахъ на гористыхъ мъстахъ, и цвътетъ въ Іюнъ и вь Іюль мьсяцахь. Она имьеть крыпкій, пушкомЪ обложенный и углованый сшебель вЪ шесть и девять вершковЪ вышиною, который окружается множествомъ круглыхъ, аругь прошивь друга на искось сидящихь, периспых в или на подобіе ремней разръзанных в и на листья кавалерских в шпоров в (Delphinium, ДелфиніумЪ) похожихЪ лисньевЪ горько - острато вкуса: првты вырастають на подобіє колоса на вершинъ стебля, составлены каждой изЪ пящи разкоподобных в бавдножелных в листочков в, которые представляють нькоторымь образомь, видь шлемомЪ покрытой головки, и имъютъ не непріяшный запахЪ, а послъ спаденія оставаяющь шишечки о нъскольких в гнъздахь, въ коикъ находятся угловатыя, черноватыя и сморщившіяся съмячки. Корень ея сосщавленъ изъ двукъ ръпокъ или луковокъ покожих видом в и величиною на оливки, имъешъ снаружи желшовашый, а внушри бълесоватый цввть, и горьковатый вкусь, наполненЪ внутри ноздреватною влажностью и окружается въ низу волокнами. Бъ Медицинъ употребляють корень, который со-Часть І.

крошы, унимаеть произшедший оть въпровь рьзь въ живошъ и починается полезнымъ ошь укушенія и ужаленія ядовишых в гадинь и зв врей, от в язвы, от в лихорадок в св пять нами и от в лихорадок в случающихся от в глистовь и оть клейкости матеріи вь желудкь, оть яду и опасных в следствь принятой или събденой правы Пригрида или Борца (Napellus, Напеллусь.) ВЪ АпшекахЪ им Бешся шолько корень. Антора есть Греческое от словъ Анти, А'чті, оть, и ядовитой травы фвода, происходящее имя, какЪ бы сказать противуядная права, или права пропивящаяся ялу правы Форы. ГосподинЪ Линней полагаетъ ее въ XIII. классь правь им вющих в в цевпт своемЪ двапиашь и болъе мужчинокъ и пять женочекъ вмъстъ (Polyandria Pentagynia) а господинЪ ТурнефоршЪ вЪ XI классЪ, во II отдъленіе, во II. родЪ травЪ сЪ многолистнымЪ цвЪтомь, которато пестикь превращается вы многоги вздной плодь. По Гречески Антифвоса; по Нъмецки Gift = Seil oder Seilgift; Urabisches Sittiver; по Француски Anthora; по Италіански Antorare, spezie d'Aconito; по Аглински Helmetflower Alexipharmick or Monks-Hood Antidotal.

ANTHORA MAIOR, Anmopa maiopb. ANTHORA MINOR, Anmopa минорь и ANTHORA VULGARIS, Anmopa nyaгарись. и

ANTHORAE RADICES VARIAE. AHторе радицесь наріе. Смотри Anthora, Аншора.

ANTHOS, Anmoch. CMompu Rosmarinus, Росмаринусъ.

PEDMON, Anmoch πeg-ANTHOS

монь. Смотри Anserina, Ансерина.

ANTHOXANTHVM, Anmorcaninymb. III. Анвоксанфь илл Благононная трана есть на иловатых в гористых в мъстах в въ полуденныхъ странахъ Россіи растущая и мало употребляемая трава. По Гречески Α΄ Ψόξανθον ε΄ νώδης χόρτος; πο Η Έμεικα Βοβιτιεchend Θταβ; πο Φραμιγςκα Anthoxante herbe odorante; πο Ηπαλίαнсκα Anhtoxanto, herba odorante; πο Αγλαμικα Anthoxonth, a very sweet Grass.

ANT

ANTHOXANTHVM INDICVM. Linn.

Антоксантумь Индикумь. и

ANTHOXANTHVM ODORATVM, Lin.

Антоксантумь одоратумь, и

ANTHOXANTHVM PANICVLATVM,

Linn. Смотри Anthoxanthum, Антоксантумъ.
ANTHRISCVS PLINII, Антрискусь

Плинии. Смотри Chaerefolium, Херефоліумь. ANTHROPOMORPHON, Антропоморфонь. и

ANTROPOMORPHOS, Антропоморфось. Сметри Mandragora, Мандрагора.

ANTHVLLIA, Антуппіа. Смоніри An-

thora, Anmopa.

ANTHILLIS ALTERA, Антиллись алтера. Смотри Chamaepitis, Хамепиписъ.

ANTHYLLIS ALTERA ITALORVM, Антиллись алтера Италорумь. Смотри Сатрногата, Камфората

ANTHYLLIS ALTERA LVTEAE SIMILIS, Антиллись алтера лутее симились. Смотри Glaux offic. Глауксъ оффиц.

ANTHYLLIS ALTERA PRIMA. Антиллись алтера прима. Смотри Crithmum. IV. Критмумъ IV.

ANTHYLLIS ALTERA SECVNDA, Антиплись аптера секунда. Смотри Сат.

phorata, Kampopama.

ANTHYLLIS CHAMÆPITHYDES, Anmunnuch Xamenumugech. Cmompu Chamae-pithys. Xamenumuch.

ANTHYLLIS LEGVMINOSA, Антиллись петуминоза. Смотри Vulneraria, Вул-

нераріа.

ANTHYLLIS LENTIFOLIA, Антиппись пентифоліа. Смотри Сатрногата,

Камфората.

ANTHYLLIS LOTOIDES Linn. Антиплись потоидесь. Смотри Lotus latifolia, Лотусъ латифоліа.

ANTHYLLYS MARITIMA ALSINEFO-

LIA, Антиллись маритима алсинефоліа. Смотри Paronychia, Паронихіа.

ANTHYLLIS MONTANA Linn. Антиллись монтана Линн. Смотри Linaria, Линаріа.

ANTHYLLIS NARBONENSIS, Anmuanuch nationencuch. u

ANTHYLLIS NIVEA, Антиллись Нипеа Смотри Paronychia, Паронихіа.

ANTHYLLIS SALSA Linn. Anmun-

лись салса. Смотри Kali, Кали.

ANTHYLLIS VALENTINA Clusii, Антиллись палентина Клюзіи. Смотри Herniaria, Герніаріа.

ANTHYLLIS VULNERARIA Linn. Антиллись Вулнераріа. Смощри Vulne-

raria, Вулнераріа.

ANTILION, Антиліонь. Смощри Аиricula muris, Аврикула мурисъ.

ANTILLA Антилла. Смотри Valeriana. Валеріана.

ANTIMALVM, Aнтималумь. и ANTIMELVM, Антимелумь. и

ANTIMOSPHOS PYTHAGORAS, Anmunocopoch Tumaropach. u

ANTINNION, Aнтинніснь. Смотри Mandragora, Мандрагора.

ANTINVS, Антинусь. Смотри Аграragus, Аспарагусъ.

ANTIPATHES, Антипатесь. Смотри Corallum nigrum, Кораллумы нигрумы.

ANTIPHARMACVM, Антифармакумь. Смотри Vincetoxicum, винцетоксикумь.

ANTIQVARTIVM PERUVIANVM, Антикпарціумь Перупіанумь. Смотри China Chinae, Хина Хине.

ANTIRRHINVM ALBVM, Антирртинумь албумь. Смотри Antirrhinum Vulgare, Антирргинумъ вулгаре.

ANTIRRHINVM ALPINVM Linn. An-

тирргинумь Алпинумь. и

ANTIRRHINVM ARVENSE Linn. Антирргинумь Арпенсе. Смотри Antirrhinum fyluestre. Антирргинумъ силвестре.

ANTIR-

ANTIRRHINVM ASARINA Linn. Антирргинумь Азарина. Смотри Afarina, Азарина.

ANTIRRHINVM BELLIDIFOLIO Linn. Антирргинумь Беллидифоліо. Льпопы уста сь беллисопымь листомь.

ANTIRRHINVM CYMBALARIA. Linn. Антирргинумь Цимбаларіа. Смотри Сутbalaria, Цимбаларіа.

ANTIRRHINVM ELATINE. Linn. Ан. тирргинумь елатине. Смотри Elatine, Елатине.

ANTIRRHINVM FLORE RVBRO ET ALBO, Антирргинумь флоре рубро етв альо. Смотри Antirrhinum syluestre, Антирргинумъ силвестре.

ANTIRRHINVM GENISTIFOLIVM Linn. Антирргинумь тенистифоліумь. Льпопы устась Генистнымь или шильной трапы листомь.

ANTIRRHINVM LINARIA Linn. Антирргинумь Линаріа. Смотри Linaria, Линаріа.

ANTIRRHINVM LVTEVM, Антир. ргинумь путеумь. Смотри Luteola, Луте-

ANTIRRHINVM MAIVS Linn. Антирргинумь маюсь. Смотри Antirrhinum Vulgare, Антирргинумъ вулгаре.

ANTIRRHINVM MINVS Linn. Антирргинумь минусь. Смощри Antirrhinum, fyluestre, Антирргинумъ силвестре.

ANTIRRHINVM ORIGANIFOLIO Linn. Антирргинумь ориганифоліо. Льпоны уста съ подобнымъ Душицъ листомъ.

ANTIRRHINVM ORONTIVM Linn. Антирргинумь Оронціумь. Смотри и

ANTIRRHINVM PRIMVM, Антирр-

ANTIRRHINVM SECVNDVM, Ан-

ANTIRRHINVM SYLVESTRE, Антирргинумь силпестре. Смотри Antirrhinum vulgare, Антирргинумъ вулгаре. ANTIRRHINVM TRAGI, Антирртинумь Трати. Смотри Luteola, Лутеола.

ANTIRRHINVM VULGARE, I. B. Dod. Pit. Tournefort. Антирргинумь пулгаре. Antirrhinum maius. Linn. Nares vituli, os Leonis vulgo Caef. Cynocephalos Plinii. XXXV. Выжлинь, Жабрен права, Льпопы Уста или собачья голошка трава, бываеть многихъ родовъ, изъ коихъ однакожъ большая (Majus, маюсъ и малая или дикая minus, минусъ или silvestre, силвестре) сушь главные. Перьвая свешся вв садахв, а послёдняя расшешь вы поль, на песчаных в мвстах в и в в перел всках в и цввтешь въ Маїв и Іюнь мьсяцахь; садовая имђешЪ бълый и древесовашый корень, производящій нісколько желтозеленых прямо стоящихъ, гладкихъ и густою бълою влажностью напоенных в стеблей вв девять и двенатцать вершковъ вышиною; которые окружающся зелеными, кЪ верыху обращенно одинъ прошивъ другаго сидящими, продолговаными и нѣсколко шероховаными листьями; и изЪ вергинны сгоей произвопурпуровые, вверьху желтое и на лвиное похожее устье им вющіе, однолисточные, продолгованые, внутри пустые и трубкою расположенные цв вшы; которые опадая, покидають на своемь мѣстѣ многолисшныя съ боку раскрывающіяся и видъ телячей головки представляющія шишки или съмянодержашельницы, заключающія въ двухъ своихъ гивздахъ мъленкія черныя сѣмячки. Другій сорть садовой первому во всемъ подобенъ кромъ того только, что лисшья его уже и верхнія сшеблей его въточки укращаются бълыми цвътами. Третей съ первымъ также сходствуеть, только меньше и приносишЪ желтые цвъты. Четеертый сорть или дикія львовыя уста им веть листья подлиниве и уже, и маленькіе бълесоватые цвъты вырастающіе не только на стебельных вершинах в, но и на находящихся по серединъ стебля въ-

пючкахЪ. Сія права нынъ почти совсьмЪ въ Медицинъ не употребляется, но по суевбрію употребляема бываеть въ бользняхь шакь называемыхь сь глазу, оть пришки и отъ колдовства. Антиринумъ еспь старинное Греческое имя происходящее оть словь айдос, цвыть, и ейес, ноздри пошому что находять нъкоторое сходство въ видъ цвъта сей травы съ телячьими поздрями; а Циноцефалось ошь Греческих в словъ ничос, собака, и нефали голова, ибо свиянодержащельницы ея подобны нёсколько собачьей головъ. Господинъ Линней полагаешь ее въ XIV, Клась расшеній имъющих в в в цв в своем в четыре мущинки или пычка, из в коих в два длиниве других в двухЪ (Didinamia. Дидинаміа) а ГоснодинЪ Турнефорть въ III. классъ, въ IV. отдъленіе, во И. родъ правъ съ однолистнымъ, трубкою свишымъ и разноподобнымъ цвѣтомъ. По Гречески Антіворог; по Нъмецки Догант или Стапт, Lowen = Maint, Bracken-Haupt, Ralbe-Mafen, Dunds-Kopf; а дикая называется Klein Crant, wild Löwen-Maul; no Opaunycku Musle de Veau; а дикая Mouron Violet или Oeil de Chat; по Ишаліански Antirrino grande; a дикая Antirrino seluatico; по Аглински Calves Snout or Purple Snap Dragon; а дикая The wild Snap Dragon.

ANT

ANTITHORA, Ammumopa. Cmompu Anthora, Aнтора.

ANTOFILLI, Aнтофилли. Смотри Caryophylli Aromatici, Каріофилли Арома-

ANTOMARIA MAIOR HIRSVTA, An. томаріа магорь Гирсута. Смотри Іувіmachia Offic. Лизимахіа оффиц.

ANTONIANA, Aнтоніана, Смотри Chamaenerion, ХаменеріонЪ.

ANTOPHILLI, Антофилли Смотри Caryophylli aromatici, Каріофилли Аромашици.

ANTRAPHAPHAEOS, Anmpadadeocb. w

ANTRINION, Aнтриніонь. Смотри Mandragora, Мандрагора.

ANTRISCVS, Aumpuckych. Anthriscus Plinii. quibusdam semine longo cicutariæ vel chærophylli. I. B. Scandix Anthriscus. Linn. Chærophyllum sylvestre. C. B. Apium sylvestre. Ger. Ico. Daucus sepiarius Ges. Col. Myrrhis fylvestris, semine striato lævi. Moriss. & Pit. Tournef. VI. CHEQOKD HAN AUKIN кербель права расшешь на топкихв, болошных в тнилою водою наполненных в мъстахь, првтеть въ Маів мъсяць и принадлежить къ солнечнымъ, или всякій день въ одно извъсшное время распускающимся и сокрывающимся расшеніямь, ибо цвъть ся раскрываения по утру въ седмомЪ, а скрывается по полудни вЪ третьем в часу. Она вырастаеть въ двенатцать вершков Вышиною, раздвляется на многія въшви, покрыта вся нъжнымъ пушкомъ, и имвешь сизо-зеленый и густою жидкостью наполненный спебель, который окружается красивыми, на кервельные (Срагеfolium, ХерефоліумЬ) похожими, и почти никакого вкуса не имъющими лиспъями, и бъленькими, на подобіе розона изъ пяти вЪ кружекЪ расположенныхЪ листочковЪ, составленными цв впочками, выходящими изЪ многолисиной на подобіе съпки на нъсколько лапочекъ разръзанной чашечки, которая по спаденію цветовъ превращается въ два черныя продолговатыя и узенкія съмячки. Корень у нее бълый, душиспый, и древесованый. Многіе почитають его вреднымь, и утверждають чио онь, нечаннымь образомь вы пищь вмь. сто пастарнака употребленный, лишаетъ и ввергаеть чувствЪ иа время глубокій и опасный сонЪ. Трава держишъ въ себъ много влажности, соли и масла, и способствуеть испражненію т но въ Медицинъ ръдко употребляется, чего ради и въ Апшекахъ изъ нее ничего не двляения. Анприскусь еслы Греческое ошъ словЪ

словь айдос, цвыть, и спхос, загородка, происходящее имя. ГосподинЪ Линней полагаеть еевь V. классь растений имьющих вы своем в цевтв пять тычков в и два пестика. (Pentandria Digynia) a ГосподинЪ ТурнефортЪ въ VII. классъ, во II. отдъление, въ VII. родъ травь съ многолистнымъ, на подобіе розона ра положенным в цв в пом в. По Гречески Халуе-Φυλλον άγρειον; πο Η ΒΜΕΙΚΗ Wilder Rerbel; πο Француски Cerfeuil fauvage; по Италіански Cerfoglio seluatico; по Аглински Wild Cherwil; wild Cifley; Cow-weed.

ANTROPOMORPHON, Aнтропоморфонь. Смотри Mandragora, Мандрагора.

ANVBEL, Any senb. Cmompu Iu jubae, 10:06e. ANVLINA, Анулина. Смотри Chamæmelum, ХамемелумЪ.

ANZARAS; Ansapach. Cmompu Sarco-

colla, Caprorozza.

AOVARA. C. Biron. Aonapa. Ayera, Aoпара или Аігра есінь плодъ съ куриное яицо величиною, который обведен в телухою и расшешр ср многими другими вмрсшр пучками на н Бкотпором Б Американском В высоком В и иглами обсаженномъ деревъ роду Пальмы въ Кавнкв и около Сенеги. Когда шелуха созрвешь, то лопается и оказываеть пучекь плодовь, которые зрълые мясисты, имъють золотожелтой цвёть и заключають въ себъ по одмой весьма крѣпкой, и на поверхности своей три дирочки, из в коих в дв в меньше, нежели претья, им вющей косточки съ персиковую величиною и содержащей въ себъ бълое продолговатое зерно, какЪ миндалинка нарочито пріятнаго вкуса. Индіанцы сей плод в вдять, а из в зерна выжимаюшь масло, которое размягчаеть, унимаеть поносы и укръпляеть. По Гречески Аовоξα καρπός Αμεςικάνος; πο Η Επετική 21ουσαια, είπε Americanische Frucht; no Opannyenu Aouara fruit de l'Amerique; по Италіански Aovara, frutto dell'America; по Аглински Aovara, an American fruit.

APALACHINE, Ananaxume. Caffine vera, perquam fimilis arbufcula Phillyreæ foliis antagoftini ex Provincia Carolinensi. Pluk Mantis Peragua Offic. Caffine peragua, Linn. Kaccurse, Artuпаханскій чай, или Каролинская Кассіа, есть маленькое в В Америк в в В Каролиніи растущее и ягоды о четырех в косточках в приносящее деревцо, которое окружается темнозелеными, продолговашыми, узкими, вокругь зубчапыми, жесткими и чайный вкус в им вющими листьями, кои привозяпия кЪ намъ изъ Каролины; а прозваны Апалаханскими пошому что Апалахи, народъ Индіанскій обитающій около рѣки Миссисипи пьють охотно настоянную съ оными воду. Ксименесъ и Лаэртъ упоминали уже о семъ пишъъ называемомъ имж Кассине, и утверждали, яко бы оно предохраняло ошь податры и каменной бол взни вь почкахЪ, и оно дъйспивишельно унимаетъ остроты и жженіе вЪ мочевомЪ проходъ, слегка производишъ рвоту и почитается за особенное лекарство въ болъзни, когда чрезвычайно много выходить мочи, но наиболье не острой и соединенной съ величайшей жаждою, и ошъ колопия произшедшаго от в желчи. Господин В Линней полагаеть его въ V илассь растений, имъющих в в своем в цввий пять тычков и том пестика (Pentandria Trigynia). По Гречески Τοτε της 'Απαλαχίας; πο Η ΒΜΕΙΚΗ Carolinische Cassies Bumlein; по Француски Cassia de la Саroline; no Италіански Cassia della Carolina; по Аглински The Caffioberry-bush.

APANTROPON, Апанторопонь. Смо-

три Staphisagria, Стафисагріа.

APARGIA, Anapria. Cmompu Hieracium, Tiepaniymb.

APARINA, Arrapuna. Cmompu Bardana, Бардана.

APARINA LEVIS, Апарина пепись. и APARINA SYLVESTRIS, Anapuna cuno meempuch. Смотри Matrifilua, Матрисилва.

APARINE. Brunsf. Dod. I. B. Trag. Апарине. Galium Aparine Linn. Aparine vulgaris. C. B. Pit. Tournet. Aparine aspera. Thal. Omphalocarpon Philantropon Plinii ХІ. Дерябка; Смогная или Смольная

права, растешь возля заборовь, на поляхь, вь садахь на хорошей земль между овощами, цвѣтеть въ Іюнѣ мѣсяцѣ и собираепіся лётомЪ, Она имѣепіъ маленкій корешокЪ, и много нъжныхЪ, шонкихЪ, длинныхв, четвероугольныхв, гибкихв, шероховатыхЪ, равно какЪ на кол вниы раздвленных в и кв прочимъ травамъ приивпляющихся зеленых в стеблей, окружающихся свътлозелеными, маленькими, узкими продолговащыми, по седми вкругь около всякаго колвица на подобіе звіздки расположенными и колючими щешинками покрышыми лисшьями: цвёшы на ней бёлые, маленькіе, колокольчистые и каждый на чешыре часши раздъленные. Съмяна кругловашыя въ срединъ не много пусшыя, наполнены бёлою влажностію и имёють видь маленькаго пупка и цвёть шемноватый. Она содержить въ себъ много соли и масла и умъренную часть влажности, чистить, разбиваеть, противод виствуеть яду, гонишь пошр и упошребляется внутренно оть осны, опасных выхорадок в эпилепсіи или падучей бользни. Сокь изь всей травы принятый вв виноградномв винв, исцъляеть оть ужаленія ядовитыхь звърей; нъсколько капель на клопчатой бумагъ вложенной въ уши, прогоняеть шумъ и ломъ въ нихъ, также помогаетъ онъ и оть колотья вь бокахь, употреблень будучи по три или четыре раза ежедневно по одному золошнику. Раздавленные и кЪ ранамЪ приложенные листья унимають кровь. Порошком в истолченая права присыпанная къ нарывамъ и ранамъ, исцъляеть оные. Пригошовленный изь свужей сей травы и топленато коровьяго масла пластырь разбиваеть и прогоняеть зобы. Перегонная изЪ нее вода гонишъ изЪ пузыря песокъ и камень. Декокшъ изъ правы унимаешь сильное шечение съмяни (Gonorrhæa) и разбивает в опухоль вв мощонк в и грудяхъ. Апарине есшь Греческое отъ шароховатности ея стебля происходящее имя.

Омфалокарпонъ ошъ Греческаго слова опфа дос пупь, потому что свмяна ея имвють сь онымъ нъкошорое сходство; а Филантропонь от Греческих в словь Філью, люблю, и ахдритос, человъкъ, ибо она пристаеть къ платью. Господинъ Линней полагаеть ее вы IV. классь растеній имъющих в в своем в цв в четыре пычка и одинъ песникъ (Pentandria Monogynia); а ГосподинЪ Турнефорть въ І. классъ, въ ІХ. отдъленіе, во II. родъ травъ съ однолистнымъ колокольчистым в цвытомв. По Гречески Απαρικη; у Галена Φιλίσιον, у Иппократа φιλατέριον, α у Λίοςκορυπα όμφαλουαρπος, Φιλάνθροπος πακже φιλάδελφος; πο ΗξΜεμκи RiebeRraut, Zaunreis, Dabel-Caamen; no Француски Grateron илн Reble; по Италіански Aparino; по Атлински Goose Grass or Clevers; The common or rough Clevers.

APARINE AVREA, Anapune anpea.

Смотри Стисіата, Круціата.

APARINE LATIFOLIA HVMILIOR. MONTANA. Tournef. Апарине патифолів гумиліорь монтана. Смотри Аsperula odorata, Асперула одората.

APARINE LEVIS Caesalp. Апарине пепись. Смотри Mollugo montana, Модлуго

моншана.

APARINE LEVIS Lobel. Апарине лепись. Смотри Hepatica stellata, Гепатика стеллата.

APARINE LEVIS PALVSTRIS, Апарине лешись палустрись. Смонри Gallium luteum, Галліумъ лунеумъ.

APARINE MAIOR Plin. Апарине магорь. Смотри Агрегидо, Асперуго.

APARINE SYLVESTRIS, Апарине силпестрись. Смотри Аfperula, Асперула.

APEMVM, Апемумь. Смотри Мапdragora, Мандрагора.

APHACA, Афака. Смотри Lathyrus, Латирусъ.

APHACA DIOSC. Apara Aiock.

APHA-

APHACA HEDYPNOIS, Apara reдипноись. н

APHACA THEOPHRASTI, Apaka Теофрасти. Смотри Тагахасоп, ТараксаконЪ. APHACE, Афаце. Смотри Lathyrus,

Латирусь, и Тагахасоп, Тараксаконъ.

APHACE DODON. Афаце Додон. Смотри Dentaria, Дентаріа.

APHALETON, Афалетонь. Смотри

Thymus, Тимусъ.

221

APHANES, Aganech. Cmompu Alchimilla, Алхимилла.

APHARCA THEOPHR. Apapra Teофр. Смотри Alaternus, АлатернусЪ.

APHAZARASIM, Афазаразимь. Смо-

три Bryonia, Бріоніа.

АРНLОРНО, Афлофо. Смотри Mercurialis, Mepkypianucb.

APHOLTON, Ago amoub. Смотри

Pentaphyllum, ПентафиллумЪ.

APHOSCORDON, Афоскордонь. Смотри Ophioscorodon, ОфіоскородонЪ.

APHRI, Appu. Cmompu Cervaria,

Церваріа.

APHRODISIA, Appogusia. Смотри Calamus, Kanamych.

APHRON, Афронь. Смотри Cicuta, Цикупа.

APHYLLANTHES Linn. Афилланmech. Смотри Stoebe tertia, Стебе терціа.

APHYLLANTHES ANGVILLARÆ I. В. Афиллантесь ангипларе. Смошри Globularia, Глобуларіа.

APHYLLANTHES MONSPELIENSIVM. Linn, Афиллантесь Монспеліенсіумь. Смо

три Caryophyllus, Каріофиллусь. APHYLLANTHES PRIMA, ADURACHтесь прима. Смотри Stoebe tertia, Стебе

терціа.

APHYLLANTHES PRIMA THEOPHRA-STI, Афиллантесь прима Тгофрасти. Смотри Scabiola Offic. Скабіоза Оффиц.

APHYLLANTHES QVARTA, Apunпантесь кпарта. Смотри Stoebe tertia, Стебе терціа.

APHYLLON, Афиллонь. Смотри Dentaria Orobanche, Дентаріа орабанхе.

APIANA, Aniana. Cmompu Brassica, Брассика

APIANA CRISPA, Aniana криспа. Смотри Brassica crispa, Брассика криспа.

APIARIA, Aniapia. Смопри Ialminum, ЯсминумЪ.

APIASELLVM, Aniasennymb. Cmoтри Ranunculus, Ранункулусь.

APIASTRVM, Aniacmpymb. Cmompu Melissa, Мелисса.

APIASTELLA, Aniacmenna. Cmompu Galeopsis, Taneoncuch.

APIASTELLVM, Aniacmennymb. Cmo-

три Bryonia, Бріоніа.

APII COMMVNIS VITIVM, Anin коммунись пиціумь. Сметри Petroselinum caninum, Петрозелинумъ канинумъ или; Сіcuta, Цикуша.

APIOS, Anioch. Cmompu Bulbocasta-

пит, БукбокасшанумЪ.

APIOS, Anioch. Cmompu Cyclamen, Цикламень.

AMERICANA CORNVTI, APIOS

Апіось Американа корнути. и

APIOS MATTH. Anioch Mam. u APIOS. TRAG. Anioch Tpar. CMO-

при APIOS VERA. Ad. Lob. Ger. 407. Emac. 504. Glycine Apios. Linn. Tithymalus Charracias radice Pyriformi Mor. H. R. B. Tithymalus tuberosa radice. P. Tournesort. & Lina. Tithymalus tuberosus pyriformi radice. C.B. Pin. 292. Tourn, Inft. 87. Hift. Oxon ііі. 342. ІН Красная или земляная груша, Волчые молоко сь круглы мь шишкопатымь корнемь или Дикая репа растеть на островъ Кандіи и другихъ теплыхъ странахъ, на гористыхъ мъстахъ и цвъшешь вы Іюль мъсяць. Сіе расшеніе есть родъ травы называемой волчьимъ молокомъ (Tithymalus, Титималусь) и производить нъсколько шоненкихъ, низкихъ, круглыхъ,

красно-

краснованых в и большею частію приземиспых в стеблей, усажденных в коротеньжими продолгованными, копье видными и къ концу острыми листочками; и производящих в изв вершинь своих в маленькіе, бабдножелные, однолисшные, на пяшь частей раздъленные, и видъ кувшинчиковъ им вюще цв в посл в коих в оказывающся маленькія къ тремь угламь возвышенныя и въ прехъ своихъ гивадахъ по одному продолговатому свиячку заключающія шишечки или капсулы: корень его пруглый, миникованный съ наружи черень, и внутри имветь подобіе груши. Нікоторый ученый мужъ примѣшилъ, что естьли сей корень шолств и жиренв, то производимая имв пірава гораздо меньше, нежели вырастающая изЪ шонкаго. Она содержишЪ въ себъ много соли и масла смъщаннаго въ изрядномъ количеств влажности и земли. Корень сильно слабить и причиняеть рвоту. Многіе ув Бряють, что верхняя его часть производить рвону, а чио нижняя слабишь, но всвего часши им вюшь равное свойство. Апіось, апіос, есть Греческое грушу означающее имя, пошому что корень его им веть подобіе груши, а иные прозвали его Ишась, ибо находять вы корнъ сходство съ фигою называемою по Гречески 1 хас; Господинъ Линней полагаеть ее въ XVIIклассь раствній имвющихь вь своемь цвыть десять тычковъ изъ двойнаго вмъстилища, яко изЪ двойной машки выходящихЪ (Diadelphia Decandria) а ГасподинЪ Турнефортъ въ I. классь, въ III. отдъление, въ VI. родъ травъ съ однолистным в кувшинчиком в расположенным в пвътомъ. По Гречески Атюс; по Нъменки DBolffs = Mild mit rund = Knolichter Wurkel = Erd Birn; по Француски Apios, ou Rave fauvage: по Италіански Арріо, о Rapa seluatica; по Аглински Round Knobbed-rooted spurge.

APIVM ADVLTERINVM, Апіумь адултеринумь. Смотри Сісита, Цикута.

APIVM ALEXANDRINVM, Апіумь Александринумь. Смотри Нірровевінит, Гиппоселинумь.

APIVM ALIVD GENVS, Апіумь аліудь генусь. Смотри Сісита, Цикута.

APIVM ALTERVM GENVS PEREGRI-NVM, Апіумь алтерумь тенусь перегринумь. Смотри Petrofelinum Macedonicum, Петроселинумъ Мацедоникумъ.

APIVM ANGLICVM, Апіумь Англикумь. Смотри Petroselinum, Петроселинумь.

APIVM AQVATICVM, Смощри Ranunculus, РанункулусЪ; Sium, СіумЪ, и Сісита, Пикуша.

APIVM AQVATICVM ANGVSTIFO-LIVM MAIVS, Aniymb annycmuso niymb marocb u

APIVM AQVATICVM MINVS, Aniymb акпатикумь минусь. Смотри Sium, Civmb.

APIVM ARVENSE, Апіумь арпенсе. Смотри Iris, Ирись.

APIVM ASININVM, Апіумь азининумь. Смотри Chaerefolium, Херефоліумь.

APIVM BITVMINOSVM, Aniymb En-

APIVM CANINVM, Апіумь Канииумь. Смотри Сісита, Цикута.

APIVM CERVINVM, Апіумь церпи нумь. Смотри Petroselinum montanum, пе трозелинумъ монтанумъ.

APIVM CERVINVM NIGRVM, Anio умь церпинумь нигрумь. Смотри Rolmarinus, Росмаринусь.

APIVM CICVTARIVM, Апіумь Ци кутаріумь. Смотри Сісита, Цикута.

APIVM CRISPVM, Апіумь криспумь. Смотри Petrofelinum, Петрозелинумь.

АРІУМ DVLCE, celeri Italorum. Rail Hist. Pit. Tournes. Апіумь дулце. Веніпит віше Арішт dulce. Park. Арішт graveolens. Linn. IV. Селлери, Селдерея, или Сладкая Петрушка, свется въ садахъ и цввтеть въ Іюнь мъсяць, а съмяна собираются Осенью. Селлерея есть двультнее корневое произрастеніе и родъ большой петрушки, и бываеть двухъ сортовь, бълой и зеленой.

10

ii

17

Si

ББлой имветь нежный, вкусомь пріятный и круглоуглованый корень; зеленый обыкновенно жесче, не так в вкусен в, как в бълой и окружен в многими волокнами. Съмяна ихъ легко различишь можно, ибо у бълаго съмя маленьное и цвъшомъ свъшлозеленое, а у зеленаго оное больше и чернозеженое. ВЪ прочемЪ Селдерей видомЪ очень сходствуеть съ водиною Петрушкою (Apium palustre, Атумъ палустре) и различествуеть оть оной только вы томь, что вкусь ея не столь прянъ и гораздо пріятнъе, и что стебельки ея бел вють и становятся мягкими, какъ скоро ихъ покроютъ землею. Его чистять, разръзывають вы кусочки, и либо варять въ водъ, или сырой поливають уксусомъ и деревяннымъ масломъ и подають къ жаркому вм всто сахата. Он в чистип в кровь, укрвнаяеть зрвне, гонинь мочу, поствшествуеть мъсячному теченію, разбиваеть зашверд Блости въ почкахъ, селезенкъ, полезень оть желтухи, и укрощаеть ворчаніе вЪ животь; ГосподинЪ Линней почишешь его вреднымь Апоплекшикамь падучую бол взнь им Бющим В. В В Аптеках В им вется трава, корень, стия, вода, а многіе гочящь и Селерейную водку: выжащый изъ него сокъ чистить раны, и укръпляеть зубы въ цынгопных в болвзиях в. Съмя его принадлежишр кр числу ченырехр меньшихр гръющихъ съмянъ, а корень къ пяши большимъ отворяющимъ корнямъ. Апіумъ есть Латинское от Римлянъ принятое имя, происходящее от в слова Аріз, Аписв, пчела, потому чию дума и, будто бы пчелы очень любять его цвъть; или оть Арех, Апенсъ, глава, вершина, ибо древние плели изъ правы вънки и укращали оными свои головы. Господинь Линней и Турнефорть полагающь Селдерей съ водяною Петрушкою въ одинъ классъ. По Гречески Е'любеdonor ydensgor; no Hemenun Scierie, Seilern; по француски Scéleri ou Céleri; по Италіански Cellero, или Sellero; по Аглински Celery.

APIVM EQVINVM, Апіумь екпи-Часть І.

нумв. Смотри Hipposelinum, ГиппоселинумЪ. APIVM FOEMIMA, Aniymb фемин :. Смотри Petrolelinum, ПетроселинумЪ.

APIVM FONTANVM, Aniymb pon-

танумь. Смотри Sium, Сіумь.

APIVM GRAECVM SAXATILE CRITH. MI FOLIO, Aniymb Ipenymb Cancaтиле Критми фоліо. Смотри Crithmus. marinus, Критмусь Маринусь.

APIVM GRANDE, Aniymb rpange.

Смотри Leuisticum, ЛевистикумЪ.

APIVM HOEMORRHOIDVM, Aniymb Теморргондумь. Смотри Ranunculus, РанункулусЪ.

APIVM HIRCINVM, Aniymb Tup. цинумь. Смотри Pimpinella, Пимпинелла.

APIVM HISPANICVM, Aniymb Iuспаникумь. Смотри Hippofelinum, ГиппоселинумЪ.

APIVM HORTENSE, Aniymb Top. тенсе. Смотри Petroselinum, ПетроселинумЪ.

APIVM LATIFOLIVM, Aniymb naтифоліумь Смотри Petrofelinum, ПетроселинумЪ.

APIVM MACEDONICVM, Aniymb Манедоникумь. Смотри Petrolelinum Macedonicum, Петроселинумъ Мацедоникумъ.

APIVM MACEDONICVM FVCHSII, Апіумь Мацедоникумь фуксіи. Смотри Sium, Ciymb.

APIVM MASCVLVM, Aniymb Mackyлумь. Смотри Petroselinum, Петроселинумъ.

APIVM MONTANVM, Aniymb MOHтанумь. Смотри Petroselinum montanum, Петроселинумъ монтанумъ.

APIVM MVLTIFOLIVM, Aniymb myn. тифоліумь. Смотри Petroselinum, ПетроселинумЪ.

APIVM OCTAVUM, Aniymb oxmaпумь. Смотри Випіит Обіс. Буніум'в Оффиц.

APIVM OFFICINALE, Aniymb og-

фицинале. Смотри

APIVM PALVSTRE. Matth. Apium palustre et officinarum. C. B. Pit. Tournesort. ApiApium vulgare ingratius. I B. Paludapium, Ad Tab. Eleoselinum. Tur. Dod. Lob. IV. Hemmanb mpaва Водяная, Болотная петрушка или Спиная Вошь расшеть на сырых в и болошистых в мъстахъ, цвътетъ въ Іюнь мъсяцъ, а съмяна созръвають вы началь Сентября. Она им веть длинный, толспый, бълый, прямый, тлубоко подъ землею лежащій, и часто на многія боковыя в точки раздвляющійся корень и шолстые, темнозеленые, внутри пустые и дорожчатые стебли около двенатцати вершковъ вышиною, которые производять зеленые, гладкіе лоснящіеся и на пепрушечные похожіе листья, только что больше, сочны и им вюшь не пріяшный вкусь и запахь. Корневые или нижніе лисшья длин нъе стебельных в или верхних в и утверждаются на долгихъ, красноватыхъ, и пустыхъ черешкахъ. Изъ вершины стебля вырастають маленькіе, бълые, круглыми пучками расположенные, и изЪ пяпи листочковъ составленные цввточки, послв коих в чашечки превращающся въ съмянныя гивады, изъкоих в каждое заключаеть вы себь по два маленькія, на поверьхпости кругловатыя, полосочками испещренныя, бёлесоващыя и менъе петрушечных в съмячки, острато и не пріятнато вкуса. Она содержить въ себъ много соли, масла и влажности; корень и съмя раздъляють мокроты, отворяють затверд тлости, облегчають дышание, возбуждають слюну, гонять мочу, крови и камень, прогоняють вётры, разбивають стустившееся въ грудяхъ молоко, чистятъ грудныя нарывы, укрѣпляють и полезны ошь желчи, рань и машки. Ошь ядовишыхь и заразительных в лихорадок в есть сей корень преизящное средство: должно взять онаго лошЪ вЪ порошокЪ истолченнаго, и не много теріаку, и размѣшавЪ въ перегонной изь сей же травы вод'в прим'вшать ренскаго уксуса, приняшь и послъ поптъпъ. Въ Апшенах в иногда держащ в корень; выжащый из в нее сокъ прогоняеть лихорадки, укръпляешь зубы, чистить раны, и употребляется вь

мазяхь оть рака. Господинь Линней почитаеть ее также вредною апоплектикамь и имвющимь расположение къ апоплексии и параличу. Господинь Линней полагаеть ее, какъ и Селдерею въ V. классь растеній, имъющихь въ своемь цвъть иять тычковь и два пестика. (Pentandria Digynia) а господинь Турнефорть въ VII. классь, въ I. отдъленіе, во II. родь травь съ многолистнымь, на подобіе розона вы кружекь расположеннымь цвътомь. По Гречески Едлос далог; по Арабски Affilis; по Нъмецки Срріф; Двафет-Дететфійе; Двафет Догене, по Француски Ache des marais; по Италіански Арріо равияте, по Аглински Smallage от Water Parsly.

APIVM PASTVS, Aniymb nacmycb.

Смотри Galeopsis, Галеопсисъ.

APIVM PERSICVM, Aniymb Персикумь. Смощри Hippofelinum, Гиппоселинумь.

APIVM PETRAEVM, Aniymb Hempe.

ymb. u

APIVM PETROSELINVM Linn. Antymb Петроселинумь. Смотри Petrofelinum Петроселинумь.

APIVM RANINVM, Апіумь Ранинумь. Смотри Ranunculus, Ранункулусь.

APIVM RISVS, Aniymb pusych. A APIVM RVSTICVM, Aniymb pycmus xvmb.

APIVM SARDONICVM, Anivmb capgo никумь. Смотри Ranunculus, Ранункулусь

APIVM SATIVUM, Апіумь сатів пумь. Смотри Petrofelinum, Петрозелинумь.

MIVM SAXATILE, Aniymb cancaтиле. Смотри Petrofelinum macedonicum, Петрозелинумъ манедоникумъ.

APIVM SYLVESTRE, Апіумь симпестре. Смотри Anthryscus, Антрискусь.

APIVM SYLVESTRE LACTEO SVCCO
TVRGENS, Aniymb cunhecmpe naxmed
cykko myprench. Cmompu Thysselinum,
Tuccenunymb.

APIVM SYRIACVM, Anivmb cupide, kymb. Cmompu Secacul, Cerakyab.

ma-

MB-

TUV.

'en-

вЪ

ка.

пъ

43

ВЪ

40-

IKK

217 ;

VI.

ge

cb.

-d:

M-

06.

77-

m

11-

130

160

APIVM VULGARE, Апіумь пулгаре. Смотри Арішт рашяте, Апіумь палустре. APIENON, Апленонь. Смотри Scolopendrium, Сколопендріумъ.

APLVDA Linn. Annyga. Смотри Zeu-

gites, Зеугитесь.

АРОСАРУС, Апокапукь, есть Мадагаскарское дерепо, котораго плодь имветь величину миндаля, почитается за ядь и употребляется тамошними жителями, ком выжимають изъ него масло, для мазанія своихъ волось. По Гречески Αποκάπεκ, δένδρον τε Μαδαγασκαρ; по Нъмецки Просарись, Заит іп Madaga car: по Француски Аросарис, arbre du Madaga car; по Италіански Аросарис, albero del Madaga car; по Аглински Аросарис, an Madaga car-tree.

АРОСҮМУМ. Апоцимумь. Смотри

Аросупит, АпонинумЪ.

APOCYNVM ÆGYPTIACVM LACTE-SCENS, SILIQVA ASCLEPIADIS. C. B. Pit. Tournefort. Апоцинумь Эгиптіакумь лактесценов, силикна Асклепіадись. Apocynum Syriacum, seu Palustrinum, sive Aegyptiacum. Cluss. Hist. Apocynum Aegyptiacum floribus spicatis. Pit. Tournes. Ossar vulgo in Aegypto. Essula Indica quibusdam. Apocynum syriacum I. B. Apocynum Asclepias. Linn. VI. Жабья костка; Таина трана; а по переводу Собачья смерть, расшеть только въ теплыхъ странахъ, а здъсь въ нъкоторыхъ садахъ и цвътеть въ Іюль мъсяцъ. Она производить много зеленовашых в и шонкою шерсшью покрышых в сшеблей или лоз в в осмнати, ать вершков в вышиною, кошорые окружающся бълыми, длинными, широкими, полспыми, вдоль по стеблямъ сидящими, и равно какъ всъ прочія части сей травы бълымъ горкимъ сокомЪ наполненными листыями. Цвѣты на ней пурпуровые, однолисшные и колокольчистые, которые опадая, оставляють большіе, продолговатые и по два вмёств на шолстых и нагнутых в черешках в висяще

плода, каждый о двукЪ кожахЪ, изЪ коих верьхняя зеленая перепонистая, а из сподняя, узорчатая и шафраннаго цвъта. Сіи кожи им' волокнистое, и древесному моху подобное качество, а внутренность плода наполнена вся нЪкоторымЪ родемъ самой бълой и мягкой шерсии называемой (Houatte, Гуатте). ВЪ сей шерсти находятся маленькія, красныя, на пыквенныя похожія, и біловашою горькою кашкою наполненныя съмячки. Корень у нее толстый, длинный, и волокнистый. Сіе расшеніе им веть красивую наружность и стебель, и листья ея издають изв себя молоку педобный сокв. Размножение ее двлается изъ съмяни, и корня, й ежели ее зимою хорошо покрыть мохомъ, то можеть вь оныхь прозимовать. Листья будучи употреблены въ катапласмахъ или припаркахЪ, разбиваютъ всякія наружныя холодныя опухоли: сокв изв нихв прогоняеть коросту и другія нечистопы кожи, но волосы от него вылъзають. Онъ упо. требляется только наружно, ибо принятый внутренно причиняеть смертельные поносы. ВЪ Эгиптъ, гдъ сія трава растеть въ множествъ, жители набиваютъ свои перины находящеюся вЪ плодъ шерстью вмѣсто пуха. Есть многіе другіе роды сего расшенія, из плода коих в можно дълать такоежь употребление, какъ изъ здёсь описаннаго. Апоцинумъ есть Греческое отъ слова сто, противъ и исто, собака , происходящее имя , маюшь, что собаки оть нее окальвають. ВЪ Аптекахъ ничего изъ нее не дълають. ГосподинЪ Линней полагаеть ее вЪ V. классь расшеній, имвющихь цвъть пять тычковъ и два пестика. (Реп. tandria Digynia) а ГосподинЪ ТурнефортЪ въ I. классъ въ V. родъ травъ съ одноаистнымъ колокольчистымъ цвѣтомъ. По Гречески Атопичом у Кичорегом; по Нъмецки Hunds-Todt nan Hunds-Kohl; no Prantyски Apocin, Tue chien, ou herbe de la Houette; по Италіански Аросіпо; по Arлински Dogs-bane; по Арабски Beidelfar.

APOCYNVM ANDROSÆMI FOLIO Linn. Апоцинумь андроземи фоліо. Смотри Ароcynum Aegyptiacum, АпоцинумЪ ЭгиппіакумЪ.

APOCYNVM CANADENSE ANGV STIFOLIVM, FLORE AVRANTII. Mor. Hort. les. 232. Апоцинумь Канаденсе: aurycmuponiymb. prope Апранціи. Смощри Pseudo Ipocacuanna fusca, Псевдо-Ипокакуанна фуска.

APOCYNVN CANNABINVM Linn Апоцинумь каннавинумь Смотри Аросу. num Aegyptiacum, Апоцинумъ Эгипціакумъ.

APUCYNVM CVRASSAVICVM FI-BROSA RADICE, FLORIBVS AVRANTII CHAMÆNERII FOLIIS ANGVSTIORIBVS. Herm. Parad. Bat. Prod 213. Parad. Bat. 36. Pluk. Phytog. LXXXVI. 6. Апоцинумь курассаникумь, фигроза радице флорибусь Апранціи, хаменеріи фолінсь ангустіоривусь. и

APOCYNVM ERECTVM FOLIO OB: LONGO, FLORE VMBELLATO PETALIS. REFLEXIS COCCINEO, Cat. Iam. 89. Hist. i. 206. Tab. 129. Raii. Hist. iii. Arioцинумь Еректумь фоліо облонго, флоре умбеллато петались рефлексись кокцинео. Смотри Pleudo Ipecacuanna fusca. Псеудо Ипекакуанна фуска.

APOCYNVM ERECTVM INCANVM LATIFOLIVM ÆGYPTIACVM FLORIBVS CROCEIS. Par. Bat. 27. Tourn. Inft. 91. Ano. цинумь эректумь инканумь латифоліумь Эгипціакумь флоривусь кроценсь. ж

APOCYNVM ERECTVM MAIVS LA-TIFOLIVM ÆGYPTIACVM FLORE LV. TEO SPICATO. Breyn. Prod ii. 14. Pluk. Almag. 34. Апоцинумь эректумь маюсь Эхипціакумь флоре пупатифолічть тео спикато. Смопіри Аросупит Аедурtiac m, АпопинумЪ ЭгиппіакумЪ.

APOCYNUM ERECTUM SALICISLA. TIORI FOLIO VMBELLATVM, FLORI- BVS AVRANTIIS. Ejuld. Phytog. 138. Alтад. 36. Апоцинумь эректумь салицись паціори фоліо умвеллатумь, флоривусь Апранціись. Смотри. Pfeudo - Іросасиаппа fusca, Псеудо-Ипокакуанна фуска.

APOCYNVM FRVTESCENS, Linn As поцинумь фрутесценсь. Смотри Аросуnum Aegyptiacum, Апоцинумъ Эгиптіакумъ

APOCYNVM. LATIFOLIVM AM-PLEXICAVLE. Bauh. Hift. II. p. 135. Anoцинумь патифоліумь амплексикапле. Смотри Periploca Cynanchum, foliis cordato oblongis, Периплока цинанхумъ, фоліисъ кордато облонгисъ

APOCYNVM NOVÆ ANGLIAE SVB-HIRSVTVM RADICE TVBEROSA FLORI-BVS AVRANTIIS. Herm. Cat. Hort. Lugd. 646. Апоцинумь нопе Англів субгирсутумь, радице тубероза, флоривусь апранцінсь. Смощри Pfeudo - Іросасиаппа fusca, Псеудо - Ипокакуанна фуска.

APOCYNVM QVARTVM, ATTOLING нумь кпартумь. и

APOLYNVM REPENS, ATTOLUNYMB репленсь. и

APOCYNVM RETICVLATVM Linn. Апоцинумь ретикулатумь. Смотри Реriploca, Периплока..

APOCYNVM SCANDENS MONSPELIA-CVM SCAMMONEL FOLIIS ROTVNDIORI. BVS. Par. Bat. 54. Апоцинумь сканденсь Монспеліакумь скаммоней фолінсь ротундіоривуєв. Смотри Periploca, Периплока.

APOCYNVM SYRIACVM Offic. Mont. 37. Апоцинумь Спріакум!. Смотри Аросуnum Aegyptiacum, АпоцинумЪ ЭгинціакумЪ.

TERTIVM APOCYNVM LIVM Clus. Hift. I. p. 125. Anounnymb терціумь патифоліумь. и

APOCYNVM VENETVM Linn Anoцинумь Венетумь. Смотри Periploca Суnancham, foliis cordato oblongis. Периплока Цинанхумь, фоліись кордато облонгись.

APOLEGOSA, Аполегоза. Смотри Сісита, Цикута.

APOLEIVN, Anoneronb. Смотри Ри-

legium, ПулегіумЪ.

APOLLINARIS, Аполлинарись. Смотри Hyoscyamus, Гіоспіамусь.

APONICON, Апониконь. Смотри: Soldanella, Солданелла.

APOPECARECA, Апопекарека. и

APOPECARECARI, Апопекарекари:, Смотри Cucurbita, Кукурбита.

терва. Смотри Chamapitys, Хаменитись.

APOSTEMATICA HERBA, Апостематика герба. Смощри Scabiofa, Скабіоза.

APPLAVDA, Annanga. n

APPLVDA, Апплуда. Смотри Мі-

APRONIA, Апроніа. Смотри Bryonia,

APROXIS, Апроксись. Неприступъ трава.

APRI RADIX, Апри радиксь. Смо-

APRIMA, Априма. Смотри Cerala,

APROPARINA,, Апропарина. Смотривата, Бардана.

Menthastrum, Menmacinymb.

APRVPIPENTARIVM, Апрупипен-

APRVS, Апрусь Смотри Acorus Акорусь.

APYRENI Аппрени: Смотри Paffula.

minor, Пассула минорь

АРУКІОМ, Апиріонь. Гишпанскій пустовернь трава, или овощь Гишпанскій, безь зегень, есть родь Шпината.

AQVAESATVM, Акиесатумь. Смо-

AQVATICA, Акпатика. Смотри Саlamintha, Каламиниа.

AQVIFOLIA, Anusonia. ими

folium vulgo C. B. Pit. Tournef. Ilex aculeata, baccifera, folio finuato. C. B.

Ilex aquifolium Linn. XXXIII. Annin Tepнопникь, Сладкое, шакже Остролистное дерево; Острокропы нискаго рода или по Славенски Жолдь, есть деревцо или кустарникъ растущій въ глухихъ лъсахъ, въ колодных в спранах в, на твнистых в и пустых в мъстахъ и цвътущій въ Іюнь мъсяць. Онъ имъешь древесованый корень, кръпкій пынь, и жескіе сучья, покрывается двойною, гладкою клейкою , съ наружи зеленою , а внушри бълесоватою корою, которая содрана будучи съ дерева им веть непріяшный запахь. Дерево крыпкое шяжелое, аз внутреннее его качество видомъ сверьку бълое, а къ сердцу черноватое; лиспыя зеленые, подобны лавровымЪ, толькочто угловатые, и обсаженные вокругы колючими иглами. Цввть на немъ однолистный, на верьху на четыре лапачки разръзанный. бълый, а плодъ его есшь мягкая кругловатая, красная ягода, имвющая величину горо-шенки и сладкій притормный вкусь и соде-ржащая въ себъ ченыре маленькія продо-лгованыя косточки. Сте деревцо высадахь употребляется къ шпалерамъ и размно-жается чрез в свмя, которое размятчають вы мокромы пескы и свюшь вы Апрыль мъсяцъ бороздками. Естьми оно гдъ примется, то цвътеть всякое лъто, приносить съмяна свои въ ягодахъ и привыкаетъ скоро кЪ зимней стужъ. Лучшіе роды сего кустарника сущь I. съ гладкими; II. съ жескими; и III. съ пестрыми или позлащенными листьями: Многіе садовые охошники прививающь къ молодымъ инямъ дикаго Терновника бълые розоны, которые получають зеленоващый пвыть, но лишающся запаха. НЪжную зеленую его кору кладутъ въ погреба или зарывають въ сыроващую землю, въ которой оставляють ея двенатцать или четырнатцать: дней, дабы згнила, потомь вырывають и толкуть ее вы ступахь до шьхь порь, пока здвлается шьстомь, которое вымывають вь чистой во-ДT

дв и двлаюшь шакь называемый Пшичій клей, употребляемый для ловленія пинцъ. Лучшій должень бышь зеленовать, невонючь и неводянь Оно содержишь вы себь много масла и малую часть соли. Корень и кора размягчають, разбинають, укръпаяють, полезны от колики или раза въ животъ и употребленные вв декоктахв отв застарълаго кашля. Въ водъ вареные и вмъсто питья употребленные листья прогонякошь кашель и колотье въ бокахъ, истодченные въ порошокъ гонять они мочу. и камень и служать оть желтухи; а свъжіе наложенные на ноги унимающь вы нихы опухоль. Кора сЪ корня, будучи истолчена, варена, и приложена, разбиваетъ шишки и опухоли, и умягчаеть вывихнушые и окръплые члены. Аквифоліумъ и Агрифоліумъ сушь Греческія имяна, происходящія отв слова акіз, острее, и филлог, листъ, потому что листья сего деревца острые. ГосподинЪ Линней полагаеть оное въ IV. Классь расшеній, им вющих в в своем в цв втів чептыре тычка и два пестика (Tetrandria Digynia) a ГосподинЪ Турнефорнів вЪ XXI. Классь, во И. отделение, вы IV. родъ кустарников в съ однолистным в плоским в цввтом в, котпорато пестикъ превращается въ ягоду. По Гречески 'Ауруфиллог; по Нъмецки Sted)= Palmen, Stechbaum; Palmen oder Wald-Diftel; Dilft; по Француски Houx; по Иппаліан ски Agrifoglio o Nespole Seluaggio; по Arлински The Holly-tree; Holy-oak, Holm.

AQVI

AQVILÆ VNGVIS, AKHUNE YHTHICE. Смотри Fceniculum aquaticum, ФеникулумЪ

аквашикумЪ. AQVILAI PRAVA, Achunan праца. Смоніри Agallochum, АгаллохумЪ.

AOVILARIS, AKUNTAPUCE, CMOTTPH Chelidonium majus, Хелидоніумь маюсь.

AOVILEGIA. Trag. Fuch. Annuneria. Aquilegia vulgaris Linn. Aquilegia syluestris. C. B. Pit. Tournefort. Aquilegia flore simplici. I. B. Aquileja. Fuch. Aquileia simplex. Cam. Aquilina. Matth. Ad. Lob. Isopyrum.

Dioscoridis Colum. Opanku, Голувки; Капалерскій цпвтв или колокольчики, есть цвъточное произрастение, растущее здёсь въ садахъ, а въ шеплыхъ спранахъ на гористых в мъстакъ, и въ лъсахъ, но ръдко, и нвътущее въ Іюнъ и въ Іюль мъсяцахъ. Орлики сушь прекрасные цвъ точки, которые какЪ по наружности своего вида, такъ и по различности цвъта бывають многихь родовь: ибо нъкоторые изъ них висять наклоненные кв низу, другіе обращенные кЪ верьку; иные имъютъ подобіе колокольчиковЪ, а другіе расположены опяпь звъздкою или Розономъ. Чтожъ касаения до красокЪ, що бываютъ они красные, пурпуровые, голубые, совствъ бъ лые, красные св былымв, голубые св бы лымЪ, бълозеленоватые и тълеснаго цвъта, также одинакіе и мохровые. Корень их в толщиною вв палецв, былый, окружается волокнами, имбеть сладкованый вкусь и производинь тонкій, прямый, ма**денькими** волосками покрышый, на многія вышви раздылющися, и колычатый сте бель или прушь въ девянь вершковъ выши ною, который окружается широкими, тупыми, черенястыми, на листья травы Ластовицы (Chelidonium majus, Хелидоніумь маюсь); похожими, зубчашыми, на шри часши чрезъ два глубокіе връза раздъленными, въ верьху шемнозелеными маленько голуб вощими, а въ низу св в пло зелеными дистьями; и производить изв своей и каждой въточки вершинъ красивые, изъ няши разновидныхъ листочковъ составленные и внизу закорючками окончивающіяся цвёты, которые опадая, покидають маленькіе, продолговашые, по нъскольку вмѣстъ изъ одного основанія выходящіе, шелухою обведенные остроконечные, и на подобіе пальцовъ къ верьху стоящіе бль. дно-зеленые стручечки, заключающие вр себъ, есшьли цвъшы пестрые или разноцвътные, пестрые, а естьми цвъты оди накаго

d-

u,

ree

хЪ

HO

八岁

B-

TO

32.

3 15

rie

0-

0-

·B

a.

B-

Ba

B-

HB

Va

IH

a-

R

e.

1-

BI.

)-

a

N

10

b

6

накаго колера, черныя лоснящіяся, преугольныя съмячки. Сін цвъпы съють весною, въ хорошей сыроватой земат и солнцу не очень подверженных в мъсшахъ. Они размножающся шакже чрезъ коренья, копторые можно отдълять и пересаживать осенью. Примъчать надлежить, что посъянныя весною съмяна не прежде производящъ цвъты, какЪ на будущемЪ году. Бѣлыя Орлики предпочищающся всемъ прочимъ, попюму что происходящие от их в съмянь цевшы, весьма перемвняющся и обыкновен. но бывающъ многоколерные. По примъчаніямЪ Гоєподина Линнея колокольчики троякимЪ образомЪ наполняются. І. умноженіем в пешаль или цв в ть составляющих в листочковь. II. умноженіемъ нектарій или медовых в, или сочных в сосуднов в без в цевшных в мисточновь; и III. умноженіем в нектарій при пяти остающихся петалачЪ, и между оными прехъ некпарій, взаимно одинЪ другаго истребляющихЪ. ВЪ Медицинъ употребляють одни голубыя орлики х которыя разбивають запвердълости вь печени и селезенкъ, гоняшъ мочу, пошъ и мЕсячное у женщинЪ, прошивящся гнилости и цынгв, унимають жарь и полезны оть желчи, рёзу въ животь, рань и оть чептверодневных в лихорадок в Перегонная съ цвътапи вода почитаещся преизящнымъ средсивомъ укръплянь сердце, и въ обморокахЪ. Сѣмя шолкушЪ вЪ порошокЪ и размёшавь вь виноградномь винь даюшь малымЪ дъшямЪ ошЪ родимчика въ количествъ четвертой части золотника; также принимають его и женщины по цълому золошнику въ шяжелыхъ родахъ. Оно производить поть, сущить, постъществуеть высыпанію кори и оспы, и полезно въ горячкахЪ и ошЪ круженія головы. Выжашый изъ шравы сокъ, есшьми его держать нъсколько времяни во рту, полезень от цынгошной гнили въ деснахъ, отъ гортанныхъ и въ роту случающихся ранъ и нарывовъ, и у дъщей отъ молошницы, а когда налипы

онаго не много на хлопчащую бумату, и воткнушь в в нось, що помогаеть от фистуль въ оном в. Приняшьй во внушренность полезен в въ сухотной и съ кашлемъ соединенной лихорадкъ. Вода, въ которой варена трава, составляеть хорошое полоскание опть воспаления горла. Гишпанны жують орлики всегда по утрамъ для предохраненія себя от в каменной бол взни. ВЬ Апшеках в дълающь сиронь, уксусь, тинктуру, и держать цвёты, сёмяна оть голубых в колокольчиков в и перегонную изв них в воду, а въ прежніе времена и чрезъ пережиганіе из всей правы получаемую соль. Аквилегіа, Аквилеіа, и Аквилина супь Лашинскія имена происходящія от слова Аквила, орель, по тому что закорючившіеся на концах в цввтные листочки, походять нъсколько на Орлиной носъ. Господинъ Линней полагаешъ ихъ въ XIII. классь расшеній имбющих в в своем в цввив двашцать и болве шычковь св пятью женочками вмъстъ. Polyandria Pentagynia) а Господинъ Турнефорть вы XI. классь, во III. ощдъленіе, въ IV. родь деревь и кустарников в съ многолистнымъ, разноподобнымъ, колокольчистымъ пвътомъ. По Гречески Повос; Кибочес Διοσάνθος μλη Ισόπυρον; πο Η Επεμκη Platen: Picfe= leien-Blumen; Aglen- locklein; Habergift Enriacks Rraut; но Француски Ancolie; по Италіански Ancolia; по Атлински Columbine.

AQVILEGIA ALPINA Linn. Акии.

AQVILEGIA SYLVESTRIS, ARIUneria cunnecmpuch. u

AQVILEGIA VULGARIS Linn. Armaneria nyarapuch. Cmompu Aquilegia, Arabaria.

AQVILEIA, Акпилея. и AQVILENA, Акпилена. и

AQVILENEGAZA, Акциленегова. и AQVILINA, Акцилина. Смотри Aquilegia, Аквилегіа.

ARABICVM GVMMI, Арабикумь гумми. Смотри Gummi Arabicum, Гумми Арабикумъ.

ARA-

ARABIS, Apaeuch. Смопіри Draba, Драба.

ARABIS TVRRITA Linn. Apasuch туррита. Смотри Turritis, Турритисъ.

ARABIS QUORVNDAM, Apaeuch кпорундамь. Смотри Егуптоп, ЭризимонЪ.

ARACHA, Apaxa. Cmompu Anethum, АнетумЪ.

ARACHIDNA, Apaxugua. Cmompu Vi сіа, Виціа.

ARACHIDNA THEOPHRASTI, Apaхиона Теофрасти. Смотри Chamaebalanus, Хамебаланусъ.

ARACHIDVM, Apaxugymb. CMompu Dentaria Orobanche, Aenmapia Opobanxe.

ARACHV, Apaxy. CMompu Anethum,

АнешумЪ.

ARACHVS SIVE CRACCA MINIMA. Ad Lob. Арахусь или Аракусь. Aracaus. Lugdun. Arachus altera, Dod. Gal. Vicia parua siue Cracca minor cum multis siliquis hirlutis. I. B. Vicia legetum, cum filiquis plurimisshirlutis. C. B. Pit. Tournes. Vicia Craccal Linn. Vicia minima vel quarta. Trag. VI. Мышій или Дикій Журанлиный Горохь, а по Славенски Пыро, расшеть во ржи, на пашняхъ, возав заборовъ, по плотинамъ и въ огородажь и цвётеть вы исходъ Маія мвсяца. Трава походишь на тороховую; только что меньше и имветь маленьки корешокЪ, производящій нѣсколько тонкихЪ, слабых в пятнами испещренных в и на въточки раздъляющихся стеблей, окружающихся маленькими, ускими, зелеными, и попарно другь прошивъ друга сидящими, длисточками. На концах в въточек в находятся выходки, коими он в прицепляющся ко ржи и другим в возав них в распущим в правам в. Пвыши похожи на тороховые, быленкие стручковатые и соединенные по пяти или шеспи вмЪстъ на подобіе колоса. Послъ цвъщовъ вырастають мохнатые и круглыми бълесоващыми свинчками наполненные стручечки. ВЪ Медицинъ употребляють одно съмя, но и

то рѣдко. Оное внутренно укрѣпляеть, а наружно употребленное въ припаркахъ, разбиваеть. Въ Аптекахъ ничего изъ нее не дълають. Господинь Линней полагаеть се въ XVII. классъ растеній имъющихъ вь своемь цвьть десять тычковь изь двой наго основанія, яко бы изЪ двойной машки вырастающих b. (Diadelphia Decandria.) а Господинь Турнефорть вы Х. классь, вы И. отдыленіе, въ VIII родь деревь икустарниковь сь многолиспиным в многоподобным в цв в том в. По Гречески Асанос; по Нъмецки 20 і. де; Dicten; no Француски Vesse sauvage ou Velferon; по Италіански Veccia seluatica o Arachnon; по Аглински Strangle . Tare or Wild Vetch.

ARACHVS LATIFOLIVS, Apaxycb namuponiych. Cmompu Orobus Syluations, Оробусь силватикусь.

ARACION, Apauionb. Смотри Barda-

па. Бардана.

ARACINCALON, Арацинкалонь. Смотри Aristolochia donga, Аристолохіа лонга.

ARACON, Aparonb. CMomph Capillus

Veneris, Капиллусь Венерись.

ARACVS. Apakycb. Смотри Arachus, Apaxycb; u Faba tyluestris, Фаба силвестрисЪ.

ARACVS AROMATICVS, Apakych Ароматикусь. Сметри Vanilla, Ванилла.

ARAHAR, Aparaph. Смотри Вассае

Iuniperi, Банце Юнипери.

ARALDA BONONIENSIVM, Apantда Бононіенсіўмь. Смотри Campanula (у)vestris flore luteo, . Кампанула силвестрись флоре лушео.

ARALIA Linn. V. Aparia MAN AAтильникь ягоды принесящій из БКанады. По Гречески 'Ανγελική εξηνοφόξος τέ Καναδά; по Нъмецки Ungelica aus Canada; по Франпуски Angelique du Canada, qui porte des bayes; по Ишаліански Aralia Pianta del Canada; по Аглински Aralia, an Canadian Plant.

ARALIA FOLIIS TERNIS TERNA-TIS. Gronov. Flor. Virginic. Clayt. P. I. p. 35. Араліа фолінсь тернись тернатись. и

ARA

ARALIASTRVM FOLIIS TERNIS QVINQVEPARTITIS, Apariacmpymb \$00 пінсь тернись кпинкпепартитись; и

ARALIASTRVM FRAGARIAE FOLIO MINVS. Vall. Serm de struct. flor. p. 43. Арагіаструмь Фрагаріе фоліо минусь. Смотри Ninzin. Нинзин.

ARANGIA, Aparria. Смощри Aurantia, Авранціа.

ARANSA, Apanca n

ARANSII, Apanciu. Смощри Aristolochia rotunda, Аристолохіа ротунда.

ARANTHILLIDA, Apanmun nuga. Смотри Аграгадия, Аспарагусъ.

ARANTIA, Apanuia. u

ARANTIVM., Аранціумь. Смотри Aurantium, АвранціумЪ.

ARAPOSSA, Apanocca. Cmompu Flores

Sambuci, Флоресь Самбуци.

ARARA Clusii. Apapa, есть Американской, на нъкошоромъ и по сіе время еще не описанномъ деревъ, на Францускомъ островъ Каеннъ растущий плодъ, покрывающійся черною и посредственно крѣпкою ко-Ркою, имъющій продолгованный видъ и висящій на длиньомъ черешкъ, на которомъ находящіяся неравности кажутся быть м'встами бывших в на оном в цв в тов в. Сей плодъ содержить въ себъ черный оръхъ величиною съ дикую оливку. Оный размятчаешь, а плодь раздавливають и варять декокть, которымь вымывають застарыя раны. Сей плодъ хранишся въ Европъ за РЪдкость. По Гречески Арада, Картов Аме. диахов; по Нъмецки Urara eine Umericanische Brucht; по Француски Arara, fruit de Cayenne; по Ишаліански Arara, frutto dello America; по Аглински Arara, an American

ARARISTA, Apapuema. Cmompu Ari. Rolochia longa. Аристоложіа лонга. Адпия саятия, Агнусь кастусь. Yacma I.

ARASANTHA, Apasanma. Cmompu Helleborus abus, Теллеборусь албусь.

ARASIM, Аразимь. Смотри Enula, Энула.

ARASTADE, Apacmage. Смотри

ARASTION, Apacmionb. Смотри Nastuftium, Hacmypujymb.

ARAZATA, Apasama. Смотри Helle-

borus albus, Геллеборусь албусь.

ARAZET, Apasemb. Смотири Nafturtium, Hacmypujymb.

ARBOR ABRAHÆ, Apropb Aspare. CMOMPH Agnus castus, Arnych kacmych.

ARBOR AMERICANA FRAXINI FO. LIIS, Арборь Американа фраксини фолінсь. Смотри Іијива Indica, Ююба Индика.

ARBOR AMERICANA PINNATIS FRAXINI FOLIIS, Aproph Американа пиннатись фраксини фолись. Гишпанская ясень дерено. По Гречески издіа, domanian; no Homenku Die Spanische Esche; по Француски Frêne d' Espagne; по Италіански Fraffino di Spagna, The Spanish Ash - tree.

ARBOR AMORIS, Aproph amopueb.

Смотри Siliquastrum, СиликваструмЪ.

ARBOR ANTISCORBUTICA, Apropb Антискорбутика. Смотри Pinus fyluestris.

Пинусъ силвестрисъ. ARBOR BACCIFERA LAVRIFOLIA AROMATICA, FRVCTV VIRIDI, CALY-CVLATO, RACEMOSO, Philosoph. Tranfact. N. 192. p. 465. Cat. Iam. 165. Sloan. Ній. іі. 87. Тав. 191. Арборь бакцифера паприфоліа, ароматика, фрукту пириди, калик глато, рацемозо. Смотры Canella alba, Канелла алба.

ARBOR BALSAMIFERA BRASILIEN-SIS FRUCTU MONOSPERMO. Rai. Hift. Арьорь Балсамифера Бразиліенсись фрукту моноспермо. Смотри Capivus, КапивусЪ.

ARBOR BALSAMIFERA PERUVIANA. Арворь Балсамифера Перупіана. Смотри ARBOR BALSAMIFERA TOLVTANA Ions. Dendr. 308. Арборь валсамифера Толутана. Смотри Balsamum Tolutanum, Балсамумъ Толутанумъ.

ARBOR BENZOINDERA, Aproph

Бензоиндера. или

ARBOR BENZOINIFERA. Breyn. Prod. ii. 16. Арборь Бензоинифера. Смотри Вепzoinum, Бензоинумъ.

ARBOR BRASILIA, Арборь Брази-

ліа. Смотри Fernambuc, ФернамбукЪ.

ARBOR BRASILIENSIBVS GVMMI ELE-MI SIMILE FVNDENS, FOLIS PINNATIS. Raii. Hist. ii. 1546. Apeopb Epasuniencutych rymmu snemu cumune hyngench, honiuch nunnamuch. Cmompu Prunus Iauanica Atriplicis foliis, Прунусь Яваника Атриплицись фоліись.

ARBOR CACAVIFERA, Apropb ка-

капифера. Смотри Сасао, Какао.

ARBOR CADIRE, Apropb kagupe.

Смотри Агеса, Арека

ARBOR CAMPHORIFERA Iaponica. Breyn. Cent. ii. Prod. i. 4. Арворь Камфори-фера. Смотри Сатрногівета, Камфорифера.

ARBOR CAMPHORIFERA, SVMATRA-NA GRIMMII Raii. Hist. II. 1679. Арворь Камфорифера, Суматрана Гриммін. Смотри Camphora arbor Sumatrana, Кам-Фора арборь Суматрана.

ARBOR CANELLIFER A INDICA, COR-TICE ACERRIMO, VISCIDO SEV MVCL LAGINOSO, Арборь Канеплифера Индика, кортице ацерримо, писцидо сень муципатинозо. Смотри Cassia lignea com-

munis, Kaccia Aurhea коммунисЪ.

ARBOR CANELLIFERA MALABARI-CA, CORTICE IGNOBILIORE. Breyn. Prod. ii. 18. Арторь Канеллифера Малаварика, кортице итнобиліоре. Смотри Cassia lignea Offic. Kaccia Лигнеа Оффиц.

ARBOR CANELLIFERA ZEYLANICA, CORTICE ACERRIMO SEV PRAESTAN-TISSIMO. Breyn. Prod. II. 17. Apropb Ka-

неллифера Цейланика кортице ацерримо сепь престантиссимо. Смотри Сіпатотит, Цинамомумъ.

ARBOR CASSIAM SOLVTIVAM; FERENS. CMompu Cassia fistula, Kaccia pu-

стула.

ARBOR CHILLI, Hern. 50. Cap. 10. Aproph Xunau. Cmompu Cortex Peruvianus, Kopmerch Перуванусь.

ARBOR CINAMOMI, Арворь Цинамоми. Смотри Сіпатотит, Ідинамомумъ.

ARBOR CIMICVM, Арворь Цими, кумь. Смотри Fraxinus, Фраксинусъ.

ARBOR COSTA, Арборь коста. Смо-

ARBOR CREPITANS, Aproph, kpe-

питансь. Смотри Нига, Гура.

ARBOR, CVIVS CORTEX GINGIBER-AEMVLATVR. Læt. 24. Aproph, kynch kopmekeb гингиберь емулатурь. Смотри Canella alba, Канелла алба.

MURIGERA CMOMPH Dactylus, Дактикусь

ARBOR DE RAIZ. Аркорь де раизь. Смотри Ficus Indica, Фикусь Индика.

ARBOR DRACO, Apropb Aparo

Смотри Draco arbor, Драко арборъ.

ARBOR ERYS PELAS CVRANS, Apворь еризипелась курансь. Смотри Pauate, Павате:

ARBOR EXCELSA, CORYLI FOLIO AMPLIORE, Aproph excuenca, корили фоліо ампліоре. Смотри Агеса, Арека.

ARBOR EXOTICA FRVCTV DACTY-LIS SIMILI. C. B. Pin. 508. Appopb ex30muxa ppykmy gaxmunuch cumunu. CMOmpu Palma oleofa, ITanma oneo3a.

ARBOR EXOTICA LENTISCI FOLIO.
С. В. Ріп. 399. Арборь екзотика лен.

тисци фолю. Смотри Веп. БенЪ.
ARBOR EXOTICA SPINOSA FOLIS
LENTISCI. С. В. Ріп. 399 Арборь екзотика спиноза фолінсь лентисци. Смотри

Bondac, Бондукъ.

AR.

ARBOR EX SVRINAMA, SIVE AMERICANA, MYRTI LAVREÆ FOLIIS, ELE-MI RESINAM FVNDENS. Breyn. Prod ii. 19. Aproph эксь Суринама, сипе Американа, мирти папрее фоліись, элеми резинамь фунденсь. Смощри Prunus Iauanica Atriplicis foliis, Прунусъ Яваника Атриплицись фоліись.

ARBOR FARINIFERA. Park. Theat. 1646. Aproph papunupepa. Cmompu Sagou,

Cary.

44

10

)-

M-

00

S,

1=

40

00

6-

60

ARBOR FEBRIFVGA PERUVIANA. Ions. Dendr. 476. Арборь феврифуга Перупіана. Смотри Соттех Регичіания, Кортексъ Перувіанусь.

ARBOR FERVLACEA, Арворь ферупацеа. Смотри Sagapenum, Саганенумъ.

ARBOR FOETIDA, Арборь фетида. Смотри Frangula, Франгула.

ARBOR FRAGIFERA, Aproph pparu-

фера. Смотри Fragaria, Фрагаріа.

ARBOR FRAXINEA, Арворь фраксинеа. Смотри Sorbus Tyluestris, Сорбусъ силвестрисъ.

ARBOR FRAXINI FOLIO FLORE COERVLEO, Арборь фраксини фоліо флоре церулео. Смотри Azedarach, Азе-дарахь.

ARBOR GLANDIS, Арборь гландись. Смотри Quercus, Кверкусь.

ARBOR GOA, Арворь гоа. Смотри

Opuntia, Опунціа.

ARBOR GRANA VIRIDIS, Арборь грана пиридись. Смотри Terebinthus, Теребинтусь.

ARBOR IN AQVA NASCENS, Apcopb unb axua nacyench. Смотри Suber, Суберь.

ARBOR INDICA, Арборь Индика. Смотри Carcapuli, Каркапули.

ARBOR INDICA ADMIRABILIS, Арворь Индика адмиравились. Смотри Ficus Indica, Фикусь Индика. ARBOR INDICA COCCVLOS OFFI-CINARVM FERENS. Breyn. Prod. ii, 19. Арборь Индика коккулось оффицинарумь ференсь. Смотри Cocci Orientales, Кокци Оріенталесь.

ARBOR INDICA, FOLIIS IVGLAN.
DIS, FRVCTVS NVCIS MAGNITVDINE,
Approph Unguka, poninch winanguch,
ppykmych nyunch marnumygune. Cmompu

Ambare, Ambapé.

ARBOR INDICA, FRVCTV CONOIDE, CORTICE PVLVINATO, NVCLEVM VNICVM, NVLLO OSSICVLO TECTVM, CLAVDENTE Rai. HIst. ii. 1566. Apropb Unguka, ppykmy kohonge, kopmune myamuhamo hykneymb yhukymb, hynno occukyno mekmymb, knangehme. Cmompu Anacardium, Ahakapaiymb

ARBOR INDICA, QVÆ GVMMI GVTTÆ FVNDIT, FRVCTV ACIDO, SVLCATO, MALI MAGNITVDINE. Commel.
Flor. Mal. 66. Aproph Unguka, khe rymmm rymme фундить, фрукту ацидо,
сулкато, мали магнитудине. Смотри

Cambogium, Kamboriymb.

ARBOR INSANIÆ CARAGNA NVN-CVPATA, Hern. Арборь инсанів, каратна нункупата. Смотри Сагаппа, Каранна.

ARBOR IOVIS, Aproph founch. Cmo-

три Quercus, КверкусЪ.

ARBOR IVCADICE. Nieremb. 294. Арборь юкадице. Смотри Canella alba, Канелла алба.

ARBOR IVDÆ, Aproph 10ge. CMompu

Siliquastrum, СиликваструмЪ.

ARBOR LANIGERA, Арборь ланигера. Смотри Gossampinus, Госсампинусъ.

ARBOR LAVRIFERA, Aproph naupus

фера. Смотри Laurus, Лаврусь.

ARBOR MANGIFERA. Bont. 95. Ions. Dendr. 72. Aproph мангифера. Смотри Manga, Манга.

ARBOR MARIÆ, Арборь маріе. Смо-

ARBOR MARIS, Арборь марись. Смощри Corallina, Кораллина.

ARBOR MELONIFERA, Aproph me-

жонифера. Смотри Рарауа, Папая.

ARBOR MEXICANA FRVCTV CA-STANFÆ, COCCIFERA. C. B. Pin. 419. Арборь Мексикана фрукту кастанее, кокцифера. Смотри Orleana, Органа.

ARBOR MISTICÆ PROVINCIÆ FRV-CTV AVELLANÆ SIMILI. Laet. 260. Арборь Мистице пропинціе фрукту анеллане симили. Смотри Sapindus foliis costæ alatæ innascentibus, Саминдусъ фоліисъ косте алаше иннасцентибусъ.

ARBOR MONTANA, Apeopb mouma-

на, Смотри Genista, Гениста.

ARBOR PALLADIS, Aproph Паппаqueb. Смютри Olea, Олеа.

ARBOR PARADISAEA, Apropb napa-

дизеа. Смотри Thuia, Туя.

ARBOR POMIFERA, FRVCTV ACV-LEATO MELONIS MAGNITVDINE, Apsopb помифера, фрукту акулеато, мелонись магнитудине. Смотри Durio, Дуріо.

ARBOR POPVLO SIMILIS RESINOSA. Appopt nonyro cumuruch pesunosa. Cmo-

три Тасатаћаса, Такамагака.

ARBOR QVERCI FORMIS BVTYRA-CEO FRVCTV, Арборь кперци формись тутирацео фрукту. Смощри Persea, Персеа.

ARBOR REGVNDORVM FINIVM, Apmopb peryngopymb puniymb. Cmompu Orleana, Opaeana.

ARBOR SAPIENTIAE, Apropb cani-

енціе. Смотри Betula, Бетула.

ARBOR SAPONARIA, Арворь сапонаріа. Смощри Sapindus foliis Costae alatae innascentibus, Сапиндусь фоліись косте алате иннасценнибусь.

ARBOR SASSAFRAS MONARDI Breyn. Prod. i. 18. Aproph caccappach Monapgu.

Смотри Saffatras, Сассафрасъ.

ARBOR SCORBVTICA, Арворь скорвутика. Смощри Рісеа, Пицеа.

ARBOR SILIQUOSA VIRGINIENSIS,
Appopt силикноза Виргиніенсись. Смотри

Pleudo - Acacia, Псевдо - Акаціа.

ARBOR SPINOSA INDICA MVRICA-TIS SILIQVIS. Park. Theat. 1551. Арворь спиноза Индика мурикатись силикпись. Смощри Bonduc Бондукъ.

ARBOR TABAXIR, Aproph marancuph.

Смотри Ватьон, Бамбу.

ARBOR THVRIFERA, Aproph mypn.

фера. Смотри Rhus, Русь.

ARBOR TRISTIS. Garz. Acoft. Apropt mouemuch. Ny Eanthes arbor triftis. Linn. Печальное дерепо, есть Индіанское пь Малабарв, Гов, и около приморских в городовъ Мингролы, Шаула, Дамана, Басаима и Бомбе, распущее дерево названное Португальнами печальнымъ, потому что цв в точью. Когда солнце заходить, то нёть на немь ни одного цвётка; но смустя полчаса все оно ими покрываения. Духъ отъ нихъ пріятный, но бытіе продолжается только до возхожденія солнца, при котором в одни опадають, другіе сжимаются; и сіе происходить чрезь весь круглый годь. Дерево величиною будеть сь сливное и имветь тонкіе сучья, которые мъснами раздъляющся на маленькія колвица, изъ коихъ вырастають по два большіе, зеленые, широкіе, мягкіе, и на померанцовые похожіє листа, окружающіе красивые бълые, душистые, звъздкою расположенные и изЪ красноващой осмилапочной чащечки выходящіе цвёты, послё коих в показывающся перепонисшыя шишечки, или съмянодержательницы съ волчей 606Ъ (Lupinus, ЛупинусЪ) величиною, которыя заключають вь себь быленкія, зеленою горькою кожуркою обведенныя и сердцевидныя свиячки. Дерево въ Азіи садянь о быкновенно на дворахъ для запаху и півни. Оно расшеть скоро и выпускаеть изъ корня MHO-

整

множество отростковь, кои хотя и не выше осмынатцати вершковь, производять однакожь столькоже цвыта, какь и самыя Алинныя въшви. Португальцы цвъть употребляють вь кушаніяхь вмісто шафрана, я для подкрашиванія оныхъ. Они считаются способными укрѣплять сердце, и унимать воспаление въ глазахъ. Господинъ Линней полагаеть сіе дерево во II. классь деревь имъющихь вь своемь цвыть два тычка и одинь песпикъ (Diandria Monogynia). По Гречески δένδζον, λυπησόν τε μαλαβάςη; по Ηвмецки Der Traurige Baum in Maiabar; по Француски Arbre trifte; по Ишаліански Albero tristo del Malabar; по Аглински The heavy or fad-trée of Malabar. по Гишпански Dama de noche; по Турецки Gul; по Арабски Guart; въ Канаринъ Parisataco; въ Малав Singadi; а въ Декаnt Pul.

ARBOR VRSI, Aproph ypcu. CMompu

Sambucus, СамбукусЪ.

ARBOR VASTA IN REGNO FANFVR, Арборб паста инь регно Фанфурь. Смо-

mpn Sagou, Cary.

ARBOR VIRGINIA CITRIÆ VEL LI-MONIÆ FOLIO BENZOINVM FVNDENS Hortus Amstel. i. 187. f. 97. Aproph пиргиніана цитріе пель лимоніе фоліо. вензоинумь фунденсь. Смотри

ARBOR VIRGINIANA PISAMINIS FO-LIO BACCATA, BENZOINVM REDO. LENS, Pluk. Almag. 42. Aproph Bupin. ніана пизаминись фоліо, вакката, вензопнумь редоленсь. Смотри Вепгоіпит, БензоинумЪ.

ARBOR VITÆ, Aproph nume. CMO-

mpn Thuja, Tya.

ARBOR VITIS ET LACHRYMA Ioppi. Арворь питись эть лакрима. Смотри Nux vesicaria, Нуксъ везикаріа.

ARBOR VULPIS, Aproph пулпись.

Смотри Liquiritia, Ликвириціа.

ARBOR YMENSIS FRVCTVM COFFÉ FERENS. Dougl. p. Aproph Umencuch ppyктумь коффе ференсь. Смотри

Коффе. ARBVTVS. Matth. Dod. Aprymych. Arbutus folio ferrato. C. B. Pit. Tournef. Arbutus Vnedo. Linn. Comarus Theophrasti. I. В. IV. Ежопка дерево, по Славенски Хирастіе; земляничное дерево, а плодЪ его авсное яблоко. Оно расшеть вы авсахь и на горахъ, и цввшешь въ Іюль мъсяцъ. Пънь его покрышъ жескою, и разщелившеюся корою и выпускаеть по бокамь множесшво кЪ концамЪ красноващых в сучьевЪ, окружающихся продолговащыми, широкими, гладкими, по краямЪ зазубристыми, зелеными и на лавровые похожими. лисшьями и бълыми, съ одной стороны иногда пурпуровыми, однолисиными и кисточками вися: щими цввтами; послв коихв вырастають плоды подобные видомъ земляникъ, только больше, круглые, многош вльные, до поспълости желтыя, а потомъ свътло красный цввшв получающие. Они имвюшв суровый вкусь и раздълены внутри на пяшь. тивадь, вв коихв заключають продолговашыя сёмячки. Лисшья и кора вяжушь, и унимають понось вы декоктахь употребленныя: можно ихЪ шакже упошребляшь и въ горлополоскательных в водахъ, а цвътъ почитается полезным в разбивать худыя мокроты Плодъ въ желудкъ не легко переваривается, и причиняеть вы немы боль, чего ради и производять многіе. Латинское его имя (Vnedo Унедо) от в словв унумъ едо, одинъ вмъ, потому что онъ вредишь, ежели болье однаго сывшь. Дрозды до них в очень падки: сего дерева. еще есть другій сорть, который растеть на островъ Кандіи, гдъ вырастаеть онъ до чрезвычайной вышины и приносишь черно красный, и величиною маленькому яблоку подобный плодв, копюрый мягче, и вку-

сом в пріятиве, нежели нашв. Господин в

Линией полатаеть оное въ Х. классъ ра-

спеній, имъющимь вы своемы цвыть де-

CHIES.

сять мужчинок в и одну женочку (Decandria Monogynia) а Господинъ Турнефортъ въ XX. классь вы I. отделение вы VIII. роды деревы сь однолисшиым в колокольчисшым в цвв шом в. Πο Γρεчески δενδρον πενταφιλλον Κομαρον λαγόисмог; по Нъмецки Erdbeers Baum; по Француски Arbousier; по Италіански Albatro и Corbezzolo; по Атлински The ffraw-berrytrée.

ARBUTUS ANDRACHNE Linn. Appyтусь андрахне. Смотри Andrachne, Андрахне. ARBUTUS ALPINA Linn. Apsymych CATTUHO. W

ARBUTUS DISCORIDIS VERA CO-MARA DICTA. Wheel. itin. 452. Apsymych Діоскоридись пера комара дикта. ч

ARBUTUS FOLIO NON SERRATO С. В. Ріп. 460. Арбутусь фолю нонь серрато. Смотри Adrachne, Адрахне.

ARBVTVS FOLIO SERRATO. C. B. Pit. Арбутусь фоліо серрато. ч

ARBUTUS HUMILIS VIRGINIANA

Арбутусь тумились Виргиніана, и

ARBUTUS VNEDO Linn. Apsymych унедо. Смотри Arbutus, Арбутусь.

ARBVTVS UVA VRSI Linn. Apryтусь упа урси. Смотри Arbutus, Арбутусь, и Vua vrfi, Ува урси.

ARCANDROS, Aprangpoch. Cmompu Pyrethrum, ПиретрумЪ.

ARCALON, Apranonb. Cmompu Aristo-

lochia longa, Apucmozoxia zonra.

ARCANVS DAEMONIS, Apranych демонись. Смотри Iris Illyrica, Ирисъ Иллирика.

ARCELLA, Арцепла. Смотри Agrimo-

піа. Агримоніа.

ARCEVTIS, Арцептись. Смотри Agrimonia, Агримоніа.

ARCEVTIS, Appleymuch. CMompu Iu-

пірегия, Юниперусь-

ARCHANGELICA, Архантелика. Смотри Angelica, Ангелика, и Trachelium, ТражеліумЪ.

ARCHANGELICA ALBA, Apxanteлика альа. и

ARCHANGELICA LVTEA, Apxan гелика лутеа. Смотри Lamium, Ламіумь.

ARCHANGELICA QUARTA, Apxano телика кпарта. Смотри Angelica, Ангели-

ARCHAR, Apxapb. Cmompu Bacca Lauті, Бакка лаври.

ARCHARAS, Apxapach. Cmompu Ca.

тапапсе, Кашананце.

ARCHENCHARA, Apxenxapa. CMO. три Pyrethrum, ПиретрумЪ.

ARCHESOSTIS, Apxesocmuch. CMO-

три Bryonia, Бріоніа.

ARCHIOTL, Apxiomab. CMompu Or-

leana, Орлеана и Vrucu, Уруку.

ARCHITHYRSVS, Apxumupcych. CMOтри Corona Imperialis, Корона Имперіались.

ARCIVM, Apuiymb- Cmompu Bardana,

ARCTIVM LAPPA Linn. Aprily Mb Лаппа. Смотри Bardana maior, Бардана maiopb.

ARCTIVM PERSONATA Linn. Apкціумь персоната. Смотри Personata, пер-

сонаша.

ARCONDOS, Aprongocb. Iuniperus, ЮниперусЪ; и Pyrethrum, ПирешрумЪ.

ARCONTELLA, Арконтелла. Смощря

Equisetum, Ekbucemymb.

ARCOPODIVM, Аркоподіумь. и ARCOPVS, Аркопусь Смотри Сага папсе, Катананце.

ARCTION, Aprilionb. CMompu Arcti

um, Apkiliymb.

ARCTOPHTHALMVS, Aprinopman мусь. Смотри Tormentilla, Торментилла.

ARCTOS CORODON, Aprimoch Kopo'

донь. Смотри Авішт, АлліумЪ.

ARCTVS QVORVNDAM. I. B. Apr. тусь кнорундамь. Смотри Blattaria pilos Стетіса, Блаттаріа пилоза Кретика. ARDE-

ARDENAQVEARDA, Арденакпеарда.. Смотри Rosa, роза.

ARDENVS, Арденусь. Смотри Vrtica maior, уртика маіорь.

ARDINVS, Apqueych. Cmompu Atri-

plex, АтриплексЪ:

ARECA PALMAE: SPECIES: Scalig: Apexa, Avellana Indica Acostae. Fautel Serapioni. Filfel et Fufel. Arbor cadire. Arecas Cathecu. Linn. II. Арека: или: Индійскій. Орешникь, растепь вы Азін, вы Малава-РВ, Коромандель, около Гои, и других в городовЪ, и есшь высокое, прямое и на пальму довольно похожее дерево, им вющее широкіе листья, и маленькіе, бълые почши никакого запаху не им вюще цввты. Оно приносить, продолговатый, воличиною со сливу бывающій, и на подобіє абрикосовЪ растущій плодъ или ор'вхъ, котораго скорлупа съ начала зеленая, но по созрвніи: само - жолшая, лосиящаяся. Сей: орвжв заключаеть въ себъбьлое; съ верьху полукруглое, а съ низу плоское зерно , котпораго внутренность испециренна: бълыми и красными жилками, шакЪ что походитъ на переломленной: мушкашной: оръхъ. Индіанцы называющь его Хофооль, сущащь на солна цв, шолкушь вы порошокь, и пригошовя его съ бешелемъ, канфорою, и не много амброю, жують, для возбужденія слины и Разбиванія мокрошь. Не поспылый он в охмь ляеть. Сокъ изъ него вяжеть, укрвиляеть десны, унимаеть понось и рвоту, утоляешь колошье вь бокахь и прогоняешь худый запахъ изъ рша. Стущенный изъ свъ. жей Ареки сокъ называется Индіанцами Каше, от чего можеть быть произошло из имя Кашу, по тому что думають, будтобы Кашу дваають изв соку сего плода съ примъщаніемъ какихъ нибудь пряныхъ зелій. Смотри Caschou, Кашу. ГосподинЪ Линней полагаешь сте дерево съ Пальмою в одинь классь. По Гречески Адена, Ко

quès Тобию; по Нъмецки Ureca, oder India nischer Haasel-Rus-Baum; по Француски Areque;, по Италіански Areca; по Аглински Areca от The Indian Hasel tree. Въ Коромандел в Носсвіс.

ARECCA, Aperica. Cmompu Areca.

Арека:

ARENARIA CAMPESTRIS Linn. Аренаріа кампестрись: XVI. Поленая Песчанка. Смотри Arenaria faxatilis, Аренаріа саксатились.

AREIRA, Ареира. Смотри Schinus, Схинусъ:

ARENARIA MVLTICAVLIS SERPIL-LII FOLIO Linn. Apenapia мултиканпись серпилли фоліо. Смотри Coronopus, Коронопусь, и Alfine, Алсине.

ARENARIA OFFIC, Apenapia оффиц.
Cmompu Hérniaria Alsines solio, Герніаріа

Алсинесь фоліо.

ARENARIA SAXATILIS Linn. Apeнаріа саксатились. Колосникь каменная! песчанка, есть въ Сибири на низких во мвстах во при Кинелв, и при Уражь, и на песчаных в мъстах в около Самары растущая права, вырастающая вЪосманапцать вершковЪ вышиною и имъющая темно-зеленыя шилу подобные листья. ВЪ Медицинъ ее не употребляютъ. ГосподинЪ Линней полагаеть ее въ Х. классъ расшеній, въ коихъ цвеще находящся десящь тычковь сь тремя песшиками вмъсть: (Decandria Trigynia). По Гречески Αλσινη ένυδρα πετρέια χορτον άμμαδες πετραιον; по Нъмецки Die steinigte Sand-Aehre; по Француски Arenaria faxatile; по Италіански Arenaria sassola; no Arauncku Sand Herb, or Sea Chickweed

ARENARIA SERPYLLI FOLIA Linn. Аренаріа серпилли фоліа. Смотри Согопорив, Коронопусь.

ARETHVSA Linn. Apemy 3a. CMomp

Ophioglossum, Офіоглоссумь.

ARETIA Linn. Apenia. u

255

ARETION, Aperionb. Cmonipu Bardana, Бардана.

ARGEMATA, Apremama. Смотри Iuniperus, ЮниперусЪ.

ARGEMONE ARMENIACA

Аргемоне Арменіака. и ARGEMONE CAPITULO BREVIORE. Аргемоне капитуло врепюре. Смотри

ARGEMONE CAPITULO LONGIORE,

Аргемоне капитуло лонгоре. и

Anemone minor, Анемоне миноръ.

ARGEMONE CAPITVLO TORVLIS CANVLATO, Аргемоне капитуло то рулись канулато. Смотри Papauer errati

сит, Папаверь эррашикумъ.

ARGEMONE MEXICANA Linn. et. Tournefort. Apremone Mexcukana. Papaver spinosum. C. B. Pin. 171. Glaucium Offic. V. Колючій или пороней макъ, Кобылій щапь или по переводу славительный Осеть ость въ южныхъ странахъ Росси самовольно растущая, а здёсь шолько въ садахЪ свемая и въ Тюль и Августъ мвсяцах в цв в тущая трава, производящам въпвистый, колючими иголочками обсаженный и бълою жидкостью наполненный стебель въ ченыре вершка вышиною; и посредственно из в кория вырастающие листья, из в коих в нижніе узки и продолговаты, а верхніе или обвивающіе спебель длинны, жестки, гладки, по краямъ во кругъ иголчашы, въ верьку зелены выключая жилокЪ, кои бълы и кажушся бышь какЪ мукою обсыпанные; снизу бълы и разръзаны на подобіе листьевъ рогатато мака. (Glau. cium, Гавціумь): цвыть у сей травы желный, вырастаеть изв вершины въточекъ, составленъ изъ шесни на подобіе розончика расположенных в листочков в и имветь запахь красномолочника (Chelidoпіши тајов, Хелидоніумь маюсь), за овымь сабдуень продолгованая, шесни утольная и колючая головка или капсула,

заключающая въ себъ черныя, гловатыя сёмячки: корень ся тонокъ, продолгованів и волокнисть. Сія трава содержишь въ себъ много масла и соли. Цвъть и съмя унимають боли, усыпляють и полезны оть грудных вользней: листья употребляются наружно и считаот способными разбивать, исц влять раны, и утолять воспаление глазъ. ВЪ Апшеках упомребляють по большой части выжаный из в нее сок в называемый (Glauсіит, ГлавціумЪ) Аргемоне есть Греческое от в слова прувии, аргема, нарывв, происходящее имя, потому что разбиваеть глазные нарывы и опухоли. ГосподинЪ Линней полагаеть ее въ ХИІ. классь растеній, им вющих в в в обоеродном в своем в цв в шв двашцашь и болье шычковь съ однимь пестикомъ вмѣстъ. (Polyandria Monogynia) а Господинъ Турнефортъ въ VI. классъ во Н. родъ правъ съ многолиспинымъ въ кружекъ расположеннымъ цевтомъ, котораго чашечка превращается въ одноги вздвую капсулю. По Гречески Арузмоги; по Нъмецun Stachlichter Mohn; Purgierende Diestel? по Француски Pauot épineux; по Ишаліан. ски Argémone or Papauero spinoso; по Аглински Purging Thistle.

ARGEMONE OFFICINARYM, Apreмоне оффицинарумь. Смотри Papauer er-

raticum, ПапаверЪ еррапикумЪ. ARGEMONE TERTIA Apremone mep-

ціа. Смотри Апетопе, Анемоне.

ARGEMONIA, Apremonia. CMomps

Апетопе, Анемоне.

ARGEMONIA PLINII, Apremonia Maunin. Cmompu Flos Africanus, Oxoch Африканусъ.

ARGEMONIVM, Apremoniymb. CMO-

три Апетопе, Анемоне.

ARGENTARIA, Aprenmapia. CMompa Potentilla, Пошеншилла; Pentaphylloides, Пеншафиллоидесь; Agrimonia, Агримоніа и Tormentilla, Тормениилла. ARGEN-

ARGENTARIA PETRÆA, Aprenmaрга петреа. Смотри Quinquefolium, КвинквефоліумЪ.

ARGENTEA HEPTAPHYLLOS MON-TANA, Аргентеа гептафиллось монтана Смотри Quinquefolium, КвинкгефоліумЪ.

ARGENTILLA, Aprehmunna. Cmompu

Vlmaria, Улмаріа.

ARGENTINA, Aprehmund. Cmompu

Potentilla, Потентилла.

ARGENTINA MONSPELIACA, Apren. тина Монспеліака. Смотри Chamædrys Alpina, Хамедрись Алпина.

ARGILLARIA, Aprunapia. Cmompu

Tormentilla, Торменшилла.

ARGILLITES, Aprunumech. u ARGILTRES, Aprunmpech. u

ARGYROS, Aprupoch. Смотри Mercurialis, МеркуріалисЪ.

ARI PRIMVM GENVS, Apu npu-

мумь генусь. и

ARI TERTIVM GENVS, Apu mep-Чіумь генусь. Смотри Агит, Арумъ.

ARIA ALNI EFFIGIE, FOLIO LA-NATO MAIOR. HERM. Cat. HORT. Lugd. Ват. 424. Аріа ални эффигіе, фоліо лаnamo maioph. Cmompu Sorbus Alpina, Copбусь Алпина.

ARIA ALNI EFFIGIE, FOLIO LA-NATO MINOR. Ions. Dendr. 69. Apia anчи эффигіе фоліо ланато минорь. Смоmpa Diospyrus Offic. Діоспирусь Оффиц.

ARIA THEOPHRASTI Ger. 1146. Етас. 1327. Аріа Теофрасти. Смотри Sorbus Alpina, Сорбусъ Алпина.

ARILARIA, Apunapia. Смотри Tor-

mentilla, Торменшилла.

ARINGA, Аринга. Смотри Атті, Амми. ARINDRAVTO, Apungpaymo есть Мадагаскарское дерево, которое гнилое имъешь превосходный запахь будучи зажжено. По Гречески "Арпибравтом, быбром тв мабауао кар; по Нъмецки Urindrauto, Baum in Madagascar; по Француски Arindrauto,

Часть І.

arbre de Madagascar; по Ишаліански Arindrauto, albero del Madagascar; по Аглински Arindrauto, an Madagascar tree.

ARIS, Apuch. CMompu Scordium, Crop.

діумЪ.

ARISARVM, Apusapymb. Arum Arifarum. Linn. III. Клещинець или малые Образки права, расшеть на каменистых в мъстахъ, близь дорогь и возлъ заборовъ и цвётеть вы Іюль мъсяць. Она бываеть двухъ главныхъ родовъ, узкая и широколиственная. Первая называется по Латынъ (Arifarum angustifolium, Аризарумъ ангуспифоліумь), и имбешь длинные и узкіе а вторая (Arifarum latifolium, АризарумЪ лашифоліумЪ) широкіе сЪ бълыми жилами лиспыя. Объ имъють маленький, круглый, изЪ многихЪ шолспыхЪ жилочекЪ или волошей составленный и сЪ наружи черновашый, а внутри бълый корень, сперыва сладковатаго, но потомъ остраго вкуса; который обыкновенно производишь по семи остроконечных в зеленых в, мягких в, по од. ному на каждой вершинъ длинныхъ и не много извивающихся стеблей сидящихъ, плющепымь подобныхь, и жгучій вкусь им вющих вырастает вырастает в маленкій и красными пяшнышками испещренный цавшный стебель, производящій на поверыхности своей бълесоватый, однолисминый и подобіе шапочки им Вющій цв Вть, покидающій посль опаденія красныя ягодки. Сія права содержипъ въ себъ много соли, масла, и влажности. Листья и цвъть чистять, исцаляють раны, грають и вареные въ водъ и приложенные упошребляются оть глазныхь фистуловь или тугихь неболящих в нарывовь: корень сущить, разбиваеть, содержить испражнение свободнымЪ, и почищается полезнымЪ отъ язвы, въ которомъ случав соввтують его принимать въ порошкъ количествомъ третьей части одного золошника. Аризарумъ есшь Греческое имя. ВЪ АпшекахЪ ничего M3 T

изъ него не дълають. Господинъ Линней полагаеть сію траву въ ХХ. классь растени имъющих в в своем в цвъть дватцапь и болве пычковь съ нъсколькими песпиками вмъстъ сросшихся, такъ что мужчинки сидять на пестикахь (Gynandria Polyandria) а Господинъ Турнефорть въ III. классъ въ III. отдъленте въ III. родъ травъ съ однолистным в многоподобным в пвыном в. По Тречески Арібарог у Арібаров; по НЪмецки Münchs-Rappe oder kleiner Naron, wovon eine Art schmale, die andere aber lange, breite Wlatter hat; no Француски Arifarum, plante, dont il y a deux éspêces, l'une à seuilles étroites longues et l'autre à Feuilles larges; Vit de chien; по Италіански Arifaro con foglie anguste; o con foglie largue; no Arлински Friars Coul; Friers Cowle, Hooded Aron, or Hooded Cuckee point, or Wake Robin. It is of the Family or stock of the Arons, and is twofold, viz. I. Broad-leav'd Friers Cowle. 2. Long-leav'd or Narrow leav'd Friers-Cowle.

ARISARVM ALTERVM, Apusapymb

алтерумь. Смотри

ARISARVM ANGUSTIFOLIVM, Apu-

затумь ангустифоліумь. и

ARISARVM LATIFOLIVM, Аризарумь патифоліумь. Смощри Arifarum, Аризарумь.

ARISARVM NARBONENSE, Аризарумь Нарбоненсе. Смотри Arisarum alterum,

АризарумЪ алтерумЪ.

ARISARVM PRIMVM, Аризарумь примумь. Смотри Arifarum latifolium, Аризарумъ лашифоліумъ.

ARISARVM TENVIFOLIVM Cam. Аризарумь тенунфоліумь. Смотри Агіlarum, Аризарумь.

ARISTEREVM, Apucmepeymb. Смотри

Verbena, Рербена.

ARISTERIVM, Аристеріумь: Смотри Sideritis, Сидерипись.

ARISTERON, Apистеронь. Смотри Verbena, Вербена.

ARISTIDA, Apucmuga. w

ARISTIDIA, Apucmugia. Смотри Gra-

теп, ГраменЪ.

ARISTOLOCHIA. XX. Apucmonoxid. II хинопник, или Кирказонь трана. По Гречески 'Agisoloxia; по Нъмецки Officilicell, Soll-Burg; по Француски Aristoloche; по Италански Aristolochia; по Аглински Birthwork.

ARISTOLOCHIA ADVLTERINA, Аристолохіа адултерина. Смотри Fumaria

bulbofa, Dymapia булбоза.

ARISTOLOCHIA ALTERA RADICE POLLICIS CRASSITVDINE, Apucmono xia anmepa paquue поллицись красситу дине. Смотри Aistolochia tennis, Аристоло хіа тенуись.

ARISTOLOCHIA CAVA, Аристо похіа капа. Смотри Aristolochia Pistolochia,

Аристолохіа Пистолохіа.

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS Linn, Аристолохіа клематитись. Aristolochia Sarracenica. Dod. Ariftolochia altera radice tenui. Сæs. И. КокорникВ, СмольникВ им Выющійся Кирказонь трава, бывает в двухв родовъ прямо споящая или геста, ректа з или расшилающаяся ferpens, серпенсъ. Пер вая имбешь прямые и кръпкіе стебли вы деенатинать вершков вышиною, которые украшаются большими, блёднозелеными; какЪ сердечко выръзанными, и черенясты ми листьями, между коими вырастаеть множество маленьких в, бладножелтых в однолисшных в и из в многоподобных в шпу чекъ составленныхъ цвёточковъ, после ко ихъ оказывается продолговатый, видомъ на грушу похожій и нѣсколькими перепониспыми плевами обведенный плодъ или нап сула, которая поменьше нежели у Аругих в родовъ сей правы и заключаеть въ себв приплюснуныя, черныя и одинъ на Ару гомъ лежащія сёмячки. Корень у нее мон кій, волокнистый, извитый и имбеть изв съро - бълесованый цвъть, и горько пронзи шельный вкусь, но нарочишо пріяшный запахЪ. Другая производишЪ тонкія, дорож чашыя

ira-

id.

По

:01%

па•

ort.

A-

ria

00

Va

04

100

12,

17.

113

ce

M

B

чашыя или полосочками испещренныя, на въточки раздъляющіяся и около близь ихъ стоящих в деревв, правв и других в предмътовъ на подобіе жмъля выющіяся лозы или стебли въ осьмнатцать, и дватцать четыре вершка вышиною; широкіе, на длинных в стебельках в сидящіе, гладкіе и вв верьху зеленые, а въ низу пурпурово бълесоватые листыя; желтые а иногда багряночернованные и въ срединъ поненькимъ пушкомъ опушенные цавшы, и длинный, бълесовашый, изкривленный, и изЪ толстыхЪ волокнЪ состоящій корень вязательнаго но не безпріяшнаго вкуса. Вся шрава душиста и оба сорта оной раступь въ южных в спранах в Россін до самых Уральских горъ самовольно вь лесахь и по полямь, аздёсь свется вь садахв и цввшешь вь Іюнь мвеяць. Вв Медицинъ употребляють одни имъ корни, конпорые содержанть въ себъ много масла и соли, чисшять, разбивають, укръпляють, противятся поврежденію крови, содержать испражнение свободнымЪ, полезны опр РанЪ и употребляются какЪ внутренно такъ и наружно. Внутренно принимають сіи корки для предохраненія и излеченія от в подагры, а вЪ внутренномЪ почечув весьма помогаеть уварь изънихь и промыващельное. Живущіе около Волги мужики упошребляють вареную траву въ водъ отъ всякаго лому и боли въ костяхь, а подобный смоквь плодь ея служить имЪ пищею и сушеный отъ всякой перемънной горячки; но примъчать надлежить, что отъ долговремяннаго употребленія опасаться должно, ибо производить слабость въ желудкъ и во всемъ пель. Аристолохіа есть Греческое оть словь йдігог, способный, и хохіа, місячное значущее имя, по тому что Аристоложіа или Кирказонь выгоняець місячныя крови и мъсто; а Клематитисъ происходишь от Гречекаго слова идина, лоза или прушЪ; ибо стебли ен походнтъ болъе на прушья. По Гречески первая, Арізододія осданнача виваїах; по Нъмецки первая Scidnist = Rraut, emopan Dunne Hollvurg; no Opan-

нуски первая, Aristoloche Clematite droite; вторая Aristoloche Clematite sarmenteuse; по Италіански Aristolochia Clematite; по Arлински Creeping Birthwort.

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS REC-ТА, Аристолохіа клематитись ректа и ARISTOLOCHIA CLEMATITIS SER-

PENS, Аристолохіа клематитись серпенсь. Смотри Aristolochia clematitis, Ари-

столохіа клематитись.

ARISTOLOCHIA CONCAVA, Apu. столохіа конкапа. Смотри Fumaria bulbofa, Фумарія булбоза.

ARISTOLOCHIA FABACEA, Apucmoпохіа фабацеа. Смотри Fumaria bulbola,

фумаріа булбоза.

ARISTOLOCHIA FOEMINA, Apucmo. лохіа фемина. Смотри Aristolochia rotunda, Аристолохіа ротунда.

ARISTOLOCHIA HIRTA Linn. April cmonoxia rupma. Cmompu Aristolochia Cle-

matitis, Аристолохѓа клематитисЪ.

ARISTOLOCHIA LONGALinn. Apn. столохіа лонга. Aristolochia longa vera С. B. Pit. Tournefort. Aristolochia altera, radice pollicis craffitudine. Cael. II. Длинный Пхинопникь или Лихорадочная трапа, растеть вь садахь, на штнистыхь мъстахь и цвътеть весною. Она бываеть также двухъ родовъ а имянно: длинная просшая и длинная Гишпанская (Aristolochia longa Нібрапіса, Аристолохіа лонга Гиспаника) первая имфеть продолговатый, волокнистый, снаружи с ровашый, а внутри желтоватый корень въ два дюйма полщины и шесть вершковъ длины, изъ конораго вырасшаюнъ чешвероугольные, слабые и приземистые стебли въ девять верьшковъ вышиною, окруженные мягкими, кругловашыми, вершиною оканчивающимися и на длинных в стебелькахъ утверждающимися листьями и при основаніи оных вырасшающими шемнопурпуровыми а внутри бѣлыми цвѣтами, посав коих в савдуень такаяжь капсула, какЪ у выющагося Кирказона (Аристолоxia

P 2

хіа клематитись) и заключающая такіяжь съмячки. Вторая растеть въ Гишпаніи, въ королевствъ Валенціи, и въ нъкоторых в здёшних в южных в странах в но ръдко. Она различествует в весьма мало оть вышеописанной и отмвияется оть нее только цв втом в своим в, который не только съ наружи, но и внутри весь пурпуровый, да корнемъ, который покороче простаго. Корни их в сущашв, разжижающв, отворяють, разбивають внутренніе нарывы, укрѣпляють голову, полезны вь печеночных в и легкаго бол взнях в и сходствують свойствомь своимь сь круглымь пхиновникомЪ. (Aristolochia rotunda, Аристолохіа ротунда.) По Гречески Арізодожім макра; а вторая Α'ρισολόχια μακρά Ίσπανική; по Нъмецки Offerincen, lange Holl-Wurg; а другая Spanische lange Holl-Wurg; по Француски Aristoloche longue а вругая Aristoloche longue d' Espagne; no Италіански Aristolochia lunga, а другая Aristolochia lunga di Spagna; по Аглински Long rooted Birth wort.

ARISTOLOCHIA LONGA ALTERA,

Аристолохіа лонга алтера. и

ARISTOLOCHIA LONGA HISPANI-CA, Αρμεποποχία πομτα Γμεπαμικά μ

ARISTOLOCHIA LONGA VERA, Аристолохіа лонга пера. Смотри Aristolochia longa, Аристолохіа лонга.

ARISTOLOCHIA MVLTIFLORA Rivin. Аристолохіа мултифлора. Смотри Aristolochia clematitis, Аристолохіа клематинись.

ARISTOLOCHIA PELLATA Linn. A-

ристолохіа пеллата. Смотри

ARISTOLOCHIA PISTOLOCHIA Linn. Apucmonoxia пистолохіа. Pistolochia offic. Ger. Emac. 847. Aristolochia tenuis, Cod. Med. XV. Aristolochia polyrrhizos. I. B. iii. 561. Chab. 512. Aristolochia Pistolochia dicta C. B. Pit. Tournefort. II. Многоножная трапа или Малый Кирказонь, растеть вы южныхы спранахы Россіи около Уральскихы горы, но гораздо изобильиве вы Италіи, Франціи и Гишпаніи, и цвътеть

вь Іюль мьсяць. Сія права меньше всьхь прочихъ и имъетъ много тонкихъ, слабыхъ, по земав расшилающихся и на нѣсколько въ точекъ раздъленныхъ стеблей, окружающихся маленькими, плющевымъ (Hedera, Гедера) подобными, бавднозелеными, зубчашыми, остроконечными и черенястыми листьями: цвъты такіежь, какь у прочихь, полько что меньше, и иногда темные, а иногда желшозеленые: корешки у нее космашые, соединяющся всв в в маленькую изв толстых волошей составленную головку, и имъють изъ желта сърый цвъть, аромашическій запахь и горьковащо острый вкусь. Оные употребляются въ Медицинъ и почитаются лучшими. Они содержать въ себъ много масла и соли, чистять, разжижають водянистыя густыя мокроты; облегають дышание, гонять мочу, производять поть, противятся гнилости, и полезны от Рака и ранв. Перегонная изв нее вода почишается способною унимать боль въ маткъ. Пчелы очень любять ея цвъты и высасывающь изъ оныхъ много меду. Сія пірава столь сильно размножается, что естьли не снимешь съ нее съмяна, когда еще не поспъли, то почти и истребить не можно. Полирргизонь есть Греческое отв словь толи и ріда, корень; какъ бы скавашь много коренная шрава. По Гречески Арізододіа депті; по Нъмецки Явете Дові wurk; Donner-Fluch; по Француски Petite Aristoloche; по Италіански Aristolochia picciola; no Arauncku Bushy rooted Birthavort.

ARISTOLOCHIA POLYRRHIZOS, A-pucmonoxia Полирргизось. Смотри Aristolochia Pistolochia, Аристолохіа Пистолохіа.

ARISTOLOCHIA POLYRRHIZOS, AVRICVLATIS FOLIIS VIRGINIANA Plue. Phitog. Tab. 78 Almag. 50. Apucanonoxia Полирргизось, априкулатись фолінсь Виргиніана. и

ARISTOLOCHIA POLYRRHIZOS VIR-GINIANA, Apucmonoxia Полирргизось Виргиніана. ARISTOLOCHIA PRIMA, Аристолохіа прима. Смощри Aristolochia rotunda, Арисполохіа рошунда.

ARISTOLOCHIA QVINTA, Аристокіа кпинта. Смотри Aristolochia Pistolochia, Аристолохіа Пистолохіа.

ARISTOLOCHIA ROTVNDA Linn. Apucmonoxia pomynga. Aristolochia rotunda Flore ex purpura nigro. C. B. Pin. 307. Hist. Oxon, iii. 509. Tourn. Inst. 161. Elem. Bot. 132. Boerh. Ind. A. 278. Rupp. Flor. Ien. 201. Aristolochia scemina. Lugd. Aristo lochia prima. Caef. Aristolochia rotunda vera Trag. II. Кууглый Кирказонь или Расті права, расшетъ пами во южных в спранахъ Россіи на дугахъ, и по полямъ на жирной землв, а здёсь въ садахъ и цвъшешЪ лѣшомЪ. Она выпускаешЪ много слабыхЪ и гибкихЪ стеблей вЪ десять верьшковъ вышиною, по которымъ сидять на искось одинъ прошивъ другаго мягкіе, блёдно-зеленые, почши совстмъ круглые, черенястые и от части стебель покрывающе листья горькаго вкуса, при основании коихЪ вырастають багряночерньющіе, изъ одного выпуклистаго листочка составленные, кЪ верьку разширенные а кЪ визу трубкою оканчивающіеся цвёточки; послё коих в чашечки превращающся въ зеленыя, но созръвая шемнъющія, продолговащыя и перепонистою кожищею обведенныя капсули, раз-Авляющіяся обыкновенно внутри на шесть тывадь, въ коихъ заключаются мъленькія, плоскія, черныя и другь на другь лежащія съмнчки; корень сей правы круглой, нарочито толств, окружень волокнами, снаружи съровать, а внутри желтовать, чрезвычайно горекъ и имъетъ не пріятный запахъ. По Гречески А різодохім зрочуйдя; по Нѣмеики Runde Hollwurk; по Француски Aristoloche rondeou sarrasine ronde; no Mmaniански Aristolochia rotonda; по Аглински Rotund Birhwort.

ARISTOLOCHIA ROTVNDA ALTE-RA. Clus. Hisp. et Hist. I. B. Apucmonoxia ротунда алтера. Aristolochia rotunda slore ex albo purpurascente. C. B. Pit. Tournefort. Круглой Пхинопникь сь буреющимь цпвтомь, расшеть въ садахъ и цвътеть въ Іюнь мъснив. Отличность его отв другихЪ ПхиновниковЪ состоитЪ вЪ томЪ, что стебли многочислениве и короче, листья больше и продолговатье, и чно по одиначки сидящій цввтв имветь св верьку бело пурпуровой, или буреющій, а внутри темновашый колерЪ; съмянодержащельниця длинные, нежели у прачить и имъешь подооге груши, съмя мълче и красноватое; а корень снаружи желповашый. Сіи два рода Пхиновника содержать въ себъ, какъ и выше описанные много масленых в и соленыхъ частей и влажности, почему укръпляють, чистять, разжижають, гонять у женщинъ мъсячное и мъсто, разбивають дурныя мокроты, противодьйствують яду, ум фряють кислоту и полезны, а особлиго корень, от в одышки, бълей, от в желтухи, водяной, падучей и цынгошной бользни и подагры, и дается или въ порошкъ отъ половины до цълаго золошника, или настоянный въ водкъ, и виноградномъ винъ, или его стущенной сокъ въ нилюляхъ; а наружно употребленной сущить, чистить гниль костей, раны, фистулы и застарьлыя нарывы и обътдаеть въ цихъ дикое мясо. ИзЪ него дълаютъ Опріакъ для бъдныхЪ, который приготовляютъ слъдующимъ образомъ: корня круглаго Кирказона, Девесила, (Helenium, ГеленіумЪ), Мирры, кашки изЪ можжухъ (Iuniperus, Юниперусь, каждаго взять поровну, и прибавишь шуды сиропу изЪ померанцовой кожи, сколько потребно, чтобъ Опріакъ очень густь не быль. Я описаль здёсь сіе авкарсиво, пошому что его не воесвхъ апшекахъ держатъ. Въ Апшекахъ употребляють одни корни всткь описанных в завсь

здъсь Пхиновниковъ, а изъ корней круглаго дълають Эссенцію или Настой въ кръпкомъ спиртъ. Господинъ Линней полагаетъ всь сорпы сей правы вь ХХ. классь растеній, имъющихъ вы своемъ цвътъ шесть шычковъ или мужчинокъ, сросшихся вмъсшъ сЪ пестиками или женочками (Gynandria Hexandria) а ГосподинЪ Турнефорть въ III. классЪ во II. отдъление въ I. родъ травъ съ оджиния многоподобным в цв в помв. По Гренески Адізоλόχια σρογνύλη άνθος λευκοπορ-Фиро; по Нъмецки Runde Sptwurg mit weiß: licht purpurfarbenen Blumen; по Француски Aristoloche ronde à seur blanche, tirant sur le purpurin; по Италіански диполосьів тоtonda con fiori bianchi tirandi supra l'purpurino; по Аглински Snake-roodt.

ARISTOLOCHIA ROTVNDA FLORE EX PVRPVRA NIGRO, Аристолохіа ротунда флоре эксь пурпура нигро. Смощри Aristolochia rotunda, Аристолохіа

рошунда.

ARISTOLOCHIA ROTVNDA FLORE EX ALBO PVRPVRASCENTE, Apucmonoxia pomynga pnope excb anto nypnypacmenne. Cmompu Aristolochia rotunda altera, Аристолохіа ротунда алтера.

ARISTOLOCHIA ROTVNDA LONGA, Apucmonoxia pomynga nonra. u

ARISTOLOCHIA ROTVNDA VERA, Аристолохіа ротунда пера. п

ARISTOLOCHIA ROTVNDA VUL-GARIS, Apucmonoxia pomyuga nynrapuch. Cmompu Aristolochia rotunda.

ARISTOLOCHIA SERPENTARIA LINN. Аристоложіа серпентаріа Линн. Смощри Serpentaria Virginiana, Серпентаріа Виргиніана.

ARISTOLOCHIA SVBHIRSVTA CHIA-LONGA FOLIO OBLONGO Tournefort. Аристолохіа субгирсута хіалонга фоліо облонго. Смотри Fumaria bulbola, Фумаріа булбоза. ARISTOLOCHIA TENVIS, Apuemonoxia menyuch. Cmompu Aristolochia Pisto-

lochia, Аристолохіа Пистолохіа.

ARISTOLOCHIA VIOLÆ FRVTICOSÆ FOLLIS VIRGINIANA, CVIVS RADIX SERPENTARIA DICITVR. Pluk, Phytog. Tab. 15. Apucmonoxia nione ppymukose poniucb, Bupruniana, kyncb pagukch cepnenmapia gunumyph. Cmompu Serpentaria Virginiana, Cepnenmapia Bupruniana.

ARISTOLOCHIA VULGARIS, Apucmonoxia пулгарись. Смощри Aristolochia,

Аристолохіа.

RADICE OBLONGA, Apucmonoxia nynrapuch anmepa pagune obnoura. Cmompa Fumaria bulbola, Oymapia булбоза.

ARISTOLOGIA, Apucmonoria. CMO.

три Aristolochia, Аристолохіа.

ARITIVM, Ариціумь. Смотри Опоbrychis, Онобрихись

ARKEVTHIS, Apreymuch. u

ARKEVTHOS, Аркеутось. Смотря Iuniperus, Юниперусь.

ARMALA, Apmana. Cmompu Ruta,

Pyma.

ARMATELLA, Apmamenna. CMompa

Matricaria, Mampukapia.

ARMENIACA BETVLÆ FOLIO ET FACIE FRVCTV EXSVCCO, Ammon. Apmeniaka Бетуле фоліо эть фаціе фрукту экссукко. и

ARMENIACA MAIORA, Cam. Tab.

Еу в. Арменіака магора. Смотри

ARMENIACA MALVS Matth. Арменіска малусь. Armeniaca maior, Baracocca vulgo, Caef. Armeniaca fructu maiori nucleo amara. Pit. Tournef. Malus Armeniaca Linn. Armeniaca maiora. Cam. Epit. I. B. VIII. Абрикосопое дерепо, растеть здъсь только въ оранжереяхъ и цвъщеть весною. Оно имъеть нарочито толстый и Нерсиковому подобный пънь, который покрывается темновато чернъющеюся корою и выпускаеть по

по бокамъ много распростерных в сучьевь, окружающихся корошкими, зубчатыми, остроконечными, широкими, на тополевые (Роpulus, популусь) но болъе на грушевные похожими и кислованый вкусь имъющими листьями, коих в один в край обнимает в другой и закрываеть его. Цвъть на немь твлеснаго колера, и составленъ изъ пяши на подобіе розона расположенных в листочковь. Послё цвёта вырастають многотёль. ные и почти совевмъ кругаые плоды или такъ называемые Абрикозы, которые видомъ и величиною походящъ нѣсколько на маленькій персикЪ, кЪ бокамЪ плоски, имьють съ одной стороны краснованый, а съ другой желшовашый цебшь и пріяшный вапахъ, и заключають въ себъ гладкую и кругловащо плоскую косточку, содержащую въ себъ горькаго вкуса ядрышко. Плодъ имветь ивжное, сладкое и прекраснаго вкуса тъло. Еторый родъ Абрикосовъ называетca Armeniaca fructu maiori, nucleo dulci, Ap меніака фрукту маіори, нуклео дулци, или Абрикосовое дерево съ большимъ плодомъ или велая Слипа и различествуеть сть описаннаго только въ томъ, что плодъ цвътомъ гораздо болъе и что находящаяся въ немъ косточка заключаеть въ себъ сладкое зерно; а третій сорть или Armeniaca minora, Арменіака минора). Малое Абрикосовое дерево имвешь круглые, зеленые лисшья и маленькій, желшовашый плодь, кошорый поспъваеть ранъе вышеупомянушыхв, но не етоль пріятенЪ вкусомЪ. Абрикозы содержать въ себъ много влажносии, масла и соли, укръпляющъ сердце и грудь, прохлаждають, возбуждають слюну, и возстановляющь силы, но въ Медицинъ ръдко употребляются; а болве вдять ихв для лакомства свъжіе, вареные въ сахарь, суще. ные и дълають изъ нихъ разные конфекпы. Находящееся въ косточкахъ ядро умерщвияеть глисты, поспъществуеть мъсячкому и родамъ, выгоинетъ мъсто, и полезно от в случающейся послъ родовъ боли-ИзЪ нихЪ можно выжимать вЪ тискахЪ такоежъ масло, какъ изъ простыхъ минда. лей. Оно унимаеть почечуйную боль и полезно от звуку въ ушахъ и от глукотек. Арменіака есть Латинское от В Арменіи, Азіатской земли произшедшее имя, из в которой въ древнія времена возили ихь въ Римъ. Господинъ Линней полагаетъ Абрикосовыя деревья вЪ XII. классЪ расшеній, имЪ. ющих вобыкновенно в в своем в цвбтв дватцать тычковь кь внутренному боку цвътной чашечки приросших в и один в песшик в (Icofandria Monogynia) а ГосподинЪ Турнефорнь вЪ XXI. классь, въ VII. отдъление, въ VII. родъ деревь и кустарниковь съ многолистнымъ на подобіе розона расположенным в цв в том в, кошораго песшикъ превращается въ плодъ объ одной косточкъ. По Гречески Аризиани реуали хригорида; по Нъмецки большое Upricosen nan Almarellen-Baum; naogb Apricosen, St Johannis Ptersichen; а маленькое Rleiner Apricasen-Baum; a naogh Rleine Us pricosen или Marillen; по Француски дерево Abricotier a naoab Abricot; no Umaniamски Armeniaco или Bricocolajo, а плодЪ Bricocolo, Armeniaco, Васосо; по Аглински Apricock - Tree a плодъ Apricock.

ARMENIACA MINOR, Apmeniara

ARMENIACA PERSICAE FOLIIS, FRVCTV EXSVCCO, VILLOSO, Amman. Арменіака Персице фоліись, фрукту екзсукко, пиллозо. Смотри Armeniaca malus, Арменіака малусь

ARMENISI, Арменизи. Смотри Со-ryle, Кориле.

ARMERIA ALTERA, Apmepia anme.

ARMERIA ALTERA SVAVE RVBENTE. FLORE, Армеріа алтера спапе рубенте флоре т

ARMERIA ALTEBA RVBRO FLORE, Армеріа алтера рубро флоре. и

ARMERIA LATIFOLIA, Apmepia naтифоліа и

ARMERIA PRATENSIS, Apmepia npaтенсись. Смотри Caryophyllus, Каріофил-

ARMERIA PROLIFERA, Apmepia пролифера. и

ARMERIVS FLOS, Apmepiych procb.

Смотри Миссірива, Мусципула.

ARMERIVS SIMPLICI FLORE PAN-NONICVS, Армеріусь симплици флоре Панноникусь. Смотри Caryophyllus, Каріо. филлусЪ.

ARMERIVS SYLVESTRIS Dod. Apmepiycb cunnecmpucb. Cmompu Caryophyllus pratensis, Каріофиллуєв прашенсисв.

ARMERIVS TERTIVS, Apmepiych терціусь. Смотри Lychnis syluestris, Лижнись силвестрись.

ARMESIA, Apmesia. Смотри Arthemi-

ба, Артемизіа.

ARMESIOS, Apmesiocb. Cmompu Tragacantha, Tparakanma.

ARMIOGRION, Apmiorpionb. CMO-

шри Arum, АрумЪ.

ARMONIACVM, Apmoniarymb. Cmoтри Ammoniacum, АммоніакумЪ.

ARMOMORMACVT, Армомормакуть. Смотри Marrubium, Маррубіумь.

ARMORACIA, Apmopania. Смотри Raphanus rusticus, рафанусь рустикусь.

ARMORACIA SYLVESTRIS PRATEN-SIS. Смотри Caryophyllus pratensis, Kapioфиллусь прашенсись.

ARMORARIA ALTERA, Apmopapia алтера. Смотри Lychnis syluestris, ЛихнисЪ

силвестрисъ.

ARMORARIA SYLVESTRIS PRATEN-SIS, Армораріа силпестрись пратен. sucb. Chompu Caryophyllus pratensis, Kaріофиллусь прашенсись.

ARMOSIA, Apmosia. Cmompu Arthe-

тівіа, Аршемизіа.

ARNABI VETERVM, Aphaeu nemeрумь. Смотри Zedoaria, Зедоаріа.

ARNICA, Aprinka. Cmompu Alysma, Алисма.

ARNIVM, Aphiymb. n

ARNOGLOSSA, Aphornocca. M

ARNOGLOSSVM, Aphotroccymb. Cmo. mpn Plantago major, Плантаго мајорћ.

AROE, Apoe. CMompu Iris nostras, Ирисъ нострасъ.

AROEIRA, Aposupa. Cmompu Molle,

Молле.

AROMA GERMANORVM, Apoma германорумь. Смотри Васса: Iuniperi, Бакце Юнипери.

ARON, Aponb. CMompu Arum, Apymbe ARON ÆGYPTIACVM, Aponb Ding пціакумь. Смотри Colocasia, Колокасіа.

ARON ALIVD FOLIO MACVLATO, Аронь аліудь фоліо макулато. Смощри Arum venis albis, АрумЪ венисЪ албисЪ.

ARON MAIVS VERONENSE Lob Аронь маюсь Вероненсе. Смотри Агіс farum, Аризарумb.

ARON MAIVS, Aponb mancb. CMO.

три Arum Dod, АрумЪ Дод.

ARON PALVSTRE, Apont nanyempe. Смотри Dracunculus aquaticus, Дракункулусь акватикусЪ.

ARONIA, Aponia. Cmompa Mespilus,

Меспилусь.

AROPH, Apodb. Смотири Mandragora, Мандрагора.

AROS, Apoch. Смотри Arum, АрумЪ. ARPINAS, Aprinach, Cmompu Equifetum, ЭквизетумЪ.

ARPRIA, Apria. Comompa Vinca per

Vinca, Винка перъ винка. ARRHENOGONON, Apprenorononb.

Смотри Mercurialis, Меркуріались. ARSANVM, Apcanymb. Cmompu Ca-

lamintha, Kanamuhma.

ARSANOTHA, Арсанота. Смотря Staphisagria, Cmaducarpia.

ARSELA, Apcena. Chompa Argemone,

Аргемоне. AR-

ARSVL, Apcyab. Cmompu Cardaus Магіж, Кардуусь Маріс.

ARTHANITA, Артанита. Смотри Су-

clamen, Цикламенъ.

ARTEDIA Linn. Apmegia, есть мало извъстная права.

ARTEMILLA, Артемилла. Смотри

Ros solis, Росъ солисъ. ARTEMISIA, Apmemusia. Смотри

Arthemisia, Аршемизіа.

ARTEMISIA ABROTANVM Linn. Ap. темизіа авротанумь. Смотри Abrotanum, АброшанумЪ.

ARTEMISIA ABSINTHIVM Linn. Ap. темизіа авсинтіумь. Смотри Авіпт-

hium, АбсиншіумЪ.

ARTHEMISIA ALBA, Apmemusia anта. Бълая полынь, еснь маленькая, бълая, шершавая, землю покрывающая, и по сухимЪ сшепямЪ, на иловащой и сочной земав въ великомъ изобили растущая трава, которая им ветъ прозимующій, дрезесованый, и въшвистыми волокнами обвъщенный корень, выпускающій, когда старь, большіе, поверькь земли разширяющиеся, и множеспьомъ маленькихЪ, черенясныхЪ, бѣлымЪ пушкомЪ онушенных в и из в перышков в составленных в лиспиьев в окружающиеся сшволы, коих в лисповые перышки равноширны, нанизаны одно возав другаго и много выръзчаны. Спа-Рые сшволы бываюшЪ безплодны, но молоныя расшенія раждаюнів кв Осени круглый сухощавый, нъсколькими не споль мошиспыми швердыми лисшьями испещренный, и около четверти длиною бывающій стебель, распускающійся кЪ концу колосистыми, весьма далеко отпопыривающимися и поперемънно разряжающимися въшвями на подобіе метелки; оныя вышви украшаются маленькими, до разцевшу въ низъ наклоняющимися, а потомъ мало помалу въ верыхъ поднимающимися цевшками, и насаждаются, равно какЪ и цвѣпючные черешки листочками или подпорками. Сіе растеніе,

Yacmb I.

имъеть весьма пріятный запахь да и горькость вкуса его не прошивна. Зимою упопребляется оно на кормъ кочевныхъ людей. ГосподинЪ Линней и Турнефорть полагающь ее съ Чернобыльникомъ въ одивъ классъ. По Гречески Артериоїм Ленні; по Ивмецки Weißer Wermuth; по Француски Absinthe blanche; по Италіански Assenzio bianco; по Аглински White Wormwood.

ARTHEMISIA ALTERA POLYCLO-NOS DICTA, Артемизіа алтера поликлонось дикта. Смотри Artemisia latitolia. Аргиемизіа лаприфоліа.

ARTHEMISIA BOTRYOIDES, Apmemnзіа вотріондесь. Смотри Атьгова, Амброзіа.

ARTEMISIA COMMVNIS, Apmemu-

зіа коммунись и

ARTEMISIA DIOSC. TERTIA, Ap. темизіа Діоск. терціа. Смотри Агтетіsia latisolia, Артемизіа латифоліа.

ARTHEMISIA DRACVNCVLVS Linn. Артемизіа Дракункулусь. Смотри Dra-

cunculus, Дракункулусь.

ARTHEMISIA CHINENSIS, Apmeмизіа Хиненсись. Китайскій или Восточный Черновыльникь, растеть въ Кишав, и имвешь копьевидные, пушкомъ опушенные, и къ концу не много пришупленные лисшья. У восточных в довъ лисшья съ ихъ пушкомъ моксою называемомъ почипается преизящнымъ средсшвом в отв подагры, чрезв нажигание (рег vstionem). По Гречески Артемоба агатомий; по Ивмецки Венбив анв Сріпа; по Француски Armoise de la Chine; по Италіански Amarella della China; по Аглински Mugwort ot China; по Индіански Итцекуй Ипатаи.

ARTHEMISIA IVDAICA Linn. Apmeмизіа Юданка. Черная нефорощь, есть чернобыльнику подобная и въ степяхъ около Каспійскаго Моря растущая права, имъющая мълкіе, продолговатые, на длинных в стебельках в упиверждающіеся и перистые листья листья. О качествах в сей травы я не могь ни гдв найти описанія, равно как в и ся названій на прочих взыках в.

ARTHEMISIA IVRENA, Apmemucia

Юрена: Смотри Botrys, БотрисЪ.

ARTHEMISIA LATIFOLIA VULGARIS MAIOR, Hist. Oxon. iii. 5. C. B. Pit. Tournef. Артемизіа пултарись маюрь. Антетіfia vulgaris Linn. Arthemifia rubra et alba Taba Arthemisia officinarum. Elem. Bot. Cnab. 375. XXII. Черновыльникь, Черновыль или по переводу съ Нъмецкаго Инанонь поясь. растепь почти вездь въ великомъ множесшвъ въ садахъ, въ огородахъ, на улицахь, на открытых в поляхь, подлё плетней возав изгородовь, вы селвніяхь и вы деревняхЪ, и цввтетъ въ Іюль мвсяцв. По внишному своему виду походишь она на полынь, кудрява, расшешь очень скоро, бываеть красная и бълая, стоить часто какъ лъсъ на подобіе крапивы и им веть множество темновато - красноватых в, а бвлая бёлозеленых В, жестких В, круглых В, полосатых в и в втвистых в стеблей; в в аршин в и болбе вышиною и часто въ палецъ толщины; копторые окружающся мълкими, периспыми, зазубрисшыми, ПолыннымЪ подобными, душистыми, жирными и сверьху темно - зелеными, а съ низу бъловатыми листьями сладковатаго вкуса. Цввты на нем в либо пурнуровые, либо бълые сложные, дунистые, расположены вдоль по въточкамЪ, жакъ у полыни и вырастають изъ одномистной чашечки: Корень у него длинный ... толщиною въ палецъ, волокнистый и аромашическато сладноващато вкуса. ЧернобыльникЪ имфенъ аленькія, красивыя и пушиещымь вънчикомъ опущенныя съмячки коими почти весь какъ унизанъ бываетъ. Его свють осенью, а листья и девты собирающся въ Коль мъсяцъ. Сія Трава: содержишъ въ себъ много соленыхъ частей и нъсколько масла, очищаеть кровь и другіе соки ненуждаеть на низь, онворяеть засорение печенки, укръпляень машку, унимаень въ ней боль, выноняеть мъсто, гонить кроги, мочу, ночечной камень и въ случав нещастія, самаго мертваго младенца, очищаеть посль родовь, утоляеть случающу юся посав того въ животь боль и полезна ошь обжоги и рань, вы которомь случав свъжую праву полкупъ съ винограднымъ виномъ, и даюшь раненому въ день по двв ложки выжащаго ея соку, щакже можно она. го немного согръпъ, и тепловатой налить въ раны, что унимаетъ болъзненное оныхъ воспаленіе; но еспьми не можно доспапь са. мо зеленую праву, по должно ее варипь въ винъ, смъщанномъ съ толикимъ же количествомЪ чистой воды, давать болящему по ушрамъ и вечерамъ оную по не многу пишь и теплою вымывать при перевязывании ранв. Цвъточныя верьхушки шакже очень полезны вЪ настойкахЪ. Свъжін и зеленыя верьхушки собирають, толкуть и положа въ чистую скаянку, наливають корошею водкою такь, чтобъ оная на три пальца ихъ покрывала, потомъ завязавши спавять на при или 60аве дней въ горячій песокъ, и процвая сперва чрезъ полошенцо, пошомъ чрезъ про пускную бумагу, принимають от пяннат цани до дванцани пяни капель во всъхъ упомянущых в бользняхв. Многіе кладушь чернобыльникъ отъ блохъ подъ простыни; пакже начиняющь имь, а особливо Нъмцы связавъ въ пучки жареныхъ гусей и утокъ, употребляють вы красномы винь для подкръпленія желудка. Артемизіа есть Греческое, от в имени Артемиси, супруги Маузола, Короля Карійскаго, происходящее имя, по шому что она первая ввела его въ употребление, но другие утверждають, будто бы сіе имя происходило от В Артемиды соименованія Діаны, прекрасной языческой охошницы: ВЪ АптекахЪ имъется трава, Экстрактъ или сгущенной сокЪ и вЪ нъкоторыхъ сиропъ. ГосподинЪ Линней полагаетъ всъ роды чернобыльника вЪ XIX классЪ многобрачных Брасше. nin ?

ній, коих в цвъшные шычки, соединены вм вств въ цилиндръ тычковою головкою (Syngenesia Polygamia superstua); а Господинъ Турнефорть вь XII. Классь, вь III. отдъление, вь IV родь шравь, съ составленнымь, изь многих в вм вств соединенных в цв в точков в, и из в однолистной чашечки выходящимъ цебтомъ. По Гречески 'Артерио'а; по Нъмецки Венбив, St. Johannis Gurtel; Rofher und Weißer-Boof; no Opamycan Armoile ou Herbe de St. Iean; по Италіански Artemisia, Атаrella; по Аглински Mugwort, or common Mugwort.

ARTHEMISIA LEPTOPHYLLOS, Apтемизіа лептофиллось. Смопри Abrota. пит тав, Аброшанумъ масъ.

ARTHEMISIA MAIOR, Apmemusia maioph. Смотри Arthemisia latifolia, Apmeмизіа латифоліа.

ARTHEMISIA MARINA Linn. Apmemuзіа Марина. Смотри Absinthium marinum, Абсинппумъ Маринумъ.

ARTHEMISIA MINIMA Linn. Apmeмизіа минима. Смотри Arthemisia latifolia, Аршемизіа лапифоліа.

ARTHEMISIA MONOCLONOS, Ap темизіа Моноклонось. Смотри Атьговіа, Амброзіа.

ARTHEMISIA NOSTRAS, Apmemusia нострась. Смотри Matricaria, Матрикаріа.

ARTHEMISIA ORIENTALIS, VULGA-RIS FACIE, Apmemusia opienmanuch, пулгарись фаціе. Смотри Artemisia Chiпепбія, Артемизіа ХиненсисЪ.

ARTHEMISIA PARTHENII SPECIES, Артемизіа партенін спецієсь. Смотри Arthemisia latisolia, Аршемизіа лашифоліа.

ARTHEMISIA POLICLONOS, Apmeмизги поликлонось. Смотри Ambrofia, Амброзіа.

ARTHEMISIA PONTICA Linn. Apтемизіа Понтика, Смотри Absinthium Ponticum, АбсиншіумЪ поншикумЪ.

ARTHEMISIA PRIMA VULGARIS,

Артемизіа прима пулгарись. Смотри Pullatilla, Пулсатилла.

ARTHEMISIA RVBRA, Apmemusia рубра. Смотри Arthemisia latisolia, Артемизіа латифоліа.

ARTHEMISIA SANTONICVM Linn. Артемизга Сантоникумь. Смотри Santoпісит, СаншоникумЪ.

ARTHEMISIA TENVIFOLIA, Apmeмизіа тенуифоліа. Смотри Tanacetum, ТанаценумЪ.

ARTHEMISIA TERTIA SATIVA AN-GLICA, Артемизіа терціа сатипа англика. Смотри Arthemisia latifolia, Apmeмизіа лашифоліа.

ARTHEMISIA TRAGACANTHI, Apтемизіа тратаканти. Смотри Matricaria, Матрикаріа

ARTHEMISIA TVRCICA, мизіа турцика. Смотри Botrys, Ботрись.

ARTHEMISIA TVRCICA RAMOSA ALTERA SPECIES, Apmemusia турцика рамоза алтера спеціесь. Смотри Matricaria, матрикаріа.

ARTHEMISIA VNICAVLIS, Apmeмизга уникантись. Смотри Tanacetum odoratum, ТанацешумЪ одорашумЪ.

ARTHEMISIA VULGARIS Linn. Apтемизіа пулгарись. Смотри Arthemisia latifolia, Артемизіа латифоліа.

ARTHETICA, Артетика. Смотри Chamæpithys, Xamenumucb.

ARTHETICA PANDECTARII, Apm. тика Пандектаріи. Смотри Bugula, Бугула.

ARTHETICA SAXONVM, Apmemuka саксонумь. Смотри Lagopus, Лагопусъ.

ARTHRITICA, Aртритика. Смотри Chamæpirhys, Xaмепипись.

ARTHRITICA ALPINA, Apmpumuka Алпина. Смотри Auricula vrfi, Аврикула урси.

ARTHRITICA CAVLE EXIGVO VEL NVLLO, Артритика капле экзигуо пель нулло. Смотри Primula veris, Примула верисъ.

ART-

ARTHRITICA COERVLEIS FLOSCV-LIS, Артритика церуленов флоскулись. Смощри Sanicula Alpina, Саникула Алпина.

ARTHRITICA FLORE PVRPVREO,
Apmpumuka флоре пурпурео. Смотри

Primula veris, Примула верисъ.

ARTHRITICA GENVS ALPINVM, Артритика генусь Алпинумь. Смонири

Auricula vrfi , Аврикула урси.

ARTHRITICA GENVS DALYPODIVM SEV DENSIFOLIVM, Apmpumuka renych ganunogiymb cenb gencuhoniymb. Cmompu Primula veris, Примула верисъ.

ARTHRITICA LVNARIA, Артритика пунаріа. Смотри Auricula vrii, Ав-

рикула урси.

ARTHRITICA PLENO FLORE, Артритика плено флоре. Смотри Primula veris, Примула верисъ.

ARTHRITICVM, Артритикумь. Смотри Primula veris, Примула верись.

ARTICOCA, *Артикока*. Смотри Сіпага, Цинара.

ARTICVLARIS, Apmuny napueb. CMO-

три Primula veris, Примула верисъ.

ARTICVLORVM ANIMA ET THE RIACA, Артикулорумь анима эть Теріака. Смотри Hermodactylus, Гермода-ктилусь.

ARTIFI, Apmudu. Cmompu Tragopo-

gon, Tparonoronb.

ARTIMONIVM, Артимоніумь. Смошри Ругетhrum, Пирешрумъ.

ARTINTHILLA, Артинтилла. Смо-

мри Alchimilla, Алхимилла.
ARTISCHOCHI VULGA FIOR, Арти-

моки пулгаціорь. и

ARTISCHOKA, Артишока. Смотри Cinara, Цинара.

ARTISI, Артиги. Смотри Tragopogon, ТрагопогонЪ.

ARVM ARISARVM Linn. Арумь Аризарумь. Смотри Arifarum, Аризарумь. ARVM COLOCASIA Linn. Арумь колоказіа. Смотри Colocafia, Колоказіа.

ARVM DRACONTIVM Linn. Арумь драконціумь. Смощри Dracontium, Драконціумь.

ARVM DRACVNCVLVS, Арумь дракункулусь. Смотри Dracunculus, Дракуй-

кулусЪ.

ARVM LINGVLATVM Linn. Арумь лингулатумь. Смощри Arum Офс. Арумь Оффиц.

ARVM MACVLATVM Linn. Apymb Makynamymb. Cmompu Arum venis albis,

АрумЪ венисЪ албисЪ.

ARVM MAIVS CAVLESCENS LA-PATHI FOLIIS, Apymb manoch канлясценсь ланати фолінсь. Смотри Dracunculus maior, Дракункулусь маіорь.

ARVM MAIVS VERONENSE, Арумь маюсь Вероненсе. Смощри Агівагит, Ариза.

румЪ.

ARVM MAXIMVM AEGYPTIACVM, Арумь максимумь Египціанумь. Смотри Союсабіа, Колокасіа.

ARVM MINVS, Apymb munycb. CMo.

mpu Arifarum, АрисарумЪ.

ARVM NIGRICANTIBVS LITVRIS SIGNATVM, Apymb нигрикантивусь то турись сигнатумь.

ARVM NON MACVEATVM, Apymo

нонь макулатумь. Смотри

АRVM OFFICINARVM. I. В. п. 783. Спав. 258. Raii. Hift. п. 1208. Synop. пт. 266. Dill. Cat. Gift. 56. Арумь оффиционарумь. Arum lingulatum Linn. Arum vulgare non maculatum. С. В. Pit. Tournef. Агон. Brunf. Geln. XX. Обраски трана, а съ нъмецкаго, Итмецкий Инбира или Телячья нога расшеть на поляхъ на тънистыхъ мъстахъ. Листья распускаются въ мърть, а цвъть распускаются въ нонь мъсяцъ. Она имъсть продолговатые, широкіе, треугольные, или какъ сердечко вытръзанные, зелемые, гладкіе, лоснящіеся и объякное

обыкновенно по одиначкъ на черешкъ сидящіе листья, изъ средины коихъ возвыша. ется маленькій, круглый, кЪ верьху острый и красноватый стебелекь, производящій изъ вершины своей однолисшный, выпуклисшый и трубкою расположенный пурпуровый цв втв, послѣ которато показываются красныя и на подобіє кЪ верьку спонщихЪ кисточекЪ, другЪ на другь сидящія ягодки, заключающія въ себъ по одному, а иногда и по два съмяч. ка. Корень у нее бълый, продолговашый, и волокнистый составлень изъ кругловатыхъ, между собою соединенных в колтицовъ и ам веть пряный вкусь. Качеством в своим в сходствуеть сія трава съ Сухотнымъ корнемъ (Arum venis albis, Арумъ венисъ албисъ) съ которымъ и въ одинъ классъ полагается. По Гречески Адог; по Арабски Iarus, или Sara; по Нъмецки Uron, Pfaffen= pint; Deutscher Ingwer; по Француски Pied de Veau; по Ишаліански Аго; по Аглински Wake - Robin , Cuckow - Point or common Wake Robin without spots, or Priests' pintle.

ARVM PALVSTRE, Apymb nanycmpe. Смотри Dracunculus aquaticus, ДракункулусЪ

акватикусЪ.

ARVM POLYPHYLLVM, Apymb Troлифиллумь. Смотри Dracontium, Дракон-

ARVM SCORZONERAE FOLIO. A-Румь скорзонере фолго. Смотри Arifarum, АризарумЪ.

ARVM VENIS ALBIS C. B. Apymb Tenneb areneb. Arum maculatum Linn. et Cord. Schroder. Aron aliud folio maculato. Dracunculus minor. Ges. Aplac. Dracunculus alter seu Henirophyllos. Cord. Hist. Arisarum. Matth. Dod. Gal. Сухотный корень, Горныя обраски права расшеть на гориспых в мъсшан в и имъеть треугольные, стрелоподобные и шемно зеленые, бълымм пяшнышками попещренные лиспъя прямый и зеленый сшебель въ шесть верьшковъ вышиною и круглый, пюлстый, съ наружи темнованый, а внутри бълый, во-

локнистый и изъ многихъ составовъ составленный корень. Обраски есть особливое и ошь другихь вь томь отмичающееся расшеніе, что цвітное основаніе у него продолжено и писшиллы (пестики или женочки) находятся на немЪ, а стамина (тычки или мужчинки) на верьхней части, такЪ что песпики бывають внв и около пычковь. Оба рода сей травы содержать въ себъ много соленых в частей, но въ Медицинъ употребляются одни их в корни, которые гр вють, сущать, разжижають, укръпляють желудокъ, поспъществують варенію пищи придающь аппешишь, унимающь рызь вы животь, гонять мочу, разбивають стустившуюся кровь и густыя нечистыя мокроты въ легкомъ, утоляютъ рвоту и раздробляюшъ бубоны или язвенныя шишки. Многіе шолкушъ ихъ въ порошокъ и принимаюшъ оной либо въ водъ въ количествъ отъ чешверши до цёлаго золошника, либо смёшивающь сь мукою, пекушь изь оной хавбь и упопребляющь сь пользою оть удушія, одышки и водяной бользни. Индіанцы живущіе Америкъ, гдъ сія права растеть въ множествв, жарять и употребляють ихъ въ пищу. Ихъ выкапывающь въ Маршъ мъсяць. Въ Апшекахъ имъешся цъльный въ порошокъ истолченный, и съ уксусомъ приготовленный корень, и перегонная вода, которая почищается полезною от яду всяких в отравв, и заражающих в или прилипчивых в бол взней, в в которых в должно ее употреблять по утрамь и вечерамь по полной столовой ложкъ. Господинъ Линней полагаеть ихь вь ХХ. классь расшеній им вющих в в в своем в цв в тв десять мужчинокъ съ пестиками сросшихся (Gynandria Decandria); а Господинъ Турнефортъ въ III. Классъ, въ І, ощавленіе, въ 1 родъ травъ съ однолисшнымъ не правильнымъ цвъщомъ. Арумь есть Лашинское от слова ... вредь, происходящее имя, потому чию древние почитали сію траву вредною. По Гречески 'Адог хвижоведот з по Ивмецки Aron mit weiß gesprenckels

284

sten Blattern, Magen или Fieber-Burt; St. Johannis-Haupt; по Француски Pied de Veau à feuilles marquetées de taches blanches; по Италіански Aro con foglie marquate con vene bianche; по Аглински Common spotted Wake Robin.

ARVM VIRGINIANVM Linn. Apymb Buprunianymb. Cmompu Dracunculus maior,

Дракункулусь мајорь.

ARVM VULGARE, Арумь пулгаре. Смотри Arum officinarum, Арумь оффицинарумъ.

ARVNDINACEA PINNATA ET SPI-NOSA, Арундинацеа пинната эть спимоза. Смотри Cereus, Цереусъ.

ARVNDO AMNICA, Арундо Амника. Смотри Arundo vulgaris, Арундо вул-

тарисЪ.

ARVNDO ARBOR, IN QVA HVMOR LACTEVS GIGNITVR, QVI TABAXIR AVICENNAE ET ARABIBVS DICITVR. C. B. Pin. 18. Hift. Oxon. III. 219. Apyngo appopb, unb kna rymopb лактеусь титнитурь, кпи табаксирь Апиценне эть Арабибусь дицитурь. и

ARVNDO ARBOR TABAXIFERA C. B. Theat. 285. Apyngo appopb masaxcu-

фера. и

ARVNDO ARBOREA MAMBV VEL BAMBOV DICTA; Apyngo appopea Mamsy пель Бамбу дикта. Смощри Bambos, Бамбось.

ARVNDO ARENARIA Linn. Арундо аренаріа. Смотри Arundo vulgaris, Арундо вулгарись.

ARVNDO BAMBOS Linn. Apyngo

Бамбось. Смотри Ватьов, Бамбось.

ARVNDO CALAMAGROSTIS Linn.

Apyngo kanamar pocmucb. Смотри Butomus,

Бутомусь.

ARVNDO CYPRIA, Арундо Ципріа. и ARVNDO DOMESTICA, Арундо до-

ARVNDO DONAX Linn. Apyngo go-

наксь. Смотри Arundo Satiua, Арундо Са-

ARVNDO FARCTA GER. 33. Emac. 37. Flaua, offic. C. B. Pin. 17. Theat. 277. Raii. Hift. II. 1.277. Hift. Oxon. III. 221. II. Сирской остроконечный Тростникь, привозится изъ Сиріи. По Гречески Κάλαμος Σύριακός; по Нѣмецки Ӌfeil-ℜohr; по Француски Canna per gettar Dardi; по Аглински The Dart Weed.

ARVNDO FARCTA FLAVA Оffic С. В. Арундо фаркта флапа. и

ARVNDO FARCTA NONA Park Theat. 1210. Арундо фаркта нона. Смотря Arundo Farcia, Арундо фаркта.

ARVNDO FLAVA, Арундо флана. А ARVNDO FOEMINA SECVNDA, А рундо фемина секунда. Смотри Arundo farcta, Арундо фаркта.

ARVNDO GENICVLATA, Арундо теникулата. Смотри Arundo farcta, Арундо фаркта.

ARVNDO GRACILIS ALIA, Apyngo rpayunuch ania. Тожъ.

ARVNDO HORTENSIS. I В. Арундо гортенсись. Смотри Arundo sativa, Арундо сатива.

ARVNDO INDICA MAXIMA ARBOREA CORTICE SPINOSO HERMANNIA Syen. in not. Hort. Mal. C. Comm. Flo. Mal. 36. Apyngo Unguka Makcima appopea kopmune chunoso Tepmannu. Cmomph Bambos, Bamboob.

ARVNDO ITALICA MAIOR, Аруно до Италика майорь. Смотри Arundo за tiva, Арундо сатива.

ARVNDO MAMBY, Pinson Mant. Arom 186. Raii. Hist. II. 1315. Apyngo mamby Смощри Ватьов, Бамбось.

ARVNDO MAXIMA, Apyngo makcuma. u ARVNDO MINIMA, Арундо миніма. Смотри Arundo sativa, Арундо сатива.

ARVNDO NASTOS, Арундо настось. Смотри Arundo farcta, Арундо фаркта.

ARVNDO OFFICINARVM, Apyngo Оффицинарумь. Arundo vallatoria. Ger. 32. Emac. 36. Raii. Hift. 11. 1275. Synop. 41. 401. Mer. Pin. 11. Arundo vulgaris. I. B. Arundo vulgaris. C. B. Pit. Tournef. Arundo phragmites Linn. Canna fecunda quæ fæmina. Dios. Ang. Calamus vulgaris. Cord. in Diose. XVII. Тростникь, Трость; Камышь, Мятлина, Осоть или Очереть по Украински расшеть вы болошахъ, вь прудахь, въ озерахь и другихъ стоящихъ водахъ. Онъ имъешъ многочисленные и узлами перехваченные коренья, производящие длинные, внутри пустые, на многіе кол вицы разд вленные и въ мизинецъ толщиною бывающие зеленые стебли или шрубки, кои выпускающь изъ своихъ кол внцовъ, длинные, широкіе, жескіе, прямо стоящіе, от части стебель закрывающіе, негладкіе, и по объимъ краямъ острые листыя. На вершинъ трубки вырастають пурпуровые, по пяти изъ шелушной чашечки выходящие, маленькие и изъ молошочковъ или шылковъ сосшавленные цвъты, которые при совершенномъ распрышій получають пепельный цвыть, разносящея выпромы и оставляють кругловашыя съмячки. Почши всъ соршы Тросшниковъ содержащъ въ себъ много масла и соли. Цвыть и листья полезны оть рань. Црыть варять вы водь и вы пивь, процъживають и подсластя сахаромъ или медомъ, употребляють оть одышки, застарвлаго кашля и чахотки. Корни чистять, содержать испражнение свободнымъ, гонятъ крови и мочу, производящь пошь, разжижающь и вареные въ водъ прогоняють воспенныя пянна. Свёжіе истолчены будучи съ луком в и смъщаны съ медом в или вином в вышигивають занозы; приложенные на подобіе пластыря они разбивають опухоли и нарывы и утоляють боль вывихнутых в членовь какь у людей, такь и у скота; а вајеными въ щолокъ моюшь съ пользою голову от болячек и других в нечистоть кожи. ВЪ нъкопюрыхЪ деревняхЪ употребляють простникь на покрышку избь, и на устиланіе имъ половъ; также можно дълать изъ него разные ткальные инструменшы. Въ Аншекахъ упошребляющъ его весьма радко: Арундо если Лашинское, смысла не им вющее слово, хошя многіе оное и произдоводящь ошь слова арео, сохну. Госполинь Линней полагаеть всв роды прость никовъ въ III. классъ расшеній, имъющихъ вь своемь цвьть три тычка, и два пестика (Triandria Digynia) А господивЪ Турнефорть въ XV. классъ, въ III отдъление. въ ІХ. родъ расшеній съ безлисшичнымъ цвышомь. По Гречески франции или Кала-1005 г по Арабски Calab; по Нъменки Жори Ried: Schilf unu gemein Robr: no peangycher Canne ou Roleau; по Италіански Саппа о Calamo; по Аглински Reed. Common Reed. or Common Pool Reed.

ARVNDO OCTAVA, Арундо октана. Смотри Saccharum, Сахарумъ.

ARVNDO PALVSTRIS, Арундо палустрись. Смотри Arundo Officinarum, Арундо Оффицинарумъ:

ARVNDO PHRAGMITES Linn: Арунgo фрагмитесь. Смотри Arundo Officinarum, Арундо Оффицинарумь.

ARVNDO PRIMA, Арундо прима. Смотри Arundo farcta, Арундо фаркта.

ARVNDO SACHARIFERA, Арундо Сахарифера. Смотри Sacharum, Сахарумъ.

ARVNDO SATIVA, Apyngo camuna. Arundo Donax. Linni Arundo maxima et hortensis. I. B. Canna quarta quae Donax I. B. III. Ппанскій Тростнико растеть только вы теплыкы странажы, какы вы Америкы, вы Гишпаній и Италіи, гды надоч-

но размножають его вь садахь и бываеть прехь родовь, одинь сь желпо попещрен нымЪ, другой съ бълымЪ, а третій прекраснымЪ и лилев подобнымЪ цвъщомъ. Сіе расшеніе имъешъ большіе, гладкіе, свѣтло - зеленые и табашным в нвсколько подобные лисшья, и производишь между оными два, но обыкновенно одинъ высокій, правяниспый зеленый, коленчатый стебель или трубку. Цвъть на немъ такой же какЪ и на простникъ, имъетъ вверьку упомянуные колеры и осшавляеть послъ себя шершавыя и продолгованю - круглыя шелухи, въ которыхъ находятся по одному черному, круглому, какЪ камень кръпкому, и видомъ и величиною гороховому зерну подобному съмячку. Сте растенте требуеть корошую щепную съ ръчнымъ чиспымъ пескомЪ смѣшанную землю, частую на солнцѣ нъсколько времяни стоящею водою лѣтомЪ поливку, и шеплыя солнцемЪ долго огреваваемыя и от сверных и восточных в в в тровь защищенныя мъста: но еще передъ Михайловым в днем в должно оное вносить в в оранжереи или въ теплицы, и оставлять вь оныхь чрезь всю зиму безь поливанія, на тепломъ мъсть. Размножение онаго дълаешся двоякимъ образомъ, какъ изъ молодыхЪ, вЪ Мартъ мъсяцъвъ упомянутую землю сажаемых в, и в в оной до л в ше плой горницъ сохраняемых в отпрысковъ, и изъ съмяни, которое должно ради крвпости его, не множко вверьху распилить, только безЪ поврежденія сердца, мочить цілую неділю въ водъ, въ которую положено не много селишры и расшершаго сушенаго овечьяго кала, и потомъ впыкать въ землю на парники на палецъ глубины, а когда на столькож вышины начнет вырастать, то пересаживать въ горшки, выставливать на солнце и при сухой погодъ часто поливать. Зола его исцъляеть всякія гнилыя и распространяющіяся нарывы, особливо случающіяся во рту. Листья обмоченные въ водь съ уксусомъ, или въ виноградномъ

винъ, составляють превосходное средство отъ свъжихъ нарывовъ. Сженая кора способствуеть къ ращенію волось. Оно полагаепіся съ Тростникомъ вь одинъ классь. По Гречески Догаз по Нъмецки Ерапію oder Indianisches Rohr; по Француски Canne d' Espagne; по Ишаліански Canna di Spagna; по Аглински The Spanish or West Indian Cane-Reed.

ARVNDO SCRIPTORIA. Offic. Ger. 34. Emac. 37. I. B. 11. 487. Raii. Hist. 11. 1276. Hist. Oxon III. 219. Арундо скрип. mopia. Harundo minor sive Elegia. Park Theat. 1211. Пилцій Тростникь растеть на влажных в и сырых в мъсшах в въ Греціи, Ипіаліи и въ Азіи и употребляется Турками и другими воспючными народами носящими его всегда съ собою въ карманахъ, вмъсто перьевъ для писанія. По Гречески Φραγμίτης ησί Κάλαμος μειον; πο Η Εмецки Echreib-Rohr; по Француски Canne, Rofeau pour écrire; по Ишахіански Саппа per scrivere; по Аглински Writing Reed.

ARVNDO SYLVATICA ELATIOR PANICVLA MOLLI ET SERICI MODO LV-CENTI Hist. Oxon. III. 218. Apyngo cut. натика элаціорь паникула молли эть серици модо луценти. Смотри Gramen Arundinaceum, Грамеи В Арундинацеум В.

ARVNDO SYRIACA AROMATICA FOLIIS EX ADVERSO SITIS, Hift. Oxon. н. 221. Арундо Сиріака ароматика фолінсь эксь адперсо ситись. Смотри Саlamus aromaticus, Каламусъ аромашикусъ.

ARVNDO VALLATORIA Raii Hist. н. 1275. Арундо паллаторіа. Смотри А rundo Officinarum, Арундо Оффицинарумъ.

ARVNDO VIBABRASILIENSIBVS DIC ТА Рів. (1648) Арундо шиба Бразилівня сивусь дикта. Sacharum, Сахарумъ.

ARVNDO VULGARIS, Apyngo IYA

тарись. Смотри Arundo Officinarum.

ARZ, Арзь Смощри Огуга, Ориза. ASA, Aca. CMompu Affa, Acca.

ASA DVLCIS, Aca gynunch. Смотри Benzoinum, БензоинумЪ.

ASA FOETIDA, Aca pemuga. Cmoтри Almarhoc, АсмаргокЪ.

ASA ODORATA, Aca ogopama. CMompи Benzoinum, БензоинумЪ.

ASACH, Acaxb. CMompk Thus, Tycb. ASAGEN, Acarenb. M ASAGNE, Acarne. u

ASANGE, Acante. Смотри Sanguis Draconis, Сангвисъ Драконисъ.

ASANTHEA, Acanmea. Смотри Nymрћаеа, Нимфеа.

ASARA, Acapa. Cmompu Nardus rustica, Нардусъ русшика.

ASARATH, Asapamb. CMompu Bangue, Бангуе.

ASARI, Асари. Смотри Afarina, Азарина. ASARIEN , Asapient. Смотри Nardus rustica, Нардусъ рустика.

ASARINA. Lob. Lugd. Pit. Tournef. Азарина. Antirrhinum Alarina Linn. Alarina Lobelii, flore Hederae terrestris I. B. Asarina siue saxatilis hederula. Lob. Icon. Hedera saxatilis magno flore C. B. III. Auxin Hogлъсникві, каменный Плющь, есть маленькая на гориспых в и камениспых в мъспах в растущая и въ Маїв и Іюнь мъсяцахъ цвьтущая трава роду подлесника (Afarum, Азарумъ), которая имъетъ волокнистые ко-Ренья, приземистые стебли, БудровымЪ (Неdera terrestris, Гедера террестрисЪ) подобные, зеленые, по землъ разстилающиеся листья, и трубкою свитые, однолисточные и на цвъты Львовых b устовъ (Antirrhinum, АнтирргинумЪ) похожіе цвёты, послё коихЪ показывается обведенная перепонистою шелухою капсула, заключающая въ двухъ своих в гивадах в продолгованыя свиячки. Она содержить въ себъ много соли и посредственную часть масла и влажности, отворяеть засорившеся сосуды и почипается полезною оть рань, вовь въ легкомъ, отъ удушія и засоренія

Yacma I.

въ почкахъ. Азарина есть Латинское отъ имени травы Азарумь Подлесникь произжодящее имя, по тому, что она видомъ съ оною сходствуеть. Господинь Линней полагаешь ее въ XIV. классь расшеній, имъющих въ своемъ цвътъ четыре тычка, изъ коихъ два длинные, а два короткіе (Didynamia) а господинъ Турнефорть въ III. классь, въ IV. отдъление, въ III. родъ правъ съ однолиспинымъ, не правильнымЪ, репейченымЪ и прубчанымЪ цв втомЪ. по Гречески "Абарог аурбог; по Нъмецки раfel-Wurk mit Bundelreb = Blumen ; по Француски Asarine; по Италіански Asar saluatico, по Аглински Wild Asarabacca.

ASARVM Dod. I B Pit. Tournef. A3abymb. Afarum Europaeum Linn. Nardus rustica. Hoff. Flo Altorff. Sanguis Martis, Baccaris, Vulgago, Perpensa IV. Подлесничь, Облапа или Охпатка простая, Копытникь, Копетень, Подорышникь, Сухой Водолень, Скипидарной корень, Дикой Перець, Пхихопникь, есть маленькая трав ка, растущая въ лъсахъ, поль оръшинами, въ кустарникахъ лежащихъ при подощвъ горь, и на півнистых и вітрамь не подверженных в мъстах в, и цвътущая в в Іюль мъсяцъ. Она имъенъ понкіе, загнупые, волокнистые, кол внчатые, свроватые и скипидарный прошивный запахь имъюще коренья, маленькіе, гладкіе, жирные, не большую выемку, на подобіе почекъ имъющіе, кЪ концу притупленные, лоснящіеся, зимою не замерзающіе, всегда зелен вющіе и на длинных в стеблях в утверждающиеся листья и между оными близь корня на нъжныхъ длинных вырастающие, из вырастающие, двенатцати темновато - пурпуровых В молоточковъ составленные, душистые и шелухою покрывающіеся цвіточки, содержащіе въ шелухъ своей угловатое, маленькое, бълою жидкостью напоенное и виноградному зерну, подобное съмячко. Листья и корень содержать въ себв много соли и масла,

2.92

слабять, разбивають густыя мокроты, и выгоняющь оныя либо испражнениемь, либо рвошою, гоняшь крови, и плодь, производяшь рвошу, чвмь и лихорадку истребляють, и полезны оть одышки, желчи и водяной бользни; въ маломъ количествъ съ козьимъ молокомъ рареный корень, выгоняешр льезр низр жечный мокрошы и гомипр мочу. Его толкуть въ порошокъ и принимають по утрамь на тощакь вы количествь одного золошника въ бъломъ виноградномъ винь, наблюдая при шомъ шакое же ошъ пинци воздержаніе, какое при слабительных в. Порошокъ изъ листовъ нюхають для того, чтобь онь болье вышиливаль мокроть изъ ноздрей вв продолжительных в головных в бол взнях в. Сіе л вкарство весьма полезно оть встхь трехь и четырехь дневных в ликорадокЪ, отъ желчи, застарълой боли въ лядвеяхЪ, очищаетЪ желудокЪ отЪ дурных в и сырых в мокротв и отворяет в за сореніе въ почкъ, селезенкъ, машкъ, и ошъ внутренных в нарывов в. Из в травы дёлаемая мазь употребляется от лому въ ногахЪ. Многіе мішають листья въ лошади. иый кормЪ, дабы очистить ихЪ внутреннее; а вЪ Нѣмецкой землѣ молошницы кладушЪ оные свъжіе, въ свъже - доенное молоко, чтобь гуще садилось и давало бол ве снимокъ. Есть еще особливый родъ Подлесника растущій вЪ Америкъ вЪ Канадъ (Alarum Canadense Linn. Asapymb Kanagence; котораго листья остроконечные и подобные видомЪ почкъ и коего коренья не слабять и употребляются Индіанцами вЪ пищу вмѣсто Инбиря. Азарумь есть Греческое от словь ж не, σαίζω, украшаю происходящее имя, какъ бы сказашь ни къ какому украшенію не служащая права, по тому что *древніе* в в в в в в ках в и гирландах в своих в ее не упошребляли. ВЪ АпшекахЪ имвешся трава, корень и двлается экстракть. ГосподинЪ Линней полагаеть ее въ XI. жлассь расшеній, им вющих в в своем в цевть оть двенапцати до девящнапцати

пычковъ и одинъ пестикъ. (Dodecandria Monogynia) а господинЪ Турнефортъ въ XV. классь, вы І отдъленіе вы І. роды правы сы стаминным в или из в пычков в состоящим в цввтомЪ; задняя часть чашечки котораго превращается въ съмянодержательницу. По Гречески Ασαρόν, ησή Νάρδος άγρία; по Арабски Ава ron; По Нъменки Даје! « Двигв: по Француски Cabaret, Nard fauvage, Oreille d'homme, Oreillette Girard Roussin, Rondelle; по Италіански Alaro o Nardo faluatico; по Атлински Alarabacca.

ASARVM CANADENSE Linn, A3d. румь Канаденсе. Смотри Авагит, Азарумь.

ASARVM CYCLAMINIS FOLIO VIR* GINIANVM Dornis. M. SS. Cat. Asapymb Цикламинись фоліо Виргиніанумь. Смотри Serpentaria nigra, Серпентаріа нигра.

ASARVM EVROPAEVM Linn. A30румь Епропеумь. Смотри Авагит, Аза-

румЪ.

ASARVM HYPOCISTIDIS Linn. Asaрумь Гипоцистичнов. Смотри Hypociftis, ГипоцистисЪ.

ASARVM VIRGINIANVM Linn. A30румь Виргиніанумь. Смотри Serpentaria nigra, Серпеншаріа нигра.

ASARVM VULGARE, Asapymb IIIM

rape. Смотри Asarum, АзарумЪ.

ASCALONIA СЕРА, Аскалоніа цепа. Cepa Ascalonica offic. Matth. Pit. Tournet. Cepa sterilis. C. B. Pin. 72. Ascalonitides. Ger. Emac. 170 Allium Ascalonicum Linn. VI. Шарлоть или Ивмецкій лукь, светь ся въ садахъ. Корень его есть бълая круглая маленькая головка или луковка, им вющая вкусЪ и запахЪ чесношный полько не споль кръпокъ; онъ имъептъ длинные, широкіе, кЪ верьку заощренные, блёдно-зеленые, прубкою завивающіеся и съ корнем в равный вкусъ нмъюще лиспья, между но ими возвышается прямый, голый и кръпкій стебель, производящій из вершины своей пустый и изъ маленькихъ, шестилисточ-

ныхЪ, и на подобіе колокольчиковЪ расположенных в бъло - пурпуровых в цв в почков в составленный пучекъ. Послъ цвътовъ показывающся почти совсъмъ круглыя головки, раздъленныя внутри на три гивзда и наполненныя продолговащыми съмячками. Корень или лучше сказашь луковка его вЪ великомЪ употреблени на поварняхЪ, вЪ соусахЪ, въ разныхъ начинкахъ и другихъ кушаніях , также и вареная в уксуст, а Аистыя его въ салатахъ, а въ Нъмецкой землъ въ яишницахъ. Она содержитъ ъъ себъ много соли и масла, полезна во время дурнаго воздуху, разбиваешь, возбуждаешь аппешишь, гонишь мочу и мъсячное, поспъшествуетъ родамъ и полезна отъ каменной бол взни. Листья мочуть въ винъ и пьють оть ръзу въ нижней части живота и ощъ причиненной отъ задержанія мочи, и поврежденія въ пузыръ боли. По совъту Господина Гаубіуса выжашый и съ козьимъ молокомъ или съ медомъ въ пишъвупотребленный изъ нее сокъ, разбиваетъ мокроты въ легкомъ, унимаетъ течение крови изъ носу, кровохарканіе, от ужаленія змей, и полезень от Антонова огня. Наружно съ пользою употребляется от почечуйной боли, случающейся въ сихъ мъстах в опухом и оть гніющихь нарывовь. Обмоченнымь вь деревянномъ маслъ стеблемъ можно вынимать изъ горла рыбные кости, ежели кто по нещастію подавится. Аскалоніа есть Латинское от имяни Азіатской Провинціи Аскалоніи происходящее имя, по тому что сего рода лукъ росъ тамъ въ множествь. Господинъ Линней полагаетъ его въ VI. классъ расшеній, имъющихъ въ своемЪ цвѣтъ шесть тычковъ и одинъ пестикъ (Hexandria Monogynia) а господинъ Турне. форшЪ вЪ IX. классъ вЪ I. отдъленіе, вЪ XI. Родъ правъ съ лилейнымъ изъ шести листочковъ составленнымъ цвътомъ. По Гречески Κρόμμυον ασκαλόνικον ή Γερμανικόν; πο Ηδικεμκι Eschlauch; по Француски Eschalottes, Appetis.

ASC

по Ишаліански Scalogna, Cipolla; по Аглински a Schalott Scallion, Barren Onions, Escalots.

ASCE, Асце. Смотри Thymus, Тимусъ. ASCEBETE, Асцевете. Смотри Anethum, АнешумЪ.

ASCELECH, Achenexb. CMompu Siligo.

Силиго.

ASCELLA, Acyenna. Cmompu Agrimoпіа, Агримоніа.

ASCET, Acyemb. CMompa Balaustia,

Балавстіа.

ASCHEBETA, Асхебета. Смощри Mandragora, Мандрагора.

ASCHIL, Асхиль. Смотри Scylla, Сцилла. ASCIL, Асциль. Смотри то же.

ASCLEPIAS, Ackneniach. Cmompu Vinсетохісит, ВинцепоксикумЪ.

ASCLEPIAS ALTERA FLORE NIGRO. Асклепіась алтера флоре нигро. и

ASCLEPIAS FLORE ALBO, Ackneni.

ась флоре альо. и

ASCLEPIAS VINCETOXICVM Lion. Асклепіась пинцетоксикумь. Смотри Vinсетохісит, ВинцепоксикумЪ.

ASCLEPIVM Linn. ACKRETTIYMB. CMO-

mpu Thapsia, Tancia.

ASCOLIMBROS, ACKORUMEPOCE. CMOтри Scolymus, Сколимусъ.

ASCOLOCONDRIA, Асколокондріа. Смотри Scolopendrium, СколопендріумЪ.

ASCYRON, Acumponb. u

ASCYRVM HYPERICOIDES Linn. Acцирумь Гиперикоидесь. и

ASCYRVM VILLOSVM Linn. Acumрумь пиллозумь. Смотри Hypericum, ГиперикумЪ.

ASEBRAN, Асеврань. Смотри Efula, Эзула. ASELLA, Asenna. Cmompu Agrimonia, Агримоніа.

ASELGAS, Acenrach. Cmompu Beta, Bema. ASELIS, Azenuch. Смотри Hysfopus, ГиссопусЪ.

ASENESVM, Asenesymb. Cmompu Abfinthium, A6cuniniymb. ASE.

ASENOSVM, Acenosymb. Cmompn Saturcia, Camppeia.

ASEPEAFINE. Азепеафине. Смопіри Viscus quercinus, Вискусъ кверцинусъ.

ASERED, Aseregb. Cmompu Acetofa, Ацетоза.

ASERO, Азеро. Смотри Егиса, Ерука. ASESEN, Acesenb. CMompu Absinthium, АбсинтіумЪ.

ASININAE GALLAE, Aзинине галле. Смотри Gallae, галле.

ASKVMKVDOS, ACKYMKY gocb. CMOтри Stoechas Arabica, Стехасъ Арабика.

ASMARHOC, Acmaproxb. Ferula Affa loctida Linn. III. Acmaproxb ecms въ Азіи, вь Либіи, Сиріи, въ Мидіи, и въ Персім около Конга въ Хоразанской Провинціи растущая трава, изъ корня которой вышькаеть смолистый сокь, или Гумми названное (Affa foetida, Acca фетида) или дурный духв, а св Нъмецкаю Чертопв каль. Она походишь по внышному своему виду на зорю (Leuisticum, ЛевистикумЪ) и имъетъ Піонным в подобные, къ концу шупые, выръзчатые, поперемънно разряженные листьяна пустарнаковых похожія сімяна. Корень снаружи черновать, и когда его разръжешь, бый, густый, изъ желшоватых блестящих в кусочков в составленный и произитель. ный прошивный запахь, имфющий сокъ или смола. Лучшая должна бышь привовъ кускахъ чистая, пемножелзима шаго цввта, наполнена бълыми крупинками, и имфть крфпкій, вонючій и къ чесношному подходящій запахв. Чёмв долве онв лежить, темь болве темиветь, а естыли полежить на солнць, то начинаеть гнить. Многіс почитають сей сокь за смолу или Гумми, но Господинъ Неймань въ Химій своей называеть оный стущеннымЪ сокомЪ (Succus condenfatus). ОнЪ часто смъщивается съ Сагапеномъ, Персидскою смолою и другими тому подобными вещами, чего ради чистой рЕдко и достать можно, а узнавающь хорошій по-

тому, естьми онъжжеть на языкъ. Асса фетида или дурный духь содержишь въ себ много сырой, масличной, острой, и вонючей соли, очень полезень опть всяких в женских в, осо бливо Гисперических Б бол Взней, или припа А. ковь машки, разбиваеть, разжижаеть, умяг чаеть, чистить, утишаеть внутреннія судо роги, производить поть, гонить крови, воз буждаеть любострастіе, укръпляеть желу докъ, прогоняеть ворчание въ животъ, Она уменьшаеть колопье, выгоняеть глисты, разгоняеть бываемый посль апоплексіи сонь, причинлеть испарину, и употребляется отв воспаленія леткато и ошь рань. Большая часшь женщинъ носяпь въ карманахъ либо здълан ной изъ него порошокъ, либо спиртъ или шарики, и нюхають выслучав тошноты и маточных в припадков в. Приложенный св нару жи спирть двлаеть кожу красною и надуваешь пузыри, а распущенный въ уксуст упо шребляется в b опасном b, носовом b чирь в (Ozace па), и ошь ногтовды. Вь Ньмецкой земав, осо бливо въ верхней Гессіи, многіе люди употре бляють его вмъсто чесноку съ жаренымь, потерявние запах в напирають им в блюды, чашки и поръки, на коих в подають им в ку шанія; шакъ какъ вь Азіи, неанцы, и Ма лайцы приправляють имь вмъсто пряных зелій, свои пищи. Коновалы упопребляють ero весьма часто от в конских в бользней. В в Алшеках в им вешся порошок в, Эссенція и Пилюли, выгоняющія восну и корь. Господин В Линней полагаеть производящее оной расшениевь V. класов им вющих в в своем в цввшв папив тычковъ и два пестика (Pentandria Digynia) в Господинь Турнефорть въ VII. классь, въ 1V. родь правь съ круглымъ, въ кружокъ расположеннымЪ, и пучкомЪ растущимЪ цвттомЪ, котораго чашечка превращается въ два широковашыя и глубоко бороздчашыя съмячки. По Гречески Опос Мубінос или Егріанос; Мидскій или Сирскій сокЪ; древніе Греки называли оной Киспратов, Циринейскій; по Арабски Altiht; по Малайски и Явански Hin; по Персидски Hingile;

ASM

6

6-

по Нъмецки Teufels, Drect; oder stinckender श्रिवात, по Французски Asse setide; по Италіански Assa setida; по Аглински Devl's bit or Dung.

ASM

ASMELEGEN, Acmenerent. Cmompu

Sinapi, Синапи.

ASONORVTS, Асонорутсь есть Ма дагаскарское дерево имъющее пресладкій вкусь и служащее на дъланіе гребней. По Гречески Арогорвтζ, δενδρον τῶ μαδαγασπάρ; по Нъмецки Ябопогитв, Вашт ит Мададавсаг; по Француски Alonoruts, arbre du Madagascar; по Италіански Alonoruts, albero del Madagascar; по Аглински Alonoruts an Madagascar-trée.

ASON PASSECH, Асонь Пассехь, есть Мадагаскарское дерево, приносящее пріятнаго вкуса плодъ, съ финикъ величиною. По Гречески 'Аσσον πασσέχ, δειδρον τε Μαδαγασπάρ; по Нъмецки Ипоп Рапесь, еіп Вант ін Madagafcar; по Француски Affon Paffech, arbre du Madagafcar; по Италіа вски Affon paffech, albero del Madagafcar; по Аглински Affon paffech, an Madagasar-trée.

ASONZENAS DE LAS INDAS, A304-3enach ge nach Unzach. Cmompu Narcissus,

Нарциссусь.

ASPALATHVM. Аспалатумь. м ASPALATHVS, Аспалатусь. Смо-

ASPALATHVS ARBORESCENS. Gmel. XIII. Аспалатусь арборесценсь. Китайскій горохь. Описаніе сего расшенія не могь я нигдъ найши.

ASPALATHVS ALTER PRIMVS, Аспалатусь алтерь примусь. Смотри Genista spartium Spinosum, Гениста спарці-

ASPALATHVS EBENVS Linn. Аспа. патусь эбенусь. Смотри Ebenus, Эбенусь.

АSPALATHVS INDICA Linn. Аспапатусь Индика. Золотое дерено или Дикій Индіанскій Тернь, есть твердое, тяжелое, душистое, темно-пурпуроваго цвіта п жилками испещренное дерево, которое

нокрыто толстою, сброватою, не гладкою и какЪ золото лосиящеюся корою. По утвержденіямь многихь авторовь растеть сіе деревцо въ Индіи, обсажено бълыми иглами, и имъетъ преугольные, копьевидяые, къ концу притупленные, маленькіе, піемнозеленые и по пяши вмість сидящів листья и бабдножелтые, колокольчистые цвѣпы. Сіе дерево привозится кЪ намЪ кусками и должно бышь употребляемо безъ коры. Оно содержить въ себъ много масла и автучей соли, чистить, укрвпляеть, возбуждаеть поть и прошивится гнилоспи, но ръдко бываетъ вЪ АпшекахЪ, а вм'всто онаго употребляють дерево (Lignum Aloes, Лигнумъ Алеэсъ). Господинъ Линней полагаетъ его въ XVII. классь расшеній, имівющих вы своемъ цатть десять тычковъ изъ двойнаго основанія, яко из двойной машки вырастающих в (Diadelphia Decandria). a Господинъ Турнефортъ въ ХХ. классъ, въ V опід вленіе, въ IV. род в расшеній съ многолиспиным в колокольчистым в цв в том в. По Гречески А тахатов, Ейхогово; по Нъмецки Kalfch Ribodifer Holb, Ribodifer-Dorn; no Opanпуски Aspalat; по Италіански Aspallo; по Аглински Calambac Wood.

ASPALTION, Аспанціонь. Смотри

Lotus, Aomych.

ASPALATOIDES Linn. Аспалатондесь. Смотри Anthyllis, Антиглись.

ASPARAGIA, Acnaparia. Смотри Абра. ragus, Аспаратусъ.

ASPARAGODES, Acnaparogech. Cmo-

три Вгапіса, Брассика.

ASPARAGVS, Аспаратусь. Asparagus Officinalis Linn. Asparagus hortensis et pratensis C. В Pir. Tournef. XII. Спаржа, Сосенка, вы украины Холодець, или Заячій Холодокь а у города Архантельска пестикь, есть пріятнаго вкуса поваренное произрастеніе, бывающее садовое и дикое, называемое (Asparagus sylvestris, Аспаратусь Сильестрись) а по

Русски Громоный корень, Мухоморникь, Подсопь, Чортона Борода и Журанли. ныя ягоды около Шацка. Перьвую съють здёсь въ садахъ съмянемъ, или сажають производимые прехъ лъпние коренья на здъланныя из в навозу и сверьх в онаго на аршин в насыпаннаго чернозему гряды. Она имъетъ длинные, круглые, гибкіе, снаружи съроватые, внутри бълые, липкіе и сладкаго вкуса коренья, производящіе весною крутлые, долгіе, кръпкіе, прямые, безлистиные, съ начала зеленые, но потомъ бълые, и бълокрасноватыя поверых в земли показывающіяся толовочки или верьхушечки им вышія сочные стебли, вы маленькой палецъ но частой болье толщиною. Какъ скоро упомянушыя головки начнушь надъ землею показыванься, то стебли из в земли по корень ево выръзывающь и сваря вь водь сь солью вдять сь топленымь свёжимъ коровьимъ масломъ или съ друтимъ какимъ соусомъ, крошашъ въ супы и упопребляють въ разныхъ другихъ кушаньяхЪ, и холодныя сЪ уксусомЪ и деревеннымъ масломъ вмъсто салату. Сіи стебаи будучи оставленны для съмянъ возвытаются до осмнатцати вершковъ, сростающся по ивскольку вмвств, стоять на подобіе абса, выпускають по бокамь множество ивжныхъ ввточекъ, окружающихся мъленкими, периспыми, щешинными, остроконечными и темнозелеными листочками и шестилисточными блёдножелтыми пвъточками, покидающими послъ спаденія круглыя, мягкія, сь перва самокрасныя, но поспъвь чернъющія ягодки съ маленькую горошинку величинею и заключающія вЪ себъ по два или по три черныя и какъ рогь крыпкія сымячки. Дикая расшеть самовольно на лугахъ и въ сшепяхъ около Аспрахани, Шацка, гдв крестьянскіе мальчишки вдящь ея ягоды; около Алашыря, тав ее называющь Какушкой, Воронежа и других в мъсть, имъсть не такъ длинные почши на самой поверыхности земли ле-

ASP

жащіе коренья и желшозеленые, жесткіе, понкіе и вкусомЪ горькіе спієбли. спаржи содержать вы себы много масла и соли, но въ Медицинъ употребляются шолько ихъ коренья, и съмяна. Перывые чистять, содержать испражнение свободнымЪ, разбивають мокротную желчь, гонянів мочу и місячное, умягчаюнів опухоли въ проходной большой кишкъ и полезны ошь почечнаго и пузырнаго камня и оть боли въ лядвеяхь, но оть многаго и продолжишельнаго оной упошребленія должно осшере. тапься, по елику чрезъ то часто бываеть что выходить моча съ кровью и въ чрез и мърномъ количествъ. Покойный Господинь Докторь Монзе совыноваль пить въ горячках вареную св ними воду, а Францускій славный МедикЪ ГосподинЪ Риверій выхваляеть вареную изъ нихъ похлъбку съ петрушкою, Цикореею и съ Пастарна. комЪ, естьми употреблена будетъ каждое утро на тощакъ, отъ Гипохондріи, цынги, ожесточенія въ почкахъ и селезенки; оть чахотки, и другихь изнуряющихь бользней, особливо похваляеть онь ее вы разных внутренных д втских 60л вз. няхъ. Съмя съ пользою въ порошкъ упо треблено быть можеть оть водяной боль. зни. Стебли употребляемые нами въ куша ніях в умножають стмя, очень питательны, и почищающся полезными ощъ перемежаю. щихся прехъ дневныхъ ликорадокъ, желчи и задержанія мочи. Корни считаются вб числ'в ияпии расшворяющихъ кореньевъ м употребляются наружно въ горлополоска пельных водах в. Въ Апшеках в им вются коренья, а въ нъкоторыхъ, только ръдко, съмяна. Аспарагусъ есть Латинское отъ слова (Абрег, АсперЪ) жесткій происходя. щее имя, пошому чио поверыхность спарженых в кореньев в покрыта не прим втными выпуклисными неравносшями. Россійское имя Мухоморы дано ей чаятельно по той при чинъ, что многіе втыкають спаржевую праву

шраву или лисшья съ спеблемъ въ углы вь своихь горницахь, ибо мухи всв на оную садятся и чрезъ то не загаживають оконничныя сшеклы, зеркала, и другія вЪ оных в находящіяся вещи; Сосенка от в слова сосать, потому что отъ спаржи ВдяшЪ обыкновенно однъ вершинки, обмакивая ихъ въ соусъ и обсасывають съ стебля мягкое, а спаржа есть съ Нъмецкаговзятое имя. ГосподинЪ Линней полагаетъ вев соршы спаржь въ VI классъ расшений, имьющихь вр своемь пвыще шесше шелаковъ и одинъ пестикъ (Hexandria Monogynia) а Господинь Турнефорть въ VI классь въ VII. от вы IV. родь растений травь съ многолисшнымЪ цвѣшомЪ, копюраго песшикЪ превращается въ мягкій плодъ. По Гречеτκη 'Ασπάραγος, καὶ 'Ασφαραγος, 'Ορμίνιον, από τε ορμάν; α дикая Ασπάραγος άγριος, Мийнанда; по Арабски Halion и Helion ; по Нъмецки Spargel; садовая Garten-Spar= gel; а дикая Wilder Spargel; по Француски Alperge; а дикая Alperge sauvage; по Италіански Sparago; дикая Sparago selvatico; по Агличски Asparagus, Sparagus, and Spe rage; Asparagrass or Sparrow-grass; Садовая The Common Garden Asparagus, or Lesser-Rind; а дикая Wild Sparrow-grass, или Wild Asparagus.

ASPARAGVS ACVLEATVS TRIBVS, AVT QUATVOR SPINIS AD EVNDEM EX-ОКТУМ, Аспаратусь акулеатусь трибусь, ауть кнатнорь спинись адь эундемь екзортумь. Смотри Corruda, Корруда. ASPARAGVS ALBVS Linn. Acnapa-

Гусь альусь. и

ASPARAGI ALTERVM GENVS, Ac-

параги алтерумь генусь. и

ASPARAGVS ALTILIS, Acnaparych anmunuch. Cmompu Asparagus hortensis, Acпарагусь горшенсись.

ASPARAGVS CRETICVS FRVTICOSVS, Аспаратусь Кретикусь фрутикозусь. и ASPARAGVS DOMESTICVS VULGARIS, Аспаратусь доместикусь пулгарись. и

ASPARAGVS ELINOS, Acnaparych Enunoch. Cmompu Asparagus hortensis, Acпарагусь горменсись.

ASPARAGVS ERRATICVS, Acnapa-

тусь ерратикусь. и

ASPARAGVS FOLIO ACVTO, Acnaparych ponio axymo. Смотри Asparagus

ASPARAGVS GALLICVS, Acnaparych Галликусь. Смотри Crithmum, Критмумь.

ASPARAGVS HOLERACEVS, Acna-

рагусь голерацеусь. и

ASPARAGVS HORTENSIS, Acnapaтусь гортенсись. Смотри Asparagus, Аспа-

рагусЪ.

ASPARAGVS LVSITANNICVS PE. TRAEVS, Аспаратусь Лузитанникусь петреусь. Смотри Corruda, Корруда

ASPARAGVS MARINVS Clus. Acnaparych mapunych. Cmompu Asparagus sylveftris, Аспаратусь силвестрись.

ASPARAGVS MONTANVS, Actiapa-

рагусь монтанусь. и

ASPARAGVS MYACANTHINVS, Acпарагусь Міакантинусь. Смотри Соггиda, Корруда.

ASPARAGVS NOSTER, Acnaparych ностерь. Смотри Alparagus hortensis, Acna.

рагусь гортенсисъ.

ASPARAGVS PALVSTRIS, Acnaparycb палустрись. Смотри Afparagus fyl. vestris, Acnaparycb силвестрись.

ASPARAGVS PETRAEVS, Acnaparych

петреусь. и

ASPARAGVS PRIOR, Acnaparycb

пріорь. Смотри Corruda, Корруда.

ASPARAGVS REGIVS, Acnaparych periycb. Смотри Asparagus hortensis, Аспарагусъ горшенси ъ.

ASPARAGVS RVSTICVS, Acnaparych рустикусь. Смотри Corruda, Корруда.

ASPARAGVS SATIVUS, Acnaparych camunych. Cmompu Asparagus hortensis, Аспаратусь горшенсись.

ASPA.

ASPARAGVS SPINOSVS, Acnaparych епинозусь. Смотри Corruda, Корруда.

ASPARAGUS SYLVESTRIS, Acnaparycb cunnecmpucb. Cmompu Asparagus,

Аспаратусъ.

ASPARAGVS SYLVESTRIS TERTIVS, Аспаратусь силиестрись терціусь. Смотри Corruda, Корруда.

ASPERA LAPPAGO, Аспера Лаппа-

то. Смотри Aparine, Апарине.

ASPERATA ODORATA, Actiepama ogopama. Смотри Matrifylua, Матризилва.

ASPERELLA, Achepeana. Смотри Еquisetum, ЕквизетумЪ.

> ASPERGULA, Achepryna. Смотри

Asperula, Асперула.

ASPERGULA HERBA REPENS, Acnepтула герба репенсь. Смотри Rubeola, рубеола.

ASPERGULA ODORA, Achepryad одора. Смотри Asperula, Асперула.

ASPERVGO, Achepyro. Смотри Ара-

rine, Апарине.

ASPERVGO PROCVMBENS Linn. Acперуго прокумбенсь. Asperugo vulgaris. Pit. Tournef. Asperugo spuria Dod. Belg. Buglossum syluestre, caulibus procumbentibus C. B. Cynogloffa Forte topiaria fine Echium, Lappulatum quibusdam, I. B. Alyssum Germanicum Echioides Lobel, Lugdun, Aparine maior, Pin. Crucialis quaedam. Caef. II. Ocmpuna или Скала права, расшеть почти вездъ вь садахь, въ огородахь, на унавоженной землв и возлъ дорогъ, и цвътеть въ Маів и Іюнъ мъсяцахъ. Она имъетъ нъсколько зеленых в, тонких в, жестких в, бороздчатых в, къ землъ наклоняющихся и равно какъ на колбицы или узолки раздъленных в стеблей и изъ всякаго стебельнаго коленца по два вырастающие, продолговатые, жесткие, и посредсивенно широкіе лисшья. Цвёшы на ней однолисшные, голубые, раздёляющся вверьху на пяпь часшей, имвють фигуру воронки, поддерживаются на подобіе кувшинчика расположенною чашечкою и вырастають сь противоположенной стебельнымь листьямъ стороны. Послъ цвътовъ, чашеч. ки ихъ разширяющся, дълающся плоскими, и служать тивздами маленькимь, продолтованымъ, чернованымъ и другъ на другъ плотно лежащимъ съмячкамъ. Корень у нес тонкій. Сія трава содержить въ себъ мното масла и соли, почитается кровочистительною и полезною от рань, но ръдко употребляется въ Медицинъ, чего ради и въ Аптекахъ изъ нее ничего не дълается. Асперуго есшь Лашинское, от Римлянь приняшое, и ошь слова afper, Асперь не гладкій, жескій происходящее имя, по тому что листья ея жестки, и стебли не тладки. ГосподинЪ Линней полагаетъ ее въ V. классъ расшеній, имѣющихъ въ своемь цвышь пять шычковь и одинь пестинь. (Pentandria Monogynia). А господинъ Турнефорть во II. классь, въ III родъ травъ св однолисшнымъ, на подобіе воронки къ верь ху разширеннымЪ, цвъщомЪ. По Гречески Φίλατέριον; πο Η ΕΜΕΙΚΗ Großer Sporenstid; по Француски Spurie, ou Aspergule; по Ита ліански Spergola, forte d'herba; по Аглин CKP The Great rough Cleuers.

ASPERVGO SPVRIA, Асперуго спу pia. Смотри Asperugo procumbens, Асперу

го прокумбенсЪ.

ASPERVGO TENVIOR, FLORIBUS ALBIS. Pit. Tournef. Acnepyro menyiopb, флоривусь альнев. Смонири Buglossum caulibus procumbentibus. Буглоссумъ кавлибусь прокумбеншибусЪ.

ASPERVGO VULGARIS. Pit. Tournel. Acnepyro nyarapuch. Cmompu Asperugo pro-

cumbens.

ASPERVLA AVREA, Acnepyna all реа. Смотри Cruciata, Крупјата.

ASPERVLA ODORATA. Linn. Acne. pyna ogopama. Asperula odorata flore albo. Boerh. Ind. A. 149. Hift. Oxon. III. 331. He. patica stellata. Tab. Caprifolium vel stellaкых загоса деместакусь муль прив. н

I

N

10

10

10

11

5

9

10

10

·e.

0.

12-

124

Yacma I.

Tia. Brunsf. Matrifylua. Trag. Cord. Diosc. Rubeola montana odora C. B. Aspergula odora nostras. Ad. Aparine latifolia humilior montana. Pit. Tournef. Alysfos. Gefa. Hort. VI. Душистая Сыпорочная трана, Лесные колокольчики, Зивздоподручная или съ нъмецкаго Зпездопеченочная трапа, или Благопонная Марюна растепь вы полуденных в спранахы Россіи вь лвсахь, между густыми кустами, на песчаных горах и в тенисных и встахь, и цвететь вь Маів мёсяць. Она имветь нъжный, узловатый, волокнистый, и въ землъ далеко распространяющійся корешокЪ, и маленкіе, блъдно зеле ные, гладкіе и четвероугольные стебли въ четыре, и въ шесть вершковъвышиною, которые окружаются зелеными, мягкими, во кругъ стеблей около коленцовъ по шести и по седьми звъздкою сидящими, и на мистыя Смогной травы (Арагіпе, Апарине). похожими листьями, и производять изъ вершины своей бълые, душисные, на черешкахъ ушверждающіеся на подобіе колокольчиковъ расположенные и обыкновенно въ верьму на четыре части разръзанные цвъточки, по спаденію коих в чашечки превращаются вь капсулы о двухъ маленькихъ, круглова шых и къ серединъ пустых в съмячках в. Сія права, когда цвѣтепь, имѣеть пріяшный запахъ и должно примъчать, что Растущая въ лъсахъ покрываемся вся тоненькимъ пушкомъ, вмъсто того, что полевая и песчаная вся гладкая. Она содерda duna себъ много масла, и соли, разжижаеть, укрвпляеть сердце и печенку, отворяеть оной засорение, гочить мочу и крови, отворяеть и постъшествуеть родамь; въ водъ вареная полезна от в желчи и боли въ пузыръ; а Употребленная въ травномъ чат отъ печеночных в грудных в бользней. Наружно разбиваент она желваки и опухоли, прогомяеть шелуди и привязанная ко лбу уни-

ASP

маешь головную боль. Перегонною сь нею водою примачивають раны. Оная будучи внутренно употреблена унимаеть внутренный жарь, чистить почки и выгоняеть песокъ чрез в мочу. Весною права можеть быть употреблена въ кровочистительныхъ винахъ или пишьяхЪ. Суеверію преданные люди носящь ее на шев оть зубной боли. Въ прочемЪ употребляется сія трава для краше. нія въ желшый цвънъ. Въ Апшекахъ имъется одна только трава. Асперула есть также Латинское от слова Агрег, шероховашый, происходящее имя. Господинъ Линней полагаеть ее вь IV. классь расшеній, им выцих в в в своем в цв в тв четыре тычка и одинъ пестикъ (Tetandria Monogynia); а Господинь Турнефорть вы І. классы, вы IX опідъленіе, во II. родъ правъ съ однолистнымь, колокольчистымь цебтомь. По Гречески 'Απαρινη πλατύφυλλη ταπεινή; по НВмецки Etern Leber = Rraut; Hert = Freude; Wald Meister; по Француски Hepatique, он Muguet des bois; по Италіаски Spergola odorata: по Аглиннски Woodroof.

ASPERVLA ODORATA FLORE AL ВО, Асперула одората флоре альо. Смотри Asperula odorata, Асперула одората.

ASPERVLA REPENS, Achepyra pe-

пенсь. Смотри Iuncaria, Юнкаріа.

ASPERVLA SYLVATICA, Actrepyzo силиатика. Смощри Asperula odorata, Асперула одората.

ASPERVLA TINCTORIA Linn. Acneрула тинкторіа. Смотри Gallium, ГалліумЪ.

ASPHARAGVS, Achaparych. CMompu Alparagus, Acnaparych.

ASPHO, Асфо. Смотри Сустатен, Ци-

кламенЪ.

ASPHODELO AFFINIS, FLORIDANA, RAMOSO CAVLE, FLORIBVS ORNITHO-GALI OBSOLETIS, Pluk. Almath 40. t. 434. f.8. Асфодело аффинись, флоридана, рамозо капле, флорибусь орнитогали обсолетись Смотри Melanthium Virginicum petalis ungui-

culatis, МелантіумЪ ВиргиникумЪ петалисЪ унгвикулатисЪ.

ASPHODELVS ALBVS RAMOSVS. Hist. Oxon. 11. 330. Asphodelus ramosus Linn. Асфоделусь альусь рамозусь. Аsphodelus primus. Ang. Clus. Hift. Afphode. lus major ramosus, flore albo. I. B. Asphodelus albus ramosus mas. C. B. Pit. Tournefort. omnium XII. fed albi funt VII. Bonnшій Золотоголопникь; Волопій Хпость, Бълая Челма, а съ Нъмецкаго Золотый Корень, расшеть и свется вы садахы и цввтеть вь Іюль мвсяцахь. Сіе растеніе имбеть многіе, вь одинь общій корень соединяющіеся и видь маленьких в ръпокъ им вющіе корешки, золотаго цввта, которые хошя и сочны, но горьковато остраго вкуса, производять множество длинных в, узкихЪ, и остроконечныхЪ листьевЪ, кои съ верьху вдоль по серединъ выдались ложбиною, и изъ средины коихъ вырастаетъ кръпкій, круглый, гладкій, лоснящійся на множество въточекъ раздъляющийся и отъ четырнатцати до осымнатцати вершковъ вышиною бывающій спебель, окружающійся оть середины до самаго верьху многими лилев подобными, изв одного св верьху до низу на шесть частей разръзаннаго листочка состоящими, и внутри бълыми съ проходящею наружно вдоль пурпуровою полосою, цвиночками, посли коихи показываются кругловатые, вы прехы містахь нісколько возвышенныя и внутри на три гавзда разденныя ягодки, заключающія вы себъ черкыя, шреугольныя, кръпкія, древесованыя и сморщивніяся сёмячки. Качеешвомь своимь сходсшвуеть оно св Царскимь копьемъ (Asphodelus luteus, Асфоделусь лутеусь) съ которымъ и въ одинъ классъ полагается. По Гречески Лофоделья хеннов по Арабски Вагуасаћ; по Нъмецки Діе Двеібfe Affodill = Wurk, oder Afphodill = Wurk = по Француски Afphodele blanc; по Италіански Affodillo bianco; по Аглински The White Afphodel or Daffodil Lily.

ASPHODELVS ALBVS NON RAMO. SVS C. B. Pin. Achogenych anbych нонь рамозусь. и

ASPHODELVS ALTER, Асфоделусь алтерь. Смотри Asphodelus luteus, Асфо-делусь лутеусь.

ASPHODELVS BVLBOSVS, Асфоделусь бульозусь. Смощри Afphodelus albus, Асфоделусь албусь.

ASPHODELVS CAVLE SIMPLICINON RAMOSO, Achogenych капле сим. плици нонь рамозо. Смотри Asphodelus luteus, Асфоделусь лутеусь.

ASPHODELVS FISTVLOSVS Linn. Achogenych hucmynosych. Cmompu, Phalangium, ФалангіумЪ.

ASPHODELVS FLORE INCARNATO PALLIDO, Асфоделусь флоре инкарнато палто. и

ASPHODELVS FLORE MELINO, Achogenych phópe мелино. Смотри Alpho delus luteus, Асфоделусь лутеусь.

ASPHODELVS FLORE SVAVE - RV-BENTE. Lob. Icon. 91. Асфоделусь флоре спаперубенте. Смотри Asphodelus albus; Асфоделусь албусь.

ASPHODELVS FOLIIS FISTVLOSIS, Achogenych honinch hucmynosuch. W

ASPHODELVS GERMANICVS, Acopor genych Tepmannkych. n

ASPHODELVS LANCASTRIAE, Act pogenych Nankacmpie. Cmompu Phalangium, Phalangium, Phalangium,

ASPHODELVS LILIACEVS, Асфоделусь Смотри Liliasphodelus, Лиліасфоделусь.

ASPHODELVS LVTEVS, Achogenych nymeych. Asphodelus luteus et flore et radice C. B. Pin. 28. Rupp. Flor. Ien. 124. Tourn. Inst. 344. Boerh. Ind. A. II. 110. Hastula Regia. Trag. Простый Золото-то-

i

попь, или Золото-голопникь, Царское копъе или желтая Челма, растешъ также въ садахъ. Она различествуетъ отъ вышеописанной вЪ шомЪ, что корень у нее краснованый и имъстъ подобіе распростертой Курячьей ноги, спебель простый и не раздваненся на въшви; листья трехъ сторонные, бороздчашые, а цвёшь желшый. Оба рода сей правы содержащь въ себъ мното соли и масла, но въ Медицинъ употребляются одни только корни, которые разбивающь, отворяють, гонять мочу, плодь и мъсячное, возбуждають поть, противодвиствують яду, чистять старыя раны и нарывы и полезны от желчи и начинаю. щейся водяной бользни. Господинь Линней полагаеть ихь въ VI. плассъ. растений, имрющихр вр своемр пврше шесше шелл. ковъ и одинъ песшикъ (Hexandria Monogynia) А ГосподинЪ Турнефортъ въ IX. классъ, въ 1 отдъление въ 1 родъ травъ съ однолисточнымЪ, Лилев подобнымЪ и на шесть частей разръзаннымъ цвътомъ, котораго пестикъ превращается въ капсулю. По Гречески Аσφόδελος πήλινος; по Нъмецки Gelbe Alfodill, oder Afpfodill-QBurkel, Dreck Lilie; no Француски Asphodele jaune; по Италіански Affodillo Gialdo; по Аглински Kings Spear or The yellow Alphodel; по Арабски Erizembac.

ASPHODELVS MAIOR, Асфоделусь магорь. Смошри Asphodelus albus, Асфоделусь албусь.

ASPHODELVS MINOR, Асфоделусь минорь. Смотри Phalangium, Фалангіумъ.

ASPHODELVS NON RAMOSVS, Acфоделусь нонь рамозусь. Смотри Asphodelus luteus, Асфоделусь лутеусь.

ASPHODELVS PARVUS, Асфоделусь парпусь. Смотри Phalangium, Фалангіумь.

ASPHODELVS PVRPVRASCENS, FO-LIIS MACVLATIS. CMOMPH Achogenych nypnypacuench, poninch manynamuch. w

ASPHODELVS RAMOSVS Linn. Ac-

ASPHODELVS RVBENS, Асфоделусь рубенсь. Смотри Asphodelus albus, Асфоделусь албусь.

ASPHODELVS SPIRALIS, LVTEVS, ITALICVS, FLORE MAGNO H. R. Par. Achogenych chupanuch, nymeych, prope marno. Cmompu Liliasphodelus, Auxiachogenych.

ASPHODELVS VERVS, Асфоделусь перусь. Смотри Asphodelus albus, Асфоде-

лусъ албусъ.

ASPIDELVM, Acnugenmb. a ASPIDELVM, Acnugenymb. Cmompu Ruta maior, Pyma maiorb.

ASPLENION, Аспленіонь. и

ASPLENIVM, Actualization Computer of Homograph

Ceterach, Hemepaxb.

ASPLENIUM SYLVESTRE, Actaneniymb cuanecmpe. Cmompa Lonchitis, Лонкиписъ.

> ASPLENON, Actinehonb. K ASPLENOS, Actinehocb. K ASPLENVM, Actinehymb. K

ASPLINIVM, Acnauniymb. Cmompur Ceterach, Цетерахъ.

ASPRELLA, Аспрелла. Смотри Еquisetum, ЕквизенумЪ.

ACVIRON, Акпиронь. Смотри Нуреricum, Гиперикумъ.

ASQVIS, Аскиизь. Смотри Scoenan-thum, Сценаниумъ.

ASSA DVLCIS, Acca дупциев. Смотри Вепгоіпит, Бензоинумъ.

ASSA FOETIDA, Acca фетида. Смотри Asmarhoc, Асмаргокъ.

ASSAGEN, Accarent. Смотри Sanguis Draconis, сангвись Драконись.

ASAGNASSORA, Acarнассора. Смотри Agnus castus, Агнусъ кастусъ.

ASSALA, Accana. Смотри Nux, Нуксъ. ASSANT, Ассанть. Смотри Almar-

hoc, Acmaprokb.

V 2

ASSARVM, Accapymb. momb
ASSE, Acce. Cmompu Hyssopus, Inconych.
ASSE.

ASSEBOSA, Ассевоза. Смотри Мапdragora, Мандрагора.

ASSEFOLIVM, Acceponiymb. Смотри

Gramen, граменЪ.

ASSENETO, Accenemo. u

ASSENSA, Accensa. Смотри Abfin-

thium, AбсинтіумЪ.

ASSETREPONA, Ассетрепона. Смотри Marrubium album, Маррубіум в албум в. ASSIRADIX, Ассирадиксь. Смотри Acorus, Акорусь.

ASSIRISSE, Accupucce. Cmortipu Ana-

gallis, АнагаллисЪ.

ASSIVM, Acciymb. Cmompu Carthamus, Kapmamycb.

ASSVRBOLATIS, Ассурволатись. Смотри Spica Indica, Спика Индика.

ASSVREX, Accyperch. Cmompu Poconia, Heonia.

ASTAPHIS, Астафись. Смощри Staphilagria, Стафизагріа.

ASTARATICON, Aстаратиконь.

Смотри Eryngium, ЭрингіумЪ.

ASTERA, Астера. Смотри Arthemisia, Артемизіа.

ASTER, Астерь. Звъздочная трава, бываеть многихь родовь, какь.

АSTER ACRIS, Астерь акрись. Пряная зивэдочная трапа, расшеть вы южныхы странахы Россіи и имъеты желтые на подобіе звыздки расположенные цвытки. Господины Гмелины нашель однакожь еще другую отличную оты сего растенія породу, которая имыла угловатый и косматый стебель, котораго одна половина красная, а другая зеленая. По Гречески Абтр Дрійіс; по Ньмецки Севь Степь Ятанг поп Сфагет Севтина Севтина

ASTER AMELLVS Linn. Астерь Амелпусь. Бъложелтая эптэдочная трана, гоколо города Архангельскаго такая трана, есть особливый родъ растущій около Алатыря и имъющій внутри желщый, а съ наружи бълый цвѣть и копьевидные, цѣльные, же сткіе, и къ концу притупленные листья съ тремя, проходящими чрезъ нихъ жилками.

ASTER ATTICVS, Acmept Ammukych. Смотри Eryngium, Эрингіумь;

Buphthalmum, БуфшалмумЪ.

ASTER ATTICVS Linn. Matth. Dod. Acmept Ammunych. After Atticus variis coloribus. Mey. 'Tinctorius flos primus. Trag. Зивидочки, Бельмокь, Астерь, Зивидочь ная трапа или Эпіздочный цивть, а попереводу съ Лашинскаго Христово око, есть навточное осеннее произраствніе, бываеть многихь и различных в родовь, и расшеть по полямь, на несчаных в мъ спахъ, но большею частью въ садахъ Они имъють прямые, тонкіе, круглые, кръпкіе, не много мохнаные и красноващые сшебли въ шеспи, и девящь вершковъ вы шиною, которые окружаются продолгова пыми, жесткими, волосками покрыпыми, горьковатый Ароматическій вкусВ им вющими, и унъкоторых в сортов в противопологаясь (After Oppositifolius, Астерь Оппозипифоліусь), по стеблямъ сидящими листь ями, коих в оба края внутрь согнуты или свернушы и кои у многихЪ родовЪ сушь сердце-видные; сшебли раздъляющся к верьху на многія вЪточки украшающіяся прекрасными, звъздкою расположенными и по различію родовь, различныхь цвітовь бывающими цввтами, какв обыкновенные, или полевые голубаго, бёлаго съ желтымЪ а садовые фіолешоваго, желтаго, пурпуроваго, а иногда внутри бълаго и по краямь пурпуроваго цвёта. Послё сихь цвё товъ оказываются продолговатыя, и тоненкимъ пушкомъ обведенныя съмячки: корень у нихъ волокнистый, маленькій и им веть горькій, не много Ароматическій вкусь. Всв астры содержать вы себь много соли и масла, разбивають, отворяють и холодяшь. Съ лисшьями перегонная вода, полезна употребленная внутренно очень omb

оть внутреннаго распаленія живота, оть жабы, родимчика, и отъ ужаленія или укушенія ядовиных ваврей, вы которых в случаяхъ укушенныя мѣста припаривають разваренною въ водъ правою. Пурпуровая цевта часть, употребленная въ водъ почитается преизящнымъ средствомъ отъ всякихъ горшанныхъ болъзней. Желшоцвътные принадлежать къ лътнимъ растеніямЪ, а прочіє кЪ прозимующимЪ. Астерь есшь Лашинское ошъ слова астеръ, звъзда происходящее имя, потому что цввты расположены на подобіе звъздки. ВЪ Апшекахъ употребляется одна трава, но и то Рвдко. Господинъ Линней полагаетъ ихъ въ XIX классъ расшеній, имъющихъ на одномъ и шомъ же корнъ цвъшы и мужескіе и женскіе, и у коихЪ мужчинки или пычки соединены между собою въ цилиндръ пычковыми головками (Syngenefia Polygamia) а Господинъ Турнефоршъ въ XIV. класеъ вь І. отдъление въ І. родъ травъ, коихъ цевть расположень звыздкою, и сымя обведено пушистымъ вънчикомъ. По Гречески Ashp attinos; no Homeinen Stern, Rraut; Scharten-Rraut, Bruch-Kraut: no Opanцуски Espargoute étoilée ou Astre; по Ишаміански Aftro; не Аглински Star-wort; Star Flower, or The true After Attick.

AST

ASTER ATTICVS ALPINVS FLORE LVTEO, Астерь Аттикусь Алпинуев

Флоре лутео. и

ASTER ATTICVS ALTER, Acmepb

Аттикусь алтерь. и

ASTER ATTICVS COERVLEVS VUL-GARIS, Астерь Аттикусь церулеусь пулгарись. и

ASTER ATTICVS LVTEVS MONTA-NVS VILLOSVS MAGNO FLORE, Acmepb Аттикусь путеусь монтанусь пиплозусь магно флоре. Смотри Aster Atticus, АсшерЪ АшшикусЪ.

ASTER ATTICVS MARINVS, Acmept Аттикусь маринусь Смотри. Crithmum тагіпит, Кришмумъ маринумъ.

ASTER ATTICVS MASSILIOTICVS. Астерь аттикусь Массилотикусь, и

ASTER ATTICVS PRIMVS FLORE LVTEO, Acmepb Ammuxycb примусь флоре лутео. и

ASTER ATTICVS PVRPVREVS, Ac-

терь Аттикусь пурпуреусь. и

ASTER ATTICVS PVRPVRO COE-RVLEVS, Acmepb Αππικής πυρπυρο церупеусь. и

ASTER ATTICVS VERVS. Acmepb Аттикусь перусь. Смотри After Atticus

Асшерь Ашшикусь.

ASTER AVSTRIACVS SECVNDVS. Астерь Анстріакусь секундусь. Смощри After Atticus, Астерь Аттикусь.

ASTER CONYZOIDES, Acmepb Ro-

низопдесь. Смотри Сопуга, Кониза.

ASTER CORDIFOLIVS Linn. Acmept кордифоліусь. Астерь съ выръзаннымъ на подобіе сердца лисшомъ. Смошри Aster Atticus, Acmeph ammunych.

ASTER DVMOSVS Linn. Acmerb Думозусь. Тернопатый Астерь ихи зпёздочная трапа сЪ равноширнымЪ, цъльнымЪ листомЪ, и цвътоноснымЪ стеблемЪ.

ASTER FOEMINA, Acmepb фемина. Смотри Conyza cœrulea, Кониза церулеа.

ASTER FRVTICOSVS Linn. Acmepti фрутикозусь. Кустарная зпездочная трапа, или Асшеръ съ равноширными, и понъскольку въ мъстъ сидящими листьями и съ кустарнымъ и не гладкимъ стеблемъ.

ASTER GRANDIFLORVS Linn. Acтерь Грандифлорусь. Велико цавтная зивздочная трапа имбеть копьецо образные и назадЪ загибающеся лиспыя и по одиначкъ сидящіе цвъты.

ASTER ITALORVM, Acmepb Umaлорумь. Смотри After Atticus, АстерЪ АпшикусЪ..

ASTER LÆVIS Linn. Acmept neпись. Гладкій Астерь ими зпездочная трапа, имветь копьецо-образные, призе-

мисшые, гладкіе и нѣсколько вырѣзчашые лисшья.

AST

ASTER LINIFOLIVS Linn. Астерь линифоліусь. Астерь или звъздочная права съ подобными дикому льну лиспъями, кои равноширны, цъльны и выпуклиспыми неравностями шероховаты.

ASTER LINI FOLIIS Linn. Астерь пини фолись. Леннолиственный Астерь или Звёздочная трава имбеть публьные равно-

ширные, и остроконечные листья.

ASTER LVTEVS ANGVSTIFOLIVS, Acmepb nymeycb anrycmuhoniycb. Cmompu Aster montanus hirsutus, Acmepb монманусь гирсутусь.

ASTER LVTEVS FOLIOLIS AD FLO-REM RIGIDIS, Acmepb nymeycb ponio-

лись адь флоремь ригидись. и

ASTER LVTEVS HIRSVTO SALICIS FOLIO, Acmepb nymeycb rupcymo ca-

лицись фоліо. и

ASTER LVTEVS LVTEO FLORE MAGNO, Acmepb nymeycb nymeo phope магно. Смотри After Atticus, Астерь Аттикусь.

ASTER MARITIMVS PALVSTRIS,
Acmepb mapumumycb nanycmpucb. u

ASTER MINOR NARBONENSIVM, Acmepb минорь Нарконенсіумь. Смотри

Tripolum, ТриполіумЪ.

ASTER MONTANVS HIRSVTVS Lob. Астерь монтанусь гирсутусь. Кудрявый горный Астерь или звыздочная трава, имъеть большій, желтый, кудрявый цвыть. По Гречески Астр орегос тріходує; по Нъмецки Жанф Зегд-Stern Kraut; по Француски Aftre velu des montagnes; по Италіански Aftro hirfuto di montagne; по Аглински The hairy Star wort.

ASTER MONTANVS SALICIS GLA-BRO FOLIO, Acmeph monmanych canunuch raupo ponio. Cmompu After Atticus,

Астерь Аттикусь.

ASTER OMNIVM MAXIMVS, Ac-

терь омніумь максимусь. Смотри Неlenium, Геленіумъ.

ASTER OPPOSITIFOLIVS Linn. Астерь оппозитифоліусь. Астерь или звіздочная трава съ противоположенными другь другу, продолговатыми и шероховатю жесткими листьями.

ASTER ORIENTALIS, Aстерь оргентальсь Смотри After Sibiricus, Астерь Сибирикусь.

ASTER PANNONICVS, Астерь панноникусь. Смотри After Atticus, Астерь

АшшикусЪ.

ASTER SIBIRICVS Linn. Acmepb смвирикусь. Восточный Астерь, имбеть
копьецо образные, жиловатые, жесткіе в
къ поверьхности на подобіе пилы връзанмые листья. По Гречески 'Азпр 'Агатоліноз';
по Нъмецки Drientalisches Eterne Rraut; по
Француски Astre Oriental; по Италіански
Astro Orientale; по Аглински The Sibirish
Star-wort.

ASTER TENVIFOLIVS Linn. Астерь тенуифоліусь, Узколистивнный Астерь

или Зпездочная трапа.

ASTER TRIPOLIVM, Acmepb mpw moniymb. Chompu Tripolium, Tounoniymb.

ASTERIS AQVATICA, Acmepuch a

ASTERIS FLORE LVTEO Diole. Ac-

ASTERIS FLORE MAGNO LVTEO

Астерись флоре магно лутео. и

ASTERIS HVMIDIS LOCIS PROVENIENS, Acmepuch Tymugueb поцись про-

ASTERIS TERTIA, Астерись териа. Смотри Сопуга теміа, Кониза медіа. АSTERICIVM, Астериціумь. Смотри Ітрегатогіа, Императоріа.

ASTERISCVS. III. Acmepuckych. Chomph After Atticus luteus, Acmeph Ammukych M.

meycb.

e.

2"

ASTERIVM, Астеріумь. Смотри Раrietaria, Парієтаріа и Суапия, Ціанусь.

ASTEROCEPHALVS, Acmepouepa-

гусь. Смощри Scabiosa, Скабіоза.

ASTEROIDES III. Acmepongech. Teнистый цивть или Ложный Астерь. По Гречески Азтр Фелбіз над астробе́з; по нъмецки Unacht Stern-Rraut; по Француски Aftre bâtard; по Италіански Aftro baflardo; по Аглински The baftard Starwort.

ASTERTIPHO, Acmepmusoo. u

ASTIRTIPHE, Acmipminge. Chompin

Chamomilla, Хамомилла.

ASTOCHODAS ARABVM, Acmoxogach Aparymb. Смотри Stoechas, Стехась. ASTRA FACTVS, Астра фактусь.

Смотри Atriplex, Атриплексъ.

ASTRAGALVS, Acmparanych XXXIII. Acmparanych. Astragalus nothus. Astragalus Christianus Linn. Сплюснутый Горохв, Стручконая трана или Мышій Горохь, есть въ нъкоторыхъ Южныхъ странахъ Россіи самовольно, но здісь въ однихъ только садахъ растущее и въ Маїв и Іюнь мъсяцахъ цвътущее растение многихъ РодовЪ; Обыкновенно имѣешЪ либо нискіе приземистые, либо возвышающиеся и внутри пустые стволики, окружающеся съ объихъ сторонъ маленькими, короткими, къ концу острыми, мошистыми, и попарно Аругъ противъ друга наискось сидящими мистьями, и производящие из вершины своей множество стручковатых в, пурпуровых в или бълыхъ, многолистныхъ и по нъскольку вытемъ растущихъ цетточковъ; послъ коихъ показывающся продолговащые, красноватые и двушелушные стручечки, заключающіе въ себъ мівленткія, черныя и подобіе маленькой почки им вющія съмячки. Корень у него крвпкій, жесткій почти какв дерево, покрыть толстою темноватою ко-Рою, внутри бѣлъ, имъетъ сладкій вкусь и бываеть въ седьмь вершковъ длины и въ палецъ полщины. Всъ роды сего расшенія седержать вь себь много масла, и посред-

ственную часть соли. ВЪ Медицинъ употребляются, но рѣдко ихъ корни, которые употреблены будучи внутренно въ декоктахъ вяжуть, унимають понось и гонять мочу, а наружно очищають и сушать они раны. Вареные вЪ бѣломЪ винѣ они чистятъ десны посредством в полосканія, и сбираемые в в ноздри останавливають кровотечение изъ носу-ВЪ АпшекахЪ имћешся корень, но рѣдко. ГосподинЪ Линней полагаетъ Астрагалы въ XVII. классь расшеній, имѣющихъ въ своем в цв в десять тычков в или мужчинок в, изЪ двойной машки выходящихЪ (Diadelphia Decandria); а Господинъ Турнефортъ въ X классъ, въ V отдъление (fectio, секціо) въ І родъ травь съ многолистнымъ цввтомв, котораго пестикв превращается въ дву-гивздный стручокъ. По Гречески 'Aspayalos; no Hemenku Christian = 2Burs WirbelsKraut, Cyrische Ziesererbsen; no Opanпуски Astragale; по Ишаліански Astragalo; по Аухински The Milk Vetch.

ASTRAGALVS ALOPECVROIDES Linn. Acmparanych Anonexypougech. Смотри

Alopecurus, AлопекурусЪ.

ASTRAGALVS ARENARIVS Linn.

Acmparanych Apenapiych. Песочный Мымій горожь, расшешь вы Южныхь сшранахь Россіи, на песчаныхь місшахь и
имбешь пушкомь обведенные лисшья. По
Гречески Αρρίγαλος φαμμώδες; по Німецки
Дав ін Gandigen Gegenden wachsende Würfel Kraut; по Француски Astragale qui croit
dans les endroits sablonneux de la Russie mé
ridionale; по Ишаліански Astragalo arenoso;
по Аглински The wild sand Liquorice.

ASTRAGALVS ARVENSIS, Acmpa. ranych apuencuch. Cmompu Apios, Anioch.

ASTRAGALVS BOETICVS Linn. Acmparanych Enemukych. Cmompu Astragalus Christianus, Acmparanych Xphemianych.

ASTRAGALVS CANADENSIS Linn. Астрагалусь Канаденсись. Американская стручкопая трапа, имбеть шеро-

Koba-

320

ховатые лиспъя и зеленожелтый, на подобіе колоса из в стебельной вершины вырастающій цввть. По Гречески Аграуалог ระ Karaba; по Нъмецки Wirbel-Rraut aus Canada; по Француски Astragale du Canada; по Италіански Astragalo del Canada; по Аглински The Canadian Milk Vetch.

ASTRAGALVS CAROLINIANVS Lin. Астрагалусь каролиніанусь. Смощри Автаgalus Canadenfis, Астрагалусь Канаденсись.

ASTRAGALVS CHRISTIANVS Linn. Астрагалусь христанусь. Смотри Авга-

galus, Acmparanycb.

ASTRAGALVS CAVLESCENS EREC. TVS, LEGVMINIBVS ERECTIVSCVLIS PILOSIS, SVBVLATIS ACVMINATIS ERECTIS. Fl. Sib. IV. n. 52. t. 16. Acmpaгалусь каплесценсь эректусь, легуминибусь эрекціўскулись пилозись, субупатись, акуминатись эректись. Мышій горохв съ космаными спручками, и колосистыми цввнами расшень около Воронежа, въ Тавровъ, и по всему Дону. По Alstragalus mit aufrechtstehenden Нѣмецки den haarigten Schooten.

ASTRAGALVS CICER Linn. Acmpaталусь цицерь. Смотри Сісег, Цицерь.

ASTRAGALVS CONTORTVPLICA-TVS Linn. Астрагалусь контортупликатусь. Спилопатый или изпилистый мышій горохь, растеть почти во всьхь южных в странах в Россіи, производить по земав расшилающівся спебли и имветь свиловашые, жолобовашые и волосками покрыпые спебли и служить для скота пріятнымъ кормомъ. По Нъмецки Ивгадалия тіс umgedreht eingebogenen Schooten.

ASTRAGALVS CORNVTVS, Acmpaталусь корнутусь. Рогатая стручконая трана, расшеть въ Сибири, на пригор. кахЪ при ръчкъ Деркуль и въ Римницкой спиени и цвътеть осенью. Сіе расшеніе стоить прямо и растеть выпьвями прижавшихъ, которыхъ на немъ меньше, нежеля на сродных в ему расшеніях в. Оно

имветь дереввнеющій, рвдкій и часто вв аршинъ въ вышину выбъгающій стебель, на коемъ примъчаются оставшіеся прежняго года изсохшіе листовые черешки, которые разряжены бывають поперемвино й оттопыриваются от в стебля. Сіи чересидящія шки производянъ поперемънно почки, и изъ оныхъ однольшніе, пвъщоно сные, прилегшимъ мохомъ покрывающіяся и по перемънножъ располагающіяся въпючки, окружающіяся мягкими, узкими, продолго вашыми, на увядающих в остроконечных в подпорках в ушверждающимися, съдинькими ръдкими, особливо съ низу прилегшими во лосками покрытыми, и изъ четырехъ парных в и однаго безпарнаго листочка состоя. щими листьями На самой вершинъ вътвей держатся на угловатых в и голых в череше ках вы корошкой колосы собравшиеся цвы точки, имѣющіе при частныхъ своихъ черешкахЪ, оспіроконечныя и черными волосами покрышыя подпорки и выходящія из в цилиндрическихЪ, длинныхЪ, пяти зубчашыхЪ, черными волосками обведенныхЪ и верьхнимъ бокомъ съдъющихъ чашечекъ, кото рых В знамя (Vexillum) длиннъе, продолгова шый, багряный, и на конц в нъсколько разщели вающійся; а дно корабельное, или кораблико (Carina) сЪ сжимающимися крыльями короче и бълесовать. Стручки на немъ продолговатые, о трехъ почти не примътныхъ сторонахЪ, цилиндрические, остроконечные, смуглые, покрывающся нъжнымъ мошкомъ и имѣюшъ одно шолько сѣмянное гнѣзды шко; переведено съ Лашинскато изъ прибавленія находящагося при І. Том'в пушеше. ствія Господина Профессора Палласа на Нѣмецкомъ языкъ, страна 459. По Гре-Аграуалог нератибых; по немецки Gehörnter Astragalus; по Француски Astragale cornu; по Ишаліански Astragalo cornuto: по Аглински The corner'd Milk Vetch.

ASTRAGALVS DEPRESSVS Linn. Acтраталусь депрессусь. Смотри Affragalus ASTRA-Астрагалусь.

ASTRAGALVS DIOSC, Acmparanych Aiock. Смотри Apios, Anioch.

ASTRAGALVS FORTE PRIMVS, Acтрагалусь форте примусь. Смотри Aftragalus, Acmparanych.

ASTRAGALVS GALEGIFORMIS Linn. Астрагалусь Галегиформись. Стручкопая трана имъющая подобіе козьей рушы.

ASTRAGALVS GLAVX Linn. Acmpaгалусь глауксь. Смотри Glaux, Глауксь.

ASTRAGALVS GLYCYPHYLLOS Lion. Астрагалусь глицифиплось. Сладколистиенная стручконая трана, цв в шет в в в степяхъ, и имъетъ къ землъ прилегшій стебель дугою изогнувшійся, и три почти не примъщныя стороны имъющія стручья и продолговатно круглые на длинных в черешках в сидящіе лисшья. По Гречески Аграуалов γλυχύφιλλος; πο Ητομεικα Der Gußblatterigte Astragalus, oder Wirbel-Kraut; по Француски Astragale à feuilles douces au goût; no Umaxi-Antragalo con foglie dolce al gusto; no ATAUHCRU Milk Vetch with fweet leaf's.

ASTRAGALVS GRANDIFLORVS Linn. Астрагалусь грандифлорусь. Желтогопопникь, имъеть волосками покрыпые стебли, желные цввты, и продолговато круглые, къ концу принупленные лисшъя. Πο Γρεчески Ασράγαλος μέγαλευπός; Abmeuun Astragasus mit großen gelben Bluthen; по Француски Astragale à grands fleurs jaunes; по Итадіански Astragalo con grandi fiori gialdi; по Аглински Milk Vetch with yellow great flower's.

ASTRAGALVS LVSITANICVS CLV-Астраганусь Лузитаникусь Raysin. Смотри Astragalus, Астрагалусь.

ASTRAGALVS MICROPHYLLVS Linn. Астрагалусь Микрофиллусь. Мелколистиенная Стручкопая трапа, имъетъ мълкіе, продолговатые, круглые листья, кругловатые стручья, и нъсколько оттопыривающийся стебель. По Гречески Аграуалог шихрофиллог;

Tacma I.

по Нъмецки Das Rlein blatterigte Wirbel-Rraut; по Француски Astragale à petites seuilles ovales; по Ишаліански Astragalo con picciole foglie; по Afauheku Milk Vetch with small leaf's.

ASTRAGALVS MONSPESSVLANVS. W ASTRAGALVS MONTANVS Linn. Астрагалусь монтанусь. Смотри Astra. galus, Aстрагалусь.

ASTRAGALVS ONOBRYCHIS Linn. Астрагалусь Оноврихись. Смотри Onobrychis, ОнобрихисЪ.

ASTRAGALVS PILOSVS Linn. Acmpaгалусь пилозусь. Поленый полосистый Topoxb. CMompu Astragalus caulescens, Acmpaгалусь кавлесценсь.

ASTRAGALVS SVLCATVS, Acmpardлусь сулкатусь. Дорожчетый горохь.

ASTRAGALVS SYRIACVS Linn. Ac. трагалусь Сиріакусь. Смотри Astragalus, Астрагалусь.

ASTRAGALVS TRAGACANTHA Linn. Астрагалусь Трагаканта. Смотри Тгаgacantha, Tparakanma.

ASTRAGALVS TRIMESTRIS Linn. Aстрагалусь Триместрись. Трежь-мвсячная Стручконая трана, имбеть низкіе, тонкіе стебли и кривые, кЪ концу на подобіе шила острые и двушелушные стручья. По Гречески Аграуалог Трінпуог; по Нъмецки Das drey Monathliche Abirbel = Rraut; по Француски Astragale des trois mois; по Италіански Astragalo di tre mesi; по Аглински The Milk Vetch of three month.

ASTRACALVS VARIVS, Acmparaлусь паріусь. Березка или Разноперазная Стручконая трапа.

ASTRAGALVS VICIÆ FOLIIS, FLO-RE VIOLACEO, Acmparanych unuie poлінсь, флоре пиолацео. Разнообразная Стручкопая трапа съ Фіоленовымъ цевтомЪ, растепъвъ Сибири и по всему Дону и цвътеть чрезъ весь Май, а съмяна приносить въ концъ Іюня мъсяца. Она имъ.

имветь продолговатый, толстый и прямо вь землю идущій корень, выпускающій иногда много а иногда только н всколько весьма сучкованых в вышвей, покрывающихся былымъ пухомъ, и окружающихся зубчаными. и почин осьминарными лиспыями: Цвфпы на ней большіе, продолгованые, им'вынь синій изкрасна цвіть, поддерживающия всь однимь общимь спебелькомь, расположеннымь вь далекомь другь оть друга разстояній и вырастають извершины стебля на подобіє виноградной кисти. Цвѣточная чашечка разръзана на пять не равных в лапочекь, имбеть продолговатый круглый видь и зеленый изъ красна цвыть и покрывается вся пухомЪ. Смотри Латинское прибавление къ 1 тому Господина Профессора Гмелина пушешествія по Россіи: По-Гречески Аграуалос. Гобис по Нъменки 2013 ragalus, oder Wirbel-Kraut mit Violet fars benen Blumen; по Француски Astragale à sieurs Violettes; no Италіански Astragalo con siori Violate; no Aeauneku The Milk Vetch :

ASTRAGALVS VICIÆ FOLIIS, FLO-RIBVS IN CAPITVLVM CONGESTIS PVR-PVREIS Gmel. Aemparanych nunie poлінсь, флоривусь инь капитулумь кон. тестись. Разнообразная багряноцивтная Стручконая трана, расшеть съвышечномянушою въ одникъ мъсшахъ, шакже и цвъщетъ съ нею въ одно время. Она имъеть волокнистый корень, выпускающій прямые, изъ кругла долгіе, и нъсколько косматые спебли, окружающіеся зубчаными лисныями, изъ коихъ нижніе разряжены поперем вню от десяти до двенатиати паръ и имфють едино образные, тупые, съ верьку зеленые, съ низу не много косматые и длиною вЪ дюймЪ бывающіе зубчики; а верьхніе стоять другь противь друга и зубчики у нихЪ плошные. Основаніе у сихъ листовъ разширено; къ верьху идуть они уже и кончатся острымь концомь. Промежь верхнихь листовь поднимаюния въ верьхъ цвъщочные не много косма. шые стебельки, поддерживающіе багряно. нвыные, по нъскольку вмысть вы продолговаттую и плоскую головку соединенные, прямо идущую и пухомъ обросшую подво. локу имъющіе и изъ косьматой, на пять не равных вырвзовь раздъленной чашеччи выходящіе цвёты. Имя разнообразных в да но симъ по родамъ стручковой травы по ному, что они разные принимають образы въ принадлежащихъ къ прораствнию расположенію частяхь. По Гречески 'Азра' χαλος: πορφυρές; Πο. Η ΒΜΕЦΚΗ Ustragalis mit Purpurfarbenem Blumen; no Opan цуски Astragale à fleurs couleur de pourpre, по Италіански Astragalo con fiori purpureli по Аглински: Milk. Vetch with purple Flo

ASTRAKTIS, Acmparmuch. Cmomps
Eryngium, Epuhriymb.

ASTRANTIA, Астранціа. и

ASTRANTIA ALPINA, Астранців Алпина. Смощри Ітрегатогіа, Императоріа

ASTRANTIA MAIOR Linn. Mor. umb. Астранціа магорь. Astrantia nigra. offic. Ger. 828. Raii. Hift. 1. 475. Aftrantia maio corona floris purpurascente. Pit. Tournes. O steritium montanum, Trag. Imperatoria nigra Tab. Veratrum nigrum Dioscoridis. Ger. Emac. 978. Helleborus niger, Saniculæ folio maior C. B. Pin. 186. Park. Theat. 213. Sanicula foemina quibusdam, aliis Helleborus niger В. т. 638. Chomel. 567. И. Большій чер ный Царскій корень расшеть завсь в салахь, но въ нъкоторыхъ странахъ Рос сіи и въ лъсахъ, на гористыхъ мъстахъ и цвв теть вы Іюль мысяць. Она имветь черные, волокнистые и въ низу маленькую головку составляющие корешки, производя щіе жестковатые, Саникульным в подобные на пяшь лапочекЪ, имъющихъ каждая при врвза раздвленные, и на длинных спе бельках в сидящіе лисшья из в средины ко

14

a.

0.

1-

30

0.

16

IN

2.

2-

10

11

N

id

Co

6

ихь возвышаются два или три тонкихь стеблей, окружающихся до вершины и всколькими, нижнымъ во всемъ подобными листьями, производящіе изъ вершины своей пучечки съ бъло-пурпуровыми изъ многоподобных в и къ срединъ пвъта загнутых в лисшочковъ составленными цвѣточками о. кружающимися въ низу листочными вънчиками. Послъ цвътовъ превращаются ихъ чашечки въ двугиъздныя, пленчашыя, про-Аолговатыя и бороздчатыя свиянодержашельницы о двух в долговашых в, узеньких в съмячкажь. Качествомъ и дъйствіємъ своимъ въ Медицинъ сходствуетъ онъ съ малымЪ чернымЪ ЦарскимЪ корнемЪ (Astrantia minor, Астранціа минорЪ), съ которымЪ и вЪ один в классъ полагается. По Гречески названія Homb; no Homenku Schwarze Meister, Wurgel; по Француски Otruche noire; по Италіански Anticirone, o Elleboro nero; по Аглин-CRM Black Masterwort.

ASTRANTIA MAS, Acmpanitics macb.

Смотри Imperatoria, Имперацоріа.

ASTRANTIA MINOR Linn. Acmpanчіа минорь. Helleborus minimus, Alpinus Astrantiae flore Bocc. Helleborus niger saniculae folio minor. С. В. Малый черный Царскій корень, расшеть на гористых в мъстахъ, цвътетъ въ Іюлъ мъсяцъ, стоишь два мъсяца въ цвъщу, и различествуеть оть вышеописанной только въ томъ, что во всъхъ частяхъ своихъ меньше, и им веть на подобіе пальцовь вырвзанные и такими какъ у пилы зубчиками окруженные листья. Оба рода сей травы прозимующіе, и содержать въ себь много соли и нъсколько масла. Корни ихъ слабятъ, и разбивають затвердымым опухоли въ селезенкъ, но въ Медицинъ ръдко употребляются. Астранція есть Греческое отБ слова Аѕпр, звъзда происходящее имя, по тому, что вершинки сихъ расшеній кажутся звіздоподобными. Господинъ Линней полагаешь ихь вь V. классь расшеній, имъющих в в в своем в цевтв пять тычков и два пестика (Рептанстіа сідупіа), а Господин в Турнефорть в VII. классь, во II. отделеніе, в V. родь травь с в многолистным в, многоподобным в и круглым в цевтом в. По Гречески имени нъть, по Нъмецки Кісіпе сфичать Мейрег - Жикев; по Француски Ретіте Отгисне поіге; по Италіански Еlleboro nero picciolo; по Аглински Тhe small Black Mastervort.

ASTRANTIA NIGRA, Астранціа нигра. Смотри Astrantia maior, Астранціа маіогь.

ASTRANTIA VULGARIS. Астранціа пулгарись. Смотри Ітрегатогіа, Императоріа.

ASTRENCIVM, Астренціумь. и

ASTRENS, Acmpench. u

ASTRENTIVM, Астрентіумь. Смо-

ASTRIVM, Астріумь. Смотри Согопория, Коронопусъ.

ASTROBILE, Астровиле. Смотри Dactyli. Дактили

ASTROBILINE, Астробилине. Смо-

ASTROCH, Acmpoxb. Cmompn Sty-

rax; Cmupakcb.

ASTROCRILIBE, Астрохрилибе. Смо-

ASTRODILBE, Астродилье. Смотри Dactyli, Дактили.

ASTROMON, Астромонь. Смотри Авгит, Азарумъ.

ASTRVACHV, Acmpyaxy. Смотри Cervaria, Церкаріа.

ASTRVCTIO, Acmpyrijio. Cmompia

Нурегісит, ГиперикумЪ.

ASTRVTHIVM, Acmpymiymb. u. ASTRVTIVM, Acmpyuiymb. CMo-

три Imperatoria, Императорia.

ASTVLA REGIA, Aступа Peria. Смо. три Asphodelus luteus, Асфоделусь лутеусь. ASVRIC, Азурикь. и

ASVRITE, Азурите. Смощри Eruca, Ерука.

ASYPHILIVM, Азифиліумь. Смотри Gramen, Грамень.

ATAMANTA, Атаманта. Смотри Мешт, Меумъ.

ATANASIA, Атаназіа. Смотри Таnacetum, ТанацетумЪ.

ATANITA, Атанита. Смотри Сусlamen, Цикламенъ.

ATHAMANTA CERVARIA Linn. Атаманта Церпаріа. Смотри Сегцагіа, Церваріа.

ATHAMANTA LIBANOTIS Linn. А. таманта Либанотись. Смотри Libanotis, Либанотись.

ATHAMANTA MEVM Linn. Атаманта меумь. Смотри Меит, Меумъ.

ATHAMANTA OREOSELINVM Linn Атаманта Ореозелинумь. Смотри Огеоfelinum, Ореозелинумь.

ATHAMANTINVM, Атамантинумь. Смотри Меит, Меумъ.

ATHANASIA, Amanasia. n

ATHANASIA LEVCANTHEMOS, А-таназіа Лепкантемось. и

ATHANASIA VULGARIS, Amanasia пултарись. Смотри Tanacetum odoratum, Танацетумъ одоратумъ.

ATHANITA, Атанита. Смотри Суclamen, ЦикламенЪ.

ATHARE, Amape. n

ATHARIO, Amapio. Смотри Lignum Lentisci, лигнумъ Лентисци

ATHEMON, Атемонь. Смотри Еріthymum, Эпишимумъ.

ATHER, Amepb. u

ATHIR, Amupb. Смотри Schenan-thum, СхенантумЪ.

ATHYLLIS, Amuanuch. Cmompu Lago-

podium, Лагоподіумь.
ATHYLLIS LEGVMINOSA, Атил-

пись легуминоза. Смотри Authyllis leguminola, Антиллись легуминоза. ATHYLLIS LENTI SIMILIS, Amunanch neumu cumunuch. Cmompu Camphorata, Kampopama.

ATHYLLIS PRIOR, Amunnuch npi

орь. Смотри Vulneraria, Вулнераріа.

ATLE, Amne. Смотри Tamariscus, Тамарискусъ.

ATRACTYLIS DIOSC. Атракти лись Діоск. Смотри Cnicus, Кникусь.

ATRACTYLIS FLORE PVRPVREO, Ampakmunuch prope nypnypeo. Cmonque Cnicus aculeatus, purpureus humilior, Khurkych akyreamych, пурпуреусь гумиліорь.

ATRACTYLIS FRVTICOSA Linn. Am рактились фрутикоза. Atractylis Offic. Ger. 1008. Emac. 1171 Atractylis lutea. B. 379. Cnicus Atractylis lutea dictus. Tours. Inft. 451. V. Воронка трапа, или Жел тый Осеть расшень вы поляхы и свется въ садахъ, и цвъшетъ въ Іюлъ мъсяць. Она есшь родъ Осотовъ, вырастаеть десяпь, и двенапідань вершков вышиною; и имбешь крыпкій, не много мохнашый, бълою, густою влажностью наполненный, ^п вверьху на многія вѣшви разщепляющійы сшебель, кошорый окружается продолговапыми, зелеными, колючими иглами обсаженными, и многими жилками испещренными листьями; изЪ вершинки каждой вѣточк^и вырасшаеть маленькая, круглая и иголь. чатая головка или шишечка, которая раз шворяясь оказываешь желшые, перисшые, ^в кучками по нъскольку вмёсть сидящіе цве ты; послё ноих в остаются черноватыя; пушистыя и горькаго вкуса съмячки. Корень его средней толщины. Она содержишЪ вЪ себъ много соли и масла, и малую часть влажносии, опіворяєть, производить поть, и употребленная въ Декоктахъ противо дейспивуенть яду. Перегонная изъ нее вода починается полезною от глухопы, вр конюром в случав должно обмочины в нее кусокъ клопатой бумаги и положить вы уши. Въ Апшекахъ имбенся шрава, одна KOT B 8

10

į,

кож в ръдко. Атрактились происходить отв Греческаго слова атраилоз, веретено; попому что древніе Греки дівлали верешены изъ ея стеблей. Господинъ Линней полагаеть ее въ XIX. Классъ многобрачных в расшеній, въ мужеских цвенахь, коихъ пычки соединены вмъстъ на подобіе цилиндра шычковою головкою (Syngenesia Polygamia) а Господинъ Турнефортъ въ XII. Классъ, во II. отдъление, въ VIII. родъ травь, имъющихь изь многихь вмёстев соединенных в цвыпочков составленный цавть и пушистое свия. По Гречески Ατραπτυλίς; πο Η Επισηκία Spillen Diftel; по Француски Atractylis espèce de Chardon; по Ишаліански Attratile или Attrattilido; по Аглински Distaff-Thistle.

ATRACTYLIS HIRSVTA, Атрактились гирсута. Смотри Carduus benedictus, Кардуусь бенедиктусь.

ATRACTYLIS LVTEA, Атрактились лутва. Смотри Atractylis fruticofa, Атрактились фрутикоза.

ATRACTYLIS MARINA, Атракти-

ATRACTYLIS MEDIA, Ampaxmu-

auch megia. n

b

20

ATRACTYLIS SANGVINEO SVCCO, Атрактились санглинео сукко. и

ATRACTYLIS SYLVESTRIS, Ampaжтились силиестрись. Смотри Carduus Vulgaris, Кардуусь вулгарись.

ATRACTYLIS VERA FLORE LV-TEO. I. В. Атрактились пера флоре лутео. Смотри Atractylis fruticola, Атрактились фрутикоза.

ATRACTYLIS VULGARIS, Ampakmunuch myntapuch. Cmompu Carduus vulgaris, Кардуусь вулгарись.

ATRAFAXIS, Ampadakeneb. Смотри Риплеков. Атрафаксиев; и Atriplex, Am-

ATRAGENE, Атрагене. Смотри Clematitis fylvestris latifolia, Клеманитисъ силвестрисъ латифоліа.

ATRAGENE THEOPHRASTI, Атрагене Теофрасти. Смотри Vitis nigra, Витиоъ нигра; и Myrtillus, Миртиллусъ.

ATRAPHAXIS ORIENTALIS, Атрафаксись оріентались. 11. Восточная кустарная Греча, растеть въ степяхъ и на самыхъ сухихъ мъстахъ въ полуденной Россіи. Сія трава есть отродье отъ кустарнаго подорожника. По Гречески Атрафакс; по нъмецки Die Orientalische Utraphas vis, oder Orientalischer Etaudigter Buchwertigen; по Француски Atraphaxis orientale, plante d'Asie peu connuë; по Италіански Аtraphaxis pianta orientale; по Аглински Аtraphaxys, ап Asiatick plant.

АТКАРНАХІЅ SPINOSA Linn. Атрафаксиев спиноза. Колючая Кустарная Греча, растетв вы Сибири и полуденныхы странахы Россій на сухихы містахы, и вы каменистыхы щеляхы. Господины Линней полагаеть оба рода вы VI. классы растеній, имыщихы вы своемы цейть тесть тычковы и одины пестикы (Нехапстіа толодупія). По Гречески Атрафаўія акандибля; по Німецки Діг ітасність странцуски Атгарнахія еріпеціе; по Италіански Атгарнахія іріпова; по Атлински Тье thorny Atrophaxis.

АТRIPLEX, Атриплексв. XXIV. Леведа, есть довольно извёстная поваренная трава, которая раздвляется на многіе роды, какв на садовую, лёсную, водяную, и проч. но я опиту здёсь только нёкоторые изв главныхв. По гречески Атрафабія по хрибодахамом; по Арабски Сатаб, или Сатаб; по Нёмецки Меіте, или Меіте, по Француски Arroche; Bonnes Dames; Prudes femmes, Follettes; по Италіански Atrebice, леторісе, и Trebice, по Аглински Arach, and Orach.

ATRIL

ATRIPLEX AGRESTIS, Ampunnench Arpecmuch. Cmompu Atriplex Syluestris,

Атриплексь силвестрись.

331

ATRIPLEX ALBA HORTENSIS. I. B. и. 970. Raii. Hift. 1. 191. Атриплексь ал. Ба гортенсись. Atriplex hortensis Linn. Atriplex satiua alba. Ger. 256. Emac. 325. Atriplex spuria hortensis candida, Volck. 53. Atriplex hortensis alba, siue pallide virens, C. B. 119. Hift. Oxon. II. 606. Tourn. Inft. 505. Boerh. Ind. A. и. 89. Белая Садопая Лебеда, свется вы садахы, и цввтеть въ Іюль мьсяць. Она имветь прямый, волокнистый, и глубоко въ землю идущій корень, производящій большій, вЪ низу круглый, къ верьху угловашый, вдоль зелеными узкими дорожками испещренный, на многія въпочки раздъленный и либо шемный либо бълесованый стебель въ полтора и часто въ два аршина вышиною, который окружается треугольными, остироконечными, тучными, съ начала бъловатыми, пошомъ шемнъющими, а на конецъ въ бабдножелный цввшь превращающимися и на листья Бросовой травы (Blitum, БлитумЪ) похожими листьями. На вершинъ кажлой въточки вырастаеть множество маленкихЪ, безлисточныхЪ или изЪ нѣсколькихЪ желшых в шычков в состоящих в цв вточков в, послъ коихъ остаются плоскія, круглыя и тонкія съмячки. Двиствіем в и качеством в своимъ сходствуеть она съ красною; (А. triplex hortenfis rubra, Ampunaench ropmenсись рубра) съ которою и въодинъ классъ полагается. Она будучи варена съ рыбою или мясомь, заступаеть у нъкоторых в креспьянъ мвсто кислой капусты. По Гречески 'Ατράζαξις иливити λευий; по Нъмецки Weise Garten Melte; no Ppannycku Arroche blanche des jardins; no Ишаліански Atrebice blanca del giardino; по Аглински The White Garden Arach.

ATRIPLEX BACCIFERA, Атриплексь бакцифера. Смотри Chenopodio-тоrus, Хеноподіо морусь. ATRIPLEX CANINA, Атрипленсь канина. Смотри Garolmus, Гаросмусъ.

ATRIPLEX CHENOPODIA AMBRO. SIOIDES FOLIO SINVATO, Hort. Monsp. 29. Ampunnench Xenonogia Amsposione gech ponio cunyamo. Cmompu Botrys, 60mpuch.

ATRIPLEX CHENORODIA FOETIDA Hort. Monsp. 29. Атриплексь Хеноподіа фетинда. Смотри Atriplex olida, Атриплексъ олида.

ATRIPLEX CHENOPODIA FOLIO TRIANGVLO, Ampunnench Xenonogia ponio mpianryno. Cmompu Bonus Henricus, Bonych Генрикусь.

ATRIPLEX CHENOPODIA LATIFO-LIA Hort. Monsp. 28. Ampunnerch Xenonogia namuponia. Cmompu Pes anserinus,

Песь ансеринусь.

ATRIPLEX DOMESTICA Ang. Matth. Ampunnench доместика. Смощри Atriples domestica alba hortensis, Ашриплеков доместика алба Горшенсисъ.

ATRIPLEX FIMETRIA MAIOR, А триплексь фиметріа маіорь. Смотри

Chenopodium, Xenonogiymb.

ATRIPLEX FOETIDA C. B. Pin. 119.
Ampunnereb pemuga. Cmompu Garofmus,
Tapocmych.

ATRIPLEX FOLIO RVFO, Ampuntonento ponio pygo. Смотри Atriplex sylvest

ris, Атриплексъ силвестрисъ.

АТКІРІЕХ GLAVCA Linn. Атриплексь тланка. Лазореная Лебеда, еспь
прямостоящая трава, которая на солких растеть кустикомь почти въ четверть вы
прастеть кустикомь почти въ четверть вы
шиною, а на высоких в Индерскато озеря
берегах в, гдв ея находится великое множе
ство древесными, и поверьх в земли изби
толщиною. Корень у нее въ разсужденти ра
стенія малый, простоватый и заощренный
и испускаеть однольтніе, простоватые,
тонкіе, ломкіе, съ верьку отстоящею свядою
кожицею покрытые, и радкими коперем вня

6

,

16

M

но разметанными, приземистыми лиспьями облагающиеся стебли вышиною въ шесть. верышновъ и больше, которые раздъляются на сильныя, и поперемвино же расположенныя вышви, кои подобны лозамь, облагающся почти всегда другими, окружающся маленькими , толстенькими продолговато круглыми, цъльными, заощренное основаніе им вющими, по м врв солкости земли больше и меньше лазоревыми и къ верьку мало по малу меньшими и равноширными бывающими листьями; и околашиваются приземиспыми цвётными клубочками, которые раз-Ражены поперемънно, опистоять одинь оть Аругаго весьма далеко и составляются побольшой часни изЪ бълесованыхЪ, пяни сторонних в и изв наскольких в шычков в св однимъ на двое раздъленнымъ пестикомъ во кругъ расположенных в цв в почковъ, коихъ перышки продолговато круглыя и тучныя. Тычковыя головки также приземистыя. СЪ Лашинскаго прибавленія Господина: Профессора Палласа къ в му тому его путешествія по Россіи на Нъмецкомъ языкъ; стран. 494, Нумеръ III. По Гречески Ατράφαξίς иичий; по Нъмецки Dielte mit hell-blauen Blattern; по Француски Arroche à feuilles azurées; по Ишаліански Atrebice con foglie azurrine; по Arauneku Arach with Skies leaf's.

плексь Галимусь. Смотри Halimus, Галимусь.

плексь гастата. Стрвлолистиенная леведа. По Гречески Атрафа вы акхнофоров.

ATRIPLEX HORTENSIS Linn. Ampuплексь гортенсись. Смотри Arriplex albahortensis, Атриплексъ алба гортенсисъ.

ATRIPLEX HORTENSIS ALBA, Am-

АТПРЕЕХ HORTENSIS RVBRA. III. Атриплексь гортенсись рубра. Красная садоная Лебеда, свется также вы поваренных варенных вараный и выходить изъ земли, также какъ и былая, вы восемы дней.

Она различествуеть от былой только вы томъ, что листья и цвъты ея красные или пурпуровые. Лебеды содержать въ себъ много влажноми, масла, и употребляюсия на поварнях вы кушаніях в, у простаго народа въ ботвиньяхъ, а въ случав голода, св рожью вв хавбахв; Лисшья умягчають, прохлаждають, понуждають на низъ, унимають боли, и полезны отъ желчи, а наружно употребляють ихъ въ клистирахЪ, и припаркахЪ, также и образомъ баненія от вому въ ногахь и для возбужденія сна; а съмяна их в производящь. рвоту и побуждають на низв, и почитаются н вкоторыми за особливое л вкарство от в Аглинской бол взни. Господин В Доктор В Диц В. совътуеть пить листья и цвъть лебеды по утрамъ вмъсто чаю, отъ хрипошы, для разбиванія мокрошь и для разжиженія или чищенія крови. Живущіе вЪ Америкъ въ Виргиніи Индіанцы достають изЪ стеблей садовой лебеды чрезЪ пережигание соль, которую употребляють вмьсто простой. ВБ АптекахВ употребляется свия. Господинь, Линней полагаешь всв сорты сей травы въ XXIII. Классь многобрачных в расшений, им вющих в на одном в и помъ же корнъ цвъпы и мужеские, и женскіе (Polygamia Monœcia) а ГосподинЪ Турнефорть вы XV. Классь, во II. отдъленіе, въ III. родъ травъ съ тычковымъ цвътомъ. По Гречески Атрафабія интенті έουθρά; πο Ητωεικи Rothe Garten Melte; πο Француски Arroche rouge des jardins; по Италіански Atrebice rossa del Giardino; по Аглински The purple Garden Arach.

аткірски Laciniata Lina Ampuплексь пациніата. Курчаная Лебеда растеть вы множесть около Илецка, и имветь зубчатые, остроугольные, и сы низу серебренаго цвыта листья. По Гречески: Аграфавія подтобля; по Нымецки Dielte mit Faltichten Biattern; по Француски Arroche roche à feuilles laciniées; no umaviancem Atrepice con foglie lacinia t

ATRIPLEX LATIFOLIA, Ampunnerch namuponia. Cmompu Halimus, Taлимусъ.

ATRIPLEX MARITIMA ANGUSTIS-SIMO FOLIO, Hift. Oxon. II. 608. Tourn. Іпп. 505. Атриплексь маритима антустиссимо фоліо. Смотри Portulaca maritima, Поршулака маришима.

ATRIPLEX MARITIMA FRUTICOSA, HALIMVS DICTA LATIFOLIA, Pluk. Almag. 61. Атриплексь маритима фрутикоза, Галимусь дикта латифоліа.

Смотри Halimus, ГалимусЪ.

ATRIPLEX MARITIMA FRVTICOSA, HALIMVS ET PORTVLACA MARINA DICTA, ANGVSTIFOLIA. Raii. Synop. 63. Атриплексь маритима фрутикоза, Гапимусь эть портулака марина дикта, ангустифоліа. Смотри Portulaca maritima, Поршулака маришима.

ATRIPLEX ODORA SEV SVAVE-OLENS, Hist. Oxon. II. 605. Ampunnench

одора сень спапеоленсь. и

ATRIPLEX ODORATA, Ampunnexcb

одората. Смотри Восгуз, Ботрисъ.

ATRIPLEX ODORATA MEXICANA. Hern. 159. Атриплексь одората Мексикана. и

ATRIPLEX ODORATA SVAVEOLENS AMERICANA MEXICANAVE, Hift. Oxon. II. 605. Атриплексь одората спапеоленсь Американа Мексиканапе. Смотри Botrys Mexicana, Бонгрисъ Мексикана.

ATRIPLEX OLIDA, Атриплексь

олида. Смотри Garosmus, Гаросмусъ.

ATRIPLEX PATVLA Linn. Ampuтлексь патула. Смотри Atriplex glauca,

АприплексЪ главка.

ATRIPLEX PEDVNCVLATA Linn. Атриплексь педункулата. Черенястая Леведа, расшеть вы изобили около Гурьева городка и въ пресолкихъ болошахъ.

Она сухощавая, лазоревая, окружается ръдкими въточками и листьями, стоинъ не весело, и имбешь весьма корошкій, проспый, заощренный, и какъ у большой части раждающихся на солких в мвстах в расшеній, извиваясь въ землю идущій корень, который производить тонкіе, слабые, простоватые, при корив иногда раздълнощіеся, и извиваясь въ верьхъ поднимающіеся стебли, которые поднимаясь вв верых в расходятся и раздванются на цевтоносныя и из в листовых в стебельков в выходя ошнопыривающіяся в точки, окружающся пресильными, по стеблю и вѣшвямъ поперемѣнно размешанными листыямъ лазоревой лебеды (Atriplex glauca, Атриплексъ главка) подобными листьями кром в того только, что тон ве, больше и стоять на черешкахь. Оныя въпочки изпещряются клубочками, идущими попере мънно и начинающимися шычковыми цев. шками, числомь оть четырехь до шести, кои сушь приземисшы, ченыре - сторонны и окружающся цввшками съ песшикомъ, ко шорые шычковых во меньше, весьма раз' топыривающся и представляють длинный; серджевидный, въ равноширный черешекъ заощренный, въ выръзахъ самымъ корош кимъ пестикомъ назначенный, и съ объ ижь сторонь произходящимь оть пестика швомЪ изрышый лисшочекЪ. Смощри Лашин ское прибавление Господина Профессора Палласа кЪ I. тому его путешествія по Россій на Нъмецкомъ языкъ, стран. 495, мерь 112.

ATRIPLEX PORTVLACOIDES Linn Атриплексь портупакондесь. Лебеда св Портупаконы милистьями, есть по земль разсшилающаяся и вдоль по Иршышу ра стущая права, имъющая прямо къ верьку стоящіе, продолговато круглые и Порту лаковымъ подобные листья. По Нъмецки Melte mit Portulactblattern; по Француски Arroche à seuilles de Pourpier; no umaniански ански Atrepice con foglie della Porcellana; по Аглински Arach with Purfran leaf's.

ATRIPLEX SALICINA, Ampunnexcb салицина. Ипо пидная или Уэколистпенная Леведа, растеть съ выше описанными въ однихъ спранахъ. Она имъеть заощренный и волокнистый корень, и облагается иногда ръдкими вътывями, кошорыя обращающся въ верьхъ прямо, а иногда бываеть она вътывистая, и растеть разширенно, голая, травная, цвв. томъ темнозеленяя, и вышиною съ локоть. Стебли у нее круглые, и по поверьхности своей вдоль бълыми, а иногда красноватымили. мъечками испещренные, и окружающся копьеобразными, черенястыми, и поперемънно разположенными лисшьями, съ неравными, РЪдкими, острыми и нъсколько загнутыми зубчиками; корневыежь на молодомъ растеній бывають равноширные и цівльные. Верьхушка на крайних в стебельках в безлистиная, и всколько вытвистая, и облагает. ся цвъточными, весьма частыми, и нарочишой величины приземисшыми клубочками, которые состоять изв многихв цвъточковъ сь шычками и песшиками. Тычки бываюшь Аолгіе, числомЪ по пяши вЪ каждомЪ цвЪточкъ. Смотри I. Томъ путешествія Господина Профессора Палласа по разнымъ мъстамъ Россіи. По Гречески Атрафаξіє хепτόφυλλη; по Нъмецки Schmaiblatterichte Salh-Melte; по Француски Arroche à feuilles de Saule; по Италіански Atrepice con foglie anguste.

ATRIPLEX SATIVA ALBA, Ampuплексь сатипа альа. Смотри Atriplex alba hortensis, Атриплексъ алба гортенсисЪ.

ATRIPLEX SATIVA ALTERA, Amриплексь сатипа алтера. и

ATRIPLEX SATIVA FOLIO RVBI-CVNDO, Атринлексь сатина фоліо рубикундо. и

Часть І.

ATRIPLEX SATIVA RVBRA, Ampuплексь сатина рубра. Смотри Atriplex hortensis rubra, Атриплексъ гортенсисъ Character garages and the

ATRIPLEX SYLVESTRIS Dod Ampuплексь силпестрись. Atriplex sylvestris folio sinuato, saturate virente, spica rubra. Hist. Oxon. II. 604. Atriplex agrestis. Trag. Fimetria minor. Thal. Blitum Atriplex Syluestris dictum. Raii. Synop. 63. Chenopodium folio laciniato comà purpurascente. Tourn. Inst. 506. Boerh. Ind. A. 11 90. Buxb. 69. Auкая или Лесная Леведа, растеть вы лвсахЪ, на песчаныхЪ мъсшахЪ, пустыряхЪ и пашняхъ, и при дорогахъ, цвътеть лътомъ и бываеть четырскъ главных в родовь, а имянно: Лвсная Лебеда съ бълыми лоснящимися листьями (Atiplex sylvestris folio sinuato candicante. C. B. Атриплексъ силвестрисъ фоліо синуато кандиканте) Маленкая дикая Лебеда. Atriplex lyluestris minor, Атриплексь силвестрисъ миноръ Широколистиенная дикая Леведа. Atriplex syluestris latifolia, Ашриплексъ силвестрисъ латифоліа: и Вонючая Дикая Лебеда, Atriplex foetida. Ашриплексъ фетида. Они имъютъ прямый стебель около девяти вершков вышиною сизо - зеленые листья, изъ пяти или шести красноватых в тычков в составленные цвъщочки, и маленкія круглыя, черныя, лоснящіяся и сплюснушыя стмена. Они умягчають, разбивають и жидять, но вь Медицинъ не употребляются, чего ради и въ АпшекахЪ, ничего не имвешся. По Гречески Arpagakis aypia; no Homenku Wilde oder ABaid Melte; по Француски Arroche sauvage по Ишаліански Atrepice seluatica; по Аглински Wild Orache.

ATRIPLEX SYLVESTRIS ALTERA. С. В. 119. Ger. Етас. 326. Атриплексь

силпестрись алтера. и

ATRIPLEX SYLVESTRIS FOLIO SI-NVATO CANDICANTE C. B. Ampunnexcb силиестрись фолю синуато кандикантеля X ATRI-

ATRIPLEX SYLVESTRIS LATIFOLIA, Атриплексь силпестрись латифоліа. н

ATRIPLEX SYLVESTRIS SECVNDA, Атриплексь силпестрись секунда. и

ATRIPLEX SYLVESTRIS SINVATA, Атриплексь силпестрись синуата. Смопри Atriplex syluestris, Априплексъ силвестрисъ.

ATRIPLEX SYLVESTRIS TERTIA, Атриплексь силнестрись терціа. Смотри

Chenopodium, Хеноподіумь.

ATRIPLEX SYLVESTRIS VULGATI-OR SINVATA. PARC. 747. Ampunnekch силпестрись пулгаторь синуата. Смотри Atriplex syluestris, Атриплексъ силве-

етрисЪ.

ATRIPLEX TATARICA. Linn. Ampuплексь Татарика. Татарская лебеда имвень правный спебель, и остроугольные, поперемънно расположенные, многовыръзчатые и выпуклистые листья. По Гречески 'Ατράφαξις Ταρταφική; по Нъмецки Zartarische Melte; по Француски Arroche de Tartarie; по Италіански Atrepice della Tartaria; по Аглински The Tartarian Orache.

ATRIPLEX VENETA SEMINE RVB-RO ET HERBACEO, Ampunnench Beneта семине рубро еть гербацео. Смотри

Halimus, ГалимусЪ.

ATROPA BELLADONA Linn. Ampoпа Белладона. Смопіри Belladonna, Белладонна.

ATROPA MANDRAGORA. Linn. Aтропа Мандрагора. Смотри Mandragora, Мандрагора.

ATTICVS, Ammunych. CMompu Eryn-

gium, ЕрингіумЪ.

ATTRACTYLIS HIRSVTIOR, Amтрактились гирсуціорь. Смотри Carduus Benedictus, Кардуусь Бенедиктусь.

ATTRACTYLIS MEDIA Gein. Amтрактились медіа. Смотри Carduus yulдагія, Кардуусь вулгарись.

AVBEL, Ayrenb. CMompu Thymus, Tuмусъ. acted Arach while Portland

AVBIVM, Aybiymb. CMomph Chelidonium maius, Хелидоніумъ маюсъ.

AVCATA, Aykama. CMompu Ammi Амми.

AVCVPARIA FRAXINVS, AURYTO ріа Фраксинусь. Смотри Fraxinus, ФраксинусЪ.

AVCVPARIA SORBVS, Anxynapia

Сорбусь. Смотри Sorbus, Сорбусь.

AVELLANA, Анеллана. Смотри Avellana, Авеллана.

AVENA, Anena. Cmompu Avena, Авена.

AVLBARVM, Аулбарумь называем ся зерно изъ большой виноградной ягоды.

AVLITICA HERBA', Aunumuna rep' Ба. Смотри Chamomilla, Хамомилла.

AVMEB, Aymerb. Cmompu Iuiubae, 10. юбе.

AVRA, Anpa. Смотри Centaurium minus, ЦентавріумЪ минусЪ.

AVRANGIVM, Anpahriymb. u AVRANTIA POMA, Απρακιμία πο

AVRANTIA MALA, Aupanuia Mas na. u

AVRANTIVM VULGARE, Aпранціумь пулгаре. Смотри Malus aurantia, малусь авранціа.

AVREA COMA, Апреа кома. Смотря Chamomilla, Хамомилла; и Stoechas citrina, Стехасъ цитрина.

AVRELIA, Aupenia. Смотри Bombax, БомбаксЪ.

AVREOLA, Апреола. Смотри Stoechas Citrina, Стехасъ цитрина; и Calendula, Календула.

AVREVM MALVM, Anpeymb Ma. лумь. Смотри Malus Aurantia, Малусъ Авранціа. и

AVRICOMVM, Aприкомумь. Смотри Ranunculus, Ранувкулусь.

AVRI

AVRICVLA ALPINA, Априкула Алпина. Смотри Auricula vrsi, Аврикула урси-AVRICVLA, Априкула. Смотри Pri-

mula, примула.

AVRICVLA IVDAE, Aприкула Юде. fungus membranaceus auriculam reserens, siue Sambucinus. C.B. 372. Raii. Hist. 1. 106. Synop. 18. Fungus Sambucinus, Park. 1320. Agaricus Auriculae forma, El. Bot. 441. Tourn. Inst. 562. Boerh. Ind. A. 14. Buxb. 7. Peziza Auriculam referens. Dill. Cat. 195. I. Бузинная Губка, или съ Нъмецкаго Гудопо Ушко, есть родъ безчерешнаго гриба, или по мивнію Господина Турнефорта родъ Губки, вырастающей на пняхъ спарых Б бузинных Б дерев (Sambucus , СамбукусЪ), и имъющей величину и подобіе человічьяго уха. Она покрыта перепочистою сморщившеюся кожею, им веть темносърый цвъть, и бываеть, когда еще на жеревв, тонкая и мягкая, но снята булучи сь дерева, становится жесткою и получаеть сущительно - вязательное качество. Сей на-Рость или губка содержить въ себъ много масла, и соли, разбиваеть опухоли и упопребляется наружно вЪ горлополоска тельныхЪ водахЪ; шакже мочашЪ ее вЪ Феникольной, попушниковой (Plantago , Планшаго) или Розовой водъ и припаривають ею красные воспалившеся глаза, коих в боль и воспаленіе унимаєть. Многіє варять ее вы молокь или мочать въ уксусв и употребляють съ пользою наружно. Внутренно вредить она желудку, причиняеть въ немъ ръзъ и производить рвоту. Априкула Юзе есть Латинское и Гудопо Ушко значущее имя по тому, что сей нарость имъеть подобіе уха, и что по мивнію многих в, Іюда предашель пов всился на том в деревв, на котором в она растетв. Господинь Линней полагаеть ее въ XXV. классь майнобрачных b расшеній (Cryptogamia, Кринтогаміа); а Господинь Турнефорть вь XVII. классъ, въ 1 отдъление, въ V родъ земных в и древесных в произрасшеній, коих в цввтв и плодь обыкновенно не извъстны. По Гречески Миля актя, ней шиля актяс, ней шиля актяс, ней шиля актяс, ней шиля эполовен в фолите в фо

AVRICVLA LEPORIS, Априкула Лепорись. Смотри Виресигит, Буплеврумь.

AVRICVLA LEPORIS RIGIDIOR, Априкула Лепорись ригидіорь. Смотри Вирісичні latifolium, Буплеврум в латифоліум в.

AVRICVLA LEPORIS VMBELLA LV-TEA, Априкула Лепорись умбелла лутеа. Смотри Bupleurum angustifolium, Буплеврумъ ангустифоліумъ.

AVRICVLA MVRIS, Априкула му-

pucb. Смотри Myosotis, Міосопись.

AVRICVLA MVRIS ALIA, Априкупа мурись апіа. Смощри Pilosella, Пилозелла.

AVRICVLA MVRIS COERVLEA, Anpukyna mypuch nepynea. Cmompu Myofotis, Miocomuch.

AURICVLA MVRIS DIOSCORIDIS .
Anpukyna mypuch Aiockopuqueh. u

AVRICVLA MVRIS LVTEA, Априкула мурись путеа. и

AVRICVLA MVRIS MAIOR, Anpu-

кула мурись магорь и

AVRICVLA MVRIS MINOR, Априкула мурись минорь. Смощри Pilofella, Пилозелла.

AVRICVLA MVRIS MINOR TERTIA, Априкула мурись минорь терціа. Смотри Alyofotis, Аліосопись.

AVRICVLA MVRIS PRIMA, Anpu-

кула мурись прима. и

AVRICVLA MVRIS QVARTA, Ап-

AVRICVLA MVRIS QVINTA, Aupu-

кула мурись кпинта. и

AVRICVLA MVRIS SECVNDA, Ап-

344

AVRICULA MURIS TERTIA, Aupuкула мурись терціа. Смотри Veronica officinarum, Вероника оффицинарумЪ.

AVRICVLA VRSI, Априкула урси. AVRICVLA VRSI APVD HELVETI-OS, Априкула урси апудь Гелпеціось. Смотри Sanicula Alpina, Саникула Алпина.

AVRICVLA VRSI BORRAGINOIDES, Munt. Aardgew. p. 382. c. fig. Phythogr. p. 23. fig. 113. Априкула урси воррагиноngecb. Смотри Verbascum foliis lanatis ra. dicalibus, scapo nudo, Вербаскумъ фоліисъ ланашисъ радикалибусъ скапо нудо.

AVRICVLA VRSI FLORE ALBO,

Априкула урси флоре алью. и

AVRICVLA VRSI FLORE FLAVO, Априкула урси флоре флано. Смотри Sanicula Alpina, Саникула Алпина.

AVRICVLA VRSI FLORIBVS AVREIS GVTTATIS, Априкула урси флорибусь

апреись гуттатись. тожъ

AVRICULA VRSI FLORIBUS COE. RVLEIS, Априкула урси флорибусь це. руленсь. и

AVRICVLA VRSI FLORIBVS PVRPV-REIS, Априкула урси флорибусь пурпуреись. Смотри Primula veris, Примула верись.

AVRICVLA VRSI FOLIO ET FLORE BORRAGINIS MYCONI. R. Vallet Tardin. du Roy etc. fol. 14. f. 3. Aприкула урси фолю еть флоре воррагинись микони. Смотри Verbascum foliis lanatis, ВербаскумЪ фоліись ланашись.

AVRICVLA VRSI LACINIATA Априкула урси лациніата. Смотри Cor-

tufa, Кортуза.

AVRICULA VRSI MINIMA, AHPUKYурси минима. Смотри Sanicula Alpina,

Саникула Алпина.

AVRICVLA VRSI MYCONI. Dalech. Hist. Lugd. 1. 837. Априкула урси микони. и

AVRICVLA VRSI MYCONI VILLOSA COERVLEA. I. B. III. app. 869. Anpunyла урси Микони пиллоза церулеа. Смо° три Verbascum foliis lanatis, ВербаскумЪ фо ліись ланапись.

AVRICVLA VRSI RVBESCENS, Anрикула урси рубесценсь. Смотри Sanicula

Alpina, Саникула Алпина.

AVRICVLA VRSI SVAVERVBENS, Априкула урси спаперувенсь. Смотри Primula veris, Примула верисъ.

AVRINA ALBA, Априна алба. Смо

mpu Gratiola, Граціола. и

AVRONVM, Aпронумь. Смотри Ав

rotanum, АброшанумЪ.

AVRVM HORIZONTALE VEGETA ВІСЕ, Апрумь Горизонтале пететабиле Смотри Museus terrestris, Мускусъ терре стрисЪ: векатична болькой на весе

AVTOVR. Aumoypb есть кора съ на котораго дерева, которая привозится изв Леванта. Цвътомъ и видомъ походить она на карицу, кромъ шого шолько, что не мно то толще, блёднёе и имветь внутри цевтв разломленнаго Мускашнаго оръха съ мно жествомъ маленькихъ блестящихъ звъздо чекъ. Она очень легка, не имъетъ почти никакого вкуса и запаха и употребляетися въ составахъ кармина. По Гречески Отврј флою тух Абас; по Нъмецки Интой eine Rinde aus Lewante; по Француски Autour, écorce du Levant; no Umanianent Autour e una scorza del Levante; no Aranni ски Autour

Смотри AUTURION, Anmypionb. Centavrium minus, Центавріумъ минусь.

AVZVBA OVIEDO, Anayra Oniego

Смотри Carandas, Карандась.

AVACCARI (Garciae) Апаккари еспр Азіапіское, въ Малабаръ на гориспых в стахъ растущее маленькое деревцо, кото раго листья, цвъть и плодъ подобны Мир товымв. Они укръпляють и починающе тамошними жителями способными, унимань продолжающійся и отв сильной простуды живота произшедшій кровавый понось. 44

70°

600

11-

1112

100

p.

33

Ha

13

Гречески Аваннарн, миго быворог тё Малавар; по Нъмецки Явассагі, Вашт іп Malabar; по Француски Avaccari arbre du Malabar; по Италіански Avaccari albero dell'Malabar; по Аглински Avaccari, tree from Malabar.

AVANTIA, Ananyia, u

AVARTIA, Апарија. Смошри Рапах Негасleum, Панаксъ Гераклеумъ.

AVELLANA, Апеллана. и

AVELLANA BARBATA, Апеллана варбата. и

AVELLANA BYZANTINA, Апелпана Бизантина. Смотри Corylus, Корилусъ. AVELLANA INDICA, Апеллана Индика. Смотри Areca, Арека.

AVELLANA MEXICANA; Апеллана Мексикана. Смотри Сасао, Какао.

AVELLANA PVRGANS, Апеллана

AVELLANA PVRGATRIX, SEV PVR-GATIVA, Апеллана пургатриксь сепь пургатина. Смотри Вееп тадпит, Беенъ магнумъ.

AVENA Dod. Anena. Avena vulgaris seu alba C. B. Pit. Tourn. Avena alba I. B. Avena Ad. Lob. Avena satiua Onecb, есть довольно извъстное растеніе, которое свется на поляхь на навозной земль и цевшешь въначаль Іюля мъсяца. Онъ имъ. еть нъсколько тонкихъ сперва зеленыхъ, но послё опцивтения желпеющих в коленчапых в иколосистых в стволов в или трубок в, обведенных в отв колвица до колвица желтоватою шелухою, и окружающихся нёсколькими, изъ кол вицовъ по одному вырасшающими, узкими и Пырейнымъ подобными листьями; или перьями; цвёты разширяются въ колосья свитые какЪ веревки, подпирающся шонкими черешками, составлены изъ нёсколькихъ тычковъ соединяющихся въ маленькую чешуйчатую чашечку, вырастають изъ самыхъ вершинъ стеблей нъсколько къ землъ обращенно, и оставляють посль спаденія длинныя, понкія, гладкія, въ колосках в другь надъ Аругомъ сидящія; и листьями цвётной чашечки

покрышыя желшыя свмена, называемыя нами овсомЪ; корень у овса маленькій, тонкій и волокнистый. Овесь содержить въ себъ много масла, и соли, укрвпляеть, разбиваеть, умъренно сушить; и унимаеть боли. Сёмя жаряпів, кладупів ві мішечки и горячіе прикладывають на животь оть колики или ръза, а женщинамъ отъ матки; также толкуть его св уксусомь и согрвя кладуть оть болей простудных в на бокв или другія болящія мъста на тьль, ибо оныя утоляеть и производить испарину. Овсяную муку варяшь сь масломь и дълаюшь мазв, которою съ пользою мажуть голову оть болячекь и всякихь нечистоть. Овсяная вода или шакъ называемая кашица прохлаждаеть, утоляеть жарь, очищаепів кровь отв соленыхв и желчныхв остроть, полезна оть осны и кори, оть лому въ костяхъ и другихъ отъ цынги происходящихъ болъзней, также и отъ продолжишельной головной боли, а особливо могушь ее св пользою упошреблять имбющіе угревашое лицо, потому что она, какЪ уже выше сказано, унимаеть остроты въ крови и выгоняеть оныя чрезъ мочу. ГосподинЪ ЛоверЪ, славный Аглинскій МедикЪ совътуеть ее варить слъдующимъ образомв. Должно взяшь полторы горсти хорошо очищеннаго овса и горсть мълко изрубленной цикорен, и наливъ на оныя девять бутылокъ чистой воды, варить въ чистой кострыль такь долго, пока половыкипить, пошомъ процъдить воду сквось полошно и положа въ нее одинЪ лотъ литрованной селитры и двенашцать лотовъ сахару или чистаго меду, дать еще разъ вскипъть, послъ того надобно ее прохолодить и когда устоялась, слить въ бутылки. Въ Лихорадкахъ можно еще туть же прибавить не много оленьяго рогу, а въ женскихъ бол взняхъ не много Мелиссы или Пчельной травы. Овсяная крупа очень пишашельна, полезна боля**шим**Ъ

347 щимъ лихорадкою и чахошкою и упошребляется въ пищу, ибо дълають изъ нее жисель, и варять кашу. Съверной Великобриштаній жители пекуть изв нее хлібы и двлають лепешки; многіе овесь солодять и варять пиво, потому что оному же только придаеть хорошій цвыть и свыжій жусь, но и двлаеть его здоровымь. Хорошимъ овсомъ кормять также лошадей, и мѣшаюшь частю вь кормь курамь, гусямЪ, ушкамЪ и голубямЪ, а мякиною кормять крестьяне зимою своих в кобыль. Авена, есть Латинское, от Римаянъ принятое имя; которато смыслъ не извъстенъ, но по моему мивнію, можно оное производить отв слова avere, желать, потому что лошади такЪ его любять, что начинають ржать, какъ скоро услышать его. Въ Аптекахъ его недержать. Господинь Линней полагаеть его въ III классъ растеній, имъющихъ мужескіе и женскіе цвёты вмёсть, и въ каждомЪ изЪ оныхЪ по при мужчинки и двѣ женочки (Triandria Digynia) а ГосподинЪ ТурнефоршЪ вЪ XV. классЪ, вЪ III. ощдъленіе, въ V. родъ травъ съ безлисточнымъ цвѣтомъ. По Гречески Веомос, и Воброс от слова Вобра, пища; по Арабски Chartal; по Нъмецки Saber, и Safer; по Француски Aveine или Avoine; по Ита-

AVENA ALBA, Апена алба. Смотри Avena Dod. Авена Дод.

makke Manured Oats.

ліански Biada, и Avena; по Аглински Oats,

AVENA ALTERA, Anena anmepa. Смотри Avena nigra, Авена нигра.

AVENA BARBATA, Апена варката. Смоттри Avena nigra, Авена нигра.

AVENA ERRATICA, Anena appaтика, пожъ.

AVENA FATVA Linn. Allena pamya. Смощри Вготов, Бромось.

AVENA GRÆCA, Anena Ipera. u AVENA HERBA, Auena герба. Смо. шри Bromus, Бромусъ.

AVENA MITIOR, Апена миціорь. Смотри Ачепа, Авена.

AVENA NIGRA. C. B. I. B. Pit Tour. Апена нигра. Avena altera Ang. Avena Iemine nigro. Rupp. Flor. Ien. 244. Auxin, unu Черный или Пестрый овесь и Морской Ячмень, есть родъ овса, который ниже обы кновеннаго и расшешь на песчаной и сухощаной земав, въ березникамъ и на покосахв, ивететь вы Іюль месяць, свешся вы нъкоторых в странах в Россій, особливо въ Финландіи. Онъ совстмъ походишь на просный или былый овесь, кромв шого шолько чшо ниже и жесшче и зерны или съмяна его не споль пипапельны, бывають пестрыя, то есть иныя бълыя, а иныя черныя, и остроконечныя; раста ренное съмя прогоняеть бывающіе на глазахЪ бѣлые прыщики, а впрочемЪ сходспівуеть онь качествомь и двиствіемь своимъ съ обыкновеннымъ. По Гречески βρώμος ποα; πο Η Εмецки Schwarker Saber, по Француски Avoine noire; по Италіан ски Biada o Avena nera; по Аглински Black Oats.

AVENA NVDA Linn. Anena нуда. Смотри Avena, Авена.

AVENA PILOSA, Апена пилоза. Смотри Aegilops, ЭгилопсЪ.

PRATENSIS Linn. Anend AVENA протенсись. Смотри Avena nigra, Авена нигра.

AVENA SATIVA Linn. Anena caтипа. Смотри Avena Dod. Авена ДоА.

AVENA SEMINE NIGRO, ATTEND семине нигро. Смоніри Avena nigra, Авена нигра.

AVENA STERILIS, Апена стерн лись. Смотри Bromus, Бромусь.

AVENA SYLVESTRIS, Anena cun пестрись. Смотри Aegilops, Эгилопсъ.

AVENA VESCA, Апена песка. и AVENA VULGARIS, Anena пулга рись. Смотри Ауспа підга, Авена нигра.

AVICVLARIA SILVII, Anuxynapia Силпін. Смотри Viola, Віола.

AVERRHOA Linn. Anepproa. Смотри Bilimbi, Билимби, и Carambola, Карамбола.

AVICENNIA Linn. Апиценніа, есть

мало извъсшная шрава.

AVIDON, Anngonb. Cmompu Verbasент, Вербаскумъ.

AVIGA, Auura. Смотри Chamæpi-

thys, Хамепиписъ.

AVILA, Aпила. Смотри Chærefolium

aculeatum, Херефоліумъ акулеатумъ.

AVILA, Апила, есть Американскій плодь или явлоко, превосходящее величичою самой большой померанецЪ, и вырастающее въ Гишпанской Америкъ на нъкоторомъ, какъ жмъль около близь его находящихся предмъщовъ, выющемся расшеніи. Сей плодъ бываеть круглый, многопъльный, желшый, и заключаеть подъ пьломъ своимъ ошъ осьми до десяни кругловато плоских вы вывств сжатых и кв одному концу пришупленных оръшковь, называемыхЪ, Американцами змейными орышками, которые съ одной стороны выпуклисты, а съ другой лунковаты, шириною вь серебреной полуполшинникъ, шолщиво въ полпальца, и окружающся кажани крвикою, нарочино полстою, древесоващою, желшою и нъсколько шероховащою, особливо сЪ выпуклистой стороны скорлупою, подъ которою кроется бълое, ивжное, продолговатое и горькое зерно или миндаль, который почитается преизящным в средствомь от яду, и способнымь разбивашь дурныя мокрошы, въ кошорых в слудаяхь принимающь по одному или по два верна. По Гречески 'АВіда, нарто́ ту́ 'Аиє-Prons; no Hemenka Umila, eine Americanis the Stucht; по Француски Avila, fruit des Indes, no Италіански Avila, frutto dell' America; по Аглински Avila, an American Fruit; по Индіански Нандироба, Nandiroba.

AVOFIL, Anopunb. Cmompu Helle-

borus, Геллеборусъ.

AVORNVS, Anophych. Смотри Frangula, Франгула.

AVOTION, Апоціонь. Смотри Siliqua

dulcis, Силиква дулцисЪ.

AXEBRAN, Аксебрань. Смотри Efula,

Эзула.

AXELON, Aкселонь. Смотри Lilium album, ЛиліумЪ албумЪ.

AXERAS, Axcepach. CMOMPH Afphodelus, АсфоделусЪ.

AXI, Axen. CMompu Piper Indicum, Пиперь Индикумъ.

AXIS, Accueb. Cmompu Bangue, Banrye. AXOCHIOTL, Accoxiomab. CMOMPA

Onagra, Онагра.

AXYRIS CERATOIDES Linn IV. AKсирись цератоидесь. Бълолозникь есть высоко растущее растеніе съ прямыми прушьями, шемно-зелеными, копьевидными и пушкомъ покрышыми листьямя, и съ шишковаными кореньями. Опо расшеть въ песчаных в степяхв, по краям в и на глиниспых в мъстах в вдоль Урала и позади Оренбурга. Господинъ Линней полагаетъ его въ XXI. классъ растеній, имъющихъ на одномъ и томъже корнъ цвъпы и мужеские и женскіе, и въ мужескихъ по три тычка (Monœcia Triandria). Нъмецкихъ и другихъ имянъ я найши не могъ.

AYBORZAT, Autopsamb. CMompu

Diplacus, Auncanych.

AYCHRISON, Auxpn30Hb. CMompn Sempervivum majus, СемпервивумЪ маюсъ.

AYENIA Linn. m. Aienia ecms Ame. риканское, продолговато - круглые и гладкіе листья, и бълые звъздопободные, изъ пяти листочной чашечки выростающе цв вшы им вющее расшение. Господинъ Линней полагаешь оное въ XV. илассъ растеній, им вющих в в своем в цв втв три шычка сЪ песшиками сросшеся (Gynandria Triandria) По Гречески Асиа, фиточ Apepinavor; no Homenun Apenia, eine Americ

сапівсье Пявань, по Француски Ауспіа, plante de l'Amerique; по Италіански Ayenia, pianta dell' America; по Аглински Ayenia, an American plant.

AYNECH, Annexb. CMompu Muscus

arboreus, Myckycb ap6opeycb.

AYNENEMEN, Annenement. CMOMPH Mentha caballina, Мента кабаллина.

> AYON MAIVS, Aionb manch. u AYSO, Auso. u

AYSON MAIVS, Ansonb manch. u AYSONA, Аизона. Смотри Semperviчит majus; Семпервивумъ маюсъ.

AYSON MINVS, Ansonb munycb. Смотри Sempervivum minus, СемпервивумЪ минусъ.

AYT, Aumb. Смотри Negundo, He-

гундо.

AYTHALES, Aumanech. Смотри Sempervivum majus, Семпервивумъ маюсъ.

AZA, Asa. Смотри Assa foetida, Acca

фешида.

AZABOR, Азаборь, такъ называется н вкоторыми Химиками, Оливковое масло.

AZACH, Asaxb. Смотри Gummi Amтопіасит, Гумми АммоніакумЪ.

AZACARACH, Asakapaxb. Смотри Berberis, БерберисЪ.

AZADA, Asaga. u

AZADOR, Asagopb. Cmompu Acetofa, Ацетоза.

AZADARAC, Asagapanb. n

AZADARACHENI ARBOR, Asagapaжени арборь. Смотри Azedarach, АзедарахЪ.

AZADIR Linn. Asagupb. CMompu Me-

lia, Mexia.

AZADOCHI, Азадохи. Смотри Ассtola, Aцетоза.

AZAFORGENIS, Aзафоргенись. Смо-

три Cydonia, Цидоніа.

AZAGENTI, Asareumu. Cmompu Sanguis Draconis, Сангвисъ Драконисъ.

AZAKOL, Aзаколь. Смотри Spica, Спика.

AZALEA FOLIIS LANCEOLATIS IN TEGERRIMIS, NON NERVOSIS GLABRIS CORYMBIS TERMINATRICIBVS. Gronov. VI. Азалеа фолись панцеолатись интегерримись терминатрицивусь. Смошри Ledum floribus bullatis, ЛедумЪ флори бусЪ буллашисЪ

AZALEA FOLIIS OVATIS, COROL LIS PILOSIS, STAMINIBUS LONGISSI MIS Linn. Азапеа фолінсь опатись, короллись пилозись, стаминивусь лонгис симись. Смотри Azalea lutea, Азалев

лушеа.

AZALEA INDICA Linn. Asanea Utto дика. Индіанская Азалеа, расшеть только въ Америкъ, и имъетъ блъдно-красные, колокольчастые цвъты, коихъ ча шечка покрыша волосками по одиначк сидящіе листья; и пятигн вздную свиянодержашельницу. По Гречески 'А оад є по Нв. меции Die Indianische Uzalea; по Францу ски l'Azalea des Indes, по Италіански Ада lea dell'India; по Аглински The Indian Azalaa.

AZALEA LAPPONICA Linn. Asanto лаппоника. Лаппонская Азалеа, расшень въ съверныхъ спранахъ и имъетъ голень. стые, зеленые и широко другь оть друга растущие листья. По Нъмецки Діе варро півере शाउавеа; по Француски в Ахавьа de Lapponie; по Ишаліански Azalea della Sop

ponia;

AZALEA LVTEA Linn. Asanea M теа. Желтая Азалеа, растеть въ Аме рикъ, а особливо въ Виргиніи, и имъещь желтой длинный стволь, который вь срем динъ раздъляется на три, а иногда болбе корошенкія вышу , выпускающи зеленые стебли, поддерживающе продол товато круглые, желтозеленые, Померан цовымъ подобные, черенястые и жилками испещренные листья, изъ стеблей коих дырастають блёдно-красные съ бёлым 1,

S

M.

10

см вшанные, из в зелененькой шести лапочной, волосками покрышой, и на корошень. комЪ черешкъ сидящей чашечки, длинною прубкою идущіе, а въ верьку на пяпь цёльных в листочков в, на подобіе синели (Syringa) Разширяющіеся цвіты, из в средины коих в возвышающся пять длинных в, прямо в в верьх в стоящих в, бавднокрасных в тычков в съ оранжевою и нъсколько въ низъ нагибающеюся верьхушкою и съ однимъ пестикомЪ. Другая половина ствола идетъ въ верьхъ прямо голая, раздъляется на самой вершинъ на многія въшви украшающіяся по-406ными нижнимЪ цвѣтами и листьями, которые однакож в съ низу бывають иног-4а лазоревые. Послъ цвъта превращается песшикъ въ пяши гиъздную съмянодержательницу. ГосподинЪ Линней полагаетъ всъ соршы сего расшенія вЪ V классЪ расшъній, имъющих в в в своем в цв вш в пять шычков в кв внутренней сторонъ гуменца (Receptaculum, рецептакулумь) приросших в и один в пестик в (Pentandria Monogynia). Πο Γρεчески Άσαλεα Nixim; по Нъмецки Die gelbe Uzalea; по Франчуски 1' Azalea jaune; по Ишаліански Azalea gialda; по Аглински The yallois Azalea.

AZALEA PONTICA Linn. Asanea Понтика. ДеревцомЪ расшущая Азалеа.

AZALEA RAMIS INFRA FLORES NV-DIS Gronov. Fl. Virg. I. 21. Asanea pamneb

инфра флоресь нудись. и

AZALEA SCAPO NVDO, FLORIBVS CONFERTIS TERMINATRICIBVS, STA-MINIBUS DECLINATIS Mill. Gard. Dict. edit. noviss. арр. 5. Азалеа скапо нудо, флоривусь конфермись терминатрицивусь, стаминивусь. деклинатись. Смотри Azalea lutea, Азалеа лушеа.

AZALEP, Asanenb. Смотри Ruta hor-

tensis, Pyma гортенсисъ.

AZAM, Asamb. Cmompu Lilium album, ЛиліумЪ албумЪ.

AZANTHOS, Азантось. Смотри Absinthium, АбсинтіумЪ.

Yacma I.

AZARA BACCARA, Азара Баккара. Смотри Азагит, АзарумЪ.

AZARA BACCARA AGRESTIS, A. зара Баккара агрестись. Смотри Caryophillata, Каріофиллаша.

AZARACH, Asapaxb. Смотри Вет-

beris . БерберисЪ-

AZAREMA, Aзарема: Смотри Viola, Biona.

AZAROLVS Coeft. Caft. Asaponych. Cratœgus Azarolus Linn. Mespilus Aronia Dioscoridis. Dod. Mespilus Aronia veterum. I. B. Mespilus Apii folio laciniato. C. B Pit. Tournef. Mespilus prima. Matth. Mespilus proprie dicta, quae Tricoccos. Cord. in Diosc. Anthedon Theophrasti et Plinii Paliurus Africana Ruellii, Африканскій візый терыв или Африканская Христона Иголка есть средней величины дерево, растущее только въ шеплыхъ странахъ, какъ що въ Ишаліи, во Франціи вЪ Лангедокской Провин. ціи, и цевтущее въ Маів, и Іюнь мъсяцахЪ. Оно Имфетъ прямый, суковатый и колючими иглами обсаженный пВнь ; зеленые, листьямъ Боярышника или бълато Терна (Oxyacanta, Оксіаканта) подобные, передъ спаденіемь краснівощіе, зубчатьіе, трехъ лапочные и къ концу принупленные листья; и травянисто - зеленые, многолисточные, на подобіе розона расположенные, по нъскольку вмъсть кисточками растуще, и маленькими, на пяшь часшей разръзанными чашечками поддерживающіеся цв Вточки, по спаденію коих в чашечки превращаюшся въ кругловашые, многошъльные, съ начала зеленые, но созръв краснъющія ягодки, которыя им вють кислованый вкусЪ, гораздо меньше обыкновеннаго Меспеля, заключають въ себъ три весьма крвикія косточки, украшаются на верьху маленькою, ошь чашечных лапочекъ составленною коронкою и им вюшь словато - сладкій вкусв. Сін ягоды содер. жашь вы себъ много масла з влажносии

и кислои соли, вяжуть, укръпляють желудокЪ, и упошребляемыя вЪ пищу сырыя или вареныя въ сахаръ унимають поносъ и рвошу. Азаролусь есть Италіанское от Б Азароло происходящее имя. ГосподинЪ Линней полагаеть его въ XII. классь растеній, имъющихъ въ своемъ цвътъ обыкновенно двашцань шычковь, къ внупренному боку цвЕшной чашечки приросшихЪ, и одинЪ песпикъ (Icolandria Monogynia); а Господинь Турнефорть вы XXI классь, вы IX. отдъление, во II родъ деревъ и кустарниковъ съ многолистнымъ цвѣтомъ, котора. го чашечка превращается въ плодъ, косточки въ себъ заключающій. По Гречески 'Asagodes derdoor; no Homenum Mespel Daum mit dren Steinen; по Француски Azerolier; или Azarolier, также Nefle avec trois offelets pierreux; а въ Лангедокской Провинціи Pommette: по Аглински The Small Medlartree, или The Neapolitan Medlar.

AZASEN, Азасень. Смощри Bryonia,

Бріоніа.

AZASOPIDA, Азасопида. Смотри Liquiritia, Ликвириціа.

AZATHE, Asame. CMompu Origanum,

ОриганумЪ.

AZEDAR Linn. Asegaph. Смотри Ме-

lia , Mexia.

АZEDARACH Dod. Pit. Tournefort. Азедарахь. Pfeudolycomorus, Offic. Mont. Ind. 37. Matth. Zizyphus alba. Matth. н. Клокочина дерено, Сиятое дерено; Синецивтная Ясень или съ въменкато Ложное иминьяхь ягодь дерено, растепь въ теплыхъ только странахъ, какъ въ Азіи, особливо еколо Триполя; также въ великомъ множествъ въ Америкъ въ Виргинской провинціи, и въ Европъ въ Неаполитарскомъ Королевствъ, въ Италіи, и въ Гишпаніи. Россійкое названіе сему дереву подаеть мнъ причину думать, что растеть оное и въ Россіи, въ нъкоторыхъ южныхъ странахъ. Оно имъетъ нарочито только

и высокій п'внь, который покрывается морщеватою и пепельнаго цвёта корою, и выпускаеть по бокамь многіе выпвистые сучья, окружающіеся продолговащыми, шемно зелеными, черенястыми, попарно другъ прошивъ друга распіущими и Ясеннымъ подобными листьями, которые Осенью съ дерева опадающь, но въ Маїв місяць опящь на ономЪ вырасшаюшь Въ семъ же мъсяцъ по крывается сіе дерево прекрасными голубыми, на голыхЪ, длинныхЪ, шравяныхЪ, мягкихЪ стебельнах в сидящими, из в пяти на подо біе звіздки росположенных в лисшочков в составленными, кучками растущими, и души. спыми цвъпами съ двумя ушками, а на остромъ переднемъ концъ съ темноватою волосанною вилочкою. Послъ цвътовъ выра. стають Осенью продолговатыя, сперыва зеленыя, но пошомъ бълыя, а иногда блв. дножелшыя ягоды, заключающія въ себв каждая шесши угольную, жолобовашую коспо. чку, им вющія непріятный запах в и против. ный вкусЪ, и остающіяся во всю зиму на деревъ, косточки раздъляются внутри на шесть гнъздъ; содержать въ каждомъ изъ оных в по маленькому долговатому зерну? котпорое почитается ядовинымъ, и по сей причинъ не употребляется въ пищу. Италіи и Гишпаніи Авлають изв косточекъ чошки, чего ради и называють его многіе Сиятымь Дерепомь. Цветь его растворяеть и употреблень сушинъ , будучи въ декскшахъ или винныхъ на стойкахЪ, разбиваетЪ запоры: плодЪ или ягоды причинающь боль вы желудкв и вЪ груди, и употребляется только наружно вареный въ водъ отъ вшей и для опращенія волось. Ацедарахь есть Арабское имя. Господинъ Линней полагаеть сіе дерево въ XXIII плассъ расшений имъю щихъ много мужескихъ и женскихъ цв втовъ ьм Есть. (Polygamia) а Господин в Турне форть вь ХХІ. классь, въ III. отдъленіе, въ IV. родъ деревъ и кустарниковъ, имъ ющихъ

ющихъ многолистный цввть, котораго песшик в превращается в в многоги вздный плодв. Πο Γρεчески Ατσεδάζαχ, δένδρον Ασιατικον, πευχίνοις φύλλοις; πο Αραδοκи Azedarac; πο Ивмецки Изедагась, Зедегасв, или Paternofor Baum; no Opannycen Azedarach, ou le Sycomore faux : по Ишаліански Albero del Paradylo, o Sicomoro fallo; по Аглин-CKW The Bead-tree.

AZEDARACH SEMPERVIRENS ET FLORENS, Азедарахь семперипренсь еть флоренсь. Смотри Azedarach, Азедарахъ.

AZEHARASEN, Azerapazenb. Смотри Bryonia, Spionia.

AZEHET, Aseremb. Cmompu Absinthium, АбсинпізумЪ.

Azelis Asenuch. Cmompu Bryonia, Epi-OHia.

AZENOR, Aзенорь. Althæa, Алшеа. AZEREAZETI, Азереазети. Смотри Bryonia, Epionia.

AZOMAT, Asomamb. Смотри Atriрех, АтриплексЪ.

AZONVALALA, Aзонуалала, есть Маленькая, видомЪ и величиною красной смородин в подобная ягодка, которая расшеть на нъкоторомъ въшвистомъ низенькомъ кусточкъ въ Африкъ на островъ Мадагаскаръ, и почитается тамощними жителями за лакомство. По Гречески Атоговадада ингроз καρπός έρυφρόν τη Μαδαγασκάρ; πο Η ΕΜΕΙΚΑ Monualata, Frucht in Madagascar; по Фран-Azonualala, fruit de Madagascar, no ипаліански Azonualala, frutto del Madagascar; No Ar MHCKM Alonualala the Madagalcar-fruit.

AZOROT, Asopomb. CMompa Iniubae. Ююбе.

AZOTON, Азотонь. Смотри Саріllus Veneris, Капиллусъ Венерисъ.

AZVE, Asye. CMompu Corallia, Ko-Pannia.

BAARACATHON, Baapakamonb. u BAARACOTHON, Бааракотонь. Смотри Pfyllium, ПсилліумЪ.

BABTISECVLA, Бавтисекула. Смотри

Cyanus, Hianych.

BABVNEGVM, Basynerymb. Cmompu Chamomilla, Хамомилла.

ВАССА, Бакка. Ягода съ ядромъ, также кожица на бобу бълая.

BACATA VIRGINEA, Baxama Bupгинеа. Смотри Рараз Americanum, ПапасЪ АмериканумЪ.

BACCÆ ALKEKENGI, Bakye Ankeкенги. Смотри А kekengi, Алкекенги.

BACCÆ BERBERVM, Bakue Bepreрумь. Смотри Berberis, Берберись.

BACCÆ BERMVDENSES, Bakue Bepмуденсесь. Смотри Arbor Saponaria, Apборь Сапонаріа.

ВАССÆ EBVLI, Бакце Ебули. Смотри Ebulus, ЕбулусЪ.

BACCÆ ELEPHANTINÆ, Bakye Eлефантине. Смотри Соссі, Кокци.

BACCÆ IVNPIERI, Бакце Юнипе. pe. Смотри Iuniperus, ЮниперусЪ.

BACCÆ LAVRI, Bakye Manpu. CMO.

три Laurus, ЛаврусЪ.

BACCÆ LEVANTINÆ, Бакце Лепантине. Смотри Соссі, Кокци.

BACCÆ PARIDIS, Bakue Napuguch. Смотри Paris, Парисъ.

BACCÆ PISCATORIÆ, Eakije IInскаторіе. Смотри Соссі, Кокци.

BACCÆ SAMBVCI, Barye Cambyun,

Смотри Sambucus, СамбукусЪ.

BACCÆ SPINÆ CERVINÆ, E IRLE CTURE Церпине. Смотри Spina Cervi, Спина Церви.

BACCÆ SOLANI, Bakue Conanu.

Смотри Solanum, СоланумЪ.

BACCANVS, Bakkanych. Alarum, АзарумЪ.

BACCAR, Backaph. Cmomfu Basslicum, ВазиликумЪ.

BAC BACCARIS, Bakkapuch. Cmompu Afa.

гит, АзарумЪ. BACCHAR, Baxxapb. Cmompu Becca-

bunga, Беккабунга.

BACCHARIS, Bakxapuch. Смотри Bafilicum, БазиликумЪ.

BACCHARIS FOET DA, Banxapuch

фетида. Смотри Сопуга, Кониза.

BACCHARIS GERMANICA, Banxaрись Германика. Смотри Basilica, Базилика.

BACCHARIS MONSPELIENSIVM, Bax. харись Монепеліенсіумь. Смотри Сопуга maior, Кониза мајоръ.

BACHADE, Бахаде. Смощри Polium mentanum, ПоліумЪ монтанумЪ.

BACHALACH, Baxaraxb. u

BACHALE, Baxane. CMompu Acetolel-Іа, Ацешозелла.

BACHE, Eaxe. Смотри Negundo, Heгундо.

BACILLA, Бацилла. Смопіри Crithтит, КришмумЪ.

ВАССЕАНСНА, Баклеанха. Смотри Portulaca, Поршулака.

BACTILOGENE, Baxmunorene. CMOтри Cichoreum, ЦихореумЪ.

BADIANA SEMEN, Bagiana cemenb. Смотри Anisum stellatum, АнисумЪ стелла-

BADVCCA Linn. Бадукка. Смотри Саррагія, КаппарисЪ.

ВАДУРІККОЙ, Бадиникронь. Смотри Absinthium vulgare, АбсинтіумЪ вулгаре.

BÆCKEA Linn. Bekea, ecmb Шведское расшение, имъющее пяти листочный цвёшь, котораго чашечка разширяется къ верьху на подобіе воронки и връзана на пянь зубчиковь, и круглую ченырехь гавадную стиянодержательницу, по Нъменки За ccfea, eine Schwedische Pflanke; по Францу. кси Вжскеа, plante de la Suede; по Италіански Вжскеа, pianta della swezio; по Аглински Bacæckea, an Iwedisch plant.

BAFACAREM, Бафакаремь, Смотри Psyllium, ПоилліумЪ.

BAFEDF, Bachege. Смотри Polium mon-

tanum, Поліумь монтанумь.

BAGALOTVS TRIDENTINVS, Bo ranomycb Тридентинусь. Смотри Celtis, Целтисъ.

BAIOLÆ PRIMVM GENVS, Baione примумь генусь. Смотри Myrtillus, Мир-

шиллусЪ.

ВАКАВАВ, Бакававь. и

ВАКАКАТ, Бакакать. Смотри Bafiliсит, БазиликумЪ.

BACADE, Baxage. Сметри

montanum, Поліумъ моншанумъ.

BALA, Bana. CMompu Musa, My3a. BALANGHAS Lion. Bananrach CMO. три Sterculia, Стеркуліа.

BALANOCASTANVM, Баланокасто нумь. Смотри Bulbocastanum, Булбокаста.

нумЪ.

BALAMPVILI, Балампулли. Сиготри Tamarindi, Тамаринди.

BALANVS, Bananych. Kenygh. BALANVS ALGYPTIACA, Bananych

Етипинака. и

BALANVS MYREPSICA, Bananych Мирепсика. Смотри Весп, БеенЪ-

BALAVSTIA, Баланстіа. и

BALAVSTIVM, Баланстіумь. Смотря

Quercus, Кверкусь. BALEMCANDA - SCHVLARMANDI Rheed H. Malab. XI. p. 73. t. 37. Banemkatt. да Шуларманди. Смотри Ixia foliis enfitormibus, Иксіа фоліись енсиформибусь.

BALESSAN, Балессань. Смотри Ваl.

famum, БалсамумЪ.

BALIZIER, Banusiep E. CMompu Voafon th, Воафоншзи.

BALLÆ, Балле. Смотри Spongia, Спонта BALLARIANA, Bannapiana. CMoulf

BALLIF CAVILICVLATA, Eansuph Phu, Dy. Капликулата. Смотри Стпатотит, Циннамомумь.

BALLOTA Linn. Баллота. Смотри Ballote, Баллоте.

BALLOTE ALBA Linn. Bannome and. CMompu Marrubium album, Mappy6iyMb an6yMb.

BALLOTE INODORA FOLIIS CORO-NOPI, Amm. Ruth. 48. t. 8. Баллоте. ино. дора фоліись коронопи. Глухая Сибиркан кропина. По Нъмецки Ballote ohne Geruch mit Rråhen-Fuß-Blåttern; по Франпуски Ballote sans odeur à feuilles de Corne de cerf; по Италіански Marrubiastro con

soglie della Coronoppa.

ВАLLOTE LANATA Linn. Баллоте паната. Благопонная трапа или Греманата, растеть вы множествы около красноярска, и прозвана помянутымы имянемы потому что растеть на не подалеко от города лежащей горы, симы же иминемы называемой. Она имыеть зубчатые листыя и путистый стволы. Жители упомянущаго города употребляють ее какы внутренно, такы и наружно оты головной боли. По Гречески Валлить ерішбую ; по нымецки Діє товіїде Дайоте по Француски Вайоте Івпеціє; по Италіански Магливіавто Івпеціє; по Аглински Тhe Black woolly Horchound.

BALLOTE NIGRA Linn. Баллоте ниrpa, Marrubium majus vel primum. Trag. Marrubium nigrum foetidum Ballote, Diofe C. B. Pit. Tournef. Prasium nigrum, lætidum Ossicinarum. Черноку дреннико или Шанта Черная, расшешь на шенисшыхь и каменисшыхь мвстахъ, близко жилья, дорогъ и улицъ, и цвътеть вь 1юнь мысяць. Она имнеть жесткіе, четверогранные, мохнатые и черно краснъющіе спебли, окружающіеся сердцевидными, другь прошивь друга попарно на векось сидящими, на подобіе пилы връзан ными, волосками покрыными, черно зелеными, вонючими и МелиснымЪ подобными Аменьями. Цвёшы на ней пурпурово-шемные, спаять вокругь стебля, составлены изъ однаго листа, который свернуть трубкою, раздбляющеюся на верьху на два устья, и оставляють посль спаденія продолговашыя, черныя, шреугольныя и съмяни коло. кольчиковъ подобныя стмяна, которыя заключаются по два или по три въ маленъ кихЪ, колючихЪ и видЪ рожковЪ имъющих в съмянодержащельницах в. Корень волокнистый. Шанта черная содержить въ себъ много масла и соли, чистить застарвлые нарывы, полезна от ранв, но вв Медицинъ ръдко употребляется, чего ради и въ Апшекахъ не имъется. Діоскоридъ совѣтуешЪ прикладывать мѣлко изрубленные сей правы листья съ солью на укушенное бъщеною собакою мъсто. Господинъ Линней полагаеть всв роды сей травы въ XIV. классъ расшеній имъющихь въ своемЪ цвѣтѣ четыре тычка, изЪ коихЪ два ближніе длиннъе другихъ двухъ (Didynamia) а ГосподинЪ Турнефортъ въ IV. классъ въ II. отдъление, въ III. родъ травъ сь однолистнымь на два устья разръзаннымЪ цвѣтомЪ, котораго верьхнее устье выпуклистое. По Гречески Валлыя; Валлыя καί Πρασίον μέλαν ένυδρον; πο Ηξιμεμκη Bal= lote oder Schwarger Andorn; по Француски Ballote, Marrube noir ou Marrube puint: по Италіански Marubiastro; по Аглински Black Horehound.

BALLOTE SVAVEOLENS Linn Бал. поте спапеоленсь Смотри Ballote lanata, Баллоше ланаша.

BALSA LIGNVM, [Балса литнумь. Смотри Genista, Гениста.

BALSAM, Bancamb. Cmompu Mentha, Menma.

BALSAMELLA, Балсамелла. Смотри Ballamina, Балсамина.

BALSAMELÆON, Балсамелеонь. Смещри Balfamum Iudaicum, Балсамумъ Юданкумъ.

BALSAMINA, Балсамина. Смощри Мотогдіса, Мотордика.

BAL

BALSAMINA AGRESTIS, Балсамина агрестись. Смотри Menthastrum, Меншаструмъ.

BALSAMINA ALTERA, Балсамина ал. тера. Смотри Balsamina. Dod. Балсамина. Дод.

BALSAMINA AMYGDALOIDES, Балсамина амигдалоидесь. Смотри Balfamina Dod. Балсамина Дод.

BALSAMINA CVCVMERINA, Балсамина кукумерина. Смотри Momordica,

Момордика. BALSAMINA DOD. Балсамина Дод. Balfamina fœmina, C. B. Pit. Tourn. Balfamina fœmina, perfici folio, vel salicis folio. I. B Balsamina altera. Trag. Balsamella. Cord. Hist. Balsamina amygdaloides. Ges. ad. Cord. Catanance Cælalp. Ballamina impatiens Linn. 1х. Балсамина, есть цвъточное произрастеніе, котпорое съють въ садахь, держать вь горшкахь, и ставять для украшенія на окошки. Она бываеть многихъ родовь, изъ коихъ иные малсныкие одинакіе, другіе двойные, а нѣкоторые разноцвётные. Сіе растеніе имветь былый волокнистый корень, производящій полстый, прямый, бъло-веленый, съ низу часто красноватый, водою наполненный почти прозрачный и къ верьху на многія въшви саздъляющися стебель въ шесть и девять вершковъ вышиною. Вѣточки окружающся продолговаными, копьевидными, по краямЪ не глубоко връзанными, зелеными листьями горьковатаго вкуса, и украшающся многими, из в листовых в стебельков в вырастающими, на красноватых в черешкахЪ сидящими, и обыкновенно изЪ четырехЪ, разновидныхЪ, красныхЪ, а иногда пестрых в или былых в съ красным в листочков в составленными цв вточками, коих в верьхній листокь выпуклисть, средній выдался ложбиною, а сторонніе два сидять особливо нёсколько назадь загнувшись и окружающся каждой однимъ ушкомъ. Послъ цевша показывается маленькая, желтая, жесшкая, непримъшными волосками покры.

какъ изъ тая, грушеподобная и ровно обручиков в состоящая стмянодержательница, заключающая въ себъ кругловатыя и видъ сочевицы имѣющія сѣмячки. Стебель сего цавта бываеть зеленый, естьли производишь бълые; но шемный и въ низу красноващый, естьми пестрые пвущы. любить частую поливку, по которой при чинъ и должно его часто поливать. Цвъть и листья прохлаждають, укръпляють и почитаются полезными от ранв, одна кожЪ рѣдко вЪ Медицинѣ упопребляются; шакже и въ Апшекъ ничего изъ нихъ не двлается. Балсамина есть Латинское, от слова Balfamum, Балсамь, происходящее имя, какъ бы сказашь, способная къ дъ ланію балсама трава. ГосподинЪ Линней полагаешь ее вы ХІХ, классь однобрачных расшеній, коих в мужчинки соединены вмъстъ въ цилиндръ шычковыми головками (Syngenesia Monogamia), а ГосподинЪ Тур. нефорть вь XI, классь, вь I. отделеніе, въ 1. родъ правъ съ многолиспинымъ изъ разновидныкЪ штучекЪ составленнымЪ цвв. превращается томЪ, которато песшикъ капсулю. По Гречески въ одноги вздную Валбанда; По НЕмецки Palfamine, iam: Rraut; по Француски Balfamine; Ишаліански Balfamina; по Аглински Eagle flower or the female Balfam-Apple.

BALSAMINA FOEMINA, Bancamund

фемина. и

BALSAMINA FOEMINA PERSICI FO.
LIO, Балсамина фемина персици фоліо. п

BALSAMINA FOEMINA SALICIS FO. LIO, Балсамина фемина салицись фоліо. и

BALSAMINA IMPATIENS Linn. Бал. самина импацієнсь. Смотри Pallamina Dod. Балсамина Дод.

BALSAMINA ITALICA, Балсамина Италика. Смотри Chamærhododendros, Хамергододендросъ.

BALSAMINA LVTEA, Балсамина луmea. Смотри Noli me tangere, ноли ме тангере. BAL

пузы-

BALSAMINA MAS, Балсамина мась. Смотри Momordica, Момордика.

BALSAMINA MOMORDICA Linn, Багсамина момордика. Смотри Мотогdica, Момордика.

BALSAMINA OFFICINARVM, Балсамина оффицинарумь. Смотри Balfamina agrestis, Балсамина агрестись.

BALSAMINA ROTVNDIFOLIA RE-PENS, Балсамина ротундифоліа репенсь. и

BALSAMINA SCANDENS, Балсамина сканденсь. Смотри Momordica, Момордика.

BALSAMINE, Балсамине. Смотри Balfamina, Балсамина.

BALSAMINVM, Балсаминумь, тожь. ВАLSAMITA, Балсамина. Смощри Costus hortorum, Костусь горторумь.

вальямита ALTERA, Балсамита Алпинумъ. Смотри Ledum Alpinum, Ледумъ

самита камфората и

Валсамита состина минорь. Смотри Ageratum, Агератумъ.

ВАLSAMITA FELINA, Балсамита Смотри Nepetha, Непета.

ВАLSAMITA FOEMINA, Балсамита вемина. Смощри AGERATVM, Агерапумь. ВАLSAMITA MAIOR, Балсамита магорь. Смощри Mentha, Менша.

camuma Оффицинарумь, тожь

пери фруктусь. Смотри Сагроваватит, карпобалсамумъ.

мумь Эгипціакумь. и

ВALSAMVM ALBVM, Балсамумь самумь самумь де Меха.

BALSAMVM ALPINVM, Bancamymb

Аппинумь. Смотри Ledum Alpinum, Ледумъ Алпинумъ.

BALSAMVM CANADENSE, Балсамумь Канаденсе. Смотри Abies Canadensis, Абіесъ Канаденсисъ.

BALSAMVM CAPIVI, Балсамумв. Капипи. и

BALSAMVM CERTARVM QVARVN. DAM PLANTARVM, QVAS COPAIBAS VOCANT. I. B. I. 306. Ea camymb 14ep-mapymb кпарундамь плантарумь, кпасы копапвасы поканть. Смотри Balfamum Copaiba, Балсамумъ копапба.

BALSAMVM COPAIBA, VEL CO-PAIBÆ, VEL COPAIVÆ, Banacamymb Ковайва, или Копанве, или Копанне. Ballamum Copahu. Copaii. Copaiba Pison. Copalyua. Copaif. Campaif. Gamelo, Banneaмумь Копание или Бразильскій вылый Бальсамь, измекаеть чрезь сдъланныя настчки, изъ нткотораго въ Америкъ въ Бразиліи и Каеннъ растущаго, и Ботаниками (Arbor Balfamifera Brafiliensis, АрборЪ Балсамифера Бразиліенсись) или Бразиль-Балсамное дерепо именовано ckoe и привозишся кЪ намЬ изЪ упомянупыхь мість чрезь Португаллію. Самое дерево внутри красное, и им веть пящилисточный бабдножелный цввть и стручея заключающие въ себъ по одному на горохъ похожему зерну. Бальсамь бываеть двухь сорновь, а именно: молодый и спарый. Молодый или перывый изв дерега исшекающій бываеть свыжь, свытель, быль, жидокь, как в деревянное масло, им веть смолистый, на корицу нъсколько похожій запах в, и вышекаеть самь собою весною, вмъсто того что старый или чрезъ сдъланныя насъчки посль молодаго истекающій, желповать и густь, какь Терпеншинь. Оба сорта чистять и исцаляють раны, украпляють становыя жилы, разбивають, унимають кровавый нонось, бъль, прогоняющь знукь въ ушахь, гоняшь мочу, когда быгають раны вь почкахь,

упзырв и машкв, останавливають мвсячныя крови, прогоняють лихорадку принятые предъ наступленіем в оной, почитаются превосходнымЪ средсивомЪ опіЪ простуды, и вЪ примочках вы поврежденных вывихнутых в и переломленных в членахв, и употребляются внутренно въ количествъ отъ двенапцати додватцати четырех в капель. Страдаю. щіе Каменною бол взнію, и горячаго сложенія, шакже полнокровные люди должны оныхЪ остереталься. Понеже сей БалсамЪ рЪдокЪ, то поддълывають его чрезь смъщение чистаго Ренеціанскаго Терпеншина съ КоришневымЪ спиршомЪ. ВЪ АпшекахЪ имъешся БалсамЪ. ГосподинЪ Линней полагаешЪ всВ расшеніи, Балсам в изпускающіе в В Х класс в им вющих в в своем в цв в тв десять тычков в и одинъ пестикъ (Decandria Monogynia). По Гречески Валоания Котаув; а дерево Котая; no Hemenku Weisser Indianischer nau Americanischer Balsam; по Француски Baume blanc de Copahu ou Copai; по Италіански Ваl famo bianco dell' America; по Аглински The white American Balfam.

BALSAMVM DE COPAIBE, Балсамумь де Копайбе. Смощри Ballamum copaiва, Балсамумъ Копайба.

BALSAMVM DE MECCA, Балса. мумь де Мекка. Смотри Ballamum frutex, Балсамумъ фрутексъ.

BALSAMVM DE PERV, Балсамумь де Перу. Смотри Ballamum Peruvianum, Балсамумъ Перувіанумъ.

BALSAMVM DE TOLV. Park. Theat 1570. I. В. 1. 296. Raii. Hist. ii. 1758. Балсамумь де Толу. Balsamum Tolutamum. Offic. Balsamum Tolutanum foliis Ceratiæ similibus, quod candidum С. В. Ріп. 407. Chom. 626. Arbor Balsamisera Tolutana. Ions. Deadr. 308. Toluisera Linn. Толутанскій Балсамь, привозится кы намы засушеный изы Америки, гді оны вышекаеть вы самые жаркіе дни чрезь здівланныя насычки изы ніжотораго дерева роду Пихты, растущей вы Новой Гишпанія

между городомЪ Кароаги и мысомЪ имени Господняго (Nome di Dio) и называется тамошними жителями Толу. ОнЪ листь, кльекь, густь какь терпентинь, им веть желто красноватый цввть, пріят ный, Лимонному подобный запах и горь ковашый, однакож в не прошивный вкусв. Сей балсамъ содержишъ въ себъ много соли з масла, грветь, сушить, разжижаеть, разбиваеть въ груди мокротты, испълнеть раны, возстановляеть силы, укръпляеть нервы, противится распространению 60° лъзни рака, споспъществуетъ пищи въ желудкъ, полезенъ отъ чахопки и сильной одышки, и употребляется в количествъ ошр одной до капель. Наружно приложенный стягиваеть онъ перерубленныя, и проколошыя жилы! прогоняеть холодную головную боль, раз биваеть опухоль жельзь на шев и за уш ми, и полезенъ отъ боли въ лядвеяхъ бывающихЪ на нихЪ водяниспыхЪ булды рей, также и от в лому въ костяхъ и оне мвнія какой и нибудь части твла. В в Ап шеках в имвешся балсамв, из в котораго двлается такъ называемый Елеосахарум или расшершый съ шремя каплями Толу танскаго балсама сахарЪ, въ котором ползолошника случав caxapy берепися Оный почищается преизящнымЪ средством д оть чахопки. По Гречески Вахоамо в Tods; по Нъмецки Balfam von Zolu; Француски Веанте de Tolu; по Италіан ски Balfamo Tolutano, o del Tolu; по Ar лински The Ballam of Tolu.

BALSAMVM FRVTEX, Bancamymb

BALSAMVM GILEADENSE, Балей мумь Гилеаденсе. Смощри Balfamum daicum, Балсамумъ Юданкумъ.

BALSAMVS INDICVS NIGER, Balcamycb Ungukycb nurepb. Cmompu (amus Peruvianus, Balcamycb Перувіанусь. BALSA)

NE

R

0.

19

110

9

ib

13

0.

19

11

3.

II.

N

e.

II.

ib

13

eb

BALSAMVM IVDAICVM, VEL BAL-SAMVM FRVTEX, Бальсамумь Юдаикумь, или Бальсамумь фрутексь. Balfamum verum. I. B. Balfamum de Mecha, Mont. Exot. ob. Balfamum Syriacum Rutæ folio. С. В. Ріп. 400. IV. Бальсамное дерепо есть маленькое деревцо, которое прежде сего росло въ одной только щастливой Аравіи, въ Лерихонской долинъ, изъ коно-Рой по завоеваніи Турками Аравіи, перевезены были всё деревья, по повелёнію царствовавшаго тогда Султана въ Египетъ, 745 насадили ими въ Машаръ, двъ мили оть великаго Каира садь, который и по сей день стережется Янычарами. Нынъ собираемый от сихъ деревьевъ Бальсамъ посымается въ Царь Градъ, прямо къ самому Султану, который за ръдкость жалуетъ его однимъ только большимъ Господамъ своего двора. Изъ сего заключить должно, что ръдко можно достать настоящаго чистаго Меккскаго Бальсама, и что тоть, который мы здёсь имбемъ не Каирскій, и не Меккскій, а смісь из біблаго Бразилскаго Бальсама, (Ballamum Copaiba, Бальсамумъ Копаиба, и нъкошорой намъ не очень извъсшной существенной соли. Сіе деревцо расшеть однакожь и въ Азіи около Мекки и Медины, бываеть въ два аршина вышиною, смолисто, легко, покрываешся снаружи краснованною, а внушри зеленовашою корою, и выпускаенть по бокамъ многія, тонкія, ломкія, длинныя, липкія, на не равныя кол'внца разділенныя и благовонныя ввиши, одного цвъща съ деревомъ, которыя окружаются подобными АсеннымЪ Аменьями съ щою щолько разницею, чио они не шакъ густы и бавдно зеленые: цвъпы на немъ маленькіе, бълые, расположены звыздкою, вырасшають изв пяти зубчатой чашечки, и опадая оставляють маленькій, остроконечный, сперыва зеленый, не созръвая чернъющій плодъ или капсулю, имъющую подобіе мъщечка, и наполненную Yacma I.

внушри густо - желпюю и на медь похожею влажностію, въ которой плавлеть маленькое зерно или сЕмячно сладковато - остраго вкуса, и пріятнаго балсамическаго запаха. Лътомъ въ самое жаркое время вътви расщепляющся сами собою и испускають драгон виную смолу, которая збирается вв коженые и на подобіє кошельков в забланные м вшки. Цввть ея бываеть сперва быловать, пошомъ зеленвешь, а чрезъ нъсколько времени спановишся желтой. СЪ начала она очень жидка, но современем в двлаенся споль пверда, что должно распускать ее въ спиртъ. Сей балсамЪ называется МекскимЪ, также и бълымЪ, а по Лашынъ (Balsamum de Mecha, БалсамумЪ де Мека; или (Opobalsamum, ОпобалсамумЪ). ЛутчимЪ признается пють, который густь какъ терпентинь, имветь бъло-желтый прозрачный, а иногда золотый, цв твъ горьковато-острый вкусъ и произительный, но пріяшный запах в, и естьми капнешь вв воду, расплывается по всей ея поверыхности на подобіе наушины шакЪ, что его опять сЪ оной снять можно. ВЪ Медицинъ употребляется Бальсамь или Опобальсамумь, сушеное зерно, или Carpobalfamum, Карпобальсамумъ и привозимыя кЪ намЪ сушеныя бездисточныя вътви или Xyloballamum, Ксилобалсамумъ. ОнБ привозишся кВ намВ вВ продолговащых В маленьких в склянках в, и употребляется внутренно въ количествъ отъ одной до чешырехь каплей, ошь нарывовь вь легкомь и въ почкахъ, отъ одышки, подагры, задержанія мочи, и каменной бользни и ужаленія или укушенія ядовишых в зв врей; содержишь въ себъ много сущеста венной соли и масла, укръпляеть сердце и мозгь, чистить онаго захряслость, производишь испарину, и весьма полезень ошь кровавой мочи, почечуя, бъли, оть фрянокъ, и болъзней въ машкъ. Наружно употребленный, изцаляеть онь раны, украпляешь жилы, унимаешь остроту кожи и прогоняеть ямки и угри на лиць. Женщины

Y.

MO-

могуть его распускать вы виноградномы винь нли въ Венгерской водъ (aqua Hungarica, аква Гунгарика), и каждое утро оною умыванься. КсилобальсамумЪ. или вътви, вмъсто которых в часто въ АптекахЪ продается Мастичное или Рай. ское дерево, содержань вы себь много масла и соли, прошивод виствують яду, укръпляють голову и желудокь и употребляются вь прилипчивых в опасных в бол взнях в. Плодъ содержишь въ себъ много масла и летучей соли, укръпляеть жизненные духи. тонишь свия, исцваяеть ужаленіе зиви и других в ядовишых в гадов в и почишается надежнымъ средствомъ ошъ яду. Въ завшних В Аптеках в имвется Бальсам в и двлается Косметическій спирть Гостодипа Доктора Майбома, и Косметическій или распущенный Бальсам В в в спирт для умыванія лица. Ксилобальсамум в происходишь оть Греческих словь Ейхог, дерево, и Вальсамь, и значить Бальсамное дерево ; Карпобальсамумъ отъ словъ жартов, плодъ, и валочной; какъ бы сказашь Бальсамный плодЪ; а ОпобальсамумЪ οπιδο όπος, сон в βάλσαμον, πο есть Бальсамное масло или сокъ. По Гречески βάλосмог Тебаїхог; по Арабски БалмусЪ; по Нъменки дерево Зават = Вант, или Baisam Ctaude: a Banbcamb Wahrer unu Вацат аня Мефа; по Француски Ванme de Iudée, Baume blanc, ou vray Baume; по Италіански Balfamo bianco, о vero, o Giudaico; по Аглински дерево The true Ballam-tree. a Bankcamb The true Ballamo.

BALSAMVM PERUVIANVM NIGRVM Park. Theat. 1570. Бальсамумь Перупіанумь. Ballamum Peruanum, Offic. Ind. Med. XVII. Mont. Exot. 12. Ballamum ex Peru. I. B. 1. 294. Ballamum Hutzochitl. Laet. Ind. Occid. 224. Billamum Indicum. Перуанскій, или Черный Индіанскій Бальсамь, вытекаєть изь въточекь маленькаго деренца (Кабуренба, Caburciba) называемаго, и бытаєть трехь родовь. Перьвый называется

сухимъ (Baliamum ficcum, Бальсамумъ сиккумъ), и есни кръпкая, краснованая и благовонная смола, изшекающая изъ въшвей маленькаго, въ великомъ множествъ въ Мексикъ растущато и (Гоитзилоксита в, Ноісziloxitl) имянованнаго деревца, кошорая по собраніи вЪ кокосовыя скорлупы высшавливаешся на нѣсколько дней на солнце, дабы запвердъла, и лишилась водянистых в сырых в своих в частип, в : вторый называет ся бълымъ и изшекаешъ изъ Пня и шолстых в втвей нъкоторато Перуанскаго и въ мосмъ словаръ подъ имянемъ Ликвиописаннаго дерева, подобень бълый, Скипидару и бываетъ и благовонный. Трешій, или обыкновенный Перуанскій Бальсамь, черновать, благовонный, не есть натуральный, потому чию вываривается изъ сучьевь и листовь упомянушаго деревца. Кабуреибы собиранть сучья или листы, изрубляють ихъ мълко, и наливъ чистою водою варятъ, а потомь оную простудивъ, снимають на поверъхности воды плавающій БальсамЪ и разливають по бутылкамь. Сей послъдній не такь ръдокъ, какъ прочіе двя, и находишся въ АпшекахЪ. Лучшій долженЪ бышь липокЪ, густь какъ скипидарь, черно темнаго цвъ та, пріятнаго запаха и горько - остраго ве прошивнаго вкуса. Индіанцы вываривь и в сучьевь бальсамъ пригошовляющь оставшій послъ вывариванія Бальсама густой матерій, чрезЪ выпариваніе экспрактЪ, который смЪ шавъ съ малою частью Бальсама, пригошовлякть пітсто, и двлають изв онаго чотки, кой остажтся всегда черными и благовонными и развозятся въ множествъ по Гиппаніи и Португалліи. Перуанскій Бальсам употребляется внутренно и наружно въ количеств ошь одной до шести капель; разбиваеть, умягчаеть, претивится гнилости, укрыпляеть сердце, грудь, мозгь и желудокь, выгоннешь чрезь испарияу худыя водянистыя мокропы, чисшить и исцалаеть раны, у

^{фры}пляеть сосуды содержащіе вы себы жизнен ные духи, сухія жилы и перепонки покрывающія кости, разбиваеть тугія не бодящія опуходи, поспѣшествуєть въ задержаній місячной крови, унимаєть біли, кровавый и простый понось, утоляеть рвоту, отворяеть засорение вы печени, дылаеть женщинъ къ беременности удобнъйшими, и полезенъ отъ одышки, чахотки, колики называемой (Pictonum, Пикшонумь), каменной бользни, и отъ лому въ косшяхъ; для поспъществованія варенію пици или оть не варенія въ желудкъ, задержанія мочи и ошъ каменной боли двлающь изв него мази и пластыри, которые согрѣвъ прикладывають къ пупку или на спину; а для прогнанія времянно приходящей лихорадки принимаюшь его внутренно по три и по четыре капли, пакже кладуть его и въ Шоколать, вмъсто Ванилліи. ВЪ АпшекахЪ имѣется Бальсамь, дълается изъ него Эссенція (спирпомъ налипый) куришельныя свъчки, Тин ктура, употребляется къ составленію Па-Раличнаго или чернаго труднаго благовоннаго Бальсама (Balfamus Apoplecticus, Бальсамусь Апоплекшикусь), кошорый помогаешь вы параличъ и полезень ошь обмороковы и вы половы, и входишь вы шакь называ-СМый Жизненный БальсамЪ Господина Гоф-Манна (Ballamus vitae Hofmanni, Бальсамусь више Гофманни). Продаваемый въ ря-Дахь бываешь обыкновенио смъшень съ Спираксом в и Миндальным в маслом в. Речески Вахоано туз перв; по Нёмецки Де-Manischer Balsam; no Француски Baume du Peтон; по италіански Ballamo del Perou; по Ar-Macku The Peruvian, or Natural Ballam.

Mymb Hyahmonymb. Cmompu Afa dulcis,

1

1

LIO. C. B. Pin. 400. Bankcamymb Cupidalicum, Pyme ponio. Cmompu Balfamum Iu-Bankcamymb Юданкумъ.

BALSAMVM TOLVTANVM, Бальсамумь Толутанумь. и

BALSAMVM TOLVTANVM FOLIIS, CERATIÆ SIMILIBVS, QVOD CANDIDVM C. B Pin. 401. Бальсамумь Толутанумь фолінсь, цераціе симилибусь, кподь кандидумь. Смотри Balfamum de Tolu.

BALSAMVM VERVM, Бальсамумь перумь. Смотри Balfamum Iudaicum, Бальсамумь Юдаикумь.

BALSAMVM VIRIDE, Бальсамумь пириде. Смотри Овент Магіж, Олеумь Маріе.

BALSAMVS, Bancamych. Cmompu Balfamum, Banbcamymb.

BALSAMVS POLONICVS, Бальсамусь Полоникусь. Смотри Basilicum, Вазиликумъ.

BALTEVS SANCTI IOHANNIS, Балmeych Санкти Иотаннись. Смотри Arthemisa, Артемизіа.

BALTOMIA, Балтоміа. Смотри Chamæmelum, ХамемелумЪ.

BALVT, Балуть. Смотри Quercus, Кверкусь.

ВАЦХІАМ, Бальзіамь, значить 606ь. ВАМА, Бама. Смотри Ватіа, Баміа. ВАМВАСІОЙ, Бамбаціонь. Смотри Вотьах, Бомбаксь.

BAMBOU SIVE BAMBVS, Bamey WAR Бамбусь. Arundo Bambos. Linn. Mambu, five arbor Tabaxir. Lugd. Frag. Arundo arbor, in qua humor lacteus gignitur, qui Tabaxir Auicennæ et Arabibus dicitur. C. B. Arundo Indica maxima, cortice spinoso. Herm. Spondium, aut tabaxir. Persianorum. Acostæ. Tabaxir fiue. Mamby aproph. I. B. Arundo Tabaxifera. Offic. Бамбусь, Индіанскій Тростникь, или Тростинное дерепо, растеть въ великомъ множествъ, въ Азія, вдоль по морскимъ берегамъ, въ Малабаръ, Коромандель, въ Китав, въ Японіи и въ Персіи. Онъ вырастаеть до чрезвычайной вышнны, ибо въ Сіамъ бываеть часто во сто футовъ и имъстъ внутри пустое, и

тустою влажностью наполненное дерево, темно - желтыя, по большой части прямо къ верьку обращенные, на множесшво свиловащых в коленцовь разделенныя и кривыя боконыя вётым, выпускающие тростинные сучья, и длинные, другь оть друга далеко отстоящие, бавано - зеленые, жолобовашые и на оливковые похожіе лисшья. Бамбусовыя деревья раступь близко другь подав друга и размножающся споль сильно, что составляють непроходимыя почти льса, тьмь болье, что дерево весьма крытко и не спесобно для рубленія, хетя въ прочемъ и легко пилишся. ИзЪ каждаго колбица накодящагося на сучьях вышекаеть вы жар. жіе дни, густый, бълый и молошиый сокъ, изъ жотораго чрез выпаривание двлають сахарь жазываемый Индіанцами ТабаксирЪ и упопребляемый ими вмъсто нашего сахару въ питіяхь и пиць, также и оть разныхь бользней, какъ то, отъ ръзу въ животъ и от в кроваваго поносу. Из в Дерева строять Индіанцы себв домы и лодки, а въ Кишав дълають изъ него кровати, столы, стулья, требни корзины, трубы для теченія вод в и для телескоповЪ, функары и вЪ ЕвропЪ споль уважаемыя восточныя прекрасныя рогошки. ИзЪ боковых в его сучьев выразывающь проспи, привозимыя къ намъ Голланднами. Дерево сшоль кръпко, что естьли возмещь два жуска и попіренів другь объ друга, то произгодить отонь. Тростникь пускаеть коренья столь глубоко, чио должно копань не малыя ямы, дабы их вынушь, и большая часть Японских в жителей не имветь другаго упражиенія, и других в торгов в. Оно почитается способнымъ производить поть, а корень гнашь мочу и мъсячное. ГВ Аншеках в ничего изв него недвлается. Табаксив, Бамбу, и Мамбу сушь Арабскія имена. ГосподинЪ Линней полагаешЪ Бамбусь въ III. классь расшеній, имъющих въ обоеродномъ своемъ цвттв три шычка и два песшика (Triandria Digynia)

а Господинъ Турнефоривъ въ XV. классъ, въ III. отдъленіе, въ IX. родъ растеній съ безлисточнымъ цвътомъ. По Гречески Калароз туз Тотаз; по Нъмецки Затовивътови; по Француски Саппе, ои Rofeau des Indes; по Италіански Ватьоссіа о Саппа dell'India; по Аглински The Bambu Cane.

BAMIA. I. B. Bamia Bamia Alexandrina. Cæs. Cast. Bamia Moschata. Offic. Ketmia Aegyptiaca vitis folio parvo, flore. Pit-Tournef. Trionum Theophrasti. Rauv. Sabdariffa alia Lugd. Alcea Indica parvo flore. C. B. Exotica malvacca. Bamia, Eben quibus dam. Advers. Ankin Ernnemckin IIpo спирнякь или Баміа; есшь иностраннев расшеніе, растущее въ Египетскихъ и Азіашских в садах в. Оно бываеш вышиною съ Малву и имветъ пирокіе, зубчатые на седмь частей разръзанные, черенястые и на виноградные похожіе лисшья; и маленькіе, желшые, ПросвирнымЪ подобные; и однолисточные колокольчистые цвъточки послъ которых вырастають продолгова шыя, остроконечныя и съ верьху на сколько частей раскрывающіяся съмянодер жашельницы, заключающія въ себъ кругло вашыя, черныя, шолешою кожею обведен, ныя и сладкою бёлою кашкою (Pulpa) наполненныя с мячки. Корень длинный окружается нъсколькими волокнами. Егип тяне употребляють съмя въ пищу вм вопо наших в бобов в и гороху. Все расшение раз мягчаеть, разбиваеть, утоляеть боли помогаешъ варенію пищи въ желудкъ, гоняеть пузырной и почечной, камень, полезно от в грудных в и глазных в бол в ней. Господинъ Линней полагаеть его XVI. классъ расшений, имъющихъ въ сво емь цвыть одинь пестикь и двапцать болбе шычковЪ, шоненькими волокнами вмёсть соединенных (Monadelphia Poly классь, въ VI отдъление, въ VI родо правы

6

N

1

BANIL.

травъ съ однолистнымъ колокольчистымъ цвътомъ, котораго пестикъ превращается въ многогивздную съмянодержательницу. По Гречески Алка тъ Агуистоя; по Нъмецки Батіа oder Leguptische Lugen-Pappein; по Француски Alcée d'Egypte; по Италіански Ватіа о Malva selvatica dell' Едурто; по Аглински Thorney Mallow, ог Едур ian Vervain Mallow.

BAMIA ALEXANDRINA, Баміа Апександрина. Смотри Ватіа. І. В. Баміа.

BAMIA MOSCHATA. Offic. Eamia Mocxama. Malva moschata Linn. Alcea Aegyptiaca villosa. C. B. Pin 317. Ketmia Aegyptiaca semine moschato. Tourn. Inst. 100. A belmosch. Мохнатый Индіанскій Проспирнякь, растеть вы Египпъ, въ восточной Индій и въ Америкъ на Антильскохв островахв и цввтеть въ Маїв мвсяць. Онь имвешь пушистый стебель, мохнашые, и какъ бархашъ мягкіе лисшья, желшые трубкою свишые и внизу у самаго стебля красными пяпнышками испещренные цевшы, и мълкія, на подобіе маленькой почки расположенные, и пріншный произительный, Мускусу подобный запахъ имъющія зерны или съмяна, которыя имъютъ цвёть жженаго кофея и называются Мускусовыми зерными (Abel Mofch, АбелЪ мосхъ). Оныя упопребляющся въ разныхъ благоуханіях в и на Авланіе чоток в. Турки и Арапы мъшають ихъ въ свой кофей. Въ Апшекахъ держашъ съмя, не ради Медицинскаго употребленія, но для пріятнаго его запаха, жошя и им БюшЪ они силу укръплянь голову и желудокъ, выгонянь наружу изъ нутри коросту и шелуди, и возбуждань въ любостраснію. Господа Линней и Турнефовшь полагающь ее сь Бамісю вь одинь классь. По Гречески Ваша шотхва; по Ивмецки Ahtgen Staude mit Moschus Zaas men, a зерны Bielam-Rorner, или Abels mosh=Caamen; по Француски La graine de Mute, Graine musquée; по Инпаліански Grano di Mulchio; no Arannen Motchleed.

BAMMIA, Bammia. Cmompu Ketmia, Kemmia.

BAMMIA MOSCHATA; Бамміа мосхата. Смотри Ватіа moschata, Бамміа мосхата. BAN, Бань. Смотри Case; Кафе.

BANAICH, Banauxb. Cmompu Ebulus, Эбулусъ.

BANANA, Banana. W

BANANAS, Bananach. Смотри Mula Myca. BANGHETS, Banremch. Смотри In-

digo, Индиго.

BANGVE, Offic. Park. 1624. Garz ab. Hort. 233. C. à Costa. 290. Raii. Hist. L. 159. Bangue cannabi simile, I. B. 111. 440. Индіанскія конопли, Соколья трапа меньшая или Бангие трапа расшеть въ Азіи въ Индіи и на островъ Цейланъ, и цвъпеть въ Іюнъ мъсяцъ. Она походишь на наши конопли, и имбешь высокій, четвероугольный, и жесткій, св втлозеленый стебель вы двенапиать, и пятьнапиать вершковъ вышиною; листья подобны коноплянымЪ, бълозеленые, покрыты волосками и не имъющь никакого вкуса; съмя не шакъ бъло, какъ у нашихъ коноплей, и мълче. Индіанцы вдять свияна и лисінья, для возбужденія апешиша и любострастія; ежели они захопіять спокойно спать, то дълають изъ Ареки, Опіи, сахару и сихъ съмянъ кошышки и глошають оные; а есными пожелающь имъть пріятные и воображенію их в соопів в тетвующіе сны, то примъшивають еще не много канфоры мушкашнаго цвъща и гвоздики: когдажЪ на противъ того хотапъ быль веселыми и способными къ любострастію, то прибавляють къ тому амбры и мускусу. Въ Медицинъ сіе растеніе не употребляется, чего ради и въ Апшекахъ не имбешся. По Гречески Вагуей нагла Віс побіног; по Нѣмецки Bangue oder Indianischer Sanpf; no Opanпуски Bangue, Chanvre des, Indes; по Ишаліански Bangue o Canape dello India; по Аглински Bang.

BANILLIA, Банилліа. Смощри Vanillia, Ванилліа.

BANISTERIA Linn. VII. Banucmepia, есть Американская, малоизв встная, Госполиномъ Докторомъ Гоикстономъ найденная трава, которая имветь зеленые, продолгованю овальные, и остроконечные листья, и пурпуровые, изъ нъсколькихъ кругловашых Выпуклистых в листочков в состоящіе, и изъ пяти ланочной, при основании наружи нъсколько дырочекъ на подобіе сотовых в, им вющей чашечки вырастающіе цвіты, покидающіе послі спаденія по три маленькія и пленчатыми крылошками снабденныя съмячки. Господинъ Линней полагаетъ ее въ Х. классъ расшеній имфющих в в своем в цв в десять тычковъ и три пестика. (Decandria Trigynia) Πο Γρεчески Βανισέρια πο ΗΒмецки Die Vanisteria in West-Indien: по Француски Banisteria, plante de l'Amerique; по Италіански Banisteria pianta dell' America; по Аглински Banisteria, an American plant.

BAOBAC, Баобакь. Смотри Raobab,

РаобабЪ.

BAPRAVIS, Бапрапись. Смотри Lupinus, Лупинусь.

BAPTISECVLA, Баптисекула. Смо-

шри Cyanus, ЦіанусЪ.

BARACOCCA, Баракокка. Смотри Armeniaca, Арменіака.

BARAHVETZ, Барагуець. Смотри

Betonica, Бетоника.

ВАКALINE, Баралине. Смотри Fœni-

culum, Феникулумъ.

BARASICA, Барасика. Смотри Bdellium, БделліумЪ.

BARATRVM, Баратрумь. Смотри Sabina, Сабина.

BARBA ALGAF, Барба алгафь. и ВARBA ALSAGI, Барба алсаги. Смо-

три Helleborus albus, Геллеборусъ албусъ.

ВАКВА ARON, Барка Аронь. Смо-

BARBA GAPRÆ, Барба капре. Смо при Vlmaria, Улмаріа.

BARBA CAPRÆ FLORIBVS ALBIS, Барба капре флорибусь облонгись. Смот и Вагра сарга floribus oblongis, Барба капре флорибусь облонгись.

BARBA CAPRÆ FLORIBVS COMPAC-TIS, Барва капре флоривусь компак-

mucb Смотри Vlmaria, Улмаріа.

BARBA CAPRÆ FLORIBVS OBLON-GIS. C. B. Pit. Tournef Eapsa Kante Propus Бусь облонгись. spiræa Aruncus Linn. Barba caprina. Ces. Hort. Barbula capræ, et Barba caprina sylvestris. Trag. Potentilla secunda. Ang Dry mopogon. 1. Tab. Barba Capri. I. B. Dod. 11. Козлодродь, или Бълая Козья ворода, расшеть на сырыхь мъстахь, въ лъсахь и на горах и цвътеть вы Іюль мъсяць. Она производить, круглые, вътвистые, далеко распространяющиеся и ноздрева шостью наполненные сшебли, окружающіеся продолговаными, остроконечными, зубча пыми, и по нъсколько вмъстъ на одной сторонъ каждаго однимъ листкомъ оканчивающагося сшебля сидящими листьями. Цвёты бёлые, вырастають на вершинахъ вътвей длинными кисточками и составлены изъ пяпи на подобіе розона расположене ных в листочков в. Послъ цевта показы вается многоги вздная шишечка или кап суля о нъсколькихъ продолговащыхъ съмячкахЪ. Корень у нее нарочито толстый? волокнистый, обведенъ красноватою, довольно шолсшою корою, и наполненъ бълою жидкостью. Сія трава содержить въ себъ много существенной соли, укръпляеть сердце, производить поть, противод виствуеть яду, унимаеть понось и почечуй, и полезна от рань. Въ Аптекахъ изъ нее ничего не дълается. Барба капре, есть Лапинское имя, которымъ прозвана она пошому, что находять нъкоторое сходство въ расположений ея цвътовъ съ Козьею бородою. Господинъ Линней полагаешъ

паеть ее въ XII. классь растений, имвющихь въ своемь цветь обыкновенно по дватцати, а часто и болье гвоздковь и четыре пестика Іованста Тетгадупіа; а Господинь Турнефорть въ VI. классь въ VI. отдъленіе въ IV. родь травь съ многолистнымь цветомь, котораго пестикъ превращается въ многогнъздный плодъ. По Гречески Пиуши diysia; по Нъменки Дейв Ваге, дав апдете Серфефеф дев Сейвългъ; по Француски Вагье се Сhevre; по Италіански Негьа о Вагьа саргіпа altra; по Аглински Тьс Greater Mede-sweet or Meddow sweet.

BARBA CAPRI, Барва капри. Смотри Barba capræ floribus oblongis, Барба капре флерибусъ облонгисъ.

ванва CAPRI QVIBVSDAM, Барба капри кпибусдамь. Смотри Christophoгіана, Христофоріана.

BARBA CAPRINA, Барба каприна.

Смотри Vlmaria, Улмаріа.

ВАКВА CAPRINA ALTERA, Барва каприна алтера Смотри Вагва сарга floribus oblongis, Барба капре флорибусь облонгись.

BARBA CAPRINA MINOR, Барба Таликтрумъ. Смотри Thalictrum,

ВАКВА CAPRINA PRIOR, Барба каприна пріорь. Смощри Vimaria, Улмаріа. ВАКВА CAPRINA SYLVESTRIS, Вагра каприна силпестрись. Смощри флорибуєв облонгиєв.

Христи магорь. Смотри Sangvisorba, Сан-

Смощри Trichomanes, Трихоманесь.

BARBA DEI, Барка Ден. Смощри Sanguiforba, Сангвисорба.

ваква HERCVLIS, Барка Герку-

BARBA HIRCI, Барба гирци, и BARBA HIRCI FLORE PVRPVREO, Барба гирци флоре пурпурго. и

BARBA HIRCINA, Барба Гирцина.

Смотри Тгадородоп, ТрагопогонЪ.

BARBA IOVIS. Pin. Cam. C. B. Eapea Tounch. Anthyllis Barba Iovis. Linn. Barba Iovis pulchre lucens I. В. IX. Водяный, Кропапникь, Серебрянникь, Серебрянный Расходникь или съ Нъмецкаго Борода Іопопа, есть кустарник в растущій в в приморских в странах в на гористых в и каменистых в мвстахв, и цевтущий в В Іюнв и Іюль мьсяцахь. Онь бываеть вь девяшь, двенашцашь и двашцашь четыре вершка вышиною, и имвешь крвпкій, какь дерево жесткій, білою шерстистою корою обведенный и превътвистый стебель, окружающійся прекрасными, периспыми, равными, мошиспыми и по парно сидящими листьями серебряно лоснящагося цвъта, и производящій из вершины в в твей своих в маленькіе, желшые, на подобіе звъздки расположенные, стручковащые и на цвбты шильной правы похожіе цвёты, оставляю. щіе послі спаденія корошенкіе, продолговато круглые стручечьки, каждый объ одномь съмячкъ. Листья вяжуть и по мнънію Діоскорида унимають жарь, но внутренно не употребляются, также и въ Аптекахъ не держатся. Господинъ Линней полагаеть ее въ XVII. классъ, им вющих в в своем в цввив десяпь пычков в изь двойнаго основанія, яко изь двойной машки выходящихв, или коихв шычки свишы по пяши вм вств пюненькими волошьми. (Diadelphia Decandria) а Господинъ Турнефоршъ въ VI. классъ, въ VI. отдъление, въ І. родъ правъ съ миоголисшнымъ цвъщомъ. По Гречески Аксио то ибуа; по Нъмецки Jovisbart; Giberbart; по Француски Grande loubarbe; по Италіански Barba di Giove; по Аглински The Greater Housleek.

BARBA SENIS, Eapra cenuch. Смотри Barbula hirci, Барбула гирци.

BAR

BARBA SYLVANA, Барба силнана. Смотри Plantago aquatica, Плантаго акваппика.

BARBA SYLVESTRIS RECENTIOR, Барка силнестрись реценціорь. Смотри Sagittaria, Carummapia.

BARBAINA, Барбанна. Смотри San-

tonicum, Саншоникумb.

BARBALVS MAIOR, Bapsanych ma-

горь. Смотри Agrimonia, Агримоніа.

BARBAREA, Dod. Lob. I. B. Eaprapea. Erysimum Barbarea Linn. Pseudo-bunias. Dod. Gal. Ad. Carpentorum herba, Ruell. Sifymbrium Erucæ folio glabro, flore luteo, Pit. Tournef. Eruca latifolia lutea five Barbarea, C. B. Sideritis latissima Fuch. Ico. Ang. Nafturtium palustre. Ges. Hort. VI. Репничекь, Барбора, Царскій пеникь, или по переподу Горчишная трапа свется въ поваренныхъ садахъ, и цвъшешь въ Маїв и Іюнь мъсяцахь. Она еснь роду Кресса, и им теть кръпкіе, внутри пустые и на многія в вточки разльляющіеся стебли или стволики, въ девять верышков вышиною, которые производять пемнозеленые, лоснящеся и прессовымъ подобные лисшья, и множество маленьких желшых , махровых в изв ченырех в крестообразно расположенных в листочнов в составленных в и во кругъ стебля на подобіе пирамиды въ три верьшка вышиною растущих в цв вточковь, покидающих в послъ спаденія маленкіе, нёжные, цилиндрическіе и двугнёздные стручечки, заключающие въ себъ красноватыя съмячки. Корень длинный и нарочито толстый. Она содержить въ себъ много соли, и масла, гонишъ мочу и почечуйный камень и настоянная вЪ водъ очень полезна от иынги, тнили во рту и от селезеночной боли, и употребляется какъ внушренно такъ и наружно, особливо въ примочкахъ ошъ ранъ. Въ Апшекахъ ее не употребляють. Господинь Линней полага. ешь ее въ XV. классъ стручкованых в расшеній, им вющих в в своем в цв в шесть шычковъ, изъ коихъ чешыре длинные, а два прошивоположенные корошкие (Tetrady namia Siliquosa), а Господинъ Турнефорть въ V. классъ, въ IV. отдъление, въ VII. родъ правъ съ крестообразнымъ цевтомъ, которато пестикъ превращается въ двугнъзм ный стручокъ. По Гречески Фегдовечая им Фенбованов; по Нъмецки Сt. Barben : Rrant! Gefüllte Winter = Rreffe; по Француски Herbe aux Charpentiers ou herbe sainte Barbe; 10 Италіански Barbarea, Spezie di Crescione; по Аглински Winter Cress.

BARBAREA FOEMINA, Baptapea 90.

мина. и

BARBAREA MAS, Барбареа масы Смопіри Barbarea, Барбареа.

BARBARIA, Барбаріа. Смотри Вагва

геа, Барбареа.

BARBARIA MVRALIS, Eapsapia My рались. Смотри Егуппит, Еризимумъ.

BARBASCVS, Барбаскусь. и

BARBASTVS, Барбастусь. Смотря Verbalcum, ВербаскумЪ.

ВАКВІСАРКА, Барбикапра. Смотря Vlmaria, Улмаріа.

BARBILA, Барбила. Смотри Cartha

mus, Kapmanycb.

BARBIRVLIGI, Барбирулиги.

mpu Basilicum, БазиликумЪ.

BARBOR, Eapsoph. CMompu Polyti chen, ПолитрихонЪ.

BARBOTINA, Барботина. Смотр

Santonicum, СантоникумЪ.

BARBVLA CAPRÆ, Барбула капр Смотри Вагва саргае, Барба капре.

BARBULA CAPRINA, Eapsyna Rd.

BARBULA HIRCI, Eapsynd Inpul прина. Смотри Vlmaria, улмаріа. BARBULA HIRCI ALTERA; Bapel

ла Гирци алтера. и

BAR.

e

20

20

15

a

T- 15

-NPIINK

BARBVI.A HIRCI MINOR, Bapsyna

гирци минорь. и

BARBULA HIRCI PURPUREO-COE-RVLEA, Барбула гирци пурпурео-церулеа. Смотри Тragopogon, ТрагопогонЪ.

BARBVLA, Барбула. Смотри Anemo-

пе, Анемоне.

ВАКСА, Барка. Смотри Іаса, Яка. BARCEGARSEN, Bapyerapcenb. CMO.

три Capillus Veneris, Капиллусь Венерись. BARDANA SIVE LAPPA MAIOR. Dod. Бардана магорь. Bardana vulgaris maior. Park. 1222. Lappa maior, Arctium Diosc. C. 198. Pit. Tournefort. Arctium personata. Linn. Personata maior. IV. Лапушникь, Репейникь большій, Репець, Черный Репейникь, или Лапушка смольная, есть довольно извъсшная, и почти вездъ, какъ, то въ садахъ и огородахъ, на кладбищахЪ, близь жила, дорогЪ и улицЪ, и возаборовь растущая и въ Іюнъ мъсяцъ двъщущая права, имъющая прямые, высокіе, красноватые, бълою шерстью покрытые на многія боковыя вётви раздёляющіеся стебли, окружающіеся длинными, преширокими, съ верьху шемнозелеными, а съ низу пепельнаго цввта, черенястыми и по срединъ толстою жилою проръзанными перспистыми лиспъями: на боковых в в твырастають репейныя круглыя головки, обсаженныя множесшвом в закорючившихся маленких в крючечков в, которыми прицв. пляющся къ платьямъ. Сіи репейки цвъпушь пурпуроваго цвёту и заключають вь себв длинныя, съроватыя и пушистыя сьмячки, которыя вътромъ развъяны бывающь, ошь чего и размножающся. Корень у Лапушника длинный, просшый, снаружи черный, а внутри бълый, и имбешь сладковашый вкусь. Осенью лисшья опадаюшь сами собою, и остаются одни только стебли съ своими репейками. Дъстнемъ и качествомъ своимъ сходствуетъ съ шерстишымъ Лапушникомъ, съ которымъ и въ

Часть І.

одинъ классъ полагается. По Гречески Арκεΐον μείζον, προσώπιον, καὶ προσοπίε; πο Hb. мецки Große Rlette, Rog: Rlette; по Француски Bardane, Glouteron, Herbe aux teigneux; по Италіански Lappola, о Lappa grande; Amor d'Hortolano; по Аглински Burdock, and Clot Bur.

BARDANA SIVE LAPPA MAIOR Dod. Lob. teon. Бардана, или Лаппа маюрь. Personata altera vulgaris capitulis minus tomentosis. Raii syn. Lappa maior montana capitulis tomentosis seu arctium. C. B. 198. Tourn. Inft. 450. Boerh. Ind. A. 146. Illepстистый Лапушникь, растеть на гористых выстахв, возли дорогь и ввраз. валинахь, цвететь вы Іюль месяць, и различествуеть от вышеописаннаго Лапушника только въ томъ, что репесчки его и окружающіе оные крючечки обложены вст тонкою, бълою и паутинъ подобною шерстью. Оба рода содержать въ себъ много масленых , соленых , смолисшых в и земных в частиць. Въ Медицинъ употребляются по большой части однъ кории, которые выръзываются рано, сущать, гонять мочу, производять поть, укрыпляють и разбивають стустившуюся кровь. Вареная съ кореньями вода чистить кровь, гонить песокъ изъ почекъ и пузыря, возбуждаеть любострастіе и употребляется внутренно сЪ пользою от воспаленія в легкомь, оть одышки, колотья въ бокахъ, кровохарканія, поврежденія въ кишкахъ, оть трясенія и ослабленія членовъ въ тъль, произходимаго от в излишняго употребленія ртутных в лъкарствъ (Mercurialia) от в чахотки, коросты и от укушенія ядовитых в звірей. Вареный изъ репейникова кория и Бакаутоваго дерева (Lignum Sanctum, Лигнумъ СанкшумЪ) декокшЪ почишается превосходнымь средствомь оть фрянокь, и какь внутренныхъ, такъ и наружныхъ застарвлых в нарывовь. Гоненая из в него вода производить поть и полезна от всяких в при-Ш

липчивых в бол взней, особливо от язвы, а двоеная св корнемь и правою въ Маїв или концъ Августа мъсяца, составляетъ облегчительное средство от Подагры, въ которомЪ случав должно оную не много согръть на жаровнъ, обмочить тоненькую шряпку или полошенцо и онымъ обложищь болящее мъсто. Вареный въ сахаръ корень унимаеть каменную боль и кровавый понось; истолченный съ солью и приложенный исцвляеть укушение бъщеной сабаки. а вареный свёжій вы водь, и приложенный на подобіе пластыря утоляєть боли, и полезень оть повреждения составовь. ВЪ щолокъ вареный споспъществуетъ растенію волось и употребляется слёдующимъ образомЪ. Должно взящь корень от чернаго рвпейника, изрубить его мвлко, и наливъ горячею водою, смѣшать съ саломъ молодаго медреженка, пошомъ положишь въ муравлиный горшокъ, замазать оной тестомъ и поставить въ печь, а когда устоится, то по вечерамъ смачивать волосы. Траву и корень рубяшь мёлко, варяшь сь коровьимь масломь вь водь и делаюшь мазь, которая весьма полезна отв обжоги, и происходящей отв оной боли. Пастухи даюшь овцамь мылко изрубленный и съ свномь смвшанный корень ошь кашлю и погрежденія въ легкомъ. Отъ водяной 60. авани соввтують прикладывать раздробленный корень кЪ пяшамЪ. Наружно употребляется онь вы припаркахы оты жару. въ бользни рака и для раздробленія зобовь и опухолей. Свъжіе листья приложенные, унимающь жарь, вышягивають сырости изъ опухлыхъ ногъ, чистяпъ смарыя раны и разбивають опухоли Съмя варять вь сахарь и похваляющь оть каменной боли. Ев Нёмецкой землё варять въ водъ молодые большаго Репейника спебли очищая ихъ на передъ отв наружной ихъ коры, и вляшь вмёсто спаржи съ уксусомЪ, деревяннымЪ масломЪ и перцомЪ. листом в обвершывають ЛапушниковымЪ

плоды и покрывають ягоды въ дальное мѣстю откылаемыя, Бардана есть Греческое онъ слова Вирбов, дорога, происходящее имя, пошому что она встръчается по всъмъ почти дорогамъ, а Лаппа отъ слова давен, приставать, что репейникв приц Впляется кЪ платьямЪ. Персоната есть Латинское имя, которымЪ прозвана она пошому, чио въ сшарыя времена употребляли ея листья, для покрыванія себ лица вмъсто маски. Господинъ Линней полагаеть Репейникь вы XIX. классы многобрачных в расшеній, им вющих в равное число мужеских в и женских в цв в тов в, и у коих в находящеся в в мужеских в цвв пахв пычки соединены вм вств съ пычковыми 100 ловками (Syngenefia Polygamia Aequalia), а ГосподинЪ Турнефортъ въ XII илассъ, въ И отдъление, въ VII. родъ правъ съ пушиспымъ съмянемъ, и изъ многихъ вмъ ств соединенных цввточковь составленнымъ цвъшомъ. По Гречески Пробитиом, Вар δανα, καί Αρκείον μείζον; πο Η Επεικи Ενοίβο Klette mit wolligten Rietten Knopffen; no Opan цуски Glatteron, ou Glouteron; по Италь ански Lappa grande lanuta; по Аглински Woolly - headed Burdock.

BARDANA MAIOR, Бардана маюры Смотри Bardana fine Lappa maior, Бардана

или Лаппа мајорЪ.

BARDANA MINOR, Бардана ми норь. Смотри Жаптышт, Ксантіумь.

BARGOL, Eaprons. CMonipu Callitriснит . КаллиприхумЪ.

BARINIVM, Бариніумь. Смотри As-

phodelus, Асфоделусь.

BARLERIA. Linn. Bapnepia, Американская, на островъ Ямайкъ расту щая права, имъющая длинные, пемно зе леные, пупырышками изпещренные, и кв верьху ўже становящіеся листья, четырелапочную, цв в тную чашечку и четыреугольную, одноги вздную, и двушелушную свиян нодержа тельницу. Господинъ Линней полаraemb

гаеть ее въ XIV. классъ растений имъющихъ въ своемъ цвътъ два длинные, и два короткие тычка (Didynamia). По Гречески Βαρλεςία, χορτος της 'Αμεςικής; πο Η Εменки Barleria in Jamaica;по Француски Barlelia plante de la Iamaique; по Италіански Barleria Pianta della Iamaica; по Аглински Snap-Dragon.

BARNANICH, Барнанихь. Смотри

Betonica, Бепюника.

BARNAX, Eapharch. Cmompu Myrrha,

BAROCOCCA, Барококка. Смотри Агтепіаса, Арменіака.

BAROCHA, Bapoxa. Смотри Melissa, Мелисса.

BAROSA, Bapo.3a. CMompn Corallium, Ropanniymb.

BAROVA, Баропа. Смотри Armenia. са, Арменіака.

BARRERIA CAPENSIS Linn. Bappeріа Капенсись. Барреріа есть Американская трана им вющая пурнуровые, папилисточные, и по нъскольку вмъстъ на корошеньких в стебельках в из в пяши лапочной и кЪ верьку на подобіе Воронки разши-Ряющейся чашечки вырастающие цвѣты. ГосподинЬ Линней полагаешь ее вь V классь Расшеній имъющихъ въ своемь цевшь пяшь шычковь и пяшь песшиковь (Pentandria) πο Γρεчески Βαρφερία, χορτος της 'Αμερικής; по Нъмецки Barrevia, ein Americanisches Realit; по Француски Barreria plante de l'Amerique; по Итахіански Barreria pianta dell' America; по Аглински Barreria, an American plant.

BARTRAM, Бартрамь. Смотри Tri-Umfetta, Trivmpemma.

BARTSIA Linn. IV. Hapmeia mpana растущая въ Швеціи на гористыхъ мъпро-Алаговатые, остроконечные, равноширные, увльные, и на искось одинь прошивь Аругаго сидящие листья, и блъдно красные маленькой, на двъ части разръзанной проваваго цвъта чашечки вырастающие цвъты, оставляющие послъ спадения двугивадную семянодержашельницу, заключающую въ себъ мъленкія съмячки. ГосподинЪ Линней полагаеть ее в b XIV. классЪ растеній им вющих в два длинные и два коротенкіе тычка. (Didynamia). По Гречески Βάρτσια, Χορτος της 'Αμερικής; πο HEмецки Bartsia, Pflange aus America; по Француски Bartha, plante de l'Amerique; по Италіански Bartsia, pianta dell'America по Аглински Bartsia an American plant.

BARTSIA PALLIDA Linn. Бивдная

Бартста, расшеть въ Сибири.

BARVC, Bapyrb. Cmompu Absinthium, АбсинтіумЪ.

BARVCE EXHVRA CELSA ARBORE Clus. Exot. p. 47. Варуце эксь Гура

целса арборе. и

BARVGE FRYCTVS EX PLVRIBVS NVCIBVS ARBORIS HVRÆ I.B. Hin. T. 1. p. 333. Sloan. Cat. Pl. Iamaic. p 214. Itinerar. Vol. II. p. 186. n. VIII. Баруце фруктусь эксь плуривусь нуцивусь ар-Борись туре. Смотри Hura, Гура.

BARYTHON, Bapumoub. CMompu Sa-

bina, Сабина.

BARZO, Bap30. Cmompu Sumach arbor, СумахЪ арборЪ.

BASALAS, Basanach. Смотри Gen-

tiana, Генціана.

BASALE, Базале. Смотри Сера, Цепа BASALISCA, Базаписка. Смотри Візtorta, Бисторта.

BASARA ACHIRO, Базара ахиро.

Смотри Vrtica, Уртика.

BASARA ALCOBEL, Basapa anxo. Бель. Смотри Semen Malvæ Семенъ малье.

BASARA ARASEN SIVE ARASCIEN, Базара аразень или арасциень. Смотри Nasturtium, Hacmveniymb.

BASARA ATABA, Базара атаба. Смотри Semen Trifolii, Семенъ трифохіи.

BASARA CHATONA, Basapa xamoна. Смотри Semen Psyllii, Семенъ Псилліи. BASI- BASEDION, Базедіонь. Смотри Рœо-

BASELE, Базеле. Смотри Сера, Цепа. BASELLA Linn. III. Basenna ими Maпапарскія Псинки, бывають трехь родовъ красныя (Rubra, Рубра), бълыя, (Alba, Алба), и лоснящіяся, (Lucida, Ауцида) растуть въ Китав и Малаварв, а здёсь зимою вь оранжереяхь, но лётомь стьють ихв вы парникахь, выставливають въ сады, и ставящъ на окошки для красы въ горшкахъ. Первой годъ сіе растеніе не цвѣтеть, но на другой, любить частое поливаніе. Оно им веть противь солнца обращенные, съ низу толстые, а къ верьху тонкіе и выющіеся стебли, которые окружающся долгими, широкими, красновато-зелеными съ проходящими по нихъ бълыми жилкамм, и вокругъ спеблей длинными своими стебелючками вьющимися плоскими листьями, и либо красноватыми, либо бълыми, не пахучими, шести-листочными и безчашечными цв в точками, которые опадая оставляють на своемь мьств маленкія, видомъ и величиною на вишню похожія свётло-красныя ягодки объ одномь черномь и кругловатомь съмячкъ. Китайцы выдавливають изв ягодь сокв и пригоповаяють изъ него прекрасную водяную свътло-красную или кармазинную краску. ВЪ Медицинъ и въ Аптекахъ Ба. зелла ни кЪ чему не употребляется. ГосподинЪ Линней полагаеть ее вЪ V. классЪ растеній, им вющих в в своем в цв в тв пять тычков и три пестика (Pentandria Trigynia). По Гречески Βάσελλα, φυτόν τής nivas; по Нъмецки Bafella, ein Chinesisches Pslumen Gewächs; по Француски Basella, fleur de la Chine; по Италіански Basella, fior della China: по Атлински Basella an China flower.

BASELLA ALBA Linn. Базелла

BASELLA LVCIDA Linn. Базеппа

BASELLA RVBRA Linn. Easenna py-

BASEOSAN, Базеозань. Смотри Са.

pillus Veneris, Капиллусь венерись.

BASET, Балеть. Смотри Corallium, Коралліумь.

BASIATRAHAGI, Базіатрагати. Смотри Diplacus, Дипсакусь.

BASIGENITI, Базигенити. Смотря Fæniculum, ФеникулумЪ.

BASILICA, Базилика. и

BASILICON, Базиликонь. Смотря Ваfilicum, Базиликумь.

BASILICVM, Базиликумь. Смотря Осутит, Оцимумъ.

BASILICVM HISPANICVM, Базили кумь Гиспаникумь. и

BASILICVM INDICVN, Базиликумь

Индикумь. и

BASILICVM INDICVM MACVLA TVM, Базиликумь Индикумь макула тумь. Смотри Caryophillata major, Каріо филлата маіорь.

BASILICVM MEDIVM VULGATIVS; Базиликумь медіумь пулгаціусь. и

BASILICVM MINVS, Базиликум минусь. Смощри Осутит, Оцимумъ.

BASILICVM SYLVESTRE, Базили кумь силиестре. Смотри Осутавтити.

BASILICVM TERTIVM, Базиликумы терціумь. Смотри Clinopodium, Клино подіумь.

BASSAO, Baccao. Cmompu Corallium, Kopanniymb.

BASSY, Baccu. Смотри Voatolalaci

Воатолалакъ.

ВАТАLМЕ, Баталме. Смотри Foonis culum. Феникулумъ.

BATAN ARBOR, Батань арборь Смотри Durio, Дуріо.

BATATA, Bamama. 11.
BATATAS, Offic. C. B. Pin. 91.
B. II. 790. Bamamach. Battatas Hilpanorum
Parad

11

Parad. 577. Convolvulus Indicus Batatas dic. tus. Raii. Hist. I. 728. Pluk. Almag. 114. Convolvalus Batatas. Linn. Batatas planta peregrina, Indica, Camotes, Amotes et Ignames etiam dicta, Clusii Chab. 259. Sisarum Peruvianum. Ger. Emac. Ietica, vulgo Batata Рів. 93. III. Бататась или Индіанскій сахарный корень, растепь въ Америкъ, вь Азіи, также и въ Европъ въ Гишпаніи около Малаги и Кадикса; вЪ Португалліи около Лиссабона, и въ Ирландіи, куда привезли его Гишпанцы. Сей корень длинный, толстый имветь сладкій сахарный вкусь, составляется изъ многихъ малень. ких в корешков в, которые всв вмвств сое-Аиняются въ продолговатую головку либо краснаго, либо пурпуроваго или бълаго цвъта, и наполняются бълою ноздреватою и молошнымъ пріятнаго вкуса сокомъ. Онъ производить многіе, приземистые, острыми щешиночками обсаженные и сочные стебли, окружающіеся блідно зелеными, толспыми, жиловаными, на подобіе сердца вырвзанными и на шпинашные видомъ по-, имишпоньчиом и колокольчистыми , снаружи зелеными, а внутри бълыми, или 6 вло - пурпуровыми и по спаденію весьма РВ 4ко съмячки оставляющими цвъточками. Индіанцы упопребляють корень вареный и сырый въ пищу; Агличане жаряшъ его на угольях в употребляють вм всто хавба; а Гишпанцы и Португальцы варять его въ сахаръ и пригошовляющь и ъдящь его сь масломь, сахаромь и съ мушкашнымь оръ. комь. Онъ содержинів отдъленіе встх в соковь вь порядкъ но въ Медицинъ и въ Апшекахъ РЪдко употребляется. ГосподинЪ Линней полагаеть его вь V классь растеній, имь. и баохинат атап втвад бмэовэ ба бхишо одинЪ пестикъ (Pentandria Monogynia) По Τροчески Βάτατας, ξένον θυτόν της Ίνδίας; πο Abmenun Batatas, Patatas oder Peruvianische Rüben; по Француски Battates; по Ишаміански Ватата; по Гишпански Ватата; по

Аглински The Spanish Potato or Spanish Potates; въ Бразиліи Ietica, Етика; въ Малабаръ Карра - Kelengu, Каппа - Келенгу.

BATATA CANADENSIS OFFIC. Bamama Kanageneuch. Cmompu Flos solis tuberosus Indicus, Qnoch conneb туберозусь
Индикусь.

BATATA VIRGINIANA, Батата Виргиніана. Смощри Рара Americanum, Папа АмериканумЪ.

BATAVA Батапа. Смотри Cochlearia, Кохлеаріа.

ВАТН, Бать. Смотри Colocynthis, Колоцинтись.

BATICVLA, Батикула. Смотри Crithmum, Критмум b.

BATIM, Батимь. Смотри Dipfacus, Дипсакусь.

BATIPICRON, Батипикронь. Смотри Absinthium, Абсинтіумъ.

BATIS, Bamuch. u

BATIS HORTENSIANA, Eamueb ropmenciana. u

BATIS MARINA Linn. Батись Марина. Смотри Crithmum, Критмумъ.

BATOS, Eamoch. CMompu Rubus vulgaris, Pybych byarapuch.

BATRACHIS, Eampaxuch. n

BATRACHIVM, Батрахіумь. Смотри Ranunculus causticus, Ранункулусь кавсти-кусь.

BATRACHIVM ALBVM, Батрахіумь альумь. Смотри Ranunculus candidus, Ранункулусь кандидусь.

BATRACHIVM APVLEII, Батрахіумь Апулеіи. Смотри Ranunculus aquatiсиs, Ранункулусь акватикусь.

BATRACHIVM COERVLEVM, Батрахіумь церулеумь. Смотри Geranium Batrachoides, Гераніумь Батрахоидесь.

BATRACHIVM DVLCE, Батрахіумь дулце. Смотри Ranunculus dulcis, Ранункулусь дулцись.

BATRA-

BATRACHIVM PALVSTRE, Батражіумь палустре. Смотри Ranunculus aquaticus, Ранункулусь акватикусь.

BATRACHIVM SALVTIFERVM, Ба. трахіумь Салутиферумь. Смощри Ranunculus dulcis, Ранункулусь дулцись.

BATRACHIVM TERTIVM DIOSCO-RIDIS, Eampaxiymb mequiymb Aiocko-puguch. Cmompu Ranunculus nemorosus, Panynkynych неморозусь.

BATRACHIVM VINEALE, Батрагіумь пинеале. Смотри Ranunculus dulcis, Ранункулусь дулцись

BATRECHA, Bampexa. Смощри Melo, Mezo.

BATTADA DA PVRGA, Баттада да пурга Смотри Matalista, Маталиста. BATTADES, Баттадесь. и

BATTADA HISPANORVM, Bamma-

да Гиспанорумь. и

BATTADA INDORVM, Баттада Индорумь. Смотри Batatas Offic. Башатась Оффиц.

BATTATA VIRGINIANA, Баттата Виргиніана. Смотри Рараз Americanum, Папасъ Американумъ.

BATTATAS, Eammamach. Смотри Batatas, Баташась.

BATTISECVLA, Баттисекула. Смотри Суапия, Ціанусъ.

BATVS, Bamych. Смотри Rubus batus, Рубусь батусь.

BATVS IDÆA, Батусь Идеа. Смо-

BAVCIA, Бауціа Смотри Pastinaca Syluestris. Пастинака силвестрисъ.

BAVCIA ALBA, Bayuia ansa. n

BAVCIA HORTENSIS, Бауціа тортенсись. Смощри Pastinaca domestica, Пастинака доместика.

BAVCIA SYLVESTRIS, Бауніа силпестрись. Смотри Pastinaca fylvestris, Пастинака силвестрись.

BAVHINIA ACVMINATA Linn. VIII. Баугиніа акумината. Баугинія Американское горное Экенопое дерепо, расшеть вы Америкь и имъеть нарочито толстый и иглами обсаженный пънь; продолговато-круглые, свётло зеленые и св низу волосками покрытые листья; и пурпуровые, изъ нъсколькихъ продолговащыхъ выпуклиспых в листочков в состоящие и из в маленькой на пять частей връзанной чашечки вырастающіе цвіты, оставляющів послъ себя стручечки. Подробное сего дерева описание смотри въ Миллеровомъ вничьемъ словаръ въ І. части 357. Стран. ГосподинЪ Линней полагаетъ оное въ Х. классь расшеній имъющихь въ своемь цвьть десянь шычковь и одинь пестикв (Decandria Monogynia, Декандріа Моноги ніа). По Гречески Вабуміа апо вос; по НВменки Bauhinia oder Berge Ebenholts in Be stindien; по Француски Bauhinia, ou Ebene des montagnes de l'Amerique; no umanianски Bauhinia, o Ebeno di montagne dell'America; по Аглински Bauhinia, for The Macow-trée.

BAVERA, Бапера. Смотри Fænum græcum, Фенумъ грекумъ.

BDELLA, Bgenna. u

BDELLIVM GVMMI. Ind. Med. XVIII. Bzenniymb гумми. Bdellium omnium Auctorum Raii. Hift. II. 1844. Bdellium Offic. Park, Theat. 1571. C. B. Pin. 503. 1. B. 1 317. Chab. 70. Mont. Exot. II. Malatram. ш. Бделліумь есть красная смола, изтекающая изъ нъкотораго смолистаго, чер ною корою покрышаго и колючими иглами обсаженнато дерева, которое называется иными (Bdella; Бделла) Дерево смолошоч. ное, а ЛеонардомЪ ПлукенеромЪ (Arbot lacteicens aculeata, АрборЪ лакшесценсЪ акулеата) или Колючее молошное дерево. Оно растеть въ Аравіи, Индіи и Мидіи, быва еть вышиною съ Масличное (Olea, Onea) и имветь подобные дубовымь листья и похожій на дикую сливу плодЪ, нарочито пріятнаго вкуса. Сію смолу сушать и привозять къ намъ въ кускахъ разной вели. чины, виду и толщины. Лучшая должна бышь чиста, желтовата, смолиста, прозрачна, благовонна, клъйка, ломка, имыть горькованый вкусь и легко загараенся. Она содержишь въ себъ много масла и соли, разбиваеть, сущить, отверяеть, тонить поть и мочу, противод виствуеть яду, поспъществуеть родамь, отворяеть мъсячное, полезна от кашию и нарывовь въ легкомъ, а наружно приложенная вь пластыряхь разбиваеть тугія опуходи и шишки, приводишЪ ихЪ вЪ созрѣлость и полезна от в килы. В В Аптеках в им вется смола, эссенціа или распущенная въ передвоеной водкъ и дълають изънее пластыри и пилюли. По Гречески Вбелдог; по Ивмецки Bdellium, или Bdellien Hart; по Француски Bdellium gomme; по Ишаліански Bdellio gomma; по Аглински Gum Bdellium.

BEBANEGVM, Беванегумь. и BEBANIGI, Беваниги. Смотри Chamomilla, Хамомилла.

BEBUNEOS, Бебунеось. Смотри Асоrus palustris, Akopych nanycmpneb.

BECACVLO, Бекакуло. Смотри Іресасцапћа, Ипекакуанга.

BECARDVM, Бекардумь. Смотри Diplacus fylvestris, Auncakych силвестрись.

BECAROCH, Bekapoxb. Смотри Basiісит, Базиликум Б.

BECCABUNGA, Беккабунга. Veroni. ca aquatica maior, folio subrotundo. Mor. Hist. Pit. Tournef. Anagallis aquatica folio rotundiore major. I. B. Berula. Tob. Icon. X. Homounuxb, Цынготная трана, Ибунка или подяная порченая Помочь, расшеть по выгонамь, на сырых в и влажных в мъсшах в, на ръчных в берегахв; во рвахв, возлё ключей и осрегахь; во рыскы, магы и Іюнь мьчадахь. Она Имвешь молстые, круглые,

ноздреватые, приземистые или на поверьхиссти воды распространяющиеся, и въпвиспые красновашые сшебли производящіе широкіе, шучные, гладкіе, кругловашые, и на искось другь прошивь друга попарно на коротеньких в стебелючках в сидящіе зубчатые темнозеленые листья; между коими вырастають однолисточные, колосистые, свъщлоголубые и изъ круглой, четырехъ лапочной чашечки выходящіе цв точки, которые опадая оставляють маленькія двугивздныя свиянодержащельницы, заключающія въ себъ мьленькія съмячки. Корень у нее длинный, извишый и обвъщенный бълыми волокнами. Д. Биствіем в и качеством в своимъ сходствуетъ она съ малою Ибункою Beccabunga feu Veronica aquatica miпог, Веккабунга севЪ вероника аквашика миноръ, съ кошорою и въ одинъ классъ полагается. По Гречески 'Αναγαλλіς ένυδρος μείζων; по Нъмецки Bachbungen, Wasser : Bungen große Pfunde; по Француски Pourcelaine de mer; по Италіански Becabunga; по Аглински Brookline, or the greater roundleav'd Brooklime, and Water Pimpernel.

BECCABUNGA GERMANICA, Bexxa-Бунга Германика. Смотри Beccabunga,

Беккабунга.

BECCABUNGA SEV VERONICA A. QVATICA MINOR, FOLIO SVBRO-TVNDO. Pit. Tournef. Bekkaeyhra cenb минорь, фолю пероника акпатика сувьротундо. Anagallis aquatica five Весcabunga Germanica. Ad. Lob. Dod. Cepæa-Tur. Dod. Sium. Ang. Sii alterum genus. Fuch Icon. Sion. Brunsf. Non odoratum. I. Trag. Anagallis aquatica flore cœruleo, folio rotundiore minor. C. B. Koziń pocmb, Kozna Морда или Малая Ибунка, растеть съ вышеописанною на одних в м встах в, цв втеть вь одножь сь нею время и различествуеть оть нее только вь томь, что во встхв своих в часшях в меньше, и лисшья ея не шакъ круглы и вырасшающь при всякомъ

400

стебельном в кол виц в без в черешков в. Оба рода сей травы содержать въ себъ много существенной соли, масла, и влажности, тонять мочу, камень, мъсячное и плодъ и вЪ случав нещастья и самаго мертваго младенца, содержать всв испражненія свободными и весьма полезны от всяких в цынгошныхъ болъзней. Трава вареная въ молокъ или водъ унимаеть почечуйную боль, съ пивомъ или уксусомъ согръщая ущоляеть происходящую оть цынги боль вь лядвеяхъ, а въ пивъ вареная и на подобіе пластыря приложенная исціляеть она оть онойже происшедшія раны. Смішенная съ отрубями и употребленная въ припарках в полезна она отв рожи, воспаленія въ разныхъ частяхъ тъла, и отъ пяшенъ на лицъ. Приложенная съ солью и съ паушиною исц вляеть раны, а вв примочках в съ ромашкою разбиваеть опухоль машки и зальчиваеть раздробленныя мъста. Изъ травы выдавленный сокъ и перегонная съ нею вода чистять цынготную солковатую кровь, гонять мочу и камень и полезны оть водяной болвзни и желчи; чего ради и упопребляются съ пользою по упрамъ и вечерамъ чрезъ цёлый мёсяцъ, сокъ въ количествъ четырехъ, а вода отъ осьми до десяпи лотовъ. Отъ цынготныхъ боаваней ивть лутчаго средства, какв перегонная съ Ибункою, Брункрессомъ, ложечною травою, Cochlearia, Кохлеаріа и съ попушникомъ вода. Сія трава употребляется также въ пищу въ салатахъ, и другихъ кушаніяхъ. Беккабунга еспіь Нѣмецкое от словъ Бахъ, ручей, и Бунтень имени сей травы происходящее имя, потому что охопно растеть чейках в и около ключей и колодезей. ВЪ АпшекахЪ имвешся шрава, перегонная съ нею вода, и спирть, однакожь ръдко. Господинь Линней полагаеть ее въ II. классь расшеній имьющихь вь своємь цвьнь два пычка и одинь пестикь (Diandria

BEC

Monogynia) а ГосподинЪ Турнефорть во II. Классь, въ VI. отдъление, въ IV. родъ шравъ съ однолисшнымъ круглымъ цв^ВтомЪ, котораго пестикЪ превращается вЪ капсулю. По Гречески 'Αναγαλλις ένιδζος μείον, по Нъмецки Kleine Pfunde oder Bachbungen; по Француски Petite Pourcelaine de mer; по Ишаліански Becabunga picciola; по Arлински The leffer Brooklime with a longleaf.

BECHION, Bexionb. Cmompu Salvia,

Салвіа, и Tussilago, Туссилаго. BECHIVM, Bexiymb. CMompu Tuffi

lago, Туссилаго. Смотри Salvia, BECION, Беціонь. Салвіа.

BECOVQVILLO, Бекукпилло. и BECVLO, Бекуло. Смотри Гресасиапha, Ипекакуанга.

BEDAQVAR, Бедакпарь. Смотри Вгу onia nigra, Бріоніа нигра.

> BEDARANGIA, Begapauria. n BEDARANINE, Бедаранине. и BEDARVNGI, Бедарунги. и

BEDARVNGIE, Begapynrie. CMomps Melissa, Meaucca.

BEDARVNGI, IBN TSINÆ, Begapytt ти Ивнь Тсине. Смотри Осупит, Опри

BEDEDARAGI, Begegaparu. CMompi Melissa, Meaucca.

BEDEGARIVM, Begerapiymb. CMOTTPI Carduus, Kapayycb.

BEDEGVAR, Begeryaph. CMompu Cf

BEDEMBNE, Бедемьне. Смотри norrhodos, Цинорргодось. lissa, Meaucca.

BEDENEAMBALA, Беденеамвала. Беденеамьум BEDENEAMBVLA,

BEDENENTEGIVM, Беденентегіумы Смотри Bafilicum, БазиликумЪ.

Смотри Менія, мелисса. BEDENGIAM, Беденгіамь. BEDE. Melongena, Мелонгена.

10

BEDENVTI, Беденути. Смотри Chamomilla, Хамомилла.

BEDER ÆBINA, Бедерь эвина. Смотри Basilicum, Базиликумъ.

BEDERAMBONA, Бедерамбона. Смо-

BEDER AMBULA, Бедерамбула. Смо-

три Basilicum, Вазиликумь.

BED

BEDERECH, Begepexb. Cmompu Eruca, Dpyna.

BEEN, Беень. Смотри Венеп, Бегень. ВЕЕN ALBVM, Беень альумы. Смотри Paftinaca domestica, Пастинака доместика.

CMOMPH Ben, Behb.

ВЕЕМ PARVUM, Беень парнумь. Смопри Веп. Бенъ.

BEEN RVBRVM, Беснь рубрумь.

BEEN RVBRVM CORDI ET OFFIC. Беень рубрумь Корди эть Оффиц. Смо-

три Pyrola, Пирола.

BEGONIA OBLIQUA Linn I. Бегоніа, овликиа, есть Американское расшеніе, бывающее двухъ родовъ: мужеское и женское и имъющее былые, у мужескаго изъ четырехъ безчашечных в, а уженского из в пяпи листочков в составленные и на подобіе зв вздки расположенные цвъты, укоих в зародышь заступаеть мъсто чашки, и которые послъ спаденія превращающся въ шрехъгнъздныя съмяно-Аержашельницы. ГосподинЪ Линней полагаеть его въ ХХПІ. классь разнополых в растеній, коихъ мужескіе цвёты раступь съ женскими отдъленно. (Polygamia monoecia). Πο Γρεчески Βεγονία φυτον της 'Αμερικής; πο Ивмеции Begonia in America; по Францу-Chu Begonia, plante de l' Amerique; no Mmaміански Begonia pianta dell' America; по Arмиски Begonia, an American plant.

BEGVQVELLA, Бегукпелла. Смощри

Гресасианна, Инекакуанна.

BEHEN ALBYM Offic. Berenb ansymb. Rauwolfii. I. B. m. 36. Chab. 448. Yacma I. Serratulae affinis capitulo squammoso luteo, vt et flore, C. B. 235. Scorzonerae affinis Behen album dicta, radice repente, Hist Oxon, III. 84. Silene Behen. Linn. Бълый Бегень есшь длинный и вЪ палецЪ толстый корень, который привозится кЪ намЪ сушеный сЪ ЛиванскихЪ горЪ и изЪ других в мъсть Россіи, и имъеть снаружи шемно-стровашый, а внушри бълесовашый цвЕть и горьковатый вкусь. Онъ укрытаяеть, остонавливаеть дрожание вы членахы и прошиводъйствуеть яду, но въ Аптекахъ рѣдко имѣешся. ГосподинЪ Линней полагаешЪ его въ Х. классъ расшеній имъющихъ въ своемЪ цвЪшЪ десянь шычковЪ и одинЪ пестикъ (Decandria Digynia). По Гречески Веует Ленкой; по Ивмецки Вей Верен; по Француски Behen blanc; по Ишаліански Ве. hen bianco; по Аглински White Ben.

BEHEN ALBUM Berenb ansymb. Behen Album Monspelianum et Officinarum Merc. Bot. 1. 23. Phyt. Brit. 14. Been albam officinarum I, B. III. 356. Lychnis sylvestris, quæ Been album vulgo. C. B. Pit. Tournet. Been Album Polemonium, Dod. Papaver Spumeum XXVII Балый Бегень, или Морская Уптиная трапа, расшеть вы шеплых в странах в и цв втешь вы Іюль м всяць. Сіе растеніе им веть б влый волокнистый корень, производящій круглые, нѣжные, на колвицы раздъленные, полосочками испещренные и кЪ верьху на въточки раздъляющеся и горьковашый вкусь имъющіе спебли въ десяпь и двенадцать верьшков вышиною, которые на вершинъ своей украшаются прекрасными, изъ пяти на подобіе гвоздички расположенных в, либо красноватых в, либо былыхь, или было пурпуровых источковь составленными и пурпуровые молоточки внушри имбющими цввшочками, въ срединъ коих в находишся маленькая коронка или пучечикЪ, составленный изъ окружающихЪ каждый цввшный лисшокь шрехь или чешы. рехь колосочковь. Сін цввиючки поддерживающся продолговащыми и круглыя съмячки

вь себь содержащими чашечками. Двиспрыемъ своимъ сходствуетъ корень сего растенія съ краснымъ Behen rubrum, Бегенъ рубрумъ, съ которымъ и въ одинъ классъ полагается. По Гречески Взусу Асикой, по НБмецки Weik Behen oder Wiederstoß; по Француски Been blanc; по Италіански Been bianco; по Аглински White Ben; Spatling

or Frothy Poppy.

BEHEN RVBRVM, Eerenb pyspymb. Красный Бегень расшеть вы приморскихы теплых в странах в и цевтеть вы Іюнь мъсяцъ. Корень у нее красный привозишся къ намъ сушеный на подобіе Ялаппы кусками и производить блёднозеленье и мяхкіе листья, из в средины коих в возвышающся длинные стебли укращающіеся на вершинъ своей красивыми красными, на подобіе гвоздики расположенными и попарно растущими цвѣточками. Бѣлый и красный Бегень содержащь въ себъ много соли и масла, укрвиляють, прошиводвиствують яду, умерщваяють глисты, умножають съмя и унимаюшь кровошечение и судорожныя движенія или конвулсіи. Лучшіе корентя долж ны бышь толсты, чисты, крёпки, не червяточны и горьковато остраго вкуса. В В Апте ках в им вюшся коренья употребляемые в в составленіях Б Теріака. Господин Б Линней полагаешь ихь въ Х классь имъющих въ своемЪ цвътъ десять пычковъ и три пестика. (Decandria Trigynia.) а Господинъ Турнефортив въ VIII. классь, въ I ощделение, во II родъ правъ съ многолистнымъ на подобіе гвоздики расположеннымЪ цвѣтомЪ. по Гречески Веуеч вогврой; по Ивменки Яптвет Weben oder Wiederstoß; по Француски Веhen rouge; по Ишаліански Behen roffo; по Аглински Red Ben.

BEHEN RVBRVM OFFICINARYM, Бегень рубрумь Оффицинарумь. Смотри Limonium, ЛимоніумЪ.

BEIDELSAR, Bengencaph. n BEIDEL OSSAR, Bengenb Occapb. Смощри Аросупит, Апоцинумь.

BEIVCKA, Беюкка, есль Американ. ское расшение, которое обвивается около встав близь его стоящих в предмётов в, даже о. коло высочайших в деревв и спюль гибко и кръпко, что употребляется Индіанцами на дъланіе веревокъ и канашовъ. По Гречески Ве-Ι'έππα φύτον της 'Αμερικής; πο Η ΒΜετικи Βείμικα, Иffante in Umerica, по Француски Вејиска plante de l' Amerique; по Ишаліански Вејиска, pianta dell' America; по Аглински Вејиска; an American plant.

BEIVCOS, Беюкось Смотри Веіиска,

BELADAR, Benagapl. Смотри Anacardium, АнакардіумЪ.

BELBALIDVS, Бельалидусь. Смотри

Alkekengi, Алкекенги.

BELCHON, Белхонь. Смотри Bdel-

lium, БделліумЪ.

ВЕЦЕА, Белеа. Ярина родъ ржи.

BELEAVCVS, Beneaukych. CMompa Dipfacus, Auncakycb.

BELENGESIE, Benenzecie. CMompu Ar-

themisia, Apmemucia.

BELESAN, Белезань. Смотри Balla тит, БалсамумЪ.

BELIAT, Beniamb. CMompu Galbanum,

Галбанумь.

BELINVM, Beautymb. Cmompu Api-

um, Aniymb.

BELIOCANDAS, Benioxangach. CMO. три Millefolium, МиллефоліумЪ.

BELION, Benionb. Cmompu Primula

veris, Примула верись.

BELIRE, Beaupe. Смотри Pyrethrum,

Пирешрум в.

BELISSIS, Bennecneb. Cmompu Coral lia, Коралліа.

BELLADONNA Linn. Bennagonna.

Смотри Amaryllis, Амариллись.

BELLADONNA Clul. Pan. 504. Elem. Bot. 68 Raii. Synop. m. 265. Dill. Cat. Giff. 143. Pit. Tournetorr. Белладонна. So. lanum lethale, Offic. Ger. 269. Solanum Me-

lanocerasus, C. B. Pin. 166. Solanum maniacum, Chab. 523. Solanum / somniferum, Merc Bot. 1. 70. Solanum furiofum. Pluk. Almag. 252. Atropa Belladonna. Linn. IV. Сонь, Сонная трана, Сонная Одурь, Песын или Бъщеныя Вишни, Черныя Псинки, Вътренныя ягоды, Сонный Аурмань, а по переводу Красапица трапа, растепь въ лесахъ, на твистыхъ мъстахъ, возлъ спънъ и въ разгалинахъ, и цвв шеть въ Іюнь и Іюль мъсяцахъ. Она имбешь нёсколько шолсшых крутлых в выпьисных в мохнашых в краснойэкдэтэ бхизтинаварт и бхизти-отвя въ аршинъ и болъе вышиною, которые окружаются большими продолгованю-круглыми, цъльными, мягкими, широкими, мошкомъ покрышыми и на лисшья псинокъ (Solanum) похожими черно-зелеными листьями, изъ стебельковъ коихъ вырастають темнопурпуровые, однолисточные, на пять зубчиковъ въ верьху връзанные и на подобіе колокольчика расположенные цвёны, о пяши молоточкахЪ, которые поддерживаются маленькими, зубчаными и подобје кувшинчика имъющими чашечками, превращающимися послё спаденія цвётовъ въ черныя, лоснящияся, круглыя, двугивздныя и величиною клубник подобныя ягоды, наполненныя внутри соком в и продолгевапыми съмячками. Корень у нее длинный, поленый, бълесованый и въщвисный. Сія права бываенъ различныхъ родовъ, копорые однакож в различествують между собою только цввтомь и листьями, кои у одних в большіе, нежели у других в. Есв Роды содержанъ въ себъ много масла и Автучей соли, и употребляются только наружно, потому что ядовиты, причиняють смертельный сонь и лишають чувствь будучи употреблены внутренно. Многіе ученые врачи совъщующь такимь пещастнымь чемедленно дашь рвошное, а пошомъ поишь ях в уксусом в. Наружно упошребляющь ее для Разбиванія тугих Бопуколей, для униманія боли

возбужденія сна и ошь воспаленія наружныхь часшей шъла. Въ новъйшія времена ввель Гооподин в Алберти употребление се внутрь отв рака. ВЪ АпшекахЪ ее ничего не им вешся. Белладонна есть Италіанское имя значущее красаницу, котпорое дано сему растенію чаятельно для шого, чшо въ старину дълывали женщины изЪ него воду для умыванія рукЪ. ГосподинЪ Линней полагаеть его въ V. Классь растений имъющихъ въ своемъ цвътъ пять тычковъ и одинъ пестикъ (Pentandria Monogynia) а ГосподинЪ Турнефорнъ въ І. классъ, въ I. от двление, во II. родь травь сь однолисточным в колокольчистым в пвытомы, которато чашечка превращаемся въ ягоду. Πο Γρεчески Στεύχνος Θανατώδες; νω Στρύχvos Bavarinov; no Hismenku Baid Nachischat= ten : Todlicher Machischatten; Doll = Wurt; Schone Frau; по Француски Belle Dame или Morelle mortelle; по Иппаліански Belladonna; по Аглински Deadly Nightshade, or Dwale.

BELLEGV, Bennery. u
BELLEGV, Bennery. u
BELLEREGI, Benneperu. u

BELLIDIASTRVM, Беллидіаструмь. Смотри Doronicum, Дороникумь.

BELLERICI, Беллерици. Смотри Муrobolani, Мироболани.

PELLINVNTIA, Беллинунціа. Смої шри Нубория, Гиссопусь.

BELLIRICÆ, Беллирице. Смощри Муrobolani, Мироболани.

BELLIS, Беллись. Bellis minor. Matth. Bellis perennis. Linn. Bellis fyluestris minor. С. В. Pit. Tournesort. Bellis syluestris minor spontanea. І.В Solidago consolidæ species. Bruns. VIII. Мартаритка; Стократь, Стоцивть, Скоросивлки; Бельцы, Сердечная трана или Баржатый цивть, есть прозимующее цвёточное многихъ родовь, какъ то большое, малое, махровое и одинакое бывающее произрастене, изъ коихъ большое бёлое растеть на лугахъ и травянистыхъ мъстахъ

и имбеть прямостоящіе, длинные, высокіе и жестковатые стебли, продолговатые, вокруг в нъсколько зазубленные лиспия, и во все авто пребывающие, кругаме, зоасто желиый кружек в в средин в им вюще и изъ многихъ бълыхъ, длинныхъ, вокругъ около онаго сидящих в и остроконечных в листочковъ состоящие цвъточки; большое горное съ жесткими, и большое горное съ копьевидными лисшьями растушь на гориспых вышень и опричающих опр вышен описаннато сорта своими листьями, а малое и махровое сажающся въ садахъ, и цвъніушь сь Апрёля мёсяца во все лёто. Они служать вь разсуждении красопы пвътовь своижь ко украшенію и обсаживанію въ садах в цв в тиков в и им в ю тв маленькіе, гладкіе, продолговащые, по землів лежащіе, у иных в сортов в цальные, а у дру тих в св мвленкою высвчкою листочки, из в средины коихЪ возвышающся длинные. тонкіе, круглые, зеленожелтоватые, безлисточные стебелючки, укращающеся на вершинъ своей круглыми и изъ многихъ перистых в листочков в на подобіе зв влядки составленными цвЕточками, которые быва ють былые, щемно или півлесно красные, съ бёлымъ, иногда но весьма рёдко желтые и другь изъ друга вырастающее. Посль цвышовь оказывающся мыленкія. продолговато-круглыя, и пушистыя съмячки. Корешки у нихъ маленькіе и обвъщены многими тонкими волокнами. Маргаритка содержить въ себъ много масла, влажносии и соли, прохлаждаеть, грветь, сушишь, укранляеть, унимаеть понось и мочечуй и полезна от рань и воспаленія въ глазахъ. Есшьми кто разгоречась выпиль что нибудь холоднаго, то совътують для предупрежденія худыхь следеньь жеть и употреблянь ея листья. Трава и цвтть составляють хорошое слабительное для малых В д втей, гонять мочу, разбивают В мопрошы в в груди и полезны от в кашлю, чахопки и болъзни легкаго и селезенки. ВЪ АпшекахЪ имъетися трава или красные цвъты, изъ оныхъ перетонная вода, Эссенціа или настойка съ передвоеною водкою, сиропъ или съ сахаромъ взвареный цвъшный сокъ и консервъ или конфектъ, къ приготовлеберется полфунта нію котораго товъ и фунтъ сахару. Беллисъ и Солидато сушь Лашинскія имяна и происходяшь перы вое от слова (Bellus, Беллусь) прекрасный по причинъ красошы цвъщовъ сего расшенія, а второе (Solidare, Солидаре) исцълять, пото му что вЪ разсуждении клеистаго своего сона стягиваеть раны. Господинь Линней полагаешь его въ XIX. Классь расшеній, въ цев. шахъ коихъ шычки соединены въ цилиндръ и связаны веерьху шычковыми головками или шляпками (Syngenesia) а Господинъ Турнефорть въ XIV классь, въ III отдъленіе, вЪ I родъ правы съ многолисточным цвѣшомъ и пушисшымъ сѣмянемъ. По Гречески 'Avespis; по Нъмецки Daslieben Causendschon; Marien, Ofter, Monathe odel Ganse-Blumen; по Француски Paquerette ou Pasquette; по Италіански Beli o Carbina; по Аглински Daisie, садовая Garden Daisie, а дикая или маленькая Field Daifie.

BELLIS AVREA, Беллись апред. Смотри Buphthalmum, БуфталмумЪ.

BELLIS COERVLEA APVLA,

лись церупеа Апупа. и

BELLIS COERVLEA FOLIOSO CAV. LE, Беллись церулеа фоліозо капле. и

BELLIS COERVLEA GLOBVLARIA! Беллись церулеа глобуларіа. Смотри Glo bularia, Paceyaapia.

BELLIS FLORE RVBRO, Benauch

флоре рубро. и BELLIS HORTENSIS, Bennuch 100'

гпенсись. и

BELLIS HORTENSIS, FLORE PLENO, EOQVE MAGNO VEL PARVO. Bennauch тортенсись, флоре плено, еокпе матно BELпель парио. и

HORTENSIS MVLTIPLICI BELLIS FLORE ALBO, Beanuch ropmencuch myaтиплици флоре альо. Смотри Bellis, беллисЪ.

BELLIS INDICA MAXIMA AVTVM-NALIS Maur. Hofm. Беллись Индика максима аптумнались. Смотри Сопуга, Кониза.

BELLIS LVTEA, Bennuch nymea. Смотри Chrysanthemum, Хризантемумъ.

BELLIS LYTEA FOLIIS PROFVNDE INCISIS, Беллись лутеа фолінсь профунде инцизись. Смотри Caltha, Калта.

BELLIS MAIOR, Bennuch maiopb. Смотри Leucanthemum, Левкантемумъ.

BELLIS MEDIA, Bennich megia moxb. BELLIS MINIMA, Bennuch минима. и BELLIS MINOR, Bearneb минорь. Смотри Bellis, БеллисЪ

BELLIS MINOR FLORE COERVLEO, Веллись минорь флоре церулео. Смотри

Globularia, Глобуларіа.

BELLIS MINOR HORTENSIS FLORE ALBO RVBRO ET VARIEGATO, Bennuch минорь гортенсись флоре альо рувро еть париетато. Смощри Bellis, Беллись.

BELLIS MONTANA FRYTICOSA, Беллись монтана фрутикоза. Смотри Caltha, Kanma.

BELLIS PERENNIS Linn. Bennuch neреннись. Смотри Bellis, Беллисъ.

BELLIS PLINIANA, Bennuch Плиніана. и

BELLIS PRATENSIS, Beanuch upaтенсиов. Смотри Consolida, Консолида.

BELLIS SYLVESTRIS MINOR, Benпись силиестрись минорь. Смощри Bellis,

BELLIVM, Benniymb. Cmompu Bellis, беллисЪ.

BEILIVM MINVS, Benniymb munycb. Смотри Leucanthemum, Левкантемумb.

BELLOCANDIVM, Bennoxaugiymb. Смотри Millefolium, МиллефоліумЪ.

BELLONIA ASPERA Linn. Беллоніа аспера II. Беллоніа еспів Американское высоко растущее растеніе, им вющее длинные, гладкіе прупыя, сизозеленые и МелисснымЪ подобные лисшья и круглые цвёты, оставля. ющіе по спаденіи одногивздныя свиянодержашельницы. ГосподинЪ Линней полагаетЪ его вb V классь расшеній имъющих вь своем в двътъ пять тычков и одинъ пестикъ. (Pentandria Monogynia). По Гречески Βελλόνια, δενδρύδιον 'Αμεριχανόν; по Нѣмецки Die Staudigte Bellonia mit dem Mes liffen-Blatt in Umerica; по Француски Bellonia, plante d'Amerique; по Ншаліански Bellonia pianta dell'America; по Аглински Bellonia an American Shrub.

BELLVEDERE, Bennuegepe. CMompu Scoparia, Ckonapia.

BELMVSCVS, Beamyckycb. Cmompu Semen moschi, СеменЪ моски.

BELOCVLO, Benoxyno. CMompu Ipecacuanha, Ипекакуанга.

BELSATI, Bencamu. CMompu Aconitum, АконипумЪ.

BELSOPH, Белзофь. и BELZOE, Bensoe. u

BELZOINVM, Bensounymb. Cmompu Benzoinum, БензоинумЪ.

BEMASTRVM, Бемаструмь. Смотри Arthemisia, Артемизіа.

BEMEDATO, Бемедато. Смотри Carduus Mariæ, Кардуусъ маріе.

BEN, Benb. Ben parvum Monardi. Granum Ben. Lon. Glans Vnguentaria. Matth. & Hort. Farn. Balanus myrepsica, Pharagon inco. lis ad montem Sinai, Bellon, Nux Vnguentaria I. B. Nux Zeylanica', siliqua triangula, seminibus alatis, Herm. Parad. Bat. Prod. 357. Cat. Hort. Lugd. Bat. 692. Arbor exotica Lentisci folio. C B. Pin. 399. Moringa, Ferr. Flor. Cult. 385. Park. Theat. 1650. Katumurungha, Herm. Mus Zeyl. 62. Lignum nephriticum, Rech. in not. ib. Lignum peregrinum aquam caruleam reddens. C. B. Pin. 416. II. By-

Kulleb

жишь, есть высокое Азіатское, на Финиковое похожее, внутри твердое, но мало извъстное дерево, которое имъетъ темножелный цабть, Масшичнымъ подобные листья и дёлаеть воду синею, естьли кусокъ онаго въ нее положинь. Сіе дерево приносить продолговатый, треугольный или вь прехъ углахъ возвышенный и тонкою, довольно нъжною, гладкою, либо сърою, либо бълою скорлупою обведенный оръхъ или плодъ съ простый оръхъ величиною, называемый Баласть или Бень и заключающій въ себъ бълое, масличное и вкусомъ сладковатое зерно. Сей плодъ привозится къ намъ изъ Аравіи и доугихъ спранъ Азіи. Изъ него выжимающь масло, которое называется по Латынъ Oleum Balaninum, Олеумъ Баланинумъ, и имъетъ предъ другими то преимущество, что старъясь, не портипися. Внутренное зерно слабить, разбиваеть, сушить, производить рвоту, причиняеть біеніе сердца, выгоняеть низомЪ или чрезЪ нижнее испражнение и чрезЪ рвошу желчныя и клейкія мокрошы и употребляется внутренно, но весьма ръдко въ количествъ помовины драхмы, или полъ золошника. Выжатое из в него масло употребляется наружно от в коросты, и всякой другой нечистоты на тьль, и вмышивается въ составы разныхъ благовонныхъ мазей и масль. Еспь еще другій родь сего плода, который вышеписаннаго гораздо больше, называется у Монарда Большій Бень или слабительный оръхъ (Avellana purgatrix, Авеллана пургатриксЪ), и привозится къ намъ изъ Американскаго и Франпузамъ принадлежащаго острова Св. Доминика. Онъ сильно слабишь, причиняещь рвошу и употребляется Индіанцами внупренно въ количествъ отъ половины до пъ. лаго золошника отъ жестокой и отъ спершихся вътровъ произшедшей колики; сей плодь, будучи изжарень, твряеть свои силы. ВЪ АпшекахЪ они не имъются. По

Гречески у Аристошеля, Μυροβάλανος, а у Артемида Кысым; по Арабски Been; по Малабарски МонрингонЪ; въ Цеилангъ Кашумурунга; по Индіански КоапплЪ, и Тлапалецъ Пашли; по Нъмецки плодъ Сав: Mußlein, или Ben = Muß; по Француски La Noix de Ben; по Италіански Noce di Ben; по Аглински The Ben-Nut; Nephritick Wood

BEN IVDÆVM, Бень юдеумь. Смо-

при Benzoinum, Бензоинум b.

BEN MAGNVM, Benb Mathymb. Смотри Веп, БенЪ, и Ricinoides arbor Americana, Рициноидесь арборь Американа

BENEDICTA, Бенедикта.

Caryophyllata, Каріофиллата.

BENEGVM, Benerymb. Cmompu Hyos. cyamus, Fiocuiamycb.

BENERAU, Benepay. Cmompu Verbena,

Вербена.

BENEVINVM / Бенешинумь. Смотря Вепгоінит, БензоинумЪ.

BENGENEST, Benrehecmb. CMOTTOPA

Agnus castus, Arnych kacniych.

BENGIS, Benruch. CMompu Hyolciamus, Гіосціамусь.

BENILLI, Бенилли. Смотри Vanilla, Ванилла.

BENIVM, Beniymb. n

BENIVI, Бенипи. Смотри Вепгоіпит, БензоинумЪ.

BENZO, Бензо. Смотри Hobus, 100 бусЪ.

BENZOE, Benzoe. Cmompu Benzoinum, БензоинумЪ.

BENZOENIL, Бензоениль. Смотри Convolvulus Indicus, Конвольулусь ИндикусЪ.

BENZOES, Bensoech. M

BENZOIN, Бензоинь. Смотри

BENZOINVM Matth. Bensounymb. Benzoinum Officinarum. C. B. Benivi, Garz. Belzoe, vel Belzoim, vel Belzuinum, vulgo, Lugd. Benzoum, Benzoi, et Ala dulcis. Cord.

Hift. Ben Judaeum, Ruellio, Benevinum, Linscot, Laurus Benzoinisera, Linn. Arbor Benzonifera, Breyn. Prod. 11. 16. Arbor Virginiana Pilaminis folio baccata, Benzoinum redolens, Pluk. Almag. 41. Phytog. Tab. 139. 1. 3. d. 4. Arbor Virginiana Citriae vel Limoniae folio Benzoinum fundens, Hortus, Amstel. i. 187. f 97. Beniui Garziae, Clus, Ехог. 155. 111. Росный Ладонь или Бен. зупнь, если благовонная смола, исшекающая изъ большаго, толстаго и вътывисщаго дерева называемаго БелзофЪ и ростущаго въ Индіи, въ Сіамъ, въ Сумапірь, и на Молуккских в островах в. Дерево сіе кръпко, походить на Лавровое и имветь цвльные и лимоннымв подобные метья, кромъ того только, что не столь зелены и меньше; и бълые изъ шести меточковъ составленные цвѣты и приносишь маленькія, круглыя односъмянныя ягоды. Индіанцы не дають ему долго стоять, ибо какъ скоро дереву шесть мыть, то они оное срубають и сажають каждый годъ съмяна, изъ коихъ вырастають новыя. Бензуинь по мивнію Гоеподина Нейманна не есть Гумми, а твер-Аая, сухая, либо бѣлая, либо шемная, момкая, лосиящаяся, легко возгарающаяся прозрачная, и чрезъ здъланныя насъчки вышекающая, но пошомъ вскоръ засыхающая смола (Refina) или клей благовоннаго запаха, особливо будучи зажжена и смолистаго вкуса. Молодая им веть бълый, во еспьми постоить нъсколько времени на воздухв, то получаеть съроватый, а иногда красновашый цвБшЬ. КЬ намъ привъ праснованым цвънго и сущеную вь толстых в кусках в. Жидкая должна быть чиста, свътля, прозрачна, красноватаго цвъта и Ароманическаго пріяннаго запаха; а привозимая въ кускахъ чиста, ломка, смолиста, смъщена съ большими бълыми крупинками, желпо - бълаго краснъющаго цвъща и благовоннаго

запаха. Она состоить изъ масленыхъ кисло соленых в и нъжных в земленых в частиць, разбиваеть, разжижаеть, прошивод висшенеть яду, укрыпляеть мозгь, чистить кожу, прошивится Антонову огню, исправляенть воздухь и полезна опть рань, оть одышки и оть бользней легкаго и груди, ИзЪ шинктуры или такЪ называемаго дъвичьего молока можно дълань хорошія румяна и куришельные порошки. Распущенный въ яичномъ бълкъ или въ винномЪ спиртъ росный ладанЪ прогоияетъ оспіавшіяся посл'в фрянок в на шіль пяшна. Женщины мішають его съ Стираксомь, толкуть потомь на мълко и наливъ Француской водки, двлающь для умыванія шинкшуру, и кладушь нісколько капель оной въ чистую колодную воду, естьли умывають лицо, поному, что дълаешь кожу чистою и нѣжною. Наружно сія смола утоляеть зубную боль, сгоняеть съ лица веснушки, унимаеть частое чиханіе, мъщается въ духи и употребляется въ великомъ множествъ въ куреніяхъ, особливо въ перьквахъ. Имъющимъ сухій кашель не должно онаго употреблянь. ВЪ АнтекахЪ имвения ладанв, шинкшура или шакв называемое, дъвичье молоко и Магистеріумъ. ГосподинЪ Линней полагаетъ испускающее оный дерево вЪ IX. КлассЪ расшеній, имъющих в в цв в своем в девять тычков в и одинЪ пестикЪ (Enneandria Monogynia). По Гречески Ушири дона; по Нъмецки Деплоіп Вант, а смола или ладонъ Вензое, Венjoin или wohlriechender Affant; по Француски дерево Arbre donnant le Benjoin, а смола Benjoin; no Италіански Belzoino; no Arлински дерево The Benjamin, tree; а смола Benjamin, an arcmatick Gum.

BENZOINVM AMYGDALOIDES, Benzoinum, Fensouhymb.

BENZOVM, Bensoymb, momb.

BEONA, Беона. Смотри Faba, Фаба.

BEPOLE, Benone. CMompu Nimbo, Humbo. BER seu Bor. Garz. Acostæ. Bepb, Rhamnus Oenopoia Linn. Iujuba medica, malus gniensis non spinosa. C. B. Ber Indica fructu jujubico. 1. B. Ber in Todali. Hort. Malab. Zizyphus Zeilanica argentea, spinis carens, Parad. Bat. Prod. 386. Берь, Баніанское или Коренное дерево есни высокое Индіанское, въ Азіи, въ Малагь, Малабарь, Балатать, Малагь и Сурать растущее дерево, которог имъсть больше, съ верьху темнозеленые, съ низу бъловащые, мохнащые и на Яблонные (Malus, Малусь) похожіе листья вязашельнаго вкуса, и маленькіе, бълые изъ пяши листочковъ составленные и непахучіе цевшочки, послів коих вырастаеть множество красноватых в и никогда совершенно не созрѣвающих в ягодв, изв коих в иныя больше других в и им выш в пріятный вкусь. Кореннымъ деревомъ прозвано оно пошому, что въшеи его нагибаются, легко пускають отростки, и производять другія въшви, шакъ чию случаения иногда, что одно дерево, которому дали волю расшириться, занимаеть немалое пространство земли. Автомъ сіе дерево покрывается совсёмь нёкоторымь родомь летучихь муравьевь, которые на его вътвяхь дълають лакь, о которомь описавіе смотри вь главъ о Гумми Лакце, Gummi Laccae. Яго. ды вяжушь, а лисшья укрыпляющь и уни мають понось. Господинь Линней полагаеть сіе дерево вЪ V классЪ растеній, имѣющихЪ въ своемъ цвъть пять гвоздковъ и одинъ пестикъ Pentandria Monogynia), По Гречески Вер, καί δένδρον έηζώδης; πο Ηπωσικά Zer, ein Zaum in Off-Indien; Laccas Baum; по Француски Ber est une espêce de Jujubier ou un grand arbre des Indes: по Ишаліански Ber, albero del India orientale: по Аглински Ber, the great Indian tree. or the Lacca trée. ВЪ Малабаръ Періу-Тоддали, Periu Toddali, а на островъ цейланъ Велембълле, Wælæmbillæ.

BERA PASTORIS, Bepa nacmopuch. Смотри Burla Pastoris, Бурса пасторисъ.

BERASBOLA, Берасвола, Невареная права, мив не известна.

BERBENA, Бербена. Смотри Verbena,

Вербена.

BERBERIS. Brunf. Beprepuch. Berberis dumetorum, C. B. Pit. Tournef. Berberis vulgaris Linn. et Bellon. Oxyacantha Galeni Cam.. Oxyacantha Hermolao Ruell. Spina acida, five Oxyacantha. Dod. Crespinus Matthioli, Cæsalp. V. Барбарись или Бал варись, есль довольно извъстный кустар никЪ или маленькое колючими итлами обсажей ное, внутри желтое, ягоды приносящее и завей въ однихъ только садахъ растущее деревно лозы, котораго покрыты тонкою, гладкою и цвЕтомъ темноватою корою и окружены маленькими, зубчатыми, не много жести ми, продолговато - круглыми, черенястыми и зелеными листыями кислаго вкуса и мно жествомъ маленькихъ, изъ шести желтыхъ и на подобіе розона расположенных в дисточковъ составленныхъ, по нъскольку вмь стъ кисточками растущихъ и изъ шест листочной чашечки выходящих в цв в точков в послъ коижъ вырасшающъ красныя, про долговато - круглыя, нѣжныя, сокомъ пре исполненныя, на вершинъ черное пяшныши имъющія, въ Августъ поспъвлемыя, а в Сентябръ собираемыя, на стебелючках в пверждающіяся и киспочками висящія прі яшно - кислыя ягоды, заключающія въ се бъ каждая по два кръпкія, продатоващья сизокрасныя съмячка. Корни у Барбариса дре еесоваты, внутри желты, и далеко faculo страняющіяся. Въ Медицинъ употребляющ ся однъ ягоды, копорыя содержанів высе бъ много соли и масла, укръпляющи желудокъ и печень, возбуждающь пешишь, унимающь понось и почечуй прохлаждають, утоляють жажду и полед ны от желчи. Сок в от вареных в сахаръ ягодъ мъщающь либо съ водов либо съ овсяною кашицею и пьющь го великою пользою для унятія жара б рячкахв

Рачкахъ и утоленія великой жажды. Мноте собирають листья и пьють ихв вмъсто чаю. Корень сущать, толкуть и размъшавь вь теплой водь дають скоту пишь оть мыту. Ягоды варять въ сахаръ какъ очищенныя ошъ съмянъ и безчерешныя, такъ и кисточками. Въ Аптеках в им вется сироп в и в в сахар в вареныя ягоды. Еспь еще особливый сорть Барбарису, который привезень къ намъ изъ Канады, называется по Латинъ Berberis Canadensis latissimo folio, или Кандійскій широколистпенный Барбарись; и различествуеть от выше описаннаго только въ шомъ, что листья его гораздо ширъе, и ягоды крупнъе. Беръерисъ есть Арабское имя, а Оксіаканта Греческое, которое произходишь от словь Обіз, Оксись, кислый, и Анажа ятода, и означаеть кислую вкусомъ ягоду. Господинъ Линней полагаетъ Барварись въ VI. классъ расшений, имъющих в в своем в цввтв шесть тычков в и одинъ пестикъ (Hexandria Monogynia) а Господинъ Турнефорт въ XXI классъ, во II. отдъление, въ IV. родъ деревъ и кустарниковъ съ многолисшнымъ цвътомъ, которато пестикъ превращается въ ягоду. По Гречески 'Οξίακανθα; по Арабски Berberis; по Нъмецки Berberis; Berfing, Saur-Dorn, Deinschedel; Reisselbeer; по Француски Кустарникъ Vinetier; а ягоды Epine-vinette; no Италіански Crespina; по Аглински The Barbery, or Pipperigde bush.

BERBERIS CANADENSIS LATISSIMO FOLIO, H. R. P. et Pit. Tournef. Eepseрись Канаденсись латиссимо фоліо. и

BERBERIS DVMETORVM, Берберись Эчметорумь. и

BERBERIS VULGARIS, Берберись пулгарись. Смотри Berberis, Берберись.

BERBETINVS FRVCTVS, Бербетинусь фруктусь. Смотри Сасао, Какао. BERBILLVM, Беренллумь. Смотри Scrpillum, СерпиллумЪ.

Часть І.

BERCHIDIES, Bepaugiech. CMompu Parietaria, Hapiemapia.

BERICH, Bepuxb. CMompu Hyoscyamus,

Гіосціамусь.

BERILE, Bepune. CMompu Pyrethrum, ПиретрумЪ.

BERILION, Бериліонь. Смотри Primula veris, примула верисъ.

BERILIS, Bepunuch. Cmompu Coralli-

ит, КоралліумЪ.

BERMVDIANA IRIDIS FOLIO MA-IORI, FLORE COCCINEO PVNCTATO Krauff Бермудіана Иридись фоліо маіори, флоре кокцинео пунктато. и

BERMVDIANA IRIDIS FOLIO MA-IORI, FLORE CROCEO ELEGANTISSI-MO PVNCTATO. Бермудіана Иридись фоліо майори, флоре кроцео элегантиссимо пунктато. Смотри Ixia Chinensis Linn. Иксія ХиненсисЪ. и Sifyrinchium Linn. СисиринхіумЪ.

BERNARDA, Бернарда. и

BERNARDIA, Bephapqia, Adelia Bernardia Linn. Бернардіа, Американское, особливо на островъ Ямайкъ растущее, но мало извъсшное расшение, имъющее продолговашые, на подобіе пилы врвзанные, и мохомЪ покрышые лисшья, и бывающіе двухЪ родовь, мужескаго и женскаго, изъ коихъ первый имвешь на шри части раздвленную цвътную чашечку и въ оной нъсколько къ основанію приросших в пычков в, а вторый на пяпь частей разд Бленную чашечку и трех в гн вздныя капсули. Господин В Линней полагаеть ее въ ХХП классь растеній особо мужескіе оть женских в растущих в и у коих в в в мужеских в пвытах в находящеся шычки внизу сраслись въ одну кучку вырасшаюшь как в брашья из водного основанія (Dioecia, Monadelphia) По Гренески Ведопрова, Амедиканой виточ;по Нъмецки Bernardia, eine Pflanke in Ume= rica; по Француски Bernardia, plante de l'Amerique; по Италіански Bernardia, pianta dell'Ameтіса; по Аглински Bernardia, an American plant. BERS

BERS, Bepch. Cmompu Diplacus, Aun-

BER

BERVLA, Bepyna. Cmompu Beceabunда, Беккабунга.

BERVLA MINOR, Берула минорь. Смотри Anagallis, АнагаллисЪ.

BERYLIVM, Бериліумь. Смотри Апетопе, Анемоне.

BESACHA, Besaxa. CMompu Fungus, фунгусЪ.

BESASA, Besacc. Cmompu Harmala, Гармала.

BESCARCOTON, Бескаркотонь. Смотри Psyllium, ПсиллліумЪ.

BESER ALCHITE, Besept Anxume. Смотри Semen Lini, СеменЪ Лини.

BESER ALCHOSARET, Beseph Anхозареть. Смотри Semen Dauci, СеменЪ Давци.

BESER ANDEBE, Besept Angere. CMOтри Semen Scariolae, СеменЪ Скаріоле.

BESICALIS, Besuxanuch. CMompu Filipendula, Филипендула.

BESLERIA LVTEA Linn. Besnepia nyтеа. III. Желтая Безлеріа, есть Американское, ягоды приносящее, но мало извёстное растеніе, которое им веть темно - зеленые копье - видные листья, и желтые, изЪ маленьких в на пять лапочек в разризанных в чашечекъ вырастающие цвъты, оставляющіе послів спаденія продолговатю - круглыя и многими мъленькими съмячками наполненныя ягоды. ГосподинЪ Линней полагаетъ оное вЪ XIV. классъ растеній имъющихь вЪ своемъ цвътъ четыре тычка, изъ коихъ два ближніе длиниве других в двух в (Didyпатіа). По Гречески веодерій, 'Αμερικανόν θυтой; по Нъмецки Die Bestevia in Westindie en: по Француски Besseria, plante de l'Amerique, по Италіански Besleria, pianta dell'A. merica; по Аглински Besseria, an American plant.

BESTEGENASTEN, Бестегенастень. Смотри Capillus Veneris, Капиллусь ВенерисЪ.

ВЕЅТЕЅЕМ, Бестесемь. Стопри Dipfacus, Дипсакусь.

BESTORCOTHON, Бесторкотонь. Смотри Pfyllium, ПсилліумЪ.

BESVSTIDOS, Besycmugoch. Cmompa Nymphaea, Нимфеа.

ВЕТА, Бета. VII. Спекла.

BETA ALBA Matth. Bema And. Beta candida. I, B. Dod. Beta alba vel pallescens quae Cicla officinarum. C. B. Pit. Tour nef. Beta communis alba, Park. Parad. Ger. 251. Beta vulgaris. Linn. Etnas Cul. кла, есть довольно извъстное и въ поварен ных в садах в и в в огородах в с вемое кор невое произрасшение, которое им веть длян ный, круглый, швердый, видъ моркови и мінощій, и внушри бабдно - більни корень, въ пяшь и шесшь верьшковъ длиною и въ верьху въ полтора верьшка толщиною, ко торый производить большіе, блёдно зеле ные, гладкіе, съ верьху лоснящіеся и ны жные приземисные лисшья, имъющіе по са мой срединъ проходящій толстый хребеть напоенные селипреннаго вкуса сокомЪ: меж ду оными вырасшаешЪ вѣшвисшый и сѣса мой вершины маленькими, зелено красиво щими, изЪ пяши шычковЪ составленными и изЪ пяти листочной чашечки выходящи ми цвѣточками вдоль окружающійся стебель въ осьмнашцащь, а иногда и въ дващиаль ченыре верышка вышиною. Послъ цввнов оказывающся круглыя, щероховащыя сыми нодержащельницы о двухъ или прехъ кра сноващых в и видъ маленькой почки им во щих в съмячках в. Она вяжет в и чистипр вредительныя мокропы, а въ прочемъ чествомъ своимъ сходствуетъ она съ кра сною (Beta rubra, Беща рубра) съ которов въ одинъ классъ полагаешея. Гречески Егитлом или Тейтлом, а былая ив Хейтлог лейког; по Арабски Decka; по на мецки Bete или Mangolt; а Weiße Bete, Beiß = Kohl, Beisse, Piste, бълая Poirée по Француски Poirée или Bete, а

ip.

16.

IPM

sa.

ale

ad.

100

P-

Ho

59

30

:00

Bo

, 11

K'

10"

M

Di

a'

13

18

Poirée blanche или Réparée; по Италіански Вieta и Bietola, а бълая Bietola bianca; по Аглински Вееt, а бълая The White Beet.

BETA CANDIDA, Бета Кандида.

вета communis, Бета комму-

ВЕТА CRETICA SEMINE ACVLEATO, Бета Кретика семине акулеато. Смотри Вета бріпова, Бета спиноза.

BETA ERRATICA, Bema eppamuxa.

Смотри Pyrola, Пирола.

BETA FOLIO BREVIORE ET VIRIDI. Бета фоліо вреніоре еть пириди. Смо-

BETA HORTENSIS ALBA, Бета гортенсись алба. Смотри Вета alba, Бета алба.

ВЕТА INSIPIDA, Бета инсипида. Смотри Blitum, Блитумъ.

BETA NIGRA, Bema нигра. Смотри

Beta rubra, Bema py6pa.

BETA PALLESCENS, Бета паллесценов. Смотри Вета alba, Бета алба.

guije pane. n

ВЕТА RADICE RVBRA, Бета радирубра. Смотри Вета rubra, Бета рубра. ВЕТА ROMANA, Бета Романа. Смотри Вета alba, Бета алба.

ВЕТА ROMANA RVBRA, Бета Робра рубра. Смотри Вета гиbга, Бета ру-

BETA RVBRA Dod. I. В Бета рубра. Вета rubra vulgaris С. В. Ріт. Тоиги. Вета communis rubra. Park. Parad. 489. Веta nigra. Ang. Matth. Rapum rubrum. Fuchs. Вета Romana rubra, rapola dicta. Park. III. Красная Спекла, съещся шакже въ огородахъ и поваренныхъ садахъ, и различествуетъ отъ бълой шолько нъ шомъ, что листья ея меньше и краснъе и что корень шолще, не много короче моркови и наполненъ краснымъ сокомъ. Оба рода цвътуть вы Iюль мьсяць и содержать вы ceбъ много влажности, масла и нъсколько соли, разжижають, размятчають и разбивають. Изъ Свеклы варять щи, и такъ называемые бураки, шакже варяшь ее вь водь, и вдять вмвсто салату св уксусомЪ и деревяннымЪ масломЪ. СокомЪ ея подкрашивають коровье масло. Старые люди должиы от в нее воздержаться, ибо она ослабляеть желудокь и вспучиваеть живошь. Въ Медицинъ употребляется по большой части красная, которая однакожь, варена будучи становиться также почти бълою. Она чистить кровь, понуждаеть на низъ по причинъ шонкой своей селишреной или болъе сахарной соли, производишЪ чиханіе, а выжатый изъ нее сокъ разбиваеть нечистоту въ носу, очищаеть оный; пакже унимаеть головную и зубную боль. Сушеный и вЪ порошокЪ истолченный корень можеть быть съ пользою употреблень вмъсто табаку отв насморка и от в продолжительной от в захряслости в в толовъ произшедшей бользни, въ которомъ случав сей Свекольный шабак в еще двиствишелнъе, естьли предъ употребленіемь онаго пустишь въ носъ паръ горячаго чаю или кофея. Молодые свекольны сшебли вареные съ корнемЪ возбуждають охоту къ пищи и утоляють жажду. Вь пепель сожженный корень и съ медомъ смъщанный укръпляеть волосы, а истолченный и положенный въ виноградное вино, по мивнію нівкоторых в превращаеть его въ четыре часа въ хорошій ренсковый уксусь. Многіе моють свекольною водою голову, дабы сухіе струпья съ оной спадали. Въ Апшекахъ содержащь съмя, да и то ръдко. Господинъ Линней полагаеть всв роды свеклы въ V классъ растеній им вющих в в своем в цв в пять шычковъ и два песшика. (Pentandria Digynia). а Господинъ Турнефортъ въ XV. классь, въ I. от дъление, во II родъ травъ сЪ СтаминнымЪ или пестичнымЪ цвѣтомЪ TO TPO

Πο Γρεчески Σευτλον или Τεύτλον έρυθρόν; по Арабски Calab; по Нъменки Rothe Bete, Rother Mangolt, rothe Rüben, Beisrüben; по Француски Betterave; по Италіански Biarava, или Bietola rossa; по Аглински The Red Beet.

BETA SICLA, Bema сикла: и BETA SICVLA, Bema Cukyra CMompu Beta alba, Bema anda.

BETA SYLVESTRIS, Bema curneстрись. Смотри Pyrola, Пирола.

BETA SPINOSA feu Cretica femine aculcato. Бета спиноза, Спекла съ колючимъ съмянемъ расшешь на островъ Канліи и рідко здісь бываетть. По Гречески Σεύτλον ακανθίκον; πο Η Επεμκη Mangolt; 0= der Bete mit stachlichten Saamen; no Opanцуски Poirée avec de semences piquantes; по Италіански Bet, Bietola con seme acuto; по Аглински The Prickly Beets of Candia.

BETA VIRIDIS, Бета пиридись, Простая Спекла, имветь пемно - зеленые лиспъя.

BETA VULGARIS, Bema пулгарись. Смотри Beta rubra, Бета рубра.

BETEL. CAST. Bemenb, Betele, Acostae. Betle. Tab. Betre sive Tembul, C. B. Pin. Betella, Lugd. Romani Tembul pro Tam bul Avicennae, Betela codi Malab. Hort. Pi per Betle. Linn. II. Бетель есть родъ перца растущаго въ Азіи, а особливо въ великомъ множествъ на островъ Цеиланъ и им вющаго длинныя, плющевым в подобныя, и какЪ горохъ и хмъль около ближнихъ де ревь и других в предмътовь выющілся въти столь слабый высовій стебель, что надобно поддерживать его тычинкою. Листвя его походять на Лимонные, только что длиннъе, остроконечные, испещрены седмью вдоль проходящими жилками, поддерживающся длинными, двузубчащыми сше. бельками, и имфють зеленый, но высыхая краснъющій цвыть: плодь сего расшенія походить на длинный черный перець

им Бет в подобіе хвоста Ящерицы, ароматическій вкусь, и пріятный запахь. Бетель обыкновенно въ Азіи сажають около Ареки, по кошорому онъ и въешся какъ плющь. Лисшья разбиваюшь гусшую мокроту, чистянь и укръпляють желудокь, и ушверждаюшь десны. Индвицы всякаго возрасша и всякаго состоянія Бдять Бетель беспрестанно и держать всегда его въ рошу, ибо онь запахь, изь рошу дълаеть пріят нымЪ, гонишЪ слюну и чернишЪ зубы. Они пригошовляють оный съ Арекою, и мѣща ють съ сдъланною изъ раковинъ известью; но Европейцамъ ошъ него обыкновенно по шнишся, и многіе из вних в делаются пья. ными, хошя на малое время. Приправлен иые лисшья продающся пучками и дюжи нами во всёхь Азіашскихь лавкахь. Господинь Аббе де ла Поршь въ описаніи путешествія своего чрезЪ ЦеиланЪ упоминаеть, чню Индвискія женщины, кои суть сложенія весьма склоннаго кЪ любви, побуж даюшь Европейцовь и любовниковь свояхв употреблять Бетель, а дабы къ тому обязать, Бдять сами передь ними безь мБры; рБдко выдерживають мужчины, чтобь не склонипься на прозьбу, и онв пользу юшся шёмъ временемъ, пока челов вкъ пьянъ. Для довольствованія склонности своей кЪу тъхъ. Господинъ Линней полатаетъ его во II. классь расшеній, им вющих в в своемв цввив два шычка и шри песшика (Diandria Trigynia). По Гречески Ветел 'Аблатио Outor; по Ивменки Berel eine Uffatische Pflanke, по Француски Betel, plante de l'Afie; по Италінски Betel, pianta dell'Afia; по A глински Betel an Afiatick plant.

Смотри Ве-BETELE, Bemene. tel BETELLA, Bemenna. menb. BETLE, Bemne.

Смотри BETHISALSA, Bemucanca.

Bryonia nigra, Epionia nurpa. ВЕТІСА, Бетика. Смотри Lactuca, BETION Лактука.

вред-

BETION, Бетіонь. Смопіри Dipfacus, Ампсакуєв.

BETONIA, Бетоніа. Смотри Polium montanum, ПоліумЪ моншанумЪ.

BETONICA ALBA, Бетоника алба. Смотри Primula veris, Примула верисъ и Ветопіса vulgaris, Бетоника вулгарисъ.

ВЕТОNICA ALBA PAVL. Бетоника: альа Папл. Смотри Veronica, Вероника. ВЕТОNICA ALTERA, Бетоника алтера. Смотри Caryophyllus, Каріофились.

BETONICA ALTILIS CORONARIA, Ветоника алтились коронаріа. Смотри Сагуорнувіи hortensis, Каріофиллусь гор-тенсись.

BETONICA AQVATICA, Бетоника

BETONICA CANDIDA, Бетоника кандида. Смощри Scrophularia, Скрофуларіа.

ВЕТОЛІСА СОКОНАКІА ТЕЛУІЗ-

SIME DISSECTA, Бетоника коронаріа тенунссиме диссекта. Смотри Сагуорную lus hortensis, Каріофиллусь гортенсись.

ветопіса Domestica, Бетопіна доместика. Смощри Caryophyllus пінаг, Каріофиллусъ миноръ.

BETONICA FOETIDA, Бетоника фетида. Смощри Stachys, Сшахисъ.

ВЕТОNICA IVSTICIA Linn. Бетоника ветиціа. Смотри Інвісіа, Юстеціа.

монтана. Сметри Alisma, Алисма

BETONICA ORIENTALIS ANGV-STISSIMO ET LONGISSIMO FOLIO, Бемоника Оріентались ангустиссимо эть лонгиссимо фоліо. Смощри Ветопіса Vulgaris, Бешоника вулгарись.

ВЕТОNICA PAVLI, Бетоника Па-

пурпуреа: Смотри Betonica vulgaris, Бе-

BETONICA SYLVESTRIS ALTERA

ET PRIMA, Бетоника силпестрись алт тера эть прима. Смощри Caryophyllæus, тіпот, Каріофиллеусь минорь.

BETONICA VULGARIS. Merc. Bot. г. 23. Phyt. Brit. 15. Бетоника пулга. puch. Betonica Officinalis Linn. Betonica purpurea C. B. Pit. Tournef. Bétonica. Brunsf Trag. Dod. Vetonica. Cord. in Diofc. Х. Бълая и Красная а у иныхъ Черная Букцица трапа, расшеть въ садахъ, по огородамь, въ лъсахь, по лугамь, вь великомЪ множествъ на тънистыхъ мъстахь и цвътеть въ Іюнь и въ Іюль, а собирается въ исходъ Іюня місяца. Она имъешь зеленые, продолговащые, нарочито широкіе, по краямЪ зазубристые, жестковатые, на свекольные похожіе и на длинныхъ по землъ разсшилающихся стебелькахъ сидящіе листья, горьковашаго вкуса, промежь коими возвышаемся либо одинь, либо несколько изв черна красныхв или бёлых в четвероугольных в, цёльных в или безвъточныхъ и мохноватыхъ стеблей въ девящь, а иногда и больше вершковъ вышиною, которые окружающся и всколькими, изъ ръдка на искось по парно другъ прошивъ друга сидящими и подобіе нижнихъ имъющими листочками: цвъты на ней или пурпуровые, или бълые, вырастають куспиками изъ вершины спебля, имъють каждый видь маленькій сь верьху на двъ часпи раздъленныя прубочки и соединяющся вмЪсшЪ вЪ гусшый колосЪ. Посл'в цввша оказывающся чешыре продолгованыя сёмячка, обведенныя сёмянодержашельницею, которая служила цвёту чашечкою. Корень ее есть бълыми волокнами окруженная и на малую морковь похожая головка, въ большой палецъ и болъе толщиною. Буквица содержишь въ себъ часть масла, соли и не много влажности , укръпляетъ сердце, мозгЪ и жилы, производишЪ пошЪ, разбиваеть мокропы, разжижаеть, выгоняеть

вредныя мокроты потомъ и мочею, и смъшанная съ шалфеею, или одна вмѣсто чаю употребленная почитается полезною оть глазныхь, головныхь, зубныхь, грудных и желудочных в бол взней, отв простуды, Ипохондріи, Истерики или матки и от болей въ селезенкъ, печенкъ и въ легкомъ, шакже и ошъ ранъ и ужаленія ядовишых в гадинь. Наружно употребляють ее въ клистирахъ отъ ръзу въ животъ. Буквичный сокЪ пьють съ винограднымЪ виномЪ или съ водою ошъ боли въ желудкъ. Отъ вседневной лихорадки варятъ буквицу съ двумя лошками попушника (Plantago, Планшаго), мёшають съ теплою водою и пьють до наступленія оной. Сырые лисшья шолкушь, варяшь вь водъ и привязывають ко лбу оть глазной боли. Пвъты почитающся способными противодъйствовать яду, очищать кровь отъ мокропы съ гноемъ и опъ падучей болъзни. Простой народъ припариваетъ вареною, сь виномь и сь перцомь, буквицею болящія ядра. Сёмя пьють сь водою оть грыжи. Буквицу варять также въ щолокъ и примачивають голову оть простудной головной бользни. Всъ Медики щишають Буквицу вь число грудных в травь и приказывають пить ее оть всъхЪ выше упомянущыхЪ бол Бзней . шавъ съ ромашкою, мелиссою или пчельною правою, тулявицею или пысячели. стникомъ и съ вероникою. Въ старину суевърные люди нашивали сію праву на шев ошр порчи и для збереженія себя ошр колдоества, а бабдные люди пили и умывались ею, для полученія въ лицъ румянца. Мокшанцы паряшь буквицею чахлыхь двшей. ВЪ АпшекахЪ находятся цвъты и листья, дълается восковый пластырь, Етplastrum ceratum de Betonica, и консерва и упошребляется перегонная съ буквицею вода. Бетоника есть испорченное Шпанское. оть древняго Бискайскаго народа Бешони-

ками называемаго, происходящее имя, а Греческое имя χέβρον, от в слова απέομαι, помогаю, потому что Буквица помогаеть отъ многихъ бользией. Господинъ Линией полагаеть ее въ XIV. классъ растеній им выщих вы цвыть своем в четыре гвозяка, изъ коихъ два большіе и два малень. кіе (Didynamia) а ГосподинЪ Турнефортъ въ IV классъ, въ III отдъление, въ XVIII родъ травъ съ однолистнымъ трубочнышЪ цвѣшомЪ. По Гречески $X \in \beta \rho^{ov}$, Кеброй и Фихотрофой; по Арабски Chaftra, по Нъмецки Betonien, или Bethonien, 300 tenige, Pfaffen Blumlein (Поповъ цвъть); по Француски Bétoine; по Италіански Betonica; по Аглински Betony; по Мекшан ски МушкарЪ шище.

BETRE, Бетре. Смотри Betel, Бетель. BETVLA Dod. I. B. Pit. Tournef. Beтула. Береза или Бълая Береза есть довольно изв'єстное дерего, которое ра стеть во всъхъ съверныхъ холодныхъ спранахъ Россіи въ лъсахъ, на моховыхъ мвсшахв, на горахв и вв долинахв. Она вырастаеть очень высоко и покрывается съ верьху, естьли молода, красно темною и по мЪсшамЪ крапинками испещренною, ко рою, которая на старых в березах в, лееть, разшеливается сь низу и обра стаеть мохомь. Внутри она красна, теро ховата и обведена бълою берестою. Подв оной находишся еще шонкая, гладкая, самых в молодых в деревьях в зеленая, на других в изв бъла-желиая кожа. Вну пренное ея качество все бъловато, спо, по чему узнавается старость их и бываешь одного цвыша съ ядромь. Вып ви на ней длинныя, понкія, гибкія, яшь на нъкошорыхъ въ верьхъ, а на дру гихъ висящъ въ мизъ шонкими прушьями, зубчапыми, и окружающся зелеными, преугольными, гладкими, нѣжными, оспро ионечными, и у нъконорыхъ на бълыхъ, а у других в на красноватых в стебельках в си ДЯ- сидящими лиспівями, горькаго вкуса, которые, на старых в березах в бывают в меньше, нежели на молодыхъ, и пожелтвыв опадають. Цевты вырастають весною вмъстъ съ листомъ, бывають въ началъ зеленоваты, но часто красноваты сь пестриною и тонкою шелухою, и превращающся вскоръ въ съмянныя сперьва зеленовашыя, но пошомъ желитьющія кисточки. По спаденію листа и по появленіи на прушьяхъ почекъ, вырасшають во всю зиму на деревъ остающія тишечки или по названію БотаниковЪ кисточки, кото-Рыя при выпукиваніи йиста становятся Алиниве, гибчв, и цвв шомв пестрожелные, а по совершенном в листов выпуск весною обращающся въ желшоващую пыль и спа-Дывають. Съмяна маленькія, имъють два разпущенныя крылошка, созръвающь въ Іюдь и Августь и слетають съ деревь опъ Сентября и до самаго Октября мъсяца. Коренья у березы продолгованые, понкіе, не глубоко въ землю простираю. щіеся и въ великомъ множествъ вмёсть сплетенные. Когда начинаеть стаивать сныть, то выпускаеть она сокь, называемый нами Березовицею, который вЪ хо лодные ясные дни шечешь сильные, нежели весною, а въ большіе жары совстмъ переспаеть, чего ради проверчивають на деревь скважину, въ конторую всунувъ жолобокъ, подставляютъ гориокъ или бутылку съ лейкою. Скважину закалачивающъ потомъ деревяннымъ гвоздемъ и умазывающь глиною или смолою. Береза содержить въ себъ много масла и влажности и посредственную часть соли. Листья разбивають, сущать, чистять кожу, прохладающь и полезны от водяной бользии. Нарасшающая на березовых в пнях в губка Укръпляенъ. Ее сушатъ, и истолча въ порошокъ присыпають къ почечую, для Уняти сильнаго его теченія. Березовица, которую пьють весною, противодыйствуеть

причиняешЪ яду, гонишь камень, низъ и полезна отъ коросны, цынготной бол взни и желтухи; только надобно ее употреблять каждое утро по полуфунту. ИзЪ нее многіе ділають уксусь, также курять и вино. Достаточные людипьють ее весною съ РеинЪ Веиномъ какъ для лакомства, такъ и для пользы. Сказывають, что сдъланный изъ пережженнаго изъ березовых в листов в пепла щолокъ препянисвуенъ расни волосамъ на намазанных воным вымажь на шель. Березовый лесь пригодень на веякія домашнія потребы какъ то, на топленіе печей, на уголья, которые однакож в опасиве других в въ разсуждении того, что не скоро угасають, и на лучину. ИзЪ бълой сЪ дерева содраной коры курять деготь, а понеже она содержить въ себъ много смолы, по чему и не шакъ скоро гніешь, какь самое дерево, то обвершываюшь ею сваи до самой поверьхности земли. Чухны плетушь изъ нее лапши и покрываюшь ею свои кровли, накладывая сверьху дернЪ, а изЪ лѣсу дълають сохи, съдла и разныя домашніе сосуды. ВЪ Камчашкѣ двлають изъ Березнику санки и принадлежащіл кЪ нимЪ попіребности, особливо Корка его тамъ въ великомъ употреблении, ибо жишели оснобля оную у сыраго дерева, рубящь топориками мёлко на подобіе лапши, и Бдять съ сушеною икрою, также кваснтв они оною и березовый сокв, который от нее бываеть кислые и пріятные. ИзЪ БерезовыхЪ Болоней или Киль двлаюшь около и вь самой Казани, вь разсужденіи ихв швердосши сшаканы и всякую столовую посуду, которую работу тамъ называють Капскою. Вь Лаппоніи, Финландін и Карелін, внутренность походить на мраморЪ, и шамошніе обывашели ошъискивающь оную для токарной рабопы на чашечки, спаканы и прочія тому подобныя вещи. Во многихъ безлъсныхъ мъсшахъ Россіи употребляется березовый лѣсЪ настроеніе избЪ и другихЪ строеній. ВЪ Апте-

кахЪ.

кахЪ ничего изЪ нее не дълаешся, а гоняпів только сь сокомв воду. Имя Бетула происходить какъ думаю отъ Бретанскаго слова Беду, которое также означаешЪ Березу. ГосподинЪ Линней полагаешЪ сіе дерево вЪ XXI классЪ расшеній имѣюшихъ на одномъ и шомъ же корнъ цевшы и мужеские и женские, и въ мужескихъ цвътахъ по три гвоздочка (Monoecia Triandria) а Господинь Турнефоршь вь XIV. классь, въ III отдъление, въ VII родъ деревъ, коихъ цвъть состоинь изъ многихъ соединенных в цвтточков в имтющих в тонкое и чешуеватое основание. По Гречески Упииба; по Нъмецки Birche, или Birchen Baum, Meye; по Француски Bouleau, а сокъ или Березовица Liqueur, ou l'eau de Bouleau; по Ита міански Bedollo, Betula, Scopa; по Аглински Birch - Tree; по Камчатски Ичу; по Корятски ЛугунЪ.

BET

BETVLA ALBA Linn. Bemyna anda.

Смотри Betula Dod. Ветула Дод.

BETVLA ALNIS Linn. Bemyna An-

нусь. Смотри Alnus, Алнусъ.

BETVLA KAMSCHATTICA, Bemyna Камчаттика: Камчатская Береза, различествуеть от Европейской только вЪ томъ, что сърве и весьма шероховата и киловата. По Ивменки Die Ramschattische Bircfe; по Пранцуски Bouleau de Camschattea. но Италіански Bedolle di Camschattea.

BETVLA FRVTICOSA. Pallas. Bemyna фрутикоза, Березопый Ерникь расшеть неподалеку от Петербурга около Невскаго монастыря, въ Финландіи, также и въ Сибири, и вырастаеть кустарникомъ околе шрехь футовь вышиною, на которомь красноватая кора и маленькіе, къ острому конну круглованые, шакой же духь, какь бесезовый свъжій листь имъющіе и болье ширъ, нежели длиниве бывающіе листочки съ не примъшными почти зубчиками. По Гречески Упийба Фануовібів; по Нъмецки Діє Etrauch Bircfe: по Француски Bouleau, qui

croit en arbrisseau; по Италіански Beodol fruticolo.

BETVLA NANA Linn. Бетула нана. Малорослая Береза или Карла расшешЪ около Нерчинска и въ Камчаткъ, и им ветъ круглые маленькіе, сердцевидные и зубчатые аиспья. По Гречески *Σημύδα* Νάνεν; по Нъмецки Die Zwerg Birte; по Француски Le Bouleau Nain; по Италіански Bedollo Nano.

BETVLA NIGRA Linn. Bemyna HMT. ра. Черная Береза расшеть въ Сибиря и другихъ южныхъ странахъ Россіи и имъетъ маленкіе ромбоидическіе продолтовашые, остроконечные и двойнозубчатые листья и покрывается черною корою. По Γρεчески Σημύδα μέλαίνης; πο Η Επεικα Σίδ schwarge Birfe; по Француски Bouleau noir; по Ишаліански Bedollo nero; по Аглински The Black Birch - Tree.

BETVLARIA, Bemynapia. CMompu Tor mentilla; Торменшилла.

BETVLCA, Бетулка. Смощри Весса bunga, Веккабунга.

BETVLLA, Бетулла. Смотри Веtula, Бешула.

BETVLVS Linn. Смотри Carpinus Карпинусъ.

BEXVGILLO, Bercyrunno. CMomph

Іресасиапна, Ипекакуанга.

BEXVGO del Peru. Clus. in Mon. Cle matitis Peruviana. C. B. Bercy To ecins Te. руанскій корень, который покрыть пе пельнаго цвъта корою, весь извивается бываеть въ палецъ толщиною. Онъ имв ешь сперьва сладковашый, но получаешь ношомъ острый вкусь и жжеть въ горд Сей корень возбуждаеть слюну, и почи тается слабительнымЪ, употребленЪ буду чи внушренно истолченный въ порошкъ въ количествъ полузолотника. Индіанцы пред почитають его Мехоаканнъ въ разсуждени слабишельнаго его качества. По Гречески Benogyo, offa the Hége; no Hemenka Bent go, eine Peruanische Wurgel; no Opany

кропы

Ски Bexugo, racine du Perou; по Иппаліан-Ски Bexugo, radice del Peru; по Аглински Вехидо, an Peruvian Root.

BEZAAM, Besaamb. u

BEZARA LACHEFVLA, Безара памефула. Смотри Gummi Galbanum, Гумми ГалбанумЪ.

BEZERCVIBAT, Безеркульать. Смо-

BEZERRAVTIME, Безерраутиме. и ВЕZERRACOTHAME, Безерракотаме. Смощри Pfyllium, ПсилліумЪ.

Смотпри Polygonatum, Полигонатимь.

BEZOARDICA RADIX, Безоардика радиксь. Смотри Drakena radix, Дракена

В В В А В А Бибана. Смощри Agrimonia,

BIBENELLA, Бивенелла. Смотри Ріт-

BIBILISSA, Бибилисса, такЪ назы-

BIBINELLA, Бибинелла. Смотри Ріт-

Rapдамомумъ. Смотри Cardamomum,

Rynga. n

чіа. Смотри Раругия, Папирусь.

Auncakych. Бибокв. Смотри Dipfacus,

Chamomilla, Хамомилла.

Tyccunaro. Buxionb. Cmompu Tuffilago,

BICIDEN, Бицидень. и

BICZEIDEN, Бикзепдень. Смотри Sa-

Aningonia. Черіода съ Петрушечнымъ

ы

Jacma I.

,,

00

が五野

do

y.

33

T.A

in

KN

110

BIDENS ATRIPLICIFOLIA Linn. En. gencb Атриплицифоліа. Чергода Лебедолиственная.

BIDENS BIPARTITA, Engench En-

BIDENS CERNVA, Биденсь цернуа. Смотри Bidens tripartita, Биденсь трипар-

BIDENS FOLIO NON DISSECTO, Биденсь фоліо нонь диссекто. Смощри Verbesina, Вербезина.

BIDENS NIVEA Linn. Биденсь нипеа. Снъжная Черіода, имбеть простые, стрълоподобные, зубчатые и черенястые листья, круглые пвъты и тладкое съмя.

BIDENS TRIPARTITA Linn. Engench mpuπapmuma Bidens folio tripartito diuifo. Cœ alp. Pit. Tournefort. Cannabina aquatica folio tripartito divilo. C. B. Hydropiper. Lugd. Verbena supina vel tertia Trag. XI. Коноплянка, Совачки, Чергода, Козепыи рожки, трана расшеть на мокрыхь, болошистыхь и таких в мъстах в, кои весною и осенью вода понимаеть и кои явтомъ высыхають, и цвътенъ въ Тюлъ и Августъ мъсяцахъ. Она им вышь красноващые, кр впкіе и мохнашые сшебли около двухЪ аршинЪ вышиною, зубчатые, на три части обыкновенно разръзанные, волосками покрытые и на коноплянные похожіе зеленоващые лисшья, пріяшнаго запаха, но горькаго вкуса, и желтые, къ верьху на подобіе звъздки расположенные, пучками растущіе, и изъ мнотихЪ вмъсшъ соединенныхЪ цвъшочковЪ составленные цевты, имвюще маленькія, и съ исподи нъсколькими полько лиспочками окруженныя чашечки: съмячки у нее продолговащыя, прямыя, плоскія и имъюшь на остромь конць своемь нъкоторое подобіе трезубца составляющих в колосочковь: корень волокнисть, и производить ежегодно въ Іюль и Августь мъсяць свои отрасли. Она содержить въ себъ много соли, грветь, сушить, разбиваеть мо-

крошы, прогоняеть кашель, укръпляеть печенку, чистить застарылые нарывы, производить чихание и считается полезною от уязвленія змый, сырая на рану приложенная. Наружно употребляють ее оть рань и въ разныхъ баненіяхъ. Въ желчных , печеночных в и селезеночных в бользняхь полезны ея листья, которыхь вь семь случав берушь при горспи, и наливъ на оные бушылку воды, подслащивають сахаромь и пьють ежедневно по двъ винные рюмки. ИзЪ набранной молодой травы черюды, вареной въ простой водъ сь примъсомь малаго количества квасцовъ выходишь желшая краска, а естьли приложено будешь нъсколько маряоны (Gallium, Галліумь) то здълается изь оной жаркая. ВЪ АпшекахЪ она не употребляется. Биденсь названа она пошому, что стмя ее имъетъ нъсколько подобія съ дву зубцемъ названномъ по Лашынѣ Биденсъ, (Bidens.) ГосподинЪ Линней полагаетъ ее въ XIX. классь расшений, имвющих вы своемы цвв. шв много гвоздковь, пыльными мвщечками вмъстъ соединенныхъ. (Syngenesia Polygamia) а Господинъ Турнефорть въ XII классь, въ III отдъление, въ VIII. родъ травъ съ многолисшным в составленным в цевтом в. Πο Γρεчески Έυπατοριον ένεδρον το βήλυ γένος; по Нъмецки Runigund-Kraut; Weib Waffer= Dolt; Hirsch-Riee; по Француски Eupatoire fémelle bâtarde; по Италіански Bidente или Erba giulia femina bastarda; по Аглински Female Water Agrimony или Hemp-like Agrimony.

BIDENS ZEYLANICVM, Биденсь Зейланикумь. Смотри Acmella, Акмелла.

BIFOLIVM MAIVS, Бифоліумь маivcb. Смотри Ophris, Офрись.

BIFOLIVM PRIMVM, Бифоліумь примумь. Смотри Нератіса alba, Гепашика алба. и Vnifolium, Унифоліумь.

BIGNONIA CATALPA Linn. Бигноніа каталпа. Сіе дерево вырастать чрезвычайно скоро, выпускаеть множество отростковъ и имъетъ изо всъхъ смолиспых в дерев в найбольше листья, которые сердцевидны и сидять по три вмёсть. Цвъпы свои приносипъ оно пучками; они открыты, им вынв почти совсвмв подобів рыльца, бъловашый съ красными пяшнами и йонгольки выходять изв пяпилапочной и видЪ ложечки имъющей чашечки. Съмян ныя сосудны сушь древесовашые, продолго вашые, двугивздные стручечки, заключа ющіе въ себъ легкія перепонистыя и кры лошками снабденныя съмяна, ивъ кощо раго сіе дерево произрасшаеть. Кто сіе дерево пожелаешь эдьсь сохранить вы вольныжь садахь, тоть должень хорошо онос покрывань от стужи. Естьлибъ оно вы держивало здёшній КлиманшЪ, побъ соста вляло пригодивищее и красиввищее дерево для Алей; зимою держать его вь оранже реяхъ возлъ Фиговыхъ деревъ. Господивъ Линней полагаешь его съ Бигнонією Из дика въ одинъ классъ.

BIG

BIGNONIA INDICA Lian. Eurnonio Индика. Bignonia Americana, fraxini folio flore amplo phoeniceo. T. Inst. 164. Gelsemi num Indicum. Corn. 102. Ungiance Жезминь или Американскіе Попим шные Колокольчики есть Американское пьющееся расшеніе, растущее въ Аме рикъ и въ нъкошорыхъ Европейскихъ дахь. Оно имвешь шемно-зеленые, и ясенные похожіе листья, коих в края парам лельно соединяющся, и производинь вершинъ каждой изъ своихъ въшеей само красные, пучками растуще и на подоб жесминных в расположенные цевшы, послу коих в остаются жесткіе продолговатые маленькія съмячки объ одномъ крылошку въ себъ заключи вь себв заключающе стручечки. Его са жають возав Фиговых и других в деревы къ кошорымъ онъ бывающими на выпряже его плъщочками прицъпляется и до самар H BB верьку обвивается. Въ Медицин в ATTIE

PE

. 9

АпшекахЪ оно не употребляется. ГосподинЪ Линней полагаеть сіи растенія вь IV классь, имвющих въ своемъ цввтв четыре гвоздка, изъ коихъ два длиннъе а два короче; и съмянные сосудцы или коробочки. (Didynamia Angiospermia) а Господинъ Турнефорть въ III классъ въ III отдъленіе, вь І родъ расшеній, имъющих в однолистный, не правильный и съ объихъ сторопЪ открытый цввтъ. По Гречески Віуνόνια, ανθος της βίργυνίας; πο Η Επεικα Bignonia, oder Indianischer Jasmin; no Француски Bignonia ou Iasmin de Virginie; по Италіански Bignonia или Gellomino della Virginia; по Аглински Bignonia or Geffamy of Virginia.

BIHAI. II. Биган, есть Американское мало-извъстное растеніе; по Нъмецки Вінаі, еіпе Утегісапіясье Ряапре.

BHON, Бижонь. Смотри Terebinthina,

BILASE, Bunase. n

Rapдамомумъ.

BILIMBI Linn. Билимый. Смотри Са-

BILINGVA, Билингна. Смотри Uvu-

BILISCONE, Билисконе. Смотри Риlegium, ПулегіумЪ.

BILIVM, Buniymb. CMoinpu Farfara,

Aсфоделусь. Вимо. Смотри Asphodelus,

Pimpinella, Пимпинелла. Смотри

BINEM, Бинемь. Смотри Bdellium,

BIOMON, Біомонь. Смощри Егуп-

BiPINELLA, Бипинелла. Смотри Вітpinella, Бимпинелла; и Tragolelinum, Трагозелинумъ.

Gingidium, Гингидіумь. Смощри

BISAXI, Бисакси. Смотри Hermodacty-lus, Гермодактилусъ.

BISCVTELLA, Бискутелла. Смощри Thlaspi, Тласпи.

BISEDEN, Eucegenb. Cmompu Satyrium, Camupiymb.

BISERR VLA PELECINVS Linn. Бисер. рула Пелецинусь. Смотри Securidaca, Се-куридака.

BISEXI, Encercu. CMompu Hermodacty-

lus, Гермодактилусь.

BISLINGVA, Бислингиа. Смотри Нірpoglossum, Гиппоглоссумь.

BISMALVA, *Enchange*. Cmompn Althaea, Anmea.

BISNAGA, Buchara. CMompu Vifnaga, Buchara.

BISTORTA BRITANNICA, Бисторта Британняка. и

BISTORTA FOEMINA, Бисторта фемина. и

BISTORTA FOLIIS AD ORAM NER-VOSIS, IMIS OVALIBVS, SVPERIORI-BVS LINEARIBVS, SEMINE GIGARTINO. Бисторта фоліись agь орамь нерпозись, имись опалибусь суперіорибусь линеарибусь, семине гигартино. Смотри Ві-ftorta maior, Бисторта маіорь.

ВІЗТОКТА FOLIIS OVATO OBLON. GIS ACVMINATIS Linn. Cliff. 150. Макаршинь Корень, расшешь вы восшочных в спранахы Россіи по мшистымы горамы и тундрамы вы великомы изобиліи. Господинь Крашениниковы вы описаніи своемы упоминаєть, что Камчадалы вдять сей корень сырой и толченой сы икрою, потому что они несравненно меньше Европейскаго вяжуть, а при томы сочны и какы орыхи вкусны.

BISTORTA LATIFOLIA, Бисторта патифоліа. Смощри Bistorta maior, Бисторта маіоръ.

BISTORTA MAIOR RADICE MAGIS INTORTA. C. B. Pit. Tournef Eucmopma maiopb pagune maruch unmopma. Polygonum gonum Bistorta. Linn. Serpentaria mas seu Bistorta. Fuch. Bistorta media folio minus rugolo VI. Сердечная трана, Ужопникь, Сердечный корень, Пестикь, Змісиникь, Сабельникь раменный, въ Сибири Горлець и Черепная трапа, около Шацка Жичотный корень, а по переводу Змв. иная трапа, растеть низенькимъ кусшочкомъ на лугахъ, на сырыхъ, горисшыхъ и швисшых в мвстахв, цввтетв вв Маів и Іюнъ мъсяцахъ, и размножается сама собою посредсивом в своето кория. Съмена: созрѣваюшь въ Іюль, а корень выкапываешся вы исходь Апрыля мысяца. Она имыеть маленькій, мясистый, на подобіе змъи: внутрь искривленный, сочный, внутри аловашый, а снаружи шонкою, черною и сморщившеюся кожицею обведенный и многими. волокнами обвещенный корень въ палецъ толщиною, который производить длинные, продолговато круглые, нарочито широкіе, вверьку красновашые, а по стебаю пурпуровозеленые и на длинных в стебельках в утверждающіеся листья, между коими возвышается нъжный, длинный, круглый и по мъстамъ маленькими и видом в нижним во всем в подобными листочками снабденный стебель, въ девять вершковъ вышиною и поддерживающій на вершинъ своей прекрасный, и изЪ многихЪ сплошныхЪ маленькихЪ цвъточковъ початкомъ составленный алый: колосокъ. Послъ цвътовъ остаются трегранныя, лоснящіяся и щавельным в подобныя съмяна. Корень сей правы наполненъ соком в горькаго вязательнаго вкуса, содержишь вы себь много масла и соли, укрыпляеть, прошивод виструеть яду, унимаеть рвоту, простый и кровавый: понось и теченіе: чечуя, исц вляеть раны препятствуеть прежде времяннымъ родинамъ (Abortio) уполяетъ кро-вохарканіе, стягиваеть перервавшіяся внутренныя жилы и полезень отврака и килы: вареный в в виноградном в вин в укр впляеть шатающеся зубы и утоляеть боль оных в. Въ Швеціи из Бмуки его д'влають хл'ябь: Наружно онь сущить, и останавливаеть сильное крово.

теченіе, когда кЪ свѣжимЪ ранамЪ присыплешь толченый изв него порошокв, также лвчитв онъ ужаленіе змви, ужей и другихъ ядовишых в гадинв, приложен в будучи на такія міста свіжій. Лушчій должень быть свъжъ, нарочито толстъ, хорошо высушенъ, крвикаго сложенія и хорошаго цевта. ВВ АпшекахЪ имъется корень. Бисторта есть Лашинское имя, которое происходить отв словъ bis, бисъ, вдвое, и торта, согнутый, ибо корень ея изгибается обыкновенно, а на званія Колубрина, Серпентаріа и Дракункулусь даны ей по шому, что корень ея бываеть часто искривлень на подобіе змви. ГосподинЪ Линней полагаешЪ сію шраву вЪ VIII. классъ расшеній, имъющих в въ своемЪ цвъшъ осьмь гвоздновъ и одинъ пестикъ (Octandria monogynia), а Господинъ ТурнефоршЪ вЪ XV. классЪ, во II ощав леніе, въ XIII родъ травъ съ гвоздочным или безлистнымЪ цвѣтомЪ. По Гречески Bisopra; по Нъмецки Datter ZBurg, roth Natter oder Schlangen Wurk, Krebse 2But веl; по Француски Bistorte; по Ишаліански Bistorta; по Аглински: Bistort; Snake weed или Adders - Wort.

BISTORTA MAS, Eucmopma Mach. I BISTORTA MEDIA, Bucmopma Me

91a: W

BISTORTA MINOR, Eucmopma MI Hopb. Смотри Bistorta maior radice magis in torta, Бисторина мајоръ радице магись инторта.

BISTORTA MONTANA MINOR, BM сторта монтана минорь. Смотри Bistor ta minor, Бисторта минорЪ.

BISTRVCTA, Биструкта. Смотря Bryonia, Бріоніа.

BITAR, Eumaph. CMounty Diplacus,

BITRON, Битронь. Смотри Rapha ДипсакусЪ.

BIVM, Biymb. CMompu Hypericum, nus, Рафанусь. BIXA Гиперинум в...

ВІХА ORELLANA Linn Бикса орелпана. Бикса, есть особливое растеніе имінощее десяпилисточный цвіть, пятизубчатую цвітную чашку и тершавую
двуще утную сімянодержательницу. Господинь Линней полагаеть оное вы XIII.
классь многотычковых растеній, имінощихь вы своемы цвіть оть дватцати до
трехь соть тычковы и одины пестикы
(Polyandria Monogynia).

BIZAR, Бизаръ Смотри Foenum

græсит, Фенумъ Грекумъ.

BIZERI ALCARAZET, Бизери алкаразеть. Смотри Semen Apii, Семенъ Апіи. BIZIDEN, Бизидень. Смотри Saty-

rium, СаширіумЪ.

ВІ.ЖІЛА ERICOIDES Linn. Блеріа Ерикоидесь. Щетинная Блеріа имбеть на четверо разръзанную цвытную чашку, пуговицею расположенный и на четыре части раздъленный цвыть, и четырехътивадную много сымянную капсулю. Господинь Линней полагаеть ее вы IV классы растеній, имбющихь вы своемы цвыть четыре тынка и одины пестикь. Тетганскіа Моподупіа)

ВLАКЕА Linn. Блакеа, имтешь шестилистный цвтть, и шестигнъздную стилистный цвтть, и шестигнъздную стилистный помагаеть ее въ XI классъ растении, имтецихъ въ своемъ цвтть от двенатцащи до девятнатцати тычковъ и одинъ пестикъ. Do-

decandria Monogynia.

BLANEA HERBA, Enanca repea. Cmo

при Calendula, Календула.

BLAPTICULA, Блаптикула: и ВLAPTISEC LA, Блаптисекула: Смо-

mpn Cyanus, Lianveb

BLASIA PVSILLA Linn. Блазіа Пузипла: Мапая Блазіа есть особливое растеніе, бывающеее мужескаго и женскаго пола, которое полагается Господином Блинчеем Б в Б XXIV. класс Б тайнобрачных Брастеній. Стуртоватіа. BLATA, *Блата*. Смотри Вета rubra, Бета рубра.

BLATTARIA ALBA, Блаттаріа алва. Смощри Blattaria Trag. Влаттаріа Траг.

BLATTARIA FLORE FERRUGINEO, Н. R. Paris. р. 31. Блаттаріа флоре ферругинео и

BLATTARIA FLORE PURPUREO, Блаттаріа флоре пурпурео. Смотри

Blattaria Trag. Bammapia Tpar.

BLATTARIA FOLIO LATO VIX LA-CINIATO, FLORE OBSOLETE FUSCO, APICE PISTILLI PURPUREO. Boerh. Ind. alb. I p. 226. Brammapia porio ramo пиксы пациніато, флоре обсолете фуско, апице пистипли пурпурео. Смощри Verbascumi caule ramoso, Вербаскумъ кавле рамозо.

BLATTARIA. LVTEA, Enammapia:

nymea. w

BLATTARIA PURPUREA. Enamma-

ріа пурпуреа. Смотри

BLATTARIA Trag. Matth Dod. Bram. mapia. Verbalcum Blattaria Linn. Blattaria: lutea folio longo laciniato. C. B. Pit. Tourn. Chrylogonum, an potius blattaria Plinii? Ad. Verbascum leptophyllum. Cord. Hist. V. Knaоликь, Кнабличка, Степный Зивробой, Семилистникь, а по переводу Мольная перапа, растепь возав речных в береговь по краямъ рвовъ и прудовъ и въ глинистой: земав, цветень вы Іюль и Августь мыся. цахЪ, и размножается сама изЪ своего съмяни, но пересажена будучи въ садахъ, перемъняеть цвтть свой. Она производишь иногда длинные, а иногда корошкіе, прямые, кръпкіе и на въщочки разд вленные стебли, которые окружаются длинными, къ концу острыми, гладкими, снизу лосиящимися и шемно - зелеными лисшьями, им вющими по краям в м вленькую высвчку, не пріяшный запах в и горькій вкусв :: цвъшы на ней желшые, либо бълые, составлены каждый из в одного на пять частей: раздъленнаго листа, и сидять на маленькихТо

ких в мохнатых в стебельках в. Посл в цв в та родишся на его мъстъ круглая капсулька содержащая въ себъ мъленкія, черноватыя съмячки. Корень у нее бъль, и имъетъ видъ маленькой ръпы, кръпокъ, и раздъляется на самомъ концъ на нъсколько волокив. Бошаники счищають ее вв классъ или родъ Царскаго скиптра (Verba(cum). Она содержить въ себъ много масла и соли, отворяеть, чистить, и умерщвляеть глисты, но въ Медицинъ и въ АпшекахЪ не употребляется. Блаттаріа есть Латинское имя, происходящее отБ слова Блатта, моль, по тому, что прежде сего думали, будто бы она умерщвляла сей родь червячковъ протачивающихъ плапья и книги. ГосподинЪ Линней полагаеть ее съ Вербаскумъ въ одинъ классъ, а Господинъ Турнефортъ во II. классъ, въ IV. отдъление, въ VIII родъ травъ съ круглымъ однолистнымъ цвѣточкомъ, котораго пестикъ превращается въ капсулю. По Нъмецки Motten или Schaben Rraut: по Француски Herbe aux Mites; по Италіански Blattaria; по Аглински Moth Mullein или Mullein Moth.

BLAVEOLA, *Бланеола*. Смотнри Суаnus, Ціанусъ.

BLECHION, Блехіонь. Смотри Dip-facus, Дипсакусь.

BLECHNON, Блехнонь. Смотри Polypodium, Полиподіумъ и Filix, Филиксъ.

BLECHNON, Блехнонь. Смошри Риlegium, Пулегіумъ.

BLEDI, Бледи. и ВLEDIVM, Бледіумь. Sum, Пулегіумь, ВІЕРНАКА, Блефара. Смощри Nym-BLEPHARON, Блефа рhæa lutea, нимфеа лушеа.

BLETHRON NICANDRI, Блетронь Никандри. Смотри Filix, Филиксъ

BLETHRUS, Блетрусь. Смощри Polypodium, Полиподіумь.

BLISEMALTAM, Близемалтамь Смотри Plantago maior, Плантаго мајоръ.

BLITI PEREGRINI GENVS PRIMVM, Блити перегрини тенусь примумь. Смотри Amaranthus maior, Амарантуєї маіорь.

BLITI SPECIES, Блити спецівов. Смотри Chenopodium, Хеноподіумъ.

BLITIS, Baumuch. CMompu Blitum,

БлипгумЪ.

BLITVM ALBVM MAIVS ET MINVS C. B. Блитумь альумь. Blitum Capitatum Linn. Blitum Trag. Lon. minus. Dod. Beta infipida. Жминда, Боропикь, Бросопая, а вы иных в мъстах в Негодная трапа, растеть сама собой на поляхъ, на жирной и унавожен ной земль, свется также и вы поваренных в садахЪ. Она цвѣтетъ во все лѣто и быва. ешь двухь родовь, красная и бълая, которыя раздъляются опять каждая на малую и большую. Большая бълая имъетъ б^в лый, крвпкій и ввинистый стебель вв полтора аршина вышиною, который скружает ся сизо - зелеными и во всемЪ на свекольные похожими лисшьями, кром в того поль. ко, что они меньше: цвъты у нее бълозеленые, маленькіе, и составлены каждый изЪ нѣсколькихъ гвоздковъ; сѣмяна ея продолговащы и походящь на съмяна лебеды (Atriplex) а корень длинный, полщиною вЪ палецЪ и безЪ вкуса. Маленькая бълая, производинь нъсколько ломкихъ, ноздрева шыхЪ, по землъ расшилающихся и сЪ ни зу красновашых в, а къ верьку бъльющих в сшеблей въ шесть вершковъ вышиною; листья у нее сизо - зеленаго цвъта, продолговашы, кЪ концу закруглены и не им вюшь почти никакого вкуса; корень бълый, толств, окруженъ волокнами и лежищь глубоко въ зе мав. Двиствіем в своим в сходствують она св красною, съ кошорою и въ одинъ классъ полагающся. По Гречески Вдугог двихог; по НВ мецки Meyer, keiner weißer Hahnen-Ramm; по Француски Blete blanche; по Ипаліан ски Blito Bianco; по Аглински The White Blite, BLITVM

BLITVM CAPITATVM Linn. Enuтумь капитатумь. Смотри Blitum album, БлишумЪ албумЪ.

BLITVM FOETIDVM, Enumymb De-

BLI

mugymb. Смотри Vulvaria, Вулваріа.

BLITVM HORTENSE, Enumymb ropтенсе. Смотри Blitum rubrum, БлитумЪ РубрумЪ.

BLITVM INDICVM Tab. Enumymb Индинумь. Смотри Amaranthus major,

Амарантусъ мајоръ.

BLITVM MACVLOSVM, Brumymb макулозумь. Смотри Amaranthus tricolor, Амараншусъ приколоръ.

BLITVM MAIVS ALBVM ET RVB-RVM, Блитумь маюсь альумь эть

Рубрумь. и

BLITVM MINVS ALBVM ET RVB-RVM, Блитумь минусь альумь эть рубрумь. Смотри Blitum album et rubrum,

Блишумъ албумъ этъ рубрумъ.

BLITVM RVBRVM MAIVS ET MINVS С. В. Блитумь рубрумь маюсь эть минусь. Blitum virgatum Linn. Красная Бросоная трана, или Сорочыи Ягоды, свется въ поваренныхъ садахъ и бываетъ шакже большая и малая. Большая сходетвуеть во всемь съ бёлою, только что марасна, и листья ея меньше; марая имъептъ красные, внутри пустые, по земаъ Расшилающіеся и краснымиж в маленкими, и кудрявыми лисшочками обсаженные сшвомики или стебли; а цвёты ее составленны изъ нъсколькихъ красныхъ волошей съ бъдыми вверьху вершинками. Корень у нее въ большій палецъ толщиною. Оба рода сей правы содержать въ себъ много влажно. спи и масла и малую часть соли, умягчаюшь, и прохлаждаюшь. Семя красной Бросовой травы унимаеть кровохарканіе, и кровавый поносъ и полезно отъ желчи, а трава почитается полезною от ужаленія скорпіоновь и ядовиных в пауковь. Просшый вародъ употребляеть ее въ пищу и въ

н вкоторых в м встаж в вдять свия ея вивсто просы. Въ Аптекахъ изъ нее ничего не им вется. Господинь Линней полагаеть ее въ II классъ растеній, у коихъ въ цвъщъ два мужчинки и одна женочка вмъсть, (Diandria Monogynia) а Господинъ Турнефорть въ XV классь, во II отдъление, въ V родъ правъ съ безлистнымъ цвъпюмъ. По Гречески Вλήτον έρυθρόν; по Нъмецки готрег Meyer, Blut Kraut, Sahnen Kamm; no Француски Blete rouge; по Италіански Blito roffo; по Аглински The Red Blite.

BLITVM SATIVUM, Brumymb caтипумь. Смотри Blitum rubrum, Блитумь

рубрумЪ.

BLITVM SYLVESTRE, Br. mymb curпестре. Смотри Blitum album, БлитумЪ,

албумЪ.

BLITVM VNGARICVM, BAUMYMB унгарикумь. Смотри Amaranthus maior floribus panniculosis, Амарантусь маіорь флорибусЪ панникулозисЪ.

BLITVM VIRGATVM Linn. Enumymb пиртатумь. Смотри Blitum rubrum, Блишумъ рубрумъ.

BOANTHEMVM, Boanmemymb. CMO-

шри Buphthalmum, БуфшалмумЪ.

BOARGESPINE, Boaprectinue. CMOтри Alaternus, Алатернусъ.

BOARIA, Boapia. Смотри Cotula, Котула; и Buphthalmum, БуфталмумЪ.

BOBARTIA INDICA Linn. Bosapuja Индика. Индіанская Бобарціа, имветь на подобіе черепицы выложенную цвітную чашку и полагается Господином В Линнеем В вь III классь трехь тычковых однопесшичных в расшеній (Triandria Monogynia). По Гречески Воβартоїа, фито τής νδίας; по Нъмецки Die Indianische Bobartia; по Француски la Bobartia des Indes; по Италіански Bobartia dell'India; по Аглински The Indish Bobartia.

BOCHION, Boxionb. Cmompu Farfara, Фарфара.

BOCHOR,

BOCHOR, Boxopb. CMompu Lignum

:aloes, ЛигнумЪ алоесЪ.

BOCCONIA FRVTESCENS Linn. Boxконіа фрутесценсь. Воссопіа гасетова Sphondylii folio tomentoso. Plum. N. G. p. 35. Tab. 25. Cocoxihuitl. Hernand. Mexic. р. Бокконіа, Пряная трапа, или Дрепесный Красномолочникь сь дубонымь аистомь расшеть въ Америкъ, особливо въ Мексикъ, и имъетъ длинный, древесо. вашый и : шолсшый бъло-зеленый стебель, выпускающій по бокамь на при вершка оть земли боковые спебли, окружающеся большими, мохнашыми и дубовымв, а по описанію Плумеріа БорщовымЪ подобными листьями, сверьху бирюзоваго, а вЪ низу лазореваго цввта. Къ верьху раздвляется онь на множество вътвей, усъянных в на подобіе укропных шишечек зеленожелшыми, продолговашыми, чепырех в лисшочными, никогда нерастворяющимися и въ верьху двумя бёленькими наружу выставив. шимися перышками украшенными цв впочками, которые поддерживаются маленькою изЪ двухЪ выпуклистыхЪ листочковЪ составленною чашечкою и оставляють послъ себя продолговащо-круглыя, двушелушныя и одноги вздныя свмянодержательницы, заключающія въ себѣ по одному черному лоснящемуся съмячку. Госцодинъ Линней полагаеть сіе расшеніе въ XIII классь мнотошычковых р однопесшичных в расшеній. (Polyandria Monogynia). По Гречески Вох πόνία Θαμνώδεος, Φυτόν της Ίνδίας; πο Η Εμεμки Die Bacconia aus Americka; по Франмуски Bocconia de l'Amérique; по Италіански Bocconia dell'America; по Аглински Bocconia, an American plant.

BOEN SANGVEN, Boenb canrnenb.

Смотри Bugloffa, Буглосса.

ВОЕНА, Боена. Смотри Faba, Фаба. BOERHAVIA Linn. V. Eyprania, ecmb Американская трапа, съ голубымъ колокольчистымъ цевтомъ, которую Госпо-

динЪ Линней полагаетъ въ II классъ растеній, им вющих в в в своем в цв в одного мужчинку и одну женочку вмъстъ (Monandria Monogynia). По Нъмецки Die Boerhavia in Umerica; по Француски Boerhavia, plante d'Amérique, а на прочихъ языкахъ Всегhavia.

BOIS DE CRABE, Boa que крабь. Смотри Curchiri, Курхири.

BOLANIDES, Bonanugech. CMompu Myrrha, Muppra.

BOLASKOS, Banackoch. CMompu A. nethum , AнешумЪ.

BOLBONE, BOREOHE. CMOMPH Bulbo. nach, БулбонахЪ.

BOLCHON, BORNOUB. CMOMPH Bdel lium, Бделліумь.

BOLESIS, Bonesuch. CMompu Corallium,

КоралліумЪ.

BOLETVS BOVINVS Linn. Tonemych вопинусь. Бороникь гривь, расшеть вы больших в березовых в рощах в. Онв им ветв тучное и кръпкое тъло, а наипаче корень его, который соченЪ, шьердЪ и бываемЪ толщиною почти съ шляпку. Маленькіе загошовляющся съ уксусомъ и солью впрокъ, а большіе жаряшь на сковородахь и сушать на зиму для пищи въ постные дни О двиствіи его смотри во главь о грибь или Agaricus Campestris, Агарикусъ Кампестрисъ.

BOLETVS CERVI, Bonemych uepun. Fungus cervi или Tuber cervi. Lycoperdon Cervinum Linn. Оленій гривь, есшь родъ мален каго, безстебельнаго гриба или труфеля, ко торый величиною и круглотою походить на большій орвхв, покрышь снаружи чернова тою неравною и внутри бълою кожею; и имъ ешь кръпкій запахь. Когда онь еще молодь, ню онъ наполненъ ноздреватою мягкостью, кошорая по засохлосии гриба превращаешся въ легкую черную пыль. Онъ расшеть изо бильно въ сосновыхъ, и еловыхъ рощахъ и по мивнію многих в только в в таких в, в в но их в находящся олени, однакож в это ложе

но, ибо часто его находять въ такихъ мъстакъ, гдъ оленей совсъмъ и не бывало. Въ старину върили, будтобы онъ зараж-Авлся от съмяни, которое олень во время яра своего раняеть на землю. Его нахо-Анть съ великимъ трудомъ, ибо онъ растеть подъ землею подъ упомянущыми деревьями. По выкапываніи его сущать и Употребляющь въ Медицинъ и въ Аптекахь. Онъ содержишь въ себъ много масленых в и земных в частицв и малую часть льтучей соли, возбуждаеть любо. спрастіє, умножаєть вь вкормилицахь молоко, прошивудъйствуеть яду, произвоанть поть, поспъществуеть родамь и Употребляется съ пользою во многихъ женвихъ бользияхъ. Господинъ Линней полагаеть его въ XXIV классъ тайнобрачныхъ Расшъній, а Господинъ Турнефорть въ XVII массь земных произраствий, коих в чевшь и плодъ не извъсшны. По Нъмецки Diesch=Brunst uzu Hiesch-Schwamm; no Opanцуски Espêce de champignon ou de truse, qui n'est pas bon à manger; по Аглински Deers.

BOLETVS ESCVLENTVS RVGOSVS, ALBICANS, PYRAMIDALIS Gmelin. Boneтусь эскупентусь ругозусь, апеихансь, пирамидались. Стругокь или Строгокь есть родь маленких в островатых в сморчковь, пирамидальнаго, и къ верьку остраго вида. Оныя употребляются въ пищу въ соусахЪ и ФрикассяхЪ. По Нъмецки Срів: Morcheln.

BOLETVS ESCVLENTVS RVGOSVS, ALBICANS, QVASI FVLIGINE INFE-CTVS. Pit. Tournef. Boletus esculentus Linn. Волетусь эскулентусь ругозусь, алыкансь, кнази фулитине инфектусь. Fungus porofus rugofus albicans, quali fuligine infestus. C. B. Fungus rugosus vel cavernosus, five Morulius ex albo non nihil rubescens. I. B. Fungi esculenti primum genus Clus. Hist. Fungus spongiosus. Dalechampii. Lugd, Fungi Yacma I.

rugofi. Caft. spongiola nonnullis Dod. Fungii fauaginosi, sive funci rugosi, fauis mellis similes. Lob. Belg. Сморчокь, грибь растеть въ густыхъ березникахъ на тънистыхъ и влажных в мъсшах в и им вет в конусный или продолговатый видь и нарочито черноватый цввшь. Онь во всвкь частяхь сморщенной, оть чего чаятельно и имя свое получиль. наполненЪ маленькими дырочками, похожими на дыры медовых в сотв, и им веть внизу бълесоватый и въ три дюйма вышиною вырастающій стручокЪ; Сморчки показывающся вскор в посл в сошествія в в лысахЪ снъга, и употребляются въ пищу свъжія, начиенныя мълко рубленными янцами, и вареные на буліонъ въ похлебкахъ. Также заготовляющся они въ прокъ, вздъваюшся на нишку и сущашся на солнцв. Всетда передъ вареніемъ должно ихъ хорошенко очищать, ибо часто въ нихъ находятся ядовишыя маленкія насъкомыя. Сморчокь содержишь въ себъмного масленыхъ, влажных в и нъсколько земных в частиць, укръпляеть и возбуждаеть аппенить. По Ньменки Morcheln или Morgeln; по Француски Morille; по Италіански Tartofflo; по Аглински The Edible Mushroms. 108

BOLETVS FIMETARIUS Linn. Boxe. тусь фиметаріусь. Чернуха трибь, раз стеть въ березовыхъ рощахъ и имветь круглую плоскую шляпку, сверьку свышло чернаго, а съ исподи шакъ какъ корешокъ бълаго цвъта; корень у нее какъ въ вышину, такъ и толщину посредственный. Сей грибъ по сняти въ скоромъ времени отваривая въ кипятив, и всколько просаливають по причинь нападенія на оный червей, и употребляють вы пищу, а вы прокы пригошовливають круто просоливши на подобіе груздей.

BOLETUS LEVIS AC VISCIDUS, SU-PERNE COLORIS SPADICEI, INTERNE LVTEI Linn. Bonemych neunch and uncцидусь, суперне колорись спадинен; интера

интерне лутеи. Осинопикь грибь, растеть между осиновыми рощами на не больших в полянкахв, и употребляется вв пишу, но онь не такъ вкусень, какъ друтіе. Онъ имветь темно - померанцовую гладкую шляпку и высокій бѣлый нарочито толстый корешокь, и имбеть видь масленика, полько онаго гораздо больше и суше. Естьми его размомишь и положишь на воздухъ, или когда станеть онъ созръвать, то у щлянки его нижняя сторона бурбеть и синветь. Естьми его разломинь, то съ начала што очень бто; но лежа на воздухь начинаеть чрезь несколько минушь голубънь и на послъдокъ покрывается преизрядным в лазоревым в цв в помв. Сколь часто бы его ни ломали, то всегда въ свъжихъ отломкахъ буденъ показыванься лазоревый цввть; и естьли выжимають из в него сокв, то уже онв во время теченія голубветь, и въ непокрытомъ сосудв тошь чась здвлаешся лазоревымь, который цавть остается и на обмоченномъ во оной сокЪ полошив. Только жалко, что сія краска блёднветь. По Немецки Ереп Maidschwamm, and a series of the series of the series

BOL

BOLETVS LVTEVS Linn. Bonemych Аутеусь. Березопикь грибь, растеть въ березовых в рощах в и им веш в круглую и полстую щлянку, съ верьху шеколаднаго, а вы исподи какы и корешокы былаго цевша; Березовики употребляются въ пищу жареные двареные и въ прокъ сушеные. По Нъ. мецки Bircken ABaldschwamm.

BOLETVS ORBICVLATVS, Boneтусь орънкулатусь. Смотри Crepitus Lupi, Крепинусь Лупи.

BOLETVS VISCIDVS Linn. Bonemych шисцидусь. Масленикь гривь, расшешь на полянках в около Сосенв и Елей на швмистых в местахв. Онв имветь круглоплоскую, скольсковащую и съ низу шемножелтую шляпку: корешокъ у нее также желный, Масленики употребляются шак-

34 PM 172 E D+

же въ пищу, будучи очищены отъ своей

BOLVMBAC, Болумбакь. Смотри Carambolas, КарамболасЪ.

BOLVS IVDAICVS, Bonyeb Hogan кусь. Смотри Althaea, Алтеа.

вома, Бома, и

BOMBACION, Бомбаціонь. и BOMBASCVM, Бомбаскумь. и

BOMBASVM, Bomeasymb. Cmompu BOMBAX ACVLEATVM Linn. Bom ваксь акупеатумь. Xylon arboreum caule spinoso. C. B. Pit. Tournes. Gossypium arbo reum, caule spinoso. С. В. Pin. 430. Деревцо приносящее хлопчаниую бумагу Индіан ское, расшешь въ Америкъ и въ Азіи, вырастаеть до величины изряднаго дерева и имвенів вколючими иглами обсаженный пвнь. По Гречески Ейхог тіз Ігдіаς по Нь менки Indianismer Laum-Wollen по Француски Cotton des Indes; по Ища ліански Bambage Indiano Pin. Ital. 37. 10 Аглински The Indian Cotton bulh.

BOMBAX INERME Linn, BOMBAKCh

Инерме. Смотри

BOMBAX OFFICINAR VM Linn. Bom Baxcb. Goffypium aut herbaceum aut arbo reum Linn. Caule laevi. C. B. Bombax inerme. Gossypium frutescens annuum. Park. XI lon arboreum I, B. Park. Raii. Hift. Pit. Tour net. Coto. Cotoneum. Дерепцо приносящее хлопчатую бумагу, расшеть во встяв че тырехъ странахъ свъта; въ Азін, Персіи, въ Кишав, во владініях велика го Могола, въ Бенгалъ, въ Сиріи и около Смирны; въ Африкъ: на островъ Мадата скаръ; въ Америкъ; въ Бразиліи; а вр Европ'в въ Сициліи, въ Неаполишанском в Государствъ, въ Калаври и Апуріи и на островъ Малтъ и Кандіи. Здёсь растеть оно только въ нъкоторыхъ оранжереяхъ. Оно вырастаеть величиною съ розовый кусть, покрывается съроватою, тонкою и частою ко рою, и производить коротенькія прямыя вып ви, кошорыя окружающся широкими, мягкими, на при, а иногда и на пять частей раздъленными, мохнашыми и на виноградные похожими метьями, котпорые однакож в гораздо меньше, бълве цвътомъ и сидять на длинных волосками покрытых в стебельках в; цвышы на немъ прекрасные, больние, желшые съ пурпуровыми краями, однолисшочные, имъють подобіе раздъленнаго съ верьку до низу на пять частей колокольчика и выходящь какъ розоны почками. Послѣ цвѣта начинають вырастать пятишелушная мохнашая шишка съ обыкновенный Грецкій орвхъ величиною, кошорая заключаеть въпяти своихъ гивздахъ маменькія, бълыя, продолгованыя, пунисныя въ мягкой шерсти обвернутыя съмяна, содержащія въ себъ маленькое масличное и вкусомъ сладкое зерно. Сія шишка разтво-Раешся по созрълости своей въ прехъ или четырехъ мъстахъ и оказываетъ во всякомb по пучку самой бѣлой и шонкой хлопчашой бумаги, кошорая смоль крѣпко сжата, что изъ всякаго пучка, естьми его Расшеребишь, выдешь по горсти бумаги. Сіе деревцо размножаепися из в съмяни, которое осенью предъ саженіемъ мочать чрезъ при дни вЪ навозной водъ, и можетЪ принести плодъ чрезъ годъ или полтора, что здъсь однакожъ бываетъ весьма ръдко. Оно есть болбе однолътнее, нежели прозимующее, потому что по большой части и при лупичемъ за нимъ кождениемъ зимою увядаеть, любить хорошую землю, частую автомв поливку и пересаживается два или три раза каждый годъ. Хлопчатою бумагою производять великій торгь, такв что одинв Китайскій Булдыханв получаеть оть оной ежегоднаго доходу болве 250000 червонных в. Вв Россію привозишся она пряденая изъ Персіи, изъ Смирны и Кипра чрезъ Турецію, которая часто весьма бываеть опасна въ разсуждечін шамошных в моровых в язвв, из Китая, такъже и изъ Италіи, но не самая тонкая, ибо хорошая у насъ ни на чтобы не годилась. Она употребляется въ великом в количеств в на Фабриках в для двланія и шканія разных в шелковых в и бумажных в мануфактур и для вязанія чулокв, колпаковЪ и другихЪ вещей. Многіе кладупів бумагу между подкладкою ихъ плапьевъ, дабы казалось пушнве и чтобъ гръла, а особливо женщины, которыя набивають ее въ накладки у своихъ робронтовъ. Купцы, какъ золотыкъ и серебряныхъ дъль мастера обвертывають и обкладывають ею свои товары. Бумага гръеть и сушить. Господинь Неймань пишеть, что дымь оть брошенной на горячія уголья бумаги, женщинамЪ полезенЪ весьма оть машки, когда его нюхають. ная въ порошокъ и присыпанная упюляеть кровь. Корпія или изь старыхь бумажных в матерій разобранныя нишки съ пользою прикладывающся кЪ ранамЪ. СБполезно от кашлю, одышки, от в кроваваго и простаго поноса и от печеночных в болезней, укръпляеть грудь, возбуждаеть или гонить съмя и унимаеть кровохарканіе. Выжатое из в стмяни масло авчишь головные шекущіе струпы и прогоняеть съ лица пятна. Цвъть полезень отъ рань. Ксилонь еснь Греческое имя, происходящее от слова вы, брвю, по тому что хлопчатую бумагу отдвляють оть плода, какъ бы бришвою, а бомбаксъ Лашинское оть слова Bombylium . Бомбиліумь происходящее имя, въ разсуждении сходносни шищки его съ стариннымъ Римскимъ и Бомбиліум в названным в судном в. В в Апшеках в бумагу ни къ чему не унотребляють. ГосподинЪ Линней полагаешЪ приносящее ея деревцо въ XVI. классъ ЕдинобрашныхЪ Пятитычковых в раствній или св сросшимися въ одну кучку, яко брашья пяшью шычками или мужчинками (Monadelphia Pentandria). а ГосподинЪ Турнефорть въ I классЪ,

b 2

классь, въ VI отделение, въ VII. родь расипвній св однолисшным в колокольчисшым в цвитомь. По Гречески Воивак или кихох; по Немецки Baumwollen-Baum или Ctaude; по Француски Coton по Италіански Cottone; по Аглински Cotton plant, или bush.

ВОМ, Бонь. Смотри Сабе, Кафе.

BONA, Бона. Смотри Faba, Фаба.

BONACOMA, Бонакома. Смоще и Chamæmelum, ХамемелумЪ.

BONADES, Bonagech. CMompu Sedum minus, Седумъ минусъ.

BONAROTA, Бонарота. Смотри Ve. гопіса, Вероника.

BONDVC INDORVM. Ponae. Ital. Bon. дукь Индорумь. Guilandina Bonduc Linn. Bonduc vulgare, maius polyphyllum. Plum. Lata Indorum C. Biron. Mates Indorum cinericei co. loris, id est Legumen Indicum. Eid. et Ponae. Fructus peregrinus primus. Clus. Exot. II. Bonдукь или съ Индвискаго Голый Горохь а съ Португальского Кошичій глазь, а по настоящему Молуккскій Орвав, есть стручковатый Американскій плодЪ, растущій на нъкоторомъ высокомъ деревъ, названномЪ БаугиніемЪ Arbor exotica spinosa foliis Lentisci, АрборЪ экзошика спиноза фоліисЪ Леншисци или Иностранное колючеедерево сЪ подобными МасшичнымЪ лисшьями, которые однакожъ гораздо ширъ и свёта величину простаго орвка, плосковать, гладокь, кръпокъ какъ рогь, им тешь пепельный лосиящися цв вшь, содержишь въ себъ бъловащое масличное зегно съ орбховое шолщиною и непріяшнаго вкуса, и заключается въ красноватомъ и во кругъ длинными и колючими иглами обсаженном в стручк в одного съ плодом в нвъша и въ большой палецъ шолщиною: каждый стручекъ заключаеть въ себъ по два орвха и утверждается на деревв на жесткихЪ, красноватыхЪ и вЪ гусиное перо толспыхЪ стебляхЪ. ЦввтЪ сего дерева однолисшный и разширяется къ верьху на подобіе воронки. Индіанцы варяшь выше описанный плодъ и Бдяшъ вмъсто нашего гороха. Онъ укръпляеть, но въ Медицинв ръдко употребляется. Господинъ Линней полагаешъ сіе дерево въ Х классъ Десяшитычковых В Однопестичных в растиній (Decandria Monogynia) а ГосподинЪ Турнефорть въ XX класов, въ V. отдъление, въ 111 род Браст вній им вющих в однолистный цевть, которато пестикъ прегращается въ струч кованый плодъ. По Гречески Вогов'я, партов The A'meginne; no Homenku Schuster : Baum in America; Schnell-Käulgen nan Ruß von Molucca; по Француски Bonduc, fruit de 1 A. merique ou Noix des Molucques; no Mula ліански Bonduch, pianta Indiana, o Bonduch Indiano; по Аглински Molucca Nuts, Marlao, Bezoar Nuts.

BONDVCH VULGARE MAIVS PO LYPHYLLVM, Бондухь пулгаре маюсь полифиллумь. Смотри Bonduc Indorum, Бондукъ Индорумъ.

BONIFACIA, Ecundania. CMompu Lavrus Alexandrina. ЛаврусЪ Александрина.

10

60

TEC

RA

Pa

M

CBC

10,

BONEDOCH, Bonegoxb. CMompu Avel lana, Авеллана.

BONODREX, Bonogperch. CMompu Se.

теп Аріі, Семенъ Апіи.

BONTIA DAPHNOIDES. Linn. Eon 1110 Дафноидесь. II. Бонціа, имветь одно лисшочную, на пяшь дапочекъ разръзанную и прубочкой расположенную цв в почную чашку; на дев губки, изв которыхв верьх. няя опуклая и стоить прямо, а нижная разръзана на при части и виситъ въ низъ, при отверстій разогнувшійся цв вть; и про долговато круглую, односъмянную Листья сидять поперемънно, а черешки од ноцвъшные. Вшорый родъ сего расшънія на BONзывается

BONTIA GERMINANS Linn. Bonnia герминансь, и отличествуеть отв вышеписанной шолько въ шомъ, что лиспья ея сидять по стеблю противополагаясь другь Аругу и чию цвътпочные черешки колосистые. Сіе растъніе находится въ Америкъ на оспровъ нмайкъ, шакже и въ Европъвъ Гишваніи. ГосподинЪ Линней полагаеть оба въ XIV. классъ расшеній имѣющихъ въ цвѣшкахЪ своихЪ четыре тычка или мужчинки, чав коихъ два крайніе длиннве, а два другъ прошивъ друга стояще короче, и приносящих в семяна свои въ капсулях в или коробочкахъ. (Didynamia Angiospermia.) По Гречески Воντσία, 'Αμεξικανον φυτόν; по НЪ-Menken Die Bontsia in America; no Ppan-Dycku Bontsia, plante de l'Amerique; no Mпаліански Bontsia, pianta dell' America; по Aranneku Bontsia an American plant.

BONVS DÆMON, Бонусь демонь. и BONVS GENIVS, Бонусь Геніусь. Смощри Реиседанит, Певцеданумъ.

BONVS HENRICVS. 1 B. Bonycb Tenpunych. Chenopodium Bonus Henricus. Linn. Lapathum unctuosum folio triangulo. C. B. Chenopodium folio triangulo Pir. Tour-Tota bona. Lob. Dod. Piger Henricus, spinaceum olus syluestre. Renod. Mopanku, Coвачыя Лебеда, Дикій Шпинать, или по переводу Добрый Генрихь, и Гусиная Лапа съ треугольнымъ листомъ, есть на пусты. рах возав дорогв и улицъ и близь заборовъ Растущая и вЪ Іюнъ и вЪ Іюль мъсяцахъ цвъпущая права, которая производить стебли въ Маїв мъсяць и размножается сама обою. Она имъешъ нъсколько толстыхъ, полосатых вы мохнатых в стеблей, вывастающих в в тесть вебетков выплажово и окружающихся множеспьюмъ mpeyодыныхъ, цъльныхъ Шпинашнымъ подобвых вы негих в склизких в в верьху гладмагних в, склижного, в понкою бълою пыльно покрышых в листовы. Цввты на сей правъ бываютъ желтые, перистые, соста-

влены каждый из в пяти гвоздков в и вырастаюшь длинными колосочками на сшебельных в верышниках в изв пяпи листочной и пяпиугольной чашечки. Послъ цвъщовъ оказываются маленькія, круглыя, черныя, вм вств сжатыя и остроконечною кучкою сидящія съмяна. Корень у нее большой, длинный, бъло желшаго цвита и горьковато остраго вкуса. Есть еще другой род в сей шравы, называемый злый Гейн рихЪ, который имбетъ мягкій, прямый и жидкою влажностью напоенный стебель, пурпуровые, волокнистые и колосистые цв вты, круглыя на просо похожія свияна и совсвив бвлый. предлинный чешуеваный корень. Сей послъдній родь почитается вреднымь и столь противень рогатому скоту, что оный даже и близъ его растущую траву всть не станешь. Перьвая употребляется въ Медицинъ и содержить въ себъ много масла и соли. Трава умерщвляеть глисты и приложенная свъжая исцваяеть застарълые нарывы и разбиваеть водяные опухоли. Многіе варять изь нее супь сь прибавленіем'в коровьяго масла и малаго количества мушкатнаго орвха и употребляють въ снъдь; листья ея свъжіе толкуть и съ см в таною или коровьим в маслом в двлають мазь, которую съ пользою употребляють отъ почечуйной боли. Корень ее не много слабишь, противод виствуеть яду и прогоняеть коросту. НЪкоторые ученые врачи совътують употреблянь праву въ припаркахъ ошъ подагрической боли. ВЪ АпшекахЪ ее рѣдко держать. Бонусь Генрикусь есть Лашинское имя, значущее добрый ГенрихЪ, для отличности от другой ей подобной выше описанной вредной травы. Господинъ Линней полагаеть ее въ V классъ Пяти тычковых В Авупестичных В раствый. (Pentandria Digynia) а ГосподинЪ Турнефорть вь XV классь, во II отделение въ IV родъ шравъ съ спаминнымъ или изъ пычковъ соспавленнымъ пвътомъ. Греческаго назганія ньть; по Ньмецки Guter

nan Stolker Heinrich, Hackens Schaar, Schmerbel; по Француски Bon-Henri или Toute bonne; по Ишаліански Buon Henrico; по Аглински Good Henry или English Mercury.

BOONA HIRCINA, Боона гирцина. Смотри Trifolium fibrinum, ТрифоліумЪ

фибринумЪ.

ВОК, Борь. Смотри Вег, Беръ.

BORAGO, Boparo. Смотри Borrago,

Bopparo.

BORBONIA CORDATA Linn. V. Bop воніа кордата. Борбоніа, Американское раствніе, имвющее сердцевидные, цвль. ные и многими жилами испещренные лисшья; заощренную колючую цвёшную чашку и остроконечные стручки. Господинъ Линней полагаеть всв роды въ XVII классъ раствній имвющих в десять тычков в в двв кучки сросшихся. (Diadelphia Decandria). По Γρεчески Βόρβονία, Φυτόν Αμερίκανον; πο Нѣмецки Die Borbonia aus Umerica; по Француски Borbonia, plante de l'Amerique; по Италіански Borbonia, pianta dell'America: по Аглински Borbonia, an American plant.

BORBONIA CRENATA Linn. Bop. воніа крената. Зубчатая Борбоніа, им теть се дцевидные многожильные зуб-

чашые лисшья.

BORBONIA LANCEOLATA Борбоніа ланцеолата. Копьенидная Борвсніа, имфеть копьевидные, иногожильные и цвльные листыя.

BORBONIA TOMENTOSA Linn. Bopboніа томентоза. Мохнатая Борьсніа им'веть продолговато круглые мохнаные листья.

BORBONIA TRINERVIA Linn. Bopвоніа тринерпіа. Борбоніа съ копьевидными, премя жилами испещренными и цёль. пыми лиспъями.

BORIVM, Bopiymb. CMompu Hellebo-

rine, Геллеборине.

BORIZA, Gopusa. Cmompu Lunaria, Лунаріа.

BORRAGO AFRICANA Linn. Boppaго Африкана. Африканская Огуречная трапа, имвешь на ввшеяхъ своихъ черенястые, и другь другу противопологаясь сидящіе лисшья, и продолговато круглые, остроконечные листочки. По Гречески Ένφρο. σινη έξ Άφρα; πο Η Εμειμι Ufricanischer Bor retsch; по Француски Bourrache d'Afrique; по Италіански Borrágine dell'Africa; по Arauncky The Africanith Borage.

BORRAGO ORIENTALIS Linn. Bops раго орієнтались; Восточная Огуречная трапа, имъешъ на подобіе сердца выръ-

занные листья.

BORRAGO FLORE ALBO, Bopparo

флоре альо. и

BORRAGO FLORE CÆRVLEO, Bop. раго флоре церулео. Смотри Воггадо обі-

cinalis, Борраго оффициналисЪ.

BORRAGO FLORE PALLESCENTE, ROSEO AVT SVAVE RVBENTE, Pit. Tour пев. Борраго флоре паллесценте, розео ауть спапе-рубенте. Огуречная трана, съ бавднорозовымъ цевтомъ; по немеция Borrerfch mit Leibfarbener Blume; no Opanпуски Bourrache à fleur couleur de chair.

BORRAGO HISPANICA LATIFOLIA, Борраго Гиспаника латифоліа. Смотря

Buglossa, Буглосса.

BORRAGO INDICA Linn. Bopparo Индика. Индіанская Огуречная трапа, имћетъ стръло подобные чашечные листоч ки. По Гречески Έυφροσινη της Ίνδίας; по Нъмецки Indianischer Borretsch; по Францу ски Bourrache des Indes; по Италіански Вог ragine Indiano; по Аглински The Indith Borage.

BORRAGO MINOR SYLVESTRIS Вограго минорь силпестрись. Смотря

Buglossa, Буглосса.

BORRAGO OFFICINAL. Linn. Bop. раго Оффицинал. Borrago floribus саги leis et albis Raii. Hist. 1, 493. Borrago ribus cæruleis, I. B. Pit. Tournef. Borrago hortensis Ger. 653. Emac. 797. Bugloffum latifolium Borrago, C. B. Pin. 256. IV. Orypeyникь, Огуречная трана, Сердечный цвъшь ась Нъмецкаго Сердечная радость, съется вы поваренных в садахы и огородахы, цвышешь во все авто и собирается вы Іюнь мёсяць. Она имбешь бълый, длинный, въ палецъ толстый, липкій, сладкій и волокнистый корень, изъ котораго вырастають широкіе, продолговатые, жесткіе, мохнованые, сморщившіеся, по краямЪ колючіе и внизу прямо, а къ верьху на искось одинъ прошивъ друга сидяще мистья, окружающие круглый, жирный, внутри пустый, превътнистый и маленькими иголочками обсаженный сшебель, производящій изъ вершины своей красивые иногда свъщно голубые, а иногда багряно видные или бълые, круглые и изъ одного на пять частей разръзаннаго и къ верьку на подобіе воронки разширяющагося листочка составленные цевшы, которые опадая оставляють каждый на своемь мъстъ по четыре черныя съмячка, испещренныя помосочками и имвющія видь змвиной гомовки. Сія права содержить въ себъ много влажности и часть соли, унимаетъ остроту въ крови, побуждаетъ на низъ, укръпляеть сердие, особливо цевны въ винь, оживляещь жизненные духи и полезна отв Гипохондрін и бієнія сердца. Лиспыя, еспыми еще молодые, имьють вкусь и запахь опуречный и употребляющся въ салащахъ. Съмя въ виноградномъ винъ умножаетъ въ кормилицах в молоко. Перегонная из в травы вода грветь, умъряеть желчь и употребляется съ пользою съ щавельною водою, д съ сладкимъ желъзо-купороснымъ спир-Momb (Spiritus Vitrioli Martis dulcis, Chupirмусь Вишріоли Маршись дулцись.) въ Меланхолических бользнях в и в горячкахъ. Въ Аптекахъ имъется права, цевты, которые считаются въ числъ сердце Украпляющих вода, перегонная вода, консерва возбуждающая мъсячное въ бъ

лом виноградном вин в приняшая. Настоенные листья и цвъты, въ какомъ нибудъ винъ, шакъ же очень полезны въ вышеупомянушых в бользияхь, в кошорых славный ГосподинЪ ДокторЪ БургавЪ совътуешЪ пишь сію траву вЪ травныхЪ чаяхЪ. Эвфрозини есть Греческое имя, значущее радость, потому что сія трава оживляеть; а Борраго есть Латинское, и какъ думають оть словь (Corago, Кораго происходящее названіе, ибо укръпляенів сердце. Господинъ Линией полагаешь ее въ V классъ Пяти тычковых В Однопестичных В раствній (Pentandria Monogynia) а Господинъ Турнефорть во II классь, въ IV отделение, I родъ правъ съ однолисточнымъ и на подобіе воронки разширяющимся цвѣтомЪ, котпорато пестикъ держить четыре мошком в обложенные зародыща, превращающіяся во сполькожь съмячекь вы цвыпной чашкъ созръвающихъ. По Гречески Егороогия: по Нъмецки Borragen, Borreisch, herhenss Rreude; по Француски Bourrache или Bourroche a fleur bleuë et blanche; no Umanianски Borragine; по Аглински Borage.

BORRAGO SEMPER VIRENS, Bopparo cemneph пиренсь. Смотри Buglossa, Вуглосса.

BORRAGO SYLVESTRIS, Boppare

силпестрись. и

BORRAGO TENVIFOLIA, Борраго тенуифоліа. Смотри Buglossum sylvestre, Буглоссумъ сильестре.

BORASS, Topacch. CMompu Rofa fyl-

veftris, Роза силвестрисЪ.

BORASSVS STABELLIFER Linn. Борассусь ставеллиферь. Смотри Phoenix dactilifera, Фениксъ дактилифера.

BORON, Eoponb. CMompu Sempervi-

vum, СемпервивумЪ.

BOSCISALVIA, Босинсалніа Смотри

Saluia agrestis, Canbia arpecmucb.

BOSEA YERVAMORA Linn. I. Бозев Іериамора, Бозев. Сіе иностранное дерево имъ

имбешь из пяши гвоздковь и одного песшика составленный цебть, пятилисточную цебтную чатку и односбмянныя ягоды. Оно можеть здбсь расти на Парниновой земль; всякіе три тода его пересаживають, выставливають сь Іюня по Октябрь мбсяць вы сады, а Зимою вносять вы Оранжереи. Господинь Линней полагаеть оное вы У классь Пятитычковых Двупестичных раствий. (Pentandria Digynia) По Гречески Воба, ξένον δένδρον; по Нъмецки Воба, cin Undlandifther Baum; по Француски Воба, arbre etranger; по Италіански Воба, albero foraftiere; по Аглински Воба а ftrange tree.

BOSMORVS, Eocmopych. Смощри Se-

famum, СезамумЪ.

BOSTOR, Босторь. Смотри Foenicu lum, Феникулумъ.

BOTIN, Bomunb. CMompu Terebinthi.

па, Теребентина.

BOTRYITES, Tompiumech. CMompu

Lunaria Лунаріа.

BOTRYS AMBROSIOIDES VULGA-RIS. Ботрись Амброзіондесь пулгарись Смотри Botrys Dod. Ботрись Дод.

BOTRYS ARTHEMISIA, Ботрись Артемизіа. Смотри Атьговія, Амброзія.

BOTRYS CHAMÆDRIOIDES, Bom-puch Xamegpiongech. Cmompu Chamaedris,

ЖамедрисЪ.

ВОТКУЅ DOD. Ботрись Дод. Chenopodium Botrys Linn. Botrys Ambrosioides vulgaris. С. В. Вотух Аттеміва Тигсіса. Еув. Chenopodium Ambrosioides folio sinuato. Pit. Tournes. V. Кудря пець, Мирь, Божій Быть, Черно-тіль, Душистая Леведа, а по переводу съ Німецкаго Турецкій Черновыльникь, Іеросалимь трана, есть низенькая травка роду гусиной лапы (Anserina) которая растеть въ полуденныхъ странахъ Россіи около береговъ рікь Волги и Иртыша, также и въ другихъ містахъ на полыхъ и солнцу подверженныхъ буграхъ и на пашняхъ, цвітеть въ Іюль и Августь, приносить съмя-

на въ Августъ и Сентябръ и собирается въ Іюль мъсяцахъ. Она имъешъ низенькій и прямый стебель, раздбляющійся на многія маленькія въщочки и окружающійся зелены ми, разнымъ образомъ на нѣсколько часшей раздъленными, продолговато - круглы ми, глубоко-высвченными и на дубовые по хожими лиспьями; цевшы бавдно - желшые, составлены изв пяти гвоздковв и раступв понъскольку вмъсшъ на подобіе кисточекь поддерживающихся маленкими пятиугольны ми и пяши листочными чашечками, кото рыя по спаденію цейнюві превращающия въ съмянодержашельницы, заключающія въ себъ кругловашыя, одношелушныя и кисшоч. ками сидящія съмяна; корень у нее бълый древесовашый и волокнистый. Вся права смо листа, имъетъ пріятный запахъ и содер жишь вр себв много существенной и лешу чен соли. Она разжижаеть, разбиваеть тонить мъсячное и въпры, выгоняеть мертвый плодъи очень полезна опів грудных в бол взней, чахопки, застарълаго кашлю, от удущя машки, и засоренія въ печенкъ; наружно при кладывающь ее оть случающейся посля ро довь въ машкъ боли, въ кошоромъ случа и перегонная съ нею вода почишается ко рошею. Употребляють ее также съ други для балсамированія ми правами вмѣстѣ мершвых в шталь и в в разных в куренідх в Многіе сущать, и кладуть ее въ шкары и сундуки между плашьемъ для збережения оных вы отв моли. Вы Аптеках в находится права, и въ нъкоторыхъ, хотя и рвано перегонная права и Консерва. Ботрись есть Треческое, от слова Вотрис, кисть проме кодящее имя, попому что цв вты и мяна сея правы расположены кисточкаму Господинъ Линней полагаетъ ее въ классь Пяшитычковых В Двупестичных в ра ствній (Pentandria Digynia); а Господин Турнефорть въ XV классъ, во П. отдъле ніе, въ IV. родъ правъ съ гвоздичным цвышомь, кошораго песшикь превращаеще

вы шелушное съмя. По Гречески Вотроз; по Ивмецки Trauben-Kraut, Kröten-Kraut, Lungene Kraut, Eurckischer Benfuß; no Француски Piment, Botris; по Иппаліански Botris, O Patienza, sorre di herba detta da alcuni Ambrosia, ch'a piccioli grappi, come di uva; по Аглински Oak of Ierusalem.

BOTRYS MEXICANA. Cod. Med. XXII. Ботрись Мексикана. Botris Ambrosioides Mexicana. C. B. Pin. 136. Raii. Hist. I. 196. Botrys Americana, Park. Theat. 89. Cheno-Podium Ambrosioides Mexicanum. Tournes. Epazoth, Atriplex odorata, Mexicana Herm. 159. Mexicanave. Hist. Oxon. II. 605. Chenopodium Ambrosioides. Linn. Мексиканскій чай или Кудрянець расшеть въ Америкъ, аздъсь полько въ нъкопорыхъ садахъ, въ коухь держишся для украшенія цвъшниковь. Онъ имъентъ волокнистые, маленкие и какъ дерево жесткіе корешки, производящіе тонвіе и длинные стебли въ двенатцать вершковъ вышиною, которые окружаются темнозелеными, длиною и шириною въ палецъ бывающими, копьевидными, зубчатыми и кръпми запахъ имъющими лисшьями и маленькими, цвъшамъ простаго Кудряпца подобими цвъточками: съмяна помълче, нежели простаго. ВЪ старину почитались листья сей травы за настоящій чай. Настоянные вЪ виноградномъ винъ почишаются полезны ми опть кровохарканія и опть молошной лихорадки у женщинь. Трава укръпляеть желу-40кв и разбиваеть запоры. Декокть изь корчей унимаетъ кровавый поносъ, разбиваетъ амень, раздвляеть распаление и полезень оть Укушенія ядовишых в звърей; а наливь гонишь мочу и производишь пошь. Господа Линней и Турнефорть полагають сію травусь Кудрянчомь въ одинъ классъ. По Гречески Вотрия, им Αμβροσία της Αμερικής; По Нъмецки Деріса-Niches Trauben-Rraut, unu Mexicanischer Thee; по Француски l'Ambroisse или le Thé du Mexique; по Италіански Ambrofia; По Аглински Ме-

Yacma I.

xico Thea uauAmerican, or Virginian Oack of Ierusalem, или Shrubby Oack of Ierusalem.

BOTRYS VERTICILLATA, Bomрись пертициплата. Смотри Снатсеdrys altera, Хамедрись алтера.

BOTRICHIVM, Bompuxiymb. Cmompa Scordium, СкордіумЪ.

BOTVA, Bomya. Смотри Pareira braua, Пареира брава.

BOVRRERIA Linn. Boyppepia. CMo. три Cordia, Кордіа.

BOVISTA, Bouncma. Cmompu Lycoperdon . ЛикопердонЪ.

BOXVS, Боксусь. Барань, родь трута на деревьях в растущій.

BOZAS, Bosach. Cmompu Fæniculum, ФеникулумЪ.

BRABEIVM STELLATIFERVM Linn. Бравеюмь степлатиферумь, есть особливое растъніе, им вющее ченырех в листочный безчашечный цввть, оставляющий круглыя мохнашыя съмянодержашельницы. Господинь Линней полагаемь оное вы IV классь четырехь тычковыхь Однопестичных в расшвній. (Tetrandria Monogynia).

BRABYLA, Брабила. Слива л'Есная. BRACHOCVCVLLI, Epaxoxyxynnu. Смотри Primula Veris, Примула ВерисЪ.

BRACOSA, Бракоза Смотри Pastinaca sylvestris, Пастинака силвестрисЪ.

BRACTEOS, Epaxmeoch. Смотри Sabina, Сабина.

BRAMECH, *Spamexb*. Cmompu Baccae lauri, Бакце лаври.

BRANCA CATHANA, Бранка катана. Смотри Hyoscyamus, Гіосціамусь.

BRANCA LEONIS, Бранка леонись. Смотри Alchimilla, Алхимилла.

BRANCA LVPINA, Бранка пупина. Смотри Cardiaca, Кардіака.

BRANCA VRSINA, Бранка урсина.

Смотри Sphondylium, СфондиліумЪ. BRANCA VRSINA ITALORVM, Бранка урсина Италорумь. Смотри Асап-BRANthus, Акантусъ.

BRANCHA, Бранха. Смотри Branca, Бранка.

BRASSICA, Брассика. Капуста, есть довольно извѣстное поваренное произрасштніе, служащее здть почти главною пищею. Капуста бываеть многих в родовь. изъ коихъ я здёсь опишу нёкоторые изъ примъчащельнъйшихъ. ГосподинЪ Линней полагаеть всв последующе роды капусты въ XV классь раствий о четырехъ неравных вычках или имбющих в цвьткахъ своихъ шесть тычковъ или мужчинокЪ, изЪ коихЪ четыре длиннве, а два другъ противъ друга стоящіе короче, и приносящих в съмена свои в в длинных в стручечкахъ, (Tetradynamia Siliquosa) a ГосподинЪ ТурнефортЪ вЪ V классЪ, вЪ IV отдъление въ I родъ травъ съ крестообразнымъ цввтомъ, которато песникъ превращается въ стручковатую двугнъздную коробочку. По Гречески Краива, Diosc. Κράμβίδιον, Poll. Κοράμβλη, 'Αμέθυσος; πο Нъмецки Ясы; по Француски Сhou; по Италіански Caolo или Caualo; по Аглински Cole, или Colewort.

BRASSICA AGRESTIS, Epaccuka arpecmucb. Смотри Perfoliata Offic. Пер-

фоліата Оффиц.

BRASSICA ALBA ET VIRIDIS. C. B. Tournef. Брассика алба эть пиридись. P. Braffica vulgaris satina Dod. Braffica alba vulgaris. I B. Braffica campefiris Linn. Cram. be. Бълая и зеленая капуста съется въ Маршъ мъсяцъ въ огородахъ, поваренныхъ садахъ и на поляхъ около городовъ и съленій и пересаживается въ Апръль и Маів мЪсяцахЪ. ВЪ деревняхЪ мужики иногда полълывають близь своих в огородовь или избъ деревянные струбы от земли аршина на три вышиною, насыпають оные землею, и стють капусту а отв ночных в заморозовъ покрывають ее рогожками. Капуста нвътетъ въ Апрълъ и прино. сишь свияна вы Маів місяці на другой

годЪ, смотря на время ее посва. имветь толстую вв землв изотнутую и нвсколькими волокнами обвёшенную, бёложелтую кочерыгу, покрывающуюся кругло. вашыми, съ начала красно-зелеными, но поспёвая бёл вющими и на длинных в, толспыхь, по краямь зубчапыхь спебляхь или кочерыжных в ошпрысках в ушверждаю. щимися и небольшой круглый кочень составляющими лисшьями. Цвѣшы, которые покрывающся кочанными лисшьями, бълые плоскіе и сосшавлены шакже какЪ и у другихЪ родовъ изъ четырехъ на подобіе креста расположенных в листочков в. Цв в тыя ча. шечки прямыя и состоять также изв четырехЪ длинненькихЪ листочковЪ. Находящіяся въ цвьть шесть тычковъ вверьху шонђе нежели въ низу и бызаюшъ чешыре длинные, а два другъ противъ стоящіе короче; пестикъ въ нихъ одинъ длинный. Послъ цвъта вырастають на цвЕшныхЪ сшебелькахЪ маленкіе, шонкіе, кругловашые и кЪ верьху острые стручики, разгороженные внутри на двъ перегородки кожицею и заключающія въ себъ мъленкія совсъмъ круглыя, черныя и перепонкою обведенныя съмячки. Сей родъ капусты употребляется наибол ве крестьянами и проспымь народомь вы ницу, а о двиспин, качествъ и употреблени ее въ Медицинъ, смотри въ главъ о красной капустъ (Brasfica rubra, Брассика рубра). По Гречески Кра́иви Леини; по Нъмецки Glatter Roll weißer Kohl, Kohl-Kraut; по Францусий Chou blond; по Ишаліански Càolo bianco; по Аглински The common или the white Colewort.

BRASSICA ALBA APII FOLIO AN-GVSTO, Брассика альа апін фоліо ам густо. и

BRASSICA ALBA APII FOLIO LATO, Брассика альа апін фоліо лато. Смотри Brassica alba Crispa, Брассика алба кри BRAS: спа.

BRASSICA ALBA CAPITE OBLON-GO, NON PENITVS CLAVSO, Epaccuka алба капите облонго, нонь пенитусь

клапзо. Смотри BRASSICA ALBA CRISPA. C. B. Pit. Tournef. Брассика альа криспа. Brassica Sábauda. Dod. Brassica Italica tenerrima glomerofa, flore albo. I. В. II. Бълая кудряная Капуста, Санойская, или Сафой Капуста, свется въ огородахъ и поваренных в садах в в В Апрыль мысяць близь стьны или забору, дабы могла безопасно стоять от съверных в вътровъ, покрывается рогожками ошр ночных в морозовъ и обсыпается трубяною сажью, чтобъ черви ея не повредили. Предъ свяніемъ свяянъ всякаго рода капусты должно оныя четверть часа мочишь въ водъ, въ которой распущена упомянушая сажа и малая часшь нашатырю. Когда капустная расада стала возвышаться надъ землею, по выкапывають и пересаживають ее въ хорошую сы-Роватую землю и на такія міста, гді много солнца. Расада от расады сажаетед на двенашцать вершковъ и прежде садки нижніе лиспъя обрубаются и кочерыта не много внизу обръзывается. Сія капуста мьтеть круглые желто - зеленые, на коропеньких в спебельках в сидяще листья, копорые обвивающся другь около друга, сое-Аиняются вверьху вмЪстЪ и составляютЪ бъловашый, круглый, но маленькій кочень вь срединъ оных в находящся бъло - желшыя, четырехъ листочные и крестообразно расположенные цвъшы, оставляющие по спаст., мъленькими съмячками наполненные спручики о двухъ перегородкахъ. О употребленіи, д'виствіи и качествах в ся смотри окрасной капуств. По Гречески Кейиви хенки тахия; по Нъмецки Wersich или Сапореть Robi; по Француски Chou frisé blanc; Chou de Savoye; по Италіански Veri o Ca-Voli Crespi; по Аглински Savoy Cabbage или Curled Zarden Colewort.

BRASSICA ALBA SESSILIS GLOMERO-SA, Брассика алба сессились гломероза. Смощри Brassica capitata, Брассика капитата.

BRASSICA ALBA VULGARIS, Брассика алба пулгарись. Смотри Brassica alba, Брассика алба.

BRASSICA ALBVLA, Брассика альула. Федерколь или Перистая Капуста, есть родь красной мыколиственной кудрявой капусты, имыющей тонкую кочерыгу.

BRASSICA ANGLICA, Брассика Англика. Смотри Brassica caulistora, Брассика кавлифлора.

BRASSICA APERTA LEVIS, Брассика аперта лешись. Смотри Braffica rubra. Брассика рубра.

BRASSICA APIANA, Брассика Апіана. Вилая Капуста. По Нъмецки Увеїєфя Яобі.

BRASSICA ARVENSIS, С. В. Ріт. Тоигпея. Брассика арпенсись. Втавіса (укvestris, Crambe dicta. Dod. Brassica campe. stris. Linn. Черная Капуста свется на поляхь для свиянь и различествуеть отв прочихь родовь капусть листьями, которые меньте, узки и приземисты и кочерытою своею, которая тонве и бываеть около двухь аршинь вышиною. Изь семяни ея выжимають масло, подобное ръпному. По Гречески Кράμβη μέλανης καὶ άγρία; По Нъмецки Roblfaat; по Француски le Colla; по Италіански Caolo rosso picciolo; по Агликски Wild colewort.

BRASSICA ASPARAGODES, CRISPA. C. B. Pin. Брассика Аспарагодесь криста. Смотри Brassica alba crispa, Брассика алба криста.

BRASSICA CAMPESTRIS Linn. Epaccuxa кампестрись. Смотри Brassica arvenfis, Брассика арвенсись.

BRASSICA CAMPESTRIS PRIMA, Брассика кампестрись прима. Смотри Perfoliata Оффиц. Перфоліата Оффиц.

BRASSICA CANINA, Bpacienca Ka-

нина. Смотри Супостатье, Пинокрамбе, и Mercurialis, Меркуріались.

BRASSICA CAPITATA ALBA, Epac-

сика капитата альа. и

BRASSICA CAPITATA LACTVCÆ НАВІТУ, Брассика капитата пактуще гавиту. Смотри послѣдующую;

BRASSICA CAPITATA MATTH. Bracсика капитата Матт. Braffica capitata alba. C B. I. B. Pit. Tournes Brassica capitata albida. Dod, Caulis capitatus vel capitulatus, Brassica sessilis et glomera turbonata, conglobata Lob. VI. Бълая Кочанная ими Копорская Капуста, свешся также какъ и Савойская вЪ поваренныхЪ садахЪ и огородахЪ и бываетЪ двухЪ родовЪ, прозимующая и лёшняя: она имбеть низкую, но претолстую, не гладкую, чешуеватую и толстоватою корою покрытую и внутри бълую кочерыту остро-сладковатаго вкуса: широкіе, почти совсёмъ круглые, красновато - зеленые, на кругловатю - острые зубчики не глубоко разръзанные, по краямъ бълые, жиловашые, и на длинныхъ и полстых , но наружно невидных в стебляхь сидящіс листья, которые покрываюнь внизу кочерыту, и опадаюнь оставляя полько верьхніе, кои также очень широки, кругловаты и бѣло - зеленато цвѣта. Сій листья обвиваются друг в около друта или покрывають взаимно другь друга въ великомъ множеспівь и сжимаются столь крепко, что составляють большой, былой, круглой, швердой и шяжелой кочань. Какь скоро оные начнушь вишься, що отородники их в обыкновенно подвязывають, дабы их в пъмь болъе сжашь. Цввшы на ней бываюшь желшые, чешырехЪ листочные и крестообразные. Находящійся вы нихъ песшикъ превращается по спаденію цетта въ длинные, узкіе, Цилиндрическіе, къ концу острые, двугивздные и мъленькія кругловашыя и перепонистыя стиячки въ себъ заключающіє стручечки. О употребленій єя на поварняхъ и въ Медицинъ смощри въ главъ о Бронколъ, (Brassica rubra, Брассика рубра). По Гречески Крадьви изфакати коини; по Нъмецки Weisser Kopf-Rohi, Rappis oder Edlies-Rraut; по Француски Chou pommé blanc или Chou cabu; по Италіански Caolo bianco con la testa, или Caolo cappuccio bianco; по Аглински White Cabbage and Coleworts.

BRASSICA CAPITATA MVRIATICA, Брассика капитата муріатика, Смотря Brassica capitata alba, Брассика капишаша алба.

BRASSICA CAPITATA RVBRA C.B. I. B. Pit. Tournes. Εραссика каπитата рубра. Braffica rubia capitata Dod. Красная Кочанная Капуста, свепіся въ огородахЪ, и поваренныхЪ садахЪ на хорошо уготовленной землъ въ исходъ марта мъсяца, бываешь шакже прозимующая и лемича и выходить изъ земли по примъ чаніямЪ Рудбекія такЪ какЪ и протчіс сорты въ десять дней. Листья у нее 6016 шіе, жиловашые, разрізаны не глубоко на острые зубчики, имъють темно-красный цвёть и выошся въ болше твердые кочни, Цвъты и съмяна такіежъ какъ у бълой. О упошребленіи ся смощри въ главъ о Бронкол в (Braffica rubra, Брассика рубра. По Гречески Кράμβη κεφαλωτή έριθρα; по нв. мецки Rother Ropf-Robi; по Француски Chou pommé или Chou cabu rouge; по Италіански Caolo capuccio roffo; по Атлин. ски Red Cabbage.

BRASSICA CAPITVLIS Брассика капитулись альидись. Смотря Braffica capitata alba, Брассика капишаша алба

BRASSICA CAVLE RAPVM GERENS, Брассика капле ранумь геренсь. Смотря Втавіса гарова, Брассика рапоза.

multi-BRASSICA CAVLIFLORA, Брассика каплифлора. Braffica florida. I. B. Brassica flore Botrytis, Lob.

Icon. Brassica Orientalis Linn. II. IIntтука, Цавтная капуста или съ НЕмецкаго Блюмколь свется въ Мартъ мъсяцъ и держиния въ шеплицахъ, цвъшеть въ Іюль и Августв, а въ Маїв ее пересаживають въ огородахъ на гряды въ швнистыхъ мъстахъ. Многе выписываютъ съмяна ее изъ Италіи и Кипра, изъ коих в первыя м влки, сухи и б влесованы, а послъднія почишаемыя за лушчія круглы, велики и красноваты. Цвътная капуста имъетъ бъло-зеленые, а иногда желтовапые въ седмь и болъе вершковъ длинные, быми жилами испещренные, оспроконечные, по краямъ мъстами разръзанные, и уже нежели у другихъ сортовъ бывающіе метья, изъ коихъ средніе или находящіеся въ срединъ походять на тобашные, вышем и составляють маленькій и мягкій кочанЪ, поверхность котораго покрыша множествомъ вмъстъ соединенныхъ и пучками растущих в бъловатых в цв в точков в, послъ коижъ остаются четверо-угольные, и черныя перепонистыя съмяна въ себъ заключающія стручки. О употребленіи и качествах в ея смотри въ о Бронколъ (Braffica rubra, Брассика рубра). По Грече-Ски Кράμβη ανθηρα; по Нъмецки Віштеп-Rohl, Laulstor, Kasekohl; no Opanuycku Chou fleur; по Италіански Cauoli fiori; По Аглински The Colliflower.

BRA

BRASSICA CAVLOIDES, Epaccuka каплоидесь. Смошри Brassica alba, Брассика

BRASSICA CAVLORAPA, Брассика каплорана. Смотри Brassica гарова, Брассика рапоза.

BRASSICA COMPOSITA, Epaccina композита. и

BRASSICA CONGLOBATA, Bpacсика конгловата. Смотри Brassica capitata, Брассика капишаша

BRASSICA CONVOLVTA, FT ARC-TE OCCLVSA RVBRO COLORE, Epac. сика конполута эть аркте окклуза рубро колоре. Смотри Braffica rubra, Брассика рубра.

BRASSICA CRISPA, Брассика криспа. Кудряная Капуста. Смотри Brasfica alba et Apiaria, Брассика алба и Aniapia.

BRASSICA CVMANA, Bpaccuka Kyмана. Смотри Braffica rubra, Брассика: рубра.

BRASSICA CYPRIA, Брассика Ципріа. Смотри Brassica Cauliffora, Брассика кавлифлора.

BRASSICA ERVCA Linn. Braccuka эрука Смотри Егиса, Эрука.

BRASSICA FIMBRIATA, Брассика фимьріата. Смотри Brassica rubra crispa, Брассика рубра криспа.

BRASSICA FLORIDA, Брассика флорида. Смотри Brassica caulistora, Брассика кавлифлора.

BRASSICA GLOMERATA, Брассика гломерата. Смотри Brassica capitata, Брассика капишаша.

BRASSICA GONGYLODES, Epacenка гонгилодесь. Смотри Braffica rapola, Брассика рапоза.

BRASSICA HIBERNA LOBELII, Bracсика гиберна Ловеліи. и

BRASSICA ITALICA, Брассика Ита. лика. Смотри Braffica Sabauda, Брассика Са. бавда.

BRASSICA ITALICA TVBEROSA, Брассика Италика тубероза. Смотри Broccoli, Брокколи.

BRASSICA LACINIATA, Bpacenka лацингата. Смотри Braffica crispa, Брассика криспа.

BRASSICA LATA ALBA, Bpaccuna лата альа. Смотри Brassica alba, Брассика алба.

BRASSICA LEPORINA, Брассика лепорина. Смотри Sonchus, СонхусЪ.

BRASSICA LEVIS, Брассика лепись. Гладкая или Синяя Капуста. По Нъмецки Вишжови.

BRASSICA MARINA, Брассика марина. Смотри Soldanella, Солданелла.

BRASSICA MARINA MONOSPERMOS, Брассика марина моноспермось. Смотри Статье, Крамбе.

BRASSICA MVLTIFLORA, Брассика мултифлора. Смотри Braffica cauliflora, Брассика кавлифлора.

BRASSICA NAPVS Linn. Брассика напусь. Смотри Napus, Напусь.

BRASSICA ORIENTALIS, Брассика оріентались. Смотри Brassica cauliflora, Брассика кавлифлора.

BRASSICA OLERACEA Linn. Брассика олерацеа. Смотри Brassica alba, Брассика алба.

BRASSICA PATVLA, Брассика па-

BRASSICA PATVLA CRISPA SA-BAVDICA AESTIVA, Брассика патула криспа Сабандика естина. Смотри Braffiса Sabauda, Брассика Сабавда.

BRASSICA PEREGRINA MEDIO CAV-LE TURBINATA ET RAPATA, Брассика перегрина медіо капле турбината эть рапата. Смощри Brassica гарова, Брассика рапоза.

BRASSICA PERFOLIATA, Брассика перфоліата. Смощри Perfoliata Offic. Перфоліата Оффин.

BRASSICA POMPEIANA, Брассика Помпеіана. Смотри Brassica Caulistora, Брассика Кавлифлора.

BRASSICA PRATENSIS, Брассика пратенсись. Смотри Carduus Pratensis, Кардуусь пратенсись.

BRASSICA PROLIFERA, Брассика пролифера. Смотри Brassica cauliflora, Брассика кавлифлора.

BRASSICA PVRPVREA, Брассика пурпуреа. Смотри Brassica rubra crispa, Брассика рубра криспа.

BRASSICA RAPA Linn. Брассика рапа. Смощри Rapa, Pana.

BRASSICA RAPICAVLIS, Epacenna

рапикаплись. и

BRASSICA RAPOSA, Брассика ра поза. Brassica caule rapum gerens Dod. Rapicaulis. Cam. Caulorapa. I. B. Chab. Gongy. Iodes. C B. Caulorapum. Lob. Tab. Ps : Hast Капуста или Брюкпа, свется въ огородахЪ и есть родЪ большой р впы. Она имвешъ кръпкую, толстую, круглую, ръдык подобную, въ земль лежащую, Нарекой кожею обведенную и вкусомЪ ръпы, шолько еще слаще кочерыту, и изъ оной вырастающіе узкія, и ръпнымь подобные листья. ЧтожЪ касается до Рып. ной капусты, оная им веть продолговатую, крѣпкую, низенькую и на четверть ар шина надъ землею вырастающую кочерыгу, и во кругъ онаго сидящіе, узкіе, зеленые лисшья, составляющіе маленькій и видъ дыньки имъющій кочень Мужики ваять ее сырую, а на поварняхь употребляють ее вы похлебкахы сы мясомы, разръзавъ на подобіе ръпы варять и при гошовливающь какь цвышную капусшу. По Гречески Кранβη άρπακτική; по нъмецки Брюква Roblrabi; a Kanycma Nibe : Robl; по Француски Choux raves; по Италіански Caolo Rapa; по Аглински Cole Rape.

ВRASSICA RVBRA CRISPA С. В. Ріг. Тоигпея. Брассика рубра криспа. Вгавіса violacea Linn. Красная, кудряпая Капуста или съ нёмецкаго Броиколь, съещся въ парникахъ, а расады пересаживающея въ корошую землю на гряды въ огородахъ на шёнистыхъ мёстахъ; она имбетъ вы соко растущую и толстую кочерыгу, и боль шіе, зелено-краснобащые, почти фіолето вые, съ низу бълъе, нежели съ верьку курчавые, великимъ числомъ жилокъ покры пыле, и въ объ стороны распространяющеся листья, которые при первомъ снът сръзывають, кладуть въ кучу, и покры

вають сивгомъ. Всв сорпы капусть содержать въ себъ много соленыхъ и масленыхъ частицъ, разтворяютъ, жидять соки и Укрѣпляють. Хорошо и не чрезъ мѣру вареная Капусша мягчить и укръпляеть желудокъ, но съ лишкомъ или чрезъ мъру вареная причиняеть ветры и запоры. Бълую или на поляхъ свемую капусту рубять мвлко, солять и положа луку, квасять: оная здёсь употребляется въ множествъ въ пищу, во щахв, въ пирогахъ и въ прочихъ кушаніяхь; также кладуть въ квашеную сію капусту цълые кочни, изъ которыхъ выжапый сокъ ежедневно употребленъ будучи вмъот пишья, иногда помогаеть от па-Аучей бользни. Приложенные къ вискамъ свъжіе листья полезны отъ сильнаго угара. Наружно варяшь ихь въ виноградномъ винъ и припаривають съ пользою старыя раны и нарывы. Смъщанный съ сахаромъ сокъ Разбиваетъ мокроты въ груди, умягчаетъ и прогоняеть хрипоту. Сырый сгоняеть бородавки. Оть ожоги прикладывають MHOTie съ успъхомъ мълко искрошенные листья съ яичнымъ бълкомъ. Охошинки до свъжихъ огурцовъ, могушъ, когда Капустные листья начнуть виться в кочень, положить в оный по отурцу, который покрывается потомъ мистьями, естьми они совсьмъ собыются. Опурцы въ кочняхъ оставляются, а сім кочни привязывающся къ навъщаннымъ въ пограбахъ шестамъ, то они сохраняются чрезъ всю зиму свъжими и зелеными. Перегонная изъ Капусты вода исцъляетъ наружно укушение бѣшеной собаки. Сѣмя томяеть глиспы. Для полученія съмянь какой ни есшь капусны, выкапывающъ поздно осенью нъсколько кочней, садяшъ въ песокъ или въ ящики наполненные землею, и стагять на зиму въ погреба, а весною пересаживающь ихъ въ огородахъ на гряды въ сырую, хорошую землю. Нажженая зола изЪ КапусшныхЪ кочерыгЪ

удабриваешъ землю, и умерщвляетъ всякіе вредные черви и гадины. Качанную капусту солять и приуготовляють рубленную съ шимономъ на зиму, а свъжую изръзавъ поливають уксусомъ и деревяннымъ масломъ и употребляють вмёсто салату. Въ Нъмецкой землъ кладушъ въ нее при соленіи можжевеловых в ягод и укропу. Кислая кочанная капуста хотя и укрвпляеть и разтворяеть, но вспучиваеть животь, и причиняеть отрышку. Меланхолики, старые и селезеночными бол взнями страдающие люди, также и женщины подверженныя частымъ маточнымъ припадкамЪ, должны воздерживаться отъ частаго такой капусты. упошребленія кислой капусты препятствуеть пространенію Антонова огня, полезенЪ ошь ожоги, ошь воспаленія вь горль, а особливо от жабы см шанный съ лимоннымЪ сокомЪ. Крестьяне кладуть дътямЪ своимЪ тепловатые листья на голову отЪ болячекъ и другихъ нечистотъ. Красная капуста возстановляеть силы, и укръпляеть желудокь. Вареныя вь водь листочныя вершинки слабять и предпочитающся упопребленныя въ питьяхъ, безопаснъйшимъ и сильнъйшимъ слабишельнымъ (смотри книгу о Медицинъ славнаго Датекаго Медика Бартолина.) Господинъ Гофманнъ совъщуеть всъмь чахотнымь и цынгошныя бользни имьющимь людямь употреблять ежедневно вареную съ говядиною и кочерыжнымъ сердцемъ отъ капусты похлебку, приложа плушЪ же не много Будры (Hedera terrestris, Гелера Террестрись), шпинашу, спаржи, крессу и цикорея. Сы солью на пяпы приложенные листья сей капусны утоляють жарь вь лихорадкахв и горячках в бывающій. Сырые обложенные около ногь унимающь подагрическую боль, а на бокъ, колотье въ бокахъ. По сняти пластыря изъ Шпанскихъ мухъ, накладывающь ихъ съ пользою на волдыри и фонтанеллы

танеллы, которыя они чистять и дълають текущими; а розсоль изв нихв вы водяной бользни очень полезень. Цвышная капуста употребляется единственно вЪ пищу и почитается за лакомство. ИзЪ Бронколя варяшь вкусныя щи, стовають съ земляными яблоками или другимъ чёмъ, и вдять къ вещчинь: Въ шеплой водъ моченые и ко лбу приложенные лисшья унимають от пьянства произшедшую головную боль. Листья варять также въ молокъ и см вшав в съ отрубями покрывают в тямь головы оть струповь. Въ сахаръ тусто завареный капустный сокъ противишся шакже хмвлю или пьянсшву. ВЪ Апшекахъ ни чего ни изъ какой капусты ГосподинЪ Линней полане дълается. всъ капусшы вЪ гаеть растый о четырехь неравныхь тычкахь, или мужчинкахъ и имъющихъ длинные стручки (Tetradynamia Siliquola) a Господинь Турнефорить вы V классь, вы IV отдъление, въ 1 родъ травъ съ крестообразно расположенным в цвътомъ, котораго песшикъ превращается въ двугнъздный стручокЪ. Брассика есть Греческое название, которое иные выводять оть слова прабий, прасики, овощь, а другіе оть глагола βράξείν; позывать; потому что капуста заслуживаеть первое мъсто между употребляемыми въ снъдь травами. Бронколь называется по Гречески Кранви арагра; по Нъмецки Braun-Rohl; по Франпуски Choux rouges crêpus; по Италіански Cauolo rosso crespo; по Аглински Red Coleworts.

BRA

BRASSICA SABAVDA, Брассика сабауда. и

BRASSICA SABAVDA CRISPA, Epacсика Сабапда криспа. Смотри Braffica alba crispa, Брассика алба криспа.

BRASSICA SATIVA, Брассика сатина. Смотри Brassica alba, Брассика алба.

BRASSICA SELINISIA, BPaccuka Ceлинизіа. Смотри Brassica Apiaria, Брассика Апіаріа

BRASSICA SELINOIDES, Bpaccurd Селинопдесь. Смотри Brassica alba crispa,

Брассика алба криспа.

BRASSICA SESSILIS, Брассика сессились. Смотри Brassica capitata, Брассика капишаша.

BRASSICA SILIQUOSA MAIOR, Смопри Брассика силикпоза мајорь. Perfoliata, Перфоліата.

BRASSICA SYLVESTRIS, Epaccuxo силпестрись. Смощри Crambe, Крамбе.

BRASSICA SYLVESTRIS HISPIDA NON RAMOSA, Брассика силнестрись гиспи да нонь рамоза. Смотри Turritis, Турритись.

BRASSICA TOPHOSA, Брассика то-Фоэа. Смощри Brassica rubra crispa, Брассика

рубра криспа.

BRASSICA VIOLACEA Linn. Bpacch ка піолацеа. Смотри Brassica rubra crispa, Брассика рубра криспа.

Брассика BRASSICA VULGARIS, пулгарись. Смотри Brassica alba, Брассина алба.

BRASSILIA ARBOR, Epaccunia ap ворь. Смотри Santalum, Санталумъ.

BRASSILIANVM ALEXIPHARMACVM Брассиліанумь Алексифармакумь. Смотри Ipecacuanha, Ипекакуанга.

BRASSILIANVM POLYCOCCOS, Boach силіанумь поликоккось. Смотри Негва Ра ris, Герба ПарисЪ.

BRASSILIVM, Bpaccuniymb. CMonney

Fernambuc, ФернамбукЪ.

BRATHYS, Epamuch. u BRATI, Брати. Смощри Sabina, Ca

BRAVEOLA, Бранеола. Смотри Су бина. anus, Ціанусь.

BRASILLETO, Бразиллето. Смотри Pléudolantalum, ПсевдосаншалумЪ.

BRE.

d

a

d

BREBOT, Бревоть. Смотри Diplacus, Аппсанусь.

BREMGI, Бремги. Смотри Нуовсуатив, Гіосціамусь.

BREPHOETONOS, Ерефетонось.

BRESILIS, Брезились. Смотри Corallium, Коралліумь.

BRETANNICA, Бретанника. Смотри

Bistorta, Eucmopma.

BRETROCHIVM, Бретрохіумь. Смо-

BREYNIA, unu Capparis Breynia Linn. II. Бренніа, есть Американское растъніе, Роду деревца приносящаго капрусы. Оно имбеть больше, и по при цввтка каждый производящие стебли, копьевидные и на мохнатых в стебельках в утверждающеся мистья и четырех в листочные цввты, копорые вырасшають из в четырех в же листоч. он дижествой наполим и оставляющь посебя черенястыя, много - твльныя и 04ногивздныя ягодки или капсулы. Господинь Линней полагаеть сте растънте въ ХПІ. классь многошычковых в однопесшичвыхъ растъній (Polyandria Monogynia). Πο Γρεчески Βρεινία, φυτόν της 'Αμερικής; πο Ивмецки Die Brennia, eine Pflanhe in Umetica; по Француски Breynia, plante de l'Amerique; по Италіански Breynia, pianta dell America; по Аглински Breynia, an Аmerican plant.

BRICIA, Бриціа. Смотри Liquiritia,

иквириціа.

N

10

M

BRINDOIN, Бриндоинь. и

BRINDONES Garz. Trag. Бриндонесь, Brindoyn Linchot. Бриндонесь есть Азіатскій плодь, который имбеть съ наружи красноватый, при созрѣваніи въ черный префащающійся, а внутри какъ кровь красный цвыть и прекрасный вкусъ: Индіанцы ѣдять сто, а изъ корня дѣлають уксусъ. Онъ въ медицинь не употребляет-

ся. По Гречески Врімдорев, карпов тів Indias; По Нъмецки Brindones, eine Frucht aus Offins dien; по Француски Brindones, fruit des Indes Orientales; по Италіански Brindones, frutto dell' Afia; по Аглински Brindones, an Afiatick fruit.

BRION, Epionb. Cmompu Caucalis,

Кавкались.

BRITANNICA, Британника. Смощри Acetosa, Ацетоза и Bistorta, Бисторта.

BRITANNICA AMERICANA, Британника Американа. Смотри Lapathum, Лапатумъ.

BRITANNICA ANGVILLARIS, Британника Ангипларись. Смонири Linaria,

Линаріа.

BRITANNICA ANTIQVORVM VERA, Британника антикпорумь пера. Смотри Lapathum, Лапатумъ.

BRIZA, Epusa. Cmompu Secale, Cerase. BRIZA ERAGROSTIS Linn. Epusa Eparpocmucb. Cmompu Eragrostis, Eparpocmucb.

BRIZA MAXIMA Linn. Бриза максима. Смощри Gramen tremulum, Граменъ премулумъ.

BRIZA MONOCOCCOS, Бриза мо-

нококкось. Смотри Zea, Зеа.

BROCA, Брока. Смотри Tamariscus;

ТамарискусЪ.

BROCHIS, Broxu b. CMompu Carduus

Mariae, Кардуусь Маріе.

BROMELIA ANANAS Linn. Бромеліа Ананась Смотри Ананав, Ананась.

BROMELIA KARATAS Linn. Epomenia Kapamach. Bromelia foliis aculeatis, racemo laxo terminatrici. Linn. VI. Cliff. p. 129. Rog. 25. Pinguin. Dill. VI. Elth. p. 320. t. CCXL. fig. 311. V. Kapamach, ecmb Aмериканское въ Мексикъ, на оспровъ Ямайкв и других в распущее распівніе, им вющев коропікій, полспый и зеленый спволь, окружающійся внизу АнанаснымЪ подобными. толстыми, по обоимъ краямъ большими, колючими иглами обсаженными жолобоващыми и какъ обръзанными листьями, съ самой средины вырасшаеть изъстебля на пос добіє Ананаснаго пучка, длинными, узкими, жальцомь оканчивающимися, внутри пунцовыми, колючими и вершинками назадь нагибающимися листочками обвивающаяся трубка; изЪ самой вершины которой показываются прекрасные аловатые, трехъ листочь ные, на подобіе кЪ верьку разширяющейся трубочки расположенные, и распростершыми пучками растущіе, внупіри шеспів желшых в шычков в им вющіе и из в шрех в лапочной длинной, зеленой и черненькими прыщечками испещренной чашечки выходящіе цвины. Посли цвина вырастають продолгованые, длинные, спручкованые и фигамъ ивсколько подобные сухіе темножелтоватые плоды, заключающие въ себъ въ прехърядахЪ лежащія темноватыя, круглыя свмяна. Другій родь сего раствнія называемаго Линнеемъ Bromelia lingulata, Броменіа лингулата. Жоловопатая Бромеліа им веть тупые, на подобіе пилы врѣзанные и колючіе лисшья и поперемінно расположенные цвётные колосья. У трешьей или Bromelia nudicaulis, голостебельной корневые листья зубчатые остроконечные, а изъ стебля вырастающіе цільные. Господин В Линней полагаеть всв сорты вы VI классь Шестишычковых в Однопестичных в раствий (Неxandria Monogynia). Πο Γρεчески Βρομελία, фитоу Аредіначо ; По Нъмецки Bromelia eine

Pfianțe in America; по Француски Bromelia plante de le Amerique; по Италіански Вго-melia, pianta delle America; по Аглински Вго-melia, an American plant.

BROMELIA LINGVLATA Linn. Бромеліа лингулата, Бромеліа плоскопе-

ристая. и

BROMELIA NVDICAVLIS Linn. Epo.

меліа нудикаплись. и

BROMELIA PINGVIN Linn. Бромеліа пингинь. Смотри Bromelia Karatas, Бромеліа Каратась.

BROMOIDES, Epomongeck. Cmomps

Bromos, БромосЪ.

BROMOS HERBA Dod. Lugd. Bromos fterilis. Linn. Aegilops prima. Math. Feftuca avenacea sterilis elatior. C. B. 00 Festuca Gazae Avena sterilis. Ad. Thal. XIV. Aukan Pomb, Опесець, или Летучій Опесь, еспь безполезное произрастение, растущее въ кл бахЪ, какЪ то въ пшеницъ, между овсомъ и ячменемъ и во ржи, кошорые часто заглушаешь, на поляхь, по дорогамь, на су жой вемав особливо послв дождей и мокрой погоды и цвътеть вы Майв, а поспъваеть авшомь. Онъ имвешь несколько шонкихв, кол Бичаных высоких в, шелухою обзе денных в спеблей или спволовъ, поддержи вающих в на вершин в своей шоненкіе, легкі на подобіе овса кЪ земаї нагнуные, кос машые, шри или четыре красные зерна! которыми осыпается прежде, упомянуные хаббы бывають сжаны, себъ содержащие и длинными, жесткими и поненкими усиками снабденные колосочки. Лисшья узкіе, перисшые, а корни многочи сленные шонкіе. Онъ причиняещь великів вредь кавбамь, чего ради и съ великимь стараніем в истребляется. Дихій Опесь содержить въ себъ посредственную часть масла и соли, сушить и чистить. Его упо требляють от всяких в нарывовь и фи стуловь или неболящих в тугих в опухолей на глазахъ полченый на подобіе пластыря ok access to MAN или припаркою ивъ его соку съ мукою смъщенчаго. Также полезень онь и оть носовых в нарывовЪ, особливо у кого ноздри згнили. ВЬ Апшенахъ его не употребляють. Эгилопев происходишь отв греческого слога Ав, агуд, коза, потому что козы его очень любять. Господинь Линией полагаеть его въ III классъ трехтычковыхъ двупестич. ныхъ (Triandria Digynia). а Господинъ Турнефорть вы XV классь, вы III отделение, вь V родь правь сь безлисточнымь цвьтомъ расположеннымъ колвицами въ колосокЪ. По Гречески Вршиос пом; по Нъмецки Bilder oder Tanb Haber; по Француски Аvoine fole, sauvage, bâtarde, Aveneron; по Италіански Biada Bastarda; по Аглински Drank or Wild Oat-Graff, Oats.

BROMOS, Epomoch. Cmompu Festuca,

Фестука.

BROMVS PINNATUS Linn. Epomycb пиннатусь. Метлика. Смотри Stipa pennata, Спипа пеннаша.

BROMVS RUBENS Llnn. Bromych py-

BROMVS SECALINVS Linn. Epomych секалинусь. Смотри Bromos herba, Бромосъ

BROMVS STERILS Linn. Epomycb стерились Смотри Вготов herba, Бромосъ

BROMVS TECTORVM Linn. Bromycb текторумь. Смотри Bromos herba, Бромосъ герба.

BROVALLIA ALIENATA Linn. HI. Бропалліа растівніе бываеть трехь родовь: alienata, аліената, скудная, demissa, демисса, повислая и elata, елаша, возвышающаяся; первая имбешь другь другу прошивоположенные листья и два длиною цв в шной трубкъ равные тычка; вторая однецвъщные стебли; а трешья одно и многоцвътчые стебли, у всъхъ пяти зубчатая цвъпная чашка, шищачный цвыпь и одногивадная свмяно держащельница. Господинъ Линней полагаеть всв роды вы XIV. классь раствий о двухь неравныхь шычкахь, и имъющихь съмянодержательницы (Didynamia Angispermia). По Гречески Βρόβαλλία άπαλλοτριωμένη; вторая, Βρόβαλλία καθειμένη, а треття Вро-Baddia Etinomén; no Homenku Die Browals на, eine fremde Pflange; по Француски Bro. vallia plante etrangere; по Италіански Вгоvallia, pianta forastiera; no Аглински Browallia an strange plant.

BROVALLIA DEMISSA Linn. Epo-

палліа демисса. м

BROVALLIA ELATA Linn. Бропал. nia enama. Cmompu Brovallia alienata, Epoвалліа аліенаша.

BRUA, Бруа. Смотри Salvia, Салвіа. BRUCHUS, Epyxych. Cmompu Eruca, Ерука.

BRUI, Бруи. Смотри Salvia, Салвіа. BRUMARIA, Брумаріа. Смотри Суclamen, ЦикламенЪ.

BRUNCUS, Брункусь. Смотри Сибcuta, Kyckyma.

BRUNEL, Boyneab. u

BRUNELLA. Brunf. Dod Epymenna. Brunella vulgaris Linn. Brunella maior folio non difsecto. C. B. Pit. Tournes. Brunella flore minore vulgaris. I. B. Prunella Fuch. Ang. Symphytum petraeum. Lobel V. Гораннка, Чер. ноголошка, Гортанная, или отмънно Гортанная трана, Слопенка, а съ Нъмецкаго Сиято-Антоніенская, есть низенкая правка растущая въ лъсахъ, на піравянистых в, сырых в, и часню каменистыхь нискихь мъстахь, вь садахь и по выгонамЪ, цвѣшешЪ вЪ Іюнѣ, Іюлѣ мъсяцахъ, и собирается лътомъ. Она им вешь тоненькіе, кусточками разположенные, четвероугольные, по землъ разстилающіеся, тоненькимъ пушкомъ обложенные, нъсколькими колънцами перехваченные шемнованные стебельки или стволики, производящіе изв каждаго колівнца по два другв **прощив**

прошивь друга на корошеньких в стебелькахЪ сидящіе, красноващые и пушистые листочки горьковато вязательнаго вкуса. ИзЪ вершины каждаго стволика вырастаешь коротенькая, либо изъ голубыхъ либо темно - фіолешовых в, но ръдко из в бълых в листочков в состоящая четвероугольмая шишка, изъ листочныхъ промежутковъ которой выходять однолисточные, составляющие раздъленною колосочки вверьху на два успъя или губки трубкою разположенные голубые или пурпуровые щевты, коихъ верьхняя губка представляеть видь шишачка, а нижняя окружается на концъ непримъщными почти иго. лочками. Сіи цвѣты поддерживаются двухЪлапочною чашечкою, украшающеюся зеленопурпуровыми мохноваными и маленькими листочками; и оставляють спадая четыре продолговато - круглые и въ цвътной чашечки раждающіяся обнаруженныя сёмяна: корешки у сей травы тоненькіе, ноздревашые и волокниешые. Она служишь ко украшенію въ садахъ, не смотря на низкій ее сиволикЪ. Темно-фіолешовые цвЪты ея, представляють, вь півнистыхь мъстахъ посъяны будучи, пріятный взору видь. Морозы ей не вредящь: ее размножающь посредствомь свиянь или пересадкою раздвленіемь кусточка. Горлянка содержишь въ себъ много масла и соли, чистить, полезна от рань, и разных въ торав случающихся болвзней, отв нарывовь и болячекь, и унимаеть кровь толченая приложенная; се употребляють въ декокшах в ошв нарывовь вы легкомь, ошь чечуя, а особливо от в жабы и других в бол взней горла, въ которыхъ случаяхъ дълаютъ изъ нее горлополоскательную воду; она разбиваеть стустившуюся и оть убоя скипъвшуюся кровь, и исцъляеть раны, разбиваеть опухоли и употребляется вы припарках от в жабы. Сокв изв нее прошивишся гнили во опту. Кроллій ушверждаеть.

будто корень ее унимаеть зубную боль, когда сухимъ тереть десны до крови, окровавленный закупаринь въ проверченную въ ивъ дырочку. Брунелла происходишъ ошЪ Нѣмецкаго существительнаго слова Вгайне Брейне, Жаба, потому, что сія трава оную абчить. Въ Аптекахъ имбется права и перегонная изъ нее вода. ГосподинЪ Линней полагаетъ ее въ XIV. классъ расшвий о двухъ не равныхъ шычкахъ и съ обнаруженнымъ въ цвъпной чашкъ съ мянемъ. (Didynamia Gymnospermia) а госпо динъ Турнефорть въ IV. классъ, въ I. от двавніе, въ VII. родъ правъ съ однолист нымъ на двв губки разръзаннымъ цвътомъ котораго верьхняя губка серповидная ими изогнушая. По Гречески Колаухола; по Нвмецки Braunelle или Brunelle, Gottheil или St. Untonii Kraut; no Opannycku Brunelle, а иные называють ее Herbe au Charpentier; по Ишаліански Brunella, по Аглински Self-heal.

BRUNELLA GRANDIFLORA Linn. Брунелла грандифлора. Велико-цивтная

голубая Горлянка.

BRUNELLA HYSSOPI FOLIO. Linn. Иссополистная Горлянка, имъешъ копье видные, равноширные, остроконечные и при земистые листья.

BRUNELLA LACINIATA Linn Брунелла лациніата. Горлянка, у которой листья разръзаны на нъсколько городковы на подобіе лоскутковъ.

BRUNELLA MAIOR FOLIO NON DISSECTO, Брунелла магорь фолго нонь диссекто. Смотри Brunella, Брунелла.

BRUNELLA PURPUREA, Брунелло

вкипецья QVARTA, Бруневла кпарта Смотри Confolida media, Консо

вкимеца SECUNDA, Брунемо

BRUNELLA SEXTA, Брунелла сек' cma. и

BRUNELLA TERTIA, Бруневла терyia. n

BRUNELLA VULGARIS Linn. Брунепла пулгарись. Смотри Brunella, Брунелла.

BRUNETA, Брунета. Смотри Суclamen, ЩикламенЪ.

BRUNGARA ARADNA, Брунгара арадна. Смотри Негва товисапа, Герба Молукана.

BRUNIA VI. Бруніа есть малоизвъстное растъніе бывающее шести родовь, коихъ первый называешся Brunia abrotanoides, Бруніа аброшаноидесь или божьему дереву подобная, и имъешъ равноширные копьевидные и понёскольку вмёсив настебелькъ сидящіе листья. 2 Brunia ciliata, Брунія циліата, имбеть продолговатокруглые, остроконечные и будню швомЪ строченные листья. 3 lanuginosa, ланутиноза, шерспистая имбеть равноширные, Распростерные, шерспистые листья. 4 Вгиnia levilan: Бруніа левизань: им вешь шучные остроконечные и на подобіе ложки расподоженные лисшья. 5 Brunia nodiflora, Бруніа но-Флора, имветь колвичатые цвыты, и черепишные ими другь друга покрывающее, на четверо разръзанные листья. 6 Brunia uniflora, Бруніа унифлора или одноцевшная им веть по одному особо сидящему цввту: всь сін сорпы сего раствиія имвють ту особливость, что цвъть у нихъ составленъ из в многих в вывств соединенных в цв в точмычекъ, коих в спички (Filamenta) соединяющся св лиспочными ногошками или самою нижнею оных в частью (unguis); струпик в или верхняя часть пестика (Stigma) расчет-Алешен на двое, а съмяна вырасшающь по Одиначкв. Господинъ Линней полагаетъ въ V. каасъ пящи шычковыхъ однопестичных в растыній, (Pentandria monogyhia). На вобхЪ прочихЪ языкахЪ Брувія.

BRUNIA ABROTANOIDES Linn. Epyніа Авротанопдесь. п.

BRUNIA CILIATA Linn. Epynia IIveniama. u

BRUNIA LANUGINOSA Linn. Epyниа линутиноза. и

BRUNIA LEVISAN: Linn. Epynia Aeписань. и

BRUNIA NODIFLORA, Boynia noдифлора. и

BRUNIA UNIFLORA, Epynia ymas

флора Смотри Вгипіа, Бруніа.

BRVNSFELSIA AMERICANA Linn. Брунсфелсіа Американская, есть Американское по имени изобръщащеля своего Доктора Брунсфелса имянованное раствніе, им вющее длинный и подобіе воронки представляющій цввть, и приносящее одноги Вздныя, многос вмянныя ягоды. Господин В Линней полаганшь оное вь V. классь пяти тычковых в однопестичных в раствній. Pentandria Monogynia). По Гречески Врвиσφελσία, φυτον της Αμερικής; πο Η Επεμκα Brunsfelsia, eine Americanische Pflanke; no Француски Brunsfelsia, plante de l'Amerique; но Ишаліански Brunsfelsia, pianta dell' America; по Аглински Brunsfellia, an American plant.

BRUSCANDULA, Брускандула. Смо-

три Lupulus, Лупулусь.

BRUSCA, Бруска. и

BRUSCUM, Epyckymb. Cmompu Ruscus, РускусЪ.

BRYARIA, Epiapia. Смотри Tamarif. сиз, ТамарискусЪ.

BRYCVMVM, Epunymymb. Cmompu Arthemisia, Apmemucia.

BRYON , Epionb. Cmompu Bryum ; Epiymb.

- BRYONIA AFRICANA Linn. Epionia Африкана. Переступь Африканскій: свется здёсь на теплых в парниках в, и различествуенть от нашего или простаго полько вЪ томъ, что имветъ видъ простерной руки, им вющій вы пяни м вспахы вразанные,

городочные и съ объихъ сторонъ гладкіе листья и большій желпый цвіть. По Гречески Вриши туѕ А'фрийс; по Нъмецки Діе Ufricanisthe Sichwurg; по Француски Couluvrée d' Afrique; по Иппаліански Brionia dell' Africa; по Аглински The Africanish Bryony.

BRY

BRYONIA ALBA Linn. Epionia ansa. Bryonia. Trag. Ges. hor. Bryonia alba. Dod. Vitis alba syluestris. Ges. Hort. Bryonia aspera, siue alba baccis rubris. C. B. Pit. Tournef. Vitis alba. Matth. Fuch. Vitis alba fiue Bryonia. I. B. V. Переступь простый или вылый, Рожденець, Тарамы шекь тра. па или Зміспа ягода, а по переводу 1/араличная рета, растеть на песчаных в и птистых в местахв, возав ствив и заборовъ и подав плешней, къ которым в она прицъпляется и обвивается до самаго верьху, цвѣтеть въ Маів мѣсяцѣ, ягоды поспввають осенью, а корень выкапывають въ Апрвав мёсяць. Сіе растеніе бываеть двухЪ половЪ мужескаго и женскаго. Оно имбеть тонкія, вбиристыя, ніжныя, не мното мохнатыя, скоро выбъгающія и крючечками своими около близь стоящих в предм втов в на подобіе виноградных в обвивающіяся лозы, окружающіяся біло-зелеными сі обінх в сторонЪ жестко шероховатыми, пушкомЪ покрышыми, на пять частей разр взанными и винораднымЪ подобными листьями. Цвъты у сего раствнія однолистные, маленькіе, бълые, расположенные колокольчиками и сидяшЪ по нѣскольку вмѣсшѣ кисшочками. Мужеекіе вырасшають изъ пятизубчатой чашечки, кЪ которой прирастають столь крепко, что ихъ оть оной почти не можно отдълить, и имъють на пять частей раздъленный цвіть и вь немь три щляпками вмёсть сросшіеся тычки или гвоздочка; а женскіе им'вюшь шакже на пяшь частей раздъленный цвъть (corolla,) зубчатую чашку, и въ цвъть на три части ращенленный пестикЪ, и оставляють по

спаденіи кругловатыя, сперыва зеленыя, но поспъвъ красныя ягодки величиною съ можжевеловыя. Сін ягодки наполнены желшовашымъ сокомъ прошивнаго вкуса и остроконечными продолговатокруглыми съмя. нами: корни у него длинные, претполстые, мочкованые и либо бълые, либо желнованые, имъющь отвратительный запахъ и торько ғашый вкусЪ. Есшь еще другой родЪ сего раствнія, приносящій совстмъ черныя яго ды, у котораго корни им вють внутри бу ковый цвѣтъ. Оный называется Вгуопіа alba baccis nigris Бріоніа алба бакцисъ ниг рись или Переступь вылый съ черными яго дами. Оба рода содержащь въ себъ много влажности, масла и соли; корни разбива юшь клейкія водянистыя мокропы, выто няющь оныя чрезь низь, мочу и рвопу возбуждають мъсячное, унимаюйь кислоту въ желудкъ, выгоняютъ мъсто и весьма полезны от одышки, подагры и всяних -селезеночных в печеночных бол взней) особливо от воденой и от припадков р -машки въ виноградномъ винъ вареныя. водяной бользни должно принимань полиора золошника въ порошокъ исполчена то и виномъ налишаго корня. Наружно раз биваеть онь шугія опухоли, и оть убол скипъншуюся кровь, также дълають изв него съ козвимъ помешомъ пластырь, кото рый приложенъ будучи на живошъ, весьма полезенъ отъ водяной бользни. Оный же пластырь приложенный къ вискамъ на обя пульса или спіановыя бьющіяся жильі рукахЪ, прогоняетъ четырехъ дневную жорадку. Наружно полезень оть колкуна или Польской волосяной бол взни. ная съ правою вода помогаетъ отъ одыни ки. Многіе совъщують прикладывать с рень съ бычачьею кровью опть рака съ винными ягодами вареный, прогоняеть св лица бородавки, шишки и родимчики или родимыя пяшна. Въ садахъ употребляющь покрыванія простых сіе растівніе RAA

авшнихъ бесвдокъ и для шпалеръ, хошя мистья его осенью и скоро опадають. ВЪ Апшеках в имбешся цълый и въ порошокъ метолченый корень. Бріонія есть Греческое оть глагола Вріш, скоро выб'єгаю, происхо-Аящее имя; ибо она въ короткое время производить свои лозы. Господинь Линней полагаеть оное въ ХХ. клась растыний, им вющих в на одномъ и томъ же корив цвъпы и мужескіе и женскіе, или съ раздівленными полами, и выдковыя шляпки срослись вмёсшё (Monoecia Syngenesia) а господинь Турнефоршь вы I. классь вы VII. отделение, вы I. роды прав съ однолистнымъ колокольчистымъ цвыпомъ, котораго чашечка превращается в вгоду. По Гречески Антелоз Лений ; по Арабски Fehre, Alfehre, Fessera, и Alfesseта; по Нъмецки Заип-Reben, Заип-Rübe, Bryonien, Cich-Rube, Stickwurg, n beisaemb. сь красными или mit rothen, и съ червыми им mit schwarzen Beeren; по Француски Bryone, Vigne blanche, Couleuvrée, Coluviée, avec des bayes rouges ou noires; no Mmaniански Brionia; по Аглински The White Bryony, or wild Vine; а другая The White Bryony with black Berries.

BRYONIA ALBA BACCIS NIGRIS, Бріоніа альа вакцись нигрись. Смотри Bryonia alba, Epionia anda.

BRYONIA AMERICANA, Epionia Aмерикана. Смотри Mechoacan, Мехоаканъ. BRYONIA ASPERA, Epionia acnepa. Смотри Bryonia alba, Бріоніа алба.

BRYONIA CORDIFOLIA Linn. Epioна кордифоліа. Переступь съ сердцевидными листьями.

9.

18

Ela.

1D

3

BRYONIA CRETICA Linn. Epionia Кретика. Переступь вълый съ двойными: подками и съ пяшилапочным в, съ верьку шево прысчатымъ листомъ. По Нъмец-Saun Reben mit doppelten Beeren; no Француски Bryone à doubles bayes; по Аглински White Bryonie with Double Berries.

BRYONIA LACINIOSA Linn Epionia зациніоза, или Ласкутный Переступь

им веть широкіе, шероховатые и копьевидными, на подобіе пилы връзанными городками окруженные листья.

BRYONIA LEVIS, Epionia neuuch BRYONIA NIGRA, Epionia unrpa. Смотри Tamnus, Тамнусъ.

BRYON PALMATA Linn. Bpionb nanмата Смотри Bryonia alba, Бріоніа алба.

BRYON LACTVCÆ FOLIIS, Epionb Лактуце фолись. Смотри Lactuca, Лактука. BRYON THALASSION, Epionb Taлассіонь. Смотри Corallina, Кораллина.

BRYON SALVTARIS, Epionb canymapuch. Смотри Lupulus, Лупулусь.

BRYOPTERIS Linn. Epionmepuch.

Смотри Lycopodium, ЛикоподіумЪ.

BRIVM, Бргумь, или по руски Чешуйчатый Линиай или Мох в бывает в многих в родовь, им веть очень маленкіе листочки и одинь пыльный мъшечекъ, сидящій на особомъ стебелькв, и будеть мною обстоятельно описань. подъ имянемъ Museus, Мускусъ.

BRYUM ACICULARE Lina. Epiymb ацикуларе. Иголчатый Мохв или Брій имвень прямо споящій пыльный мешечекъ съ выдавшеюся ложбинною крышечкою, и тонкіе прямостоящіе листочки. По Гречески Вриот даутов; по Нъмецки Падел = Доов.

BRYVM ALBIDVM Linn. Bpiymb альидумь. Бълесонатый мохь, имветь прямо стоящій пыльный мішечекь, и плоско периспые, опшопыривающеся, и туповашые листочки. По Гречески Вриог итокечnos; no Himenun Weißlichtes Moos; no Француски Mousse blanchâtre; по Италіански Muffs bianca; по Аглински The white Moff.

BRYVM ARGENTEVM Linn Epiymb аргентеумь, Серевряный мохь, расшеть въ моряхъ и имъетъ висящий пыльный мъ. шечекъ и цилиндрическія гладкія и другъ друга покрывающія въщочки или отрасли, По Гречески Вриот аруйсос; по Нъмецки Сівber See Moos; по Француски Mousse argentée de mer; no Италіански Mussa argentata marimarina; по Аглински Silver Feather - like Sea

Mosf, or red Dying sea. Mosf.

BRYVM CAESPITICIVM Linn. Бріумь Цеститиціумь. Дернопый мохь, вырасшаеть на дернинахь, имъеть висящій пыльный мъшечекь, копьевидные остроконечно-щетинные листочки и длинные черешки. По Гречески Врио Водакичь; по Нъмецки Rasen Moos; по Француски Mousse, qui croit sur les gazons; по Италіански Mussa сеspitosa; по Аглински The gréen Turf Moss.

BRYVM CELSII Linn. Бріумь Целсін. Целсівнь Мохь имбеть прямо стоящій тыльный мешечекь, длинные черешки и щетинные листочки и безстебельныя отрасли.

ВКУИМ CORNVTUM Linn. Бріумь корнутумь. Рогатый мохь, имбень крутлованый, висящій пыльный мбінечекь и остроконечные, поперемвино другь прошивь друга сидящіе листочки. По Гречески Вріоч жі атйбя; по Ибмецки Вевоній Мила по Француски Mousse cornuë; по Италіански Мияа соглита; по Аглински Тhe horned Moss.

BRYUM EXTINCTORUM, Бріумь экстинкторумь. Скрипучій мохь.

ВКУИМ FLEXUOSUM Linn. Бріумь Олексуозумь Изгивистый чешуйчатый Мохь, имвешь прямо стоящій пыльный мёшечекь, гибкіе черешки и щетиные листья. По Гречески Вріог подухацтів; по Ньмецки Вісубатев Жоов; по Француски Мощев вехівіе; по Италіански Мива вехівіе; по Аглински Flexible Мов.

ВКУИМ GLAVCUM Linn. Бріумь Гланкумь Лазореный Можь имъєть прямо стоящій пыльный мъшечекь, на подобіе дуги согнутую на оном'ь крышечку, прямые другь друга покрывающіе листочки, и вътвисты отрасли. По Гречески Вріог удалков; по Нъмецки Lichtbaues Mods; по Француски Моибе d'un bleu céleste; по Италіански Миба сстива; по Аглински Тhe skycolour'd Moss.

BRYUM MURALE Linn. Бріумь мурале. Стенный или на ствнах и изъ ствиных вразщелин вырастающій Мохв, имветь прямо стоящій пыльный мещечекь, прямые круглые листья и простыя дерновыя отрасли. По Гречески Врйог тегхілов; по Ньмецки Этаист Этов; по Француски Мочите des murailles; по Италіански Мия delle muraglie; по Аглински Тре mural Most.

BRY

BRYUM PALUDOSUM Linn. Бріумь палудозумь. Болотный Мохь, имветь тупые отпольривающієся пыльные мвшечки щетинные листочки и бываеть безстебельный. По Гречески Вріог ліргаї ; по Нъменки Ситрійней Мерв; по Француски Моибе des marais; по Италіански Миба разынова; по Аглински Тhe Fenny Moss.

вкуим PellucidvM Linn. Бріумь пеллуцидумь. Прозрачный Мохь имбень прямо стоящія пыльные мішечки, остроконечные и назадь загнушые листочки, и косьматый стебель. По Гречески Вриоч ба фаморичов; по Ивмецки Durchscheinendes Мові по Француски Mousse transparente; по Ималіански Mussa trasparente; по Аглински Тре pellucid Moss.

ВКУИМ РОМІГОКМЕ Linn. Бріумь помиформе. Видомь яблоку подобный им Круглый мохь, имветь прямые пыльные оберация в по тречески ври обергат сіпев Арбеїв рабендев Довв; по Француски Mousse ronde, qui a la figure d'une pomme; по Италіански Mussa ritonda avenda la figura d'un pomo. по Атлински Round.

ВКУИМ РУКІГОКМЕ Linn. Бріумь пириформе. Грудие индивій мохв, имветь прямыя, продолговатю круглыя шляпки им пыльные мётечки, шилу подобныя на оных крышечки, безчерешныя отрасли и продолговато - круглые туповать в листочки. По говато - круглые туповать в листочки. Обе бербай етте Вігпе фавенд; по француски Моиве, qui a la forme d'une poire; по Ипаліански Мива avenda la forma d'un pero; по Аглински Oval Moss.

ВКУ

r m

ВКУУМ RVRALE Linn. Поленой мли на поляхь растущій Мохь, имветь бльдно-зеленый цвыть, круглые назадь загибающіеся листочки, и прямые пыльные мышечки По Гречески Вдоог йуроков; по Нымецки Бею Япов; по Француски Моиме Rurale; по Италіански Мима rustica; по Аглински Ground-Moss.

ВКУУМ SCOPARIVM Linn. Бріумь скопаріумь. Вътинстый земный Мохь мучками соединенные черешки, частые назадь загнутые листочки и прямые пыльные мъщечки. По Гречески Врио оадытія ; по нъмецки Везеп. Моря; по Француски Moulfe plumens; по Италіански Мияа ясорагіа; по Аглински Веєзот Мозь.

ВКУУМ STRIATVM Linn. Бріумь стріатумь. Дорожчатый Мохь, имветь приземистые распростертые пыльные мышечки, и на оных дорожчатыя вверьму волосистыя крышечки. По Гречески Вриоч плихобля; по Нъмецки Sestreisses Moss; по Француски Mousse canelée; по Аглински Тhe chamfered Moss.

ВКУУМ SVBVLATVM Linn. Бргумь субулатумь. Шилу подобный Мохь, бываеть безчерешный и имъеть шилу подобные прямые пыльные мъшечки. По Гречески вриоу γάφω; по Нъмецки Pfriemen Moos; по Француски Mousse, qui a la forme d'un poinçon; по Аглински The pointed Moss.

BRYVM TORTVOSVM Linn. Бріумь тортуозумь. Смотри Вгуит яехиовит, вріумь флексуозумь.

ВКУУМ VERTICILLATУМ Linn. Бргумь пертициплатумь. Подсолнечный Мохь, имъеть прямо стоящіе пыльные мъщечки, тонкіе на подобіе плеточекь опрасли и круглые листочки. По Гречески Вриот Ефоновідобнитов; по Нъмецки Двігьвістьев Доров; по Француски Mousse Verticillée.

Часть І.

ВКУУМ VIRIDVLVM Linn. Бріумь пиридулумь. Зеленопатый Мохь, имъеть продолговато круглые прямые пыльные мъщечки и копьевидные остроконечные, и другь друга покрывающіе листочки. По Гречески Вдоо хлодов; по Нъмецки Стипіфіся Моов; по Француски Mousie Verdâtre; по Италіански Мия verde; по Аглински The grenish Moss.

BRYZA, Бриза. Смотри Secale, Секале. BVBLE, Бубле. Смотри Foenum Graeсит, фенумъ Грекумъ.

BVBON Linn. Бубонь. Смотри Galbanum, Галбанумъ.

BVBONIVM, Бубоніумь. Смотри After Atticus, Астерь Аттикусь.

BVBOTE, Буботе. и

BVBVE, Бубуе. Смотри Foenum Graeсит, Фенумъ Грекумъ.

BVBVLA FRAXINVS, Бубула фраженнусь. Смотри Sorbus fylvestris, Сорбусъ силвестрисъ.

BVBVLCVS, Бубулкусь. Смотри Diplacus, Дипсакусь.

BVCEANVM, Буцеанумь. Смотри Antirrhinum, Антирргинумь.

BVCECAS, Буцекась. Смотри Foenum Graecum, Фенумъ Грекумъ.

BVCEPHALVS, Бупефалусь. Смотри Tribulus aquaticus, Трибулусь акватикусь.

BVCEPOS, Буцепось. и
BVCEROS, Буцерось. Смотри Foe-

num Graecum, Фенумъ Грекумъ.

BVCHAMVM, Бухамумь. Смотри Afarum, Азарумъ.

BVCHNERA, AMFRICANA Linn. Бужнера Американа. Американская Бухнера, имъеть зубчатые, другь другу противополагаясь, сидящие листья.

ВУСНИЕКА ASIATICA Linn. Бухнера имъра Азіатика. Азіатская Бухнера имъра еть цельные, то есть не зубчатые и на искось другь противы друга сидящіе листья. У обоихы центая чатка раздёлена на пять

пять зубчиковь, цевть разръзань вверьху на пяшь же частей, а съмянодержательнина двугивздная. Господинь Линней полагаеть ихь вь XIV. классь раствый, им вющих в в невтках всемх в по четыре гвоздка, изъ коихъ два другъ прошивъ друга стоящіе длиниве, и приносящих в съмяна свои въ коробочкахъ. (Didynamia Angiosperтіа). По Гречески Вухувда Амедікачя, на 'Ao aus An ; по Нъмецки Die Umericanische und Affatische Buchnera, eine Pflanke; no Француски Buchnera de l'Amerique & d'Afie: по Ишаліански Buchnera dell' America & dell' Afia; по Аглински The Americanish and Afiatick Buchnera.

BVC

BVCIE, Bynie. Cmompu Bryonia, Epiоніа.

BVCIDA BVCERAS Linn. Byunga Byцерась есть Американское, на островъ Ямайкъ растущее растъніе, имъющее пяти - зубчатую цвътную чашку, безтрубочный въ срединъ цвъть и односъмянную ягоду. ГосподинЪ Линней полагаетъ оное въ Х классь Десяпи - шычковых в ОднопестичныхЪ раствній (Decandria Monogynia). По Нъмецки Bucida, eine Umericanische Pflanke; по Француски Bucida, plante de l'Amerique; по Ималіански Bucida, pianta dell' America; по Аглински Bucida, an American plant.

BVCRANIVM, Букраніумь. Смошри Antirrhinum, АнширргинумЪ.

BVDDLEIA AMERICANA Linn. Evg. длега есть Американское раствніе, имвющее на четыре части разръзанную цвътную чашку, четырехь - листочный цвыть, и дву - бороздчашую, двухъ гивадную многосъмянную съмянодержащельницу. По Гречески Βέδλεία, Φυτόν της 'Αμερικής; по Нъмец-Ku Die Buddleia, eine Americanische Pflanze; по Француски Buddleia, plante de l'Amerique; по Италіански Buddleia, pianta dell' A. merica; по Аглински Buddleia, an American plant.

BVFONARIA, Буфонаріа. Смотри Соtula foetida, Котула фетида.

BVFONIA TENVIFOLIA Linn. Y3KOлистпенная Буфоніа имветь четырехь. лапочную цв в тную чашку, четырех в - листочный цвьть и одногивздную, двушелу шную съмянодержашельницу. Господинъ Линней полагаеть оное во II классь Двушыч ковых в Одно пестичных в раствній (Dian, dria Monogynia). Πο Γρεчески Βεφόνια λεωζό филля; по Нъмецки Schmablatterichte Bufo nia; по Француски Bufonia à feuilles étroites, по Ишаліански Bufonia con fogliè strette; по Аглински Bufonia with narrow leaf's.

BVGIÆ CORTEX, Byrie Kopmerch. Смотри Berberis, БерберисЪ.

BVGLOSSA, Eyrnocca. CMompu Bit gloffum, Byfroccymb.

BVGLOSSA DOMESTIGA, EYPROCCO доместика. Смотри Воггадо, Борраго.

BVGLOSSA RVBRA, Byrnocca pyspa Смотри Anchufa, Анхуза.

BVGLOSSVM ANGVSTIFOLIVM Ad Lob. Буглоссумь ангустифоліумь. Ви gloffum vulgare maius I. B. Bugloffum angu stifolium maius. C. B. Pit. Tournef, Cirsium Italicum Fuch. Anchufa. Tur. Anchufa Alcibiad. Dod, Buglossa Brums, Caes. Buglossus Italica vel Gallica maior vel vera. Gef. hort. Lycop fia. Ang. Lycopsis Dod. Gal. Echium Italicum spinosum. Fuch. Icon. Anchusa angustifolia Linn. XIX Черпець или Черпонець піра ва, Волоній Языкь, Бычій Язычокь или Мужичья трапа, свется въ садах в расшень по полямь и на пашняхь, цвв теть вы Іюнь и Іюль мвсяцахь, множаешся чрезъ съмяна, а лисшья и цвв. из собирающея въ Мајъ и Гюнъ мъсяцахъ. Она имвешь длинные, посредственно ши рокіе, жесткіе, мохнатые, вокругъ колю чими иголочками обсаженные, и сизо « зеле ные лосиящіеся лисшья, изъ средины коихъ возвышающся въ шесть, девять, и двенат цапь вершковь опъ земли, круглые и щени новашые

20-

160 m

кЪ.

A Ma

Ay"

TH-

THE

an.

70-

for

esi

;

ъ.

10

новашые стебли, ращепляющеся на вершинъ своей на многія въщочки украшенныя маденькими, пурпуровыми или голубыми или быми цевточками, изы коикъ каждый имветь видь разширяющійся и въ верьху на пять частей разръзанной воронки, и оставляеть четыре черныя, подобіе зменной головки имъющія и въ цвътной чашечкъ Раждающіяся свинчки, имвющія миндальный вкусъ; корень у нее длинный, борще вому подобный, круглый, имветь снаружи черноватый, а внутри бълесоватый цвътъ и бываеть въ палецъ толщиною. Все раствніе наполнено клейко- вязашельным в со комЪ, содержишЪ вЪ себъ много влажносши, масла и соли, размягчаеть, укръпля ть грудь и сердце, чистиптъ кровь, прошиво-Ависшвуеть яду, прохлаждаеть и полезна ошь обмороковь и круженія головы. Въ виноградномъ винъ употребляемое съмя умножаешь въ кормилицахъ молоко, а истолченное и съ перегонною изъ правы водою принятое украпляеть сердце. Перегонная изъ нее вода гръешъ, унимаешъ желчныя осироты, а наружно полезна она отъ глазной боли, и ужаленія или уязвленія ядовишых в звърей и змъй. Цвъшы опитино похваляющся от Гипохондріи и Меланхоліи. Приготовуснное изр упсшревр и першовр вино политается полезнымъ отъ падучей бользни. Корень сей шравы упошребляють обыкновенно вмъсто Червяницы (Anchula, Анхуза) Аля крашенія въ красную краску. Изъ корней сдъланное красное масло полезно ошЪ Убою и продолжишельнаго кашлю. ВЪ Апше кахъ имъется трава, цвъты, считземые въ числъ ченырехъ сердце кръпишельныхъ ивътовъ, перегонная изъ нее вода, а иногда корни и консерва. Буглоссумъ есль Греческое название, происходящее от словъ Вёс, вусъ, или воос быкъ и ухибота, глосса языкЪ, ибо многіе находили сходство между листьями сей правы и бычьим в языком в. ГосподинЪ Линней полагаеть ее въ V классъ

Пяши шычковых во Одно- песшичных враствній (Pentandria Monogynia). А Господин в Турнефорть во ІІ классь, вы ІV. отдысніе, во ІІ роды травы сь одно- листочным в круглымы, или на подобіе воронки расположенным цвытом , котораго пестик в превращается вы четыре пушистые зародышки, во столько же вы цвытой чатк созрывающих сымянь перераждающійся. По Гречески Вуульогогі, по Ньмецки Освет Зипус; по Француски Bugloffe commune, Bouglofe; по Италіански Bugloffa; по Аглински Виglofs and Ox - Tongue.

BVGLOSSVM ANGVSTIFOLIVM SE-MINE ECHINATO. Pit. Tournef Буглоссумь ангустифоліумь семине ехинато. Смотри Cynoglossum minus, ЦиноглоссумЪ

минусъ.

BVGLOSSVM ARVENSE ANNVVM, LITHOSPERMI FOLIO Tournef. Буглос-сумь арпенсе аннуумь, литосперми фоліо. Смотри Lithospermum arvense, Литоспермумь арвенсе.

BVGLOSSVM CRETICVM MAIVS, Tournef. Буглоссумь Кретикумь маінсь. Echium Creticum Linn. Kanginekin Boroпій Языкь, свется здвеь для редкости вь нъкоторыхь садахь, вь которыхь служишь онь кь великому украшенію. Онь имъетъ жесткіе, и маленькіе листочки, низенькие стебельки, и бываеть съ бълыми, (flore albo, флоре албо); сЪ лазоревыми (flore coeruleo purpurants, флоре церулео пурпурание) и маленькій съ пестрыми дущисными цввнами (flore vario odorato, флоре варіо одорато). Качеством в своим в сходствуеть онь съ простымь, съ которымь и вь одинь классь полагается. По Нъмецки Die Cretische oder Candische Ochsen= Zunge, entweder mit weißen, oder himmel blauen, oder auch die kleine mit gestreifften wohrtiechens den Blumen; по Француски Grande Buglose de Candie à fleurs blancs ou azurées & petite Buglose de Candie à fleurs panacheés odo-

503

rantes; по Италіански Borragine fyluefire di Candia con fiore bianco o con fior azuro Zan. 51. e. Borragine rale, con fior odorato di Candia Zan. 47. no Аглински Ох Tongue or Bugloss of Candia with a white or tky coloured Flower; and Bugloss of Candia with a streaked sweet smelling flowers?..

BUG

BVGLOSSVM CRETICVM MAIVS FLO. RE ALBO, Буглоссумь кретикумь ма гось флоре альо. и

BVGLOSSVM CRETICVM MAIVS FLORE COERVLEO PVRPVRANTE, By*тлоссумы* Кретикумы маюсы флоре церулео пурпуранте: и

BVGLOSSVM CRETICVM MINIMVM FLORE VARIO ODORATO, BYTROCCYMB кретикумь минимумь флоре паріо оgopamo. CMompu Bugloffum Creticum maius БуглоссумЪ крешикумЪ маюсЪ.

BVGLOSSVM LATIFOLIVM, Byrnocсумь латифоліумь. Смотри Воггадо " Борparo.

BVGLOSSVM LVTEVM, Byrnocсумь лутеумь. Смотри Conyza media Кониза медіа.

BVGLOSSVM RADICE RVBRA. Byтлоссумы радице рубра. Смотри Anchula Officinalis, Анхуза ОффициналисЪ.

BVGLOSSVM SEMPERVIRENS Lob. Icon. Буглоссумь семперипренсь. Buglofsum latifolium sempervirens C. B. Pin. Tourn. Inft. 134. Anchusa sempervirens. Linn. Beerда зеленвющий Волопий Языкв, имветь широкій, борщовому совсём в подобный листь м употребляется для зелени своей ко украшенію въ садахБ. По Нёмецки Die stets grunende Ochsen-Zunge; no Opanycku Buglose, qui verdit continuellement; no umaniански Bugloffa fempre verdeggianda; по А. плински The continually verdant Bugloss.

BVGLOSSVM SILO, BYTROCCYMB CH. да. Смотри Lycopsis, Ликопсисъ.

BVGLOSSVM SYLVESTRE, Byrnoc' сумь силпестре. Смощри Есніит, Ехіумь.

BVGLOSSVM SYLVESTRE CAVLL BVS PROCVMBENTIBVS, BYTAOCCYMb спанестре канальусь прокумбентивусь. Смотри Alperugo, Acnepyro.

BVGLOSSVM VRBANVM, BYTAOC.

сумь урванумь. и

BVGLOSSVM VERVM, Буглоссумь

перумь. Смотри Воггадо, Борраго.

BVGLOSSVM VULGARE, By Troccy Mb пулгаре. Смотри Buglossum angustisolium, БуглоссумЪ ангустифоліумЪ,

BVGLOSSVS, Byrnoccycb. CMompa Buglossim . БуглоссумЪ.

BVGNA, Byrna. CMompu Betonica,

Бешоника...

BVGVLA Dod et Pit Tournef. Byry. na. Ajuga pyramidalis Linn. Consolida media pratensis coerulea. C. B. Consolida media qui busdam Bugula I. B. Confolida media et Herba Laurentiana Cast. Arthetica Pandectaril Ang. Prunella coerulea. Frag. Symphitum me dium. Lon. XI. Вологлодка, Жипучал трана или Синяя Горлянка растеть на камениспыхВ, сырыхВ и півниспыхВ мв стах в и цв втеть и собирается в в началь Іюня місяца. Она имбені двоякаго рода стебли, из в коих в цв в тоносный или производящій изЪ гершины своей цвѣты, четре рогранный, прямо спеящій и мохнашый; другой дорожчаный д пушком Б обложенный и по земя расшилающійся. Первый окру жаешся продолговаными, довольно широки ми, мягкими, кругомЪ маленькую высьчку имъющими, зелеными, или иногда красны ющими и больше душициных в бывающими листьями, сперва сладковащаго, но попюмь не много горьковащо - вязащельнаго вкуса Цввиы одно- лисшочные разрвзаны въ верь ху на одну губку, сидять одинь нады другимъ на подобіє пирамиды, и имъющь голубый, блёдно-розовый, или но весьма ръдко пепельный и бълый цвъшь. Послъ 118 bina

BUGULA SYLVESTRIS, VILLOSA, FLORE ALBO, Byryna cunnecmpuch, имплоза, флоре альо. Consolida media, Genevensis flore albo. I. B. 3. 432. Tourn. Inft. 209. Бълоцивтная Жинучая трапа.

BVGVLA SYLVESTRIS, VILLOSA FLOS RE COERVLEO. Tourn. Inst. 209. Byryпа сиппестрись, пиплоза флоре церуneo. Consolida media Genevensis I. B. Consolida media pratensis hirsuta H. R. Ajuga Genevensis Linn. Косматая Жипучая трапа, различествуеть отв простой тольвъ томъ, что спебли ея гораздо мохвашье, лисшья меньше, длиниве, зазубристве, иногда краснованыя, а иногда 61лыя и косматыя цвъщныя чашки: Сей по-Обдній родь расшень по лугамь и вы льсахЪ. Всв здёсь описанные роды сей правы содержать вы себъ много влажности и масла, и посредственную часть соли, чистять кровь, и весьма полезны оть рань, Удушія и одышки, от желчи, засоренія вы печени, селезенкы и мочевомы проходы, в особливо отъ нарывовъ въ легкомъ. На-Ружно полезны они ошЪ гнилыхЪ и вЪ шайныхр мрсшахр бывающихр фряночных на РывовЪ и ошЪ рака. Вареный изЪ травы декокть почитается полезнымь оть чакотки, слабинъ не много, исцъляетъ раны и укръпляеть печень. Въ Аптекахъ она РБАко бываеть. Бугула есть Француское оть слова Бюгав, которое то же значить, произходящее имя. Господинъ Линней полагаетъ сію праву вЪ XIV. классЪ растіній иміющихъ въ своемъ цвѣпіъ четыре тычка, изъ коихъ два длиннъе, а два короче, и у ко. ихЪ съмяна обнаружены въ цвъшныхъ чашкахъ (Didynamia Gymnospermia). a ГосподинЪ ТурнефортЪ вЪ IV классЪ, вЪ IV отдъление, въ V родъ правъ съ однолисточнымь, вверьху на однутубку разръзаннымЪ цвътомъ. По Гречески Ввувка освіа: Raxin, Reary; no Hemenkin Wild Dunfel mit blauen Blumen; no Француски Bugle fauvage veluë à fleurs bleuës; по Ишаліански Виgula syluestre hirsuta con fiori cerulei; no ATAUHCKIE The hairy Bugle with a Blew flover.

BVLAPATHVM, Булапатумь. Смотри Rhabarbarum Monachorum, Рабарбарумъ Монахорумъ

BVLB, Бульь. Смотри Milium folis, миліум'ь солись.

BVLBINA, BYABURG. W

BVLBINE, Бульине. Смотри Bulboco-dium, БулбокодіумЪ.

BVEBOCASTANVM. I. B. EYAEOXOL станумь. Bulbocastanum mas Tralliani. Lugd. Bulbocastanum maius folio Apii C. B. Pit. Tournef. Bunium Bulbocastanum Linn. Oenanthe prima Marth. Cast. Bunnium Dod. Gal. Apios. Tur. Nucula terrestris septentrionalium. Ad Lob. Pancaseolus vulgo. Caes. VI. Maiшхи, Поленыя, а по переводу земляные орышки раступь въ множествъвъ Австріи на поляхь и вь Голландіи и сушь настоящій родъ журавлинаго гороха съ прозимующимъ шишковашымъ корнемъ Vicia campestris radice tuberosa perenni, Bunia кампестрись радице тубероза перенни, также и въ Россіи въ нъкошорыхъ мъстахъ, особливо на каменистых в и не много песочь ных в, и цевтутв весною. Они бывають многихъ родовъ, но корни ихъ по большой часни выписывающь изъ Голландіи и садять вь сдъланные для нихь дощатые

SILLING OF

ящики, у коих в дно обыкновенн обываеть выбучено, потому что посаженные въ голую землю уходящь часто столь глубоко, что их в почти сыскать не льзя. Так в называемыя Мышки суть круглые, широковатые, въ большой палецъ толщиною быва. ющіе, многоп вльные, снаружи черно пемные, внушри бълые и нъсколькими хвосшиками окружающиеся продоговащые коренья, сладко - пріяшнаго и канішанному подобнаго вкуса. Сін коренья производять петрушечнымъ подобные и на длинныхъ красновашых в стебельках в сидяще листья. Стебель его раздвляется на несколько ввшвей, поддерживающих в на вершинъ своей бъленкіе, пяти листочные, на подобіе розона рисположенные, плоскими круглыми кучками или коронками растущіе и на длинных в из в одного мѣста врознь расходящихся и при основаніи своемЪ зелено - листочнымЪ вънпомь украшенных в стебельках в сидяще цввточки, посав коихв цввтная чашка превращается въ продолговатую сёмянную шишку изЪ двухЪ мѣленькихЪ, черныхЪ и пряный вкусь имвющих в зернышек в составленную. Корень употребляется въ пищу вареный, жареный и въ салашахъ, онъ сышенъ, содержить вы себв много масла и соли, укръпляеть, утоляеть всякое кровошечение и возбуждаеть любострастіе; но часто и вь больномь количеств употребленные причиняющь они выпры, обременяющь желудокь и дълають мокропу. Съмя растворяеть, а изъ цвътовъ гонять воду, которая запахомъ своимъ весьма мало розовой уступаеть. Въ Аптекахъ ихъ не держать. Бульокастанумь если Лашинское ошь словь Bulbus, Булбусь луковица и castanea, кастанеа, каштанъ происходящее имя, какъ бы сказать; растъніе, котораго корень имъетъ подобіе луковицы и вкусь кашшанной. ГосподинЪ Линней полагаетъ Мышки въ V классъ Пятипычковыхъ Двупестичных раствий (Pentandria Digynia) а Го. сподинь Турнефорть въ VII классь, въ I.

BVL

отделение, въ VI родъ правъ съ расположеннымъ круглою коронкою цевтомъ, котораго чашка превращается в в два малень. кія бороздчатыя съмячка. По Гречески 'Ауριοπάσανον, καί Βολβοπάσανον; πο Ήξιμειμε Ευδ Cicheln, Erd-Dug, Grund Cicheln, Schafer-Dug; по Француски Тетте - поіх; по Италіански Noce di terra o Bulbocastano; по Аглински Earth - nuts, Ground - nuts, Earth Chestnuts, Kipper - nuts, Pig - nuts and Hawk Nuts; 110 Голландски Muizen met staarten, Aard-akers Aard - noten.

BVLBOCODIVM CROCIFOLIVM FLO RE PARVO VIOLACEO, Бульокодіумь кроцифоліумь флоре парио піолацео. Смотря Sifyrrhingium, СизирогингіумЪ.

BVLBOCODIVM FLORE Бульоходіумь флоре плено. Смотри Natcissus fyluestris, multiplex, calyce carens, НарциссусЪ силвестрисЪ, мултиплексЪ, ка лине каренсъ.

BVLBOCODIVM HISPANICVM. 1. B. Бульокодіумь Гиспаникумь. Смотри Nat cissus major, totus luteus, calyce praelongo, Нарциссусъ мајоръ, шошусъ лушеусъ, калице прелонго.

BVLBOCODIVM MINIMVM CORO NATVM I. В. Бульокодіумь минимумь коронатуть. Смотри Narcissus montanus coronatus, Нарциссусь монтанусь нашусЪ.

BVLBOCODIVM MINVS I. B. BY 150 кодіумь минусь. Смощри Narcyffus parvus totus luteus, Наримссусь парвусь тотусь луптечсъ.

BVLBOCODIVM SEROTINVM Осенній серотинумь. Бульокодіумь цивть, имъешъ равноширные и шилу-по добные лисшья, а впрочем в сходствует в онъ съ Лилейкою, Bulbocodium vernum, Булбокодіумь вернумь, сь которою и в одинъ классь полагаешся.

BVLBOCODIVM TENVIFOLIVM FLO. RE LVTEO I. B. By neokogiymb menymb фоліумь

фоліумь флоре лутео. Смотри Narciffus montanus, Iuncifolius, calyce flauo, Hapциссусь монтанусь юнцифоліусь, калице

BVLBOCODIVM TENVIFOLIVM A. LIVD, FLORE LVTEO FIMBRIATO, I. B. Бульоходіумь тенупфоліумь аліўдь, Флоре лутео фимьріато. Смотри Narcissus montanus, alter, store simbriato, Hapчиссусь монтанусь, алтерь, флоре фим-

BVLBOCODIVM VERNVM Linn. By nвокодіумь пернумь. Лилейка растеть вь садахь, имбешь коньевидные зеленые метья, низенькіе, шестилисточные, въ срединъ на подобіе воронки расположенную трубку имъющіе и фіолето-красные цвъточки, и цвътешь съ Шафраномъ вмъсшь, чего и ради вмъстъ съ онымъ обсаживающъ им в работы или цв в тики. О Классах в смотри ниже о Сниткъ Bulbocodium Vulgatius, БулбокодіумЪ вулгаціусЪ. Ивмецки Spanische Frühlings Zeitlosen; по Француски Colchique printanier d'Espagne; по Италіански Colaco della primavera di

BVLBOCODIVM VULGATIVS. I. B. Бульоходіумь пулгаціусь Narcissus Bulbocodium Linn Bulbocodium Theophrasti Condianum, vel Condiaminum flore Codii, id est Campanula. Ges. Hort. Narcissus syluestris pallidus calice luteo, C. B. Pir. Tournef. Bulbus fyl-Vestris et Condiaminum. Ges. Hor. Pseudonarcissus, Offic. & Anglicus, Ger. 115. Emac. 133. Снитокь, Спедокь, малая Снитка, или Анкій желтый Нарциссь есть луковочное произрасштије расшущее въ садахъ, вь льсахь, по полевымъ межамъ, на лутакъ и на сырыкъ мъсшакъ, и цеттущее в Мајъ мъсяцъ. Оно есть родъ дикихъ НарциссовЪ и имветъ длинные и узкіе метья, и золото желтые, изъ шести на додобіе Нарцисса расположенных в листочсвы составленные и въ срединъ своей нарочино длинную байдно желтую и внутри пустую трубку иміющіе цвіты, выходящіе из в длинноващых в и светло-жел взнаго цвета шелухою обведенных в стволиков в. Послъ спаденія цвъщовь остаются круглыя и вь пирехъ углахъ нъсколько возвышенныя съмянныя шишки, разд вленныя внутри на три гибзда, наполняющіяся кругловатыми черными съмячками. Корень у сего расшънія луковочный и имфеть смолистый сь нъкоторою сладостью и остротою смъшанный вкусь. Корень слабить, растворяеть, разбиваеть клейкія внутри жидкости и принимается внутрь въ настойкахъ въ количествь двухь золотниковь. Булбокодіумъ есть Лапинское имя. Въ Аппекахъ ничего не имъется. Господинъ Линней полагаеть его въ VI. Классь Шестипычковых В Однопестичных В раствній, а Господинъ Турнефортъ въ IX классъ во II. ощавление, во II родъ шравъ съ однолисточным В Лихейным в цв в том в котораго чашка превращаения въ съмянодержаниель. ницу. По Гречески Вод Вохобог; по Нъменки Merken-Becher; Wilde bleich geibe Hornungs= Blume; gelber Dopsfroct; по Француски Campane jaune, Campanette, u Aiau; no Ишаліански Enula gialla; по Аглински Wild Daffodil a unu Common English Bastard Daffodil.

BVL

BVLBONAC ET BVLBONACH, Bynвонакв и булбонахв. Смотри Viola Lunaгіа, Віола Лунаріа.

BVLBONIVM, BY ABOHIYMB. CMOMPIN After, Acmeph.

BVLBVS AGRESTIS, Byneycb arpeстись. Смотри Bulbocodium, Булбокодіумь.

BVLBVS FVSCVS, BYREYCH DYCKYCH. Смотри Scylla, Сцилла.

BVLBVS MAIALIS, Eyzeych maiazuch. Сметри Bulbocodium, БулбокодіумЪ.

BVLBVS RVFVS, Byneych pygyed. Смотри Scylla, Сцилла.

M

BVLBVS SYLVESTRIS, By neych cunпестрись. Смотри Bulbocodium, Булбокодіумь. три Buphthalmum, БуфталмумЪ.

BVLBVS VOMITORIVS, Byneych Вомиторгусь. Смотри Миссагі, Мускари

BVLENGI, Буленти. Смотри Absinthiит, АбсиншіумЪ.

BULGE, Eynre. CMompu Cydonia, Hu-

доніа.

BVLGVINON, Булгинонь. Смотри Mandragora, Мандрагора.

BVLMA, Byzma. CMompu Ononis, ОнонисЪ.

BVLOGVINON, Булогинонь. Смотри Mandragora, Мандрагора.

BVLVSAR, Eynycapb. CMompu Nymphaea, Нимфеа

BVNA, Буна, Смотри Саве, Кафе. BVNA, Буна. Смотри Evonimus, ЕвонимусЪ.

BVNAPALLA, Бунапалла. Смотри Масег, мацеръ.

BVNCHOS, Bynxocb. CMompu Café,

BVNEZAT, Бунезать. Смотри Dipfacus, ДипсакусЪ.

BVNIAS, Eyniach. CMompu Napus, Напусь.

BVNIAS CAKILE Linn. Byniacb xaжиле. Смотри Cakile, Какиле.

BVNIAS ERVCAGO, Byniach spyra-

то. Смотри Егисадо, Эрукаго.

BUNIAS ORIENTALIS Linn. Byniach оргентались. Спервигусь Смотри Napus, fyluestris, напусь силвестрись.

BUNIUM ADULTERINUM, Byniymb адултеринумь. Смотри Вагвагеа, Барбареа.

BVNIVM BVLBOCASTANVM Linn. Буніумь бульокастанумь. Смотри Bulbo. castanum, БулбокастанумЪ.

BUNIUM OFFICINALE, Бунгумь оффицинале. Смотри Oreoselinum, OpeoceлинумЪ.

BVNNV, Бунну. Смотри Саfé, кафе.

BVPHTALMON, IX. Буфталмонь. И BVPHTHALMON, Буфталмонь. Смо-

BVPHTHALMON DIOSC. By&man. монь Діоск. Смотри Cotula foetida, Котула фетида.

BVPHTHALMOS, Byomanmoch. CMO-

три Buphthalmum, БуфталмумЪ.

BVPHTHALMVM AQVATICVM Linn Буфталмумь акпатикумь. Водяный Расходникь расшешь на сырыхъ и водя нистых в мъстах и имъсть продолгова. шые шупые лисшья, и изЪ сшебельковЪ оных вырастающія приземистыя и много. листочныя цевточныя чашки, а впрочих частяхь своихь сходствуеть онь сь боль шимъ Расходникомъ (Buphthalmum vulgare, БуфшалмумЪ вулгаре. По Гречески Βέφθαλ μον ένιδρος; πο Ηπαικи Waffer Minds Muge; пе Француски Oeil de boeuf aquatique; по Ишаліански Boftalmo или Occhio di bue aquatico; по Атлински The Water Ox-Eye.

ARBORESCENS BVPHTHALMVM Linn. Буфталмумь аркоресценов. Аре. песопатый вольшій Расходникь разли чествуеть от простаго беззубчатыми, другь другу прошивоположенными, видными и по нѣскольку вмѣсшѣ сидящими сво ими листьями и древесоващым в стеблем в. По Гречески Вёфваниог быбрінов; по Нъмеции Das hochwachsende stäudigte Rinds-Luge; no Француски Oeil de boeuf, qui croit en ar brisseau; по Италіански Bustalmo arboreg giando.

BVPHTHALMVM COTVLAE FOLIO Буфталмумь котуле фоліо. Смощей, tula, Komyna.

Ey & man мумь Дод. Смотри Helleborus niger Hip BVPHTHALMVM DOD. pocratis, Геллеборусъ нигеръ Гиппокращись

FILICIFOLIVM Смотри BVPHTHALMVM Буфталмумь филицифоліумь. Buphthalmum vulgare, Буфталмуг Б вум BVPH. rape.

BVPHTHALMVM FRVTESCENS Linn. Буфталмумь фрутесценсь. Кустарный большій Расходникь различествуеть оть простаго копьевидными и другь другу прошивоположенными лисшьями, двузубчаными черешками, и кустарнымъ стеблемъ.

BVHPTHALMVM GERMANICVM, Eygталмумь Германикумь. Смотри Вирь. thalmum vulgare, БуфталмумЪ вулгаре.

BVHPTHALMVM GRANDIFLORVM Linn. Буфталмумь грандифлорумь. Вепикоцпътная Пупапка имъеть от друихъ ту отмъну, что у нее листья гладкіе, копьевидные и непремівню зубчапые, и чию цввшная чашка голая. По Гречески Вёфвакμоν μέγαλευκός; по Нъмецки Rinds-Lluge mit großen Blumen; no Opanyycan Oeil de boeuf à grands fleurs; no Mmaмански В fralmo con fiori grandi; по Агмински Ox-Eye with a great flover.

BVHPTHALMVM HELIANTHOIDES Linn. Буфталмумь геліантондесь. Смо-

при Helianthemum, ГеліаншемумЪ.

BVPHTHALMVM MAIVS, Eyomanмумь магось. Смотри Leucanthemum, ЛевканшемумЪ.

BVPHTHALMVM MARITIMVM Linn. Буфталмумь маритимумь. Приморская Пупапка расшеть въ приморскихъ странахъ и отмънность ея отъ простой состоить вь томь, что листья ея клиноподобные, вътви расположены наискось фругъ противъ друга, а цвътная чашка составлена из в пупых в черенястых в листочковъ. По Гречески Вёфвах иог падавахаю. oros; по Нъмецки Das an der See wachsende Rinds-Auge; по Француски Oeil de boeuf maritime; по Ишаліански Buftalmo marino; по Аглински The Sea ox-Eye.

BVPHTHALMVM MINVS, Byomanмумь минусь. Смотри Cotula foetida,

кошула фешида.

BVPHTHALMVM SALICIFOLIVM, Linn. Буфталмумь Сапицидоліумь. Смотри Виbhthalmum vulgare, Буфталмумъ вулгаре.

Часты І.

BVPHTHALMVM SPINOSVM, By . талмумь спинозумь. Колючая пупапка имветь изв многихв остроконечных в листочков в составленную цв втную чашку, на искось другь противь друга сидящія вышви и копьевидные ц. Блыные листья. По Гречески Вёфваниог ананвию; по Нъмецки Стасий фе Minds-Blume; по Француски Oeil de boeuf Epineux; по Италіански Buftalmo spinoso; по Аглински The prickly Ox - Eye.

BVPHTHALMVM TENVIFOLIVM FO-LIO MILLEFOLII FERE. I. B. Буфталмумь тенуифоліумь фоліо миллефоліи

фере. Смотри Cotula, Котула.

BVPHTHALMVM VULGARE pan. et Hist. Buphthalmum salicifolium Linn. Buphthalmum vulgare, Chryfanthemo congener. Clus. Hist. Buphthalmus, qui est crispula herba. Amat. Chamaemelum Chryfanthemum. Fuch. Chryfanthemum verum. Ges. col. Cotula lutea, siue tertia Dod. Cotula non foetida Linn. Расходникь большой, пупанка, Ноготокь вычій, Бычій глазь, Ипань цивть или Волопые Око трапа расшешь вы лощинахы, на поляхы, вдоль по дорогамъ, на сухихъ и песчаныхъ мъстахъ, держится для украшенія цвѣтниковъ также въ садахъ и цввтеть въ Августв мъсяцъ. Сія правка имъеть тоненкіе, мягкіе, въ шесть и девять вершковъ вышиною бывающіе, и бѣлою тонкою шерстью обложенные стебли; маленькіе ДебетильниковымЪ (Tanacetum, ТанацешумЪ) подобные шерспистые, зазубрисные и копьевидные листья и большіе блёдно-желтые, видь ока представляющіе, перистые, на ромашечные похожіе цвіны, послі которых в остаются составленныя изъ многихъ маленьких в угловащых в вм вств твено соединенных в и шемноващых в съмячек в шишечки. Корень черный, волокнистый, жесткій и древесоватый. Она содержить въ себь много масла и посредственную часть соли, размягчаеть, разбиваеть, чистить и весь-

ма полезна от ранв. Перегонная св травою вода помогаеть отв желчи, отв которой бол взни соввтують употреблять вареные въ виноградномъ винъ цвъпы. Ростертые съ растопленнымъ воскомъ и приложенные цвыты разбивающь опухоли. Налишые бълымь, виномь, лисшья гоняшь, мочу и уполношь боль вы почкахь. Въ Аптекахъ ее не унопребляють. Буфталмумь происходить оть Греческихь словь Войс, Быкв, и офвакиостлазв, потому что цвъть сей травы имъеть нъкоторое подобіе в воловьим в оком в. Господин в Линней: полагаеть всв роды сей травы въ ХІХ классь раствий, въ цветкахъ коихъ пычки или мужчинки срослись вверьху одними своими шляпками, и имъющихъ множество таких в цввтовв, кои состоять вв серединъ изъ обоеродныхъ или Гермафродищныхв, а на половину или по краямь крутом в из в женских в цв почков в, оп в чего произрасшенія сего класса и названы имеющіе шляпками вверьку соединенные шычки. многобрачныя лишнія (Syngenefia Polygamia (uperflua) a Господинь Турнефорть въ XIV классь, въ III отделение, въ VII. родь правь съ круглымь периспымь цввтомЪ. По Гречески Вводах по г по Арабски Bihar: no Hömenku Gelbe St. Johanniss Blume, Rindselluge, Rinds nau Streich-Blus: me; по Француски Espargoutte Oeil de hoeuf; по Италіански Оссіно di Bue, Buftalто ; по Аглински Соттоп ох. Еуе.

BUP

BVPLEVRVM Ang. maius Gef. hort. Bynnenpymb. Bupleurum longifolium et Bupleurum rigidum Linn. Bupleurum latifolium. Tab. Bupleurum folio rigido. C. B. Pit. Tour net. Auricula leporis altera, fine rigidior. I. B. Elaphoboscum et gratia Dei Gallis Ges. hort. XV. Аминекь, Боярская Снить или Воподушка права растеть на песочныхъ молмах В, на глинистых В и каменистых В мвстахв близь рвиныхв бвреговь и невтеть вы Іюль мьсяць. Она имветь ко-

авнчашый, на двв вышви раздыляющися, и въ девять вершковъ вышиною вырастаю. щій стебель, и по оному поперем вино сидящіе, продолгованые, довольно широкіе, жесткіе, кръпкіе, жиловатые и остроконечные листья: стебельная вершинка укращается бабдно - желпыми, пяпи листочными маленькими плоскими, шаночками растущими, цев почками, ушверждающимися на длинных в изв стебля врознь расходящихся и при основании своем в зеленолисточным в вычикомЪ украшенныхЪ стебелючковЪ; послв цввта превращается его чатка въ продолговатую, изъ двухъ дорожчатыхъ, на поверьхности своей кругловатых в съмячекв составленную шишечку. Сія трава содер жишь въ себъ много соли и масла, сушишь, чистить, и весьма полезна оть рань, съмя почитается преизящнымъ средствомъ оть ужаленія змый, внутрь принятов. Бупле прумь есть Греческое оть словь воб, быкв, и тамиром бокв, происходящее Она полагается съ заечьимъ ушкомъ (Виpleurum angustisolium, БуплеврумЪ стифоліумь) въ одинъ классъ. По Грече. ски Вётлегрог; по Нъмецки Маив Девтей mit bleichgelber Blume; по Француски Рег cefeuille; по Ишаліански Perfoliata; по А глински Hares Ears broad Leau'd.

ANGVSTIFOLIVM. BVPLEVRVM Буплепрумь Ангустифоліумь. Тавети Icon. Buxb. 47: Bupleurum angustifolium Herbariorum Elem Bot. 259. Lob. Icon Auricula leporis umbella lutea. I. B. Auricula Ieporis Monspeliensium. Gesn. Hist. anim. ba vulneraria. Trag. Bupleurum folio fubrotundo fiue vulgatissimum C. B. Pit. Tournes. Mophyllon, Cord. Hift. Bupleurum tenuissis тит Linn. Гпоздочная трана или зая чье ушко, растеть на гориспыхь спахь, цвышеть вы Іюль и Августь мы сяцахь и имвешь тонкій, круглый, кій, кол внчатый, и внутри пустый стволь, въ месть, девянь и двенатцань вершков [9

I-

I=

1-

2-

10

вышиною, и зеленаго, а иногда красноватаго цвъта; простые, поперемънно вдоль по стеблю сидящіе, длинноватые, узкіе, жиловатые и при основании и всколько ширве верыхняго бывающіе листья: цвышы ея вырасшають изв стебельной вершины крутлыми коронками желпые, расположены на подобіе розона и поддерживающся длинными изъ сшебля врознь разходящимися и внизу зеленолисточным в в внчиком в украшенными стебелючками: когда сей цвътъ опадаешь, то оказываются на его мѣстъ продолгованыя, дорожчаныя. и съренкія съмяна прянаго вкуса: корень у нее маленькій, зеленовашый, и сьежившійся. Вся права имвешь пряно-горькованый вкусь, содержишь въ себъ много соли и посредственную часть масла, прохлаждаеть, отворяеть, гонить мочу и поть, разбиваеть, возбуждаеть слюну, чистить на-Рывы и полезна от ранв. Свия сущить и производишъ пошъ. Коновалы употребля. ють ее, когда случится что лошадь закована, въ которомъ случат всыпають сни истолченый изъ сущеной правы порошокъ вь рану, въ которой быль гвоздь, или мвшають сей съ корнемъ въ лошадиный кормъ. Аврикула Лепорисъ есшь Лашинское, нав словъ ушко и заячье, составленное имя, потому что въ старину находили вь мистахь ея сходство сь заячымь ушкомъ. Въ Апшекахъ ничего изъ нее не-4 влають. Господинь Линней полагаеть ее въ V, классъ Пяшишычковыхъ Двупестичных растый (Pentandria Digynia) а ГосподинЪ Турнефорнъ въ VII классъ, вы 1 от вление вы ХІ родь травы съ многолисточнымъ, и круглою плоскою коронкою растущими цвъщами, коихъ чашки прегращающся въ два шоненькія и дорожчапыя съмячка. По Гречески Тоориллог Вётлегорог; по Нъмеции Dasene Debriein; по Франпуски Oreille de Liévre; la Percefeuille viuace; по Ишаліански Marabrate; по Аглински Наres . Ear, MAN Hares . Ears narrow Leav'd.

BUPLEURUM ANNUUM ANGUSTIFO-LIUM, Буплепрумь аннуумь ангустифоліумь. Смотри Perfoliata minor, Перфоліата миноръ.

BUPLEURUM FRUTICOSUM, Бупле-

БуплеврумЪ.

BUPLEURUM LATIFOLIVM, Буплепрумь патифоліумь. Смотри Bupleurum, Буплеврумь.

BUPLEURUM LONGIFOLIUM, Буплепрумь понгифоліумь. Смощри Bupleurum,

.БуплеврумЪ.

BUPLEURUM ODONTITES Linn. Буплепрумь Одонтитесь. Смотри Регбоliata minor angustifolia, Перфоліата миноръ ангустифоліа.

BUPLEURUM PERFOLIATUM, Буплепрумь перфоліатумь. Смощри Perfoli.

ata, перфоліата.

BUPLEURUM RIGIDUM Linn. Буплепрумь ригидумь. Смотри Bupleurum, Буплеврумь.

BUPLEURUM ROTUNDIFOLIUM, Буплепрумь ротундифоліумь. Смотри Рег-

foliata, перфоліата.

BUPLEURUM TENUISSIMVM, Буплепрумь тенуиссимумь. Смотри Bubleurum angustifolium, Буплеврумъ ангустифоліумь.

BUPLEURUM VILLOSUM, Буппепрумь пиллозумь. Смотри Myosotis, Міосописъ.

BUPLEURUM VULGATISSIMUM, Буплепрумь пултатиссимумь. Смотри Auricula leporis, Аврикула лепорись.

BUPODES, Буподесь. Смотри Portu-

Паса, Портулака.

BURACH, Бурахь. Смотри Asphode-

BURATORIA, Бураторіа. Смотри Datura, датура.

BURHANINA, Бурганина. Сипорот.

жа трапа.

BURIL, Буриль. Смотри Alphodelus, Асфоделусь.

BURMANNIA BIFLORA Linn. B ypmaніа вифлора. Диойнишно цивтная Бурманніа, есть особливаго рода растініе, котораго вторый родь называется

BVR

BURMANNIA DISTICHA Linn. Eypманніа дистиха. Дпуколосная Бурманіа. Оба им вють трехь листочный цввть, разцевченную, трехъ лапочную и подобіе призмы имѣющую чашку, прехЪ гиѣздныя покрытыя свмянодержащельницы и мвлкія съмячки. Господинъ Линней полагаеть оное вь VI классъ шеститычковых в Однопеспичных в раствній. (Hexandria Monogynia.)

BVRODVC, Буродукь. Смотри Avel-

lana, Авеллана.

BVRONGI, Буронги. Смотри Cube-

bae, Кубебе.

BVRSA PASTORIS Math. I. B. Eypca Macmopuch. Thlaspi Bursa Pastoris Linn. Bursa Pastoris maior, solio sinuato. C. B Pit. Tournef. Pastoria bursa Fuch. Dod. Herba Cancri. Ger. Pera paftoris VI. Мощоночникь, Чижепь или Пастушій глазь, Ташникь или Ташка права растеть почти во всъхъ мѣстахЪ, а особливо по полямЪ, вЪ садахЪ и огородахь, въ сухихъ рвахъ и на пещаныхъ мъстахъ, цвътеть съ Маія мъсяца во все лёто и собирается въ Маїв місяців. Она имветь тоненкіе, длинные, былые и н всколькими волокнами обвещенные сладковашаго вкуса корешки, производящие продолзоватые, глубоко зубчатые, на листья полевой горчицы похожіе и по землі растилающіеся листья, между коими возвышающся нъсколько маленкихъ, въ полъ-аршина и болбе вышиною бывающих в, тонких в дорожчатыхЪ, на многія побочныя сучья или крылошки раздёляющихся, часто голых в и маленкими, видом в щавельным в подобными, у иныхъ соршовъ сей шравы зубчапыми, а у других в цвльными, и полько при томъ мъсть, гдь выходять изъ спіеблей длиные зубца им'йющими лиспіочками окруженных в стволов в, на вершинках в

коих в накв и на сучьях вырастають маленкіе бёлые, изЪ четырехъ крестообразно расположенных в листочнов в составленные и почти прямо никогда не разцавтаю. щіе цевшочки, послі коих в является множество треугольных в или сердцевидных в , плоскихЪ, на длинныхЪ и тонкихЪ стебелючках висящих в и точную фигуру зеле ной мошоночки им вющих в свиянодержательницъ или коробочекъ, которыя раздъляются внутри на два гнѣзда и наполняюшся мъленькими, почши совсъмъ круглы ми и черными съмячками. Она щипается многими въ числъ негодныхъ и часто въ огородах выпалывается. Другій главный родъ сей травы имветь темно - зеленые, круглые, во кругъ зазубристые, и жестке листья, и длинныя мошоночки. Оба содер жашь вы себь много масла и нъсковько соли, укрвпляють, сушать, вяжуть, полезны от ранъ и унимають понось, по чечуй, мочу съ кровью, кровошечение изъ носу и кровохарканіе, въ красномъ вино градномЪ винъ вареныя и исполченныя въ порошокъ и приняшыя вь бъломъ винъ уни мають самопроизвольное течение мужескаго съмяни и весьма полезны въ тяжелыхъро дахЪ, и чрезмърномъ кровошечении мъсячна го. Наружно, истолченныя съ уксусомъ, приложенныя кЪ запылку, или подвязан ная подъ подошвы уполяеть кровотечено изъ носу, въ коппоромъ случав приказыва ють ее держать вь рукь до твхв порв покуда она согрвется. Вы горячкахы и прехы дневных в лихорадках в привязывають ес съ уксусомъ къ пульсамъ. Перегонною изъ нее водою съ пользою вымывающъ раны. Рогатому скоту также и лошадям в дають сію праву съ кормомъ опъ поноса. Аптеках в имбется права, перегонная св нею пірава, а иногда и свия. Бурса Посторись есть Латинское название произко дящее ошъ словъ Бурса, мъщекъ, и па сторись, пастушій, потому что съмяно держадержашельница ся имбешь подобіє носимой пастухами за поясомЪ мошны. ГосподинЪ Анней полагаеть ее въ XV классъ раствній, имвющих в в цв втках в своих в шесть тычекь, изь коихь четыре длиннье, а двъ короче и приносящихъ корошенкіе стручки. (Tetradynamia filiculofa), а Господинъ Турнефоршь въ V классъ, во II. ощавление, въ VI родъ травъ съ крестообразнымъ многолисточнымъ цвътомь; по Нъмецки Zaschel-Kraut, Hirten=Zasche, Sackel= Mraut; по Француски Tabouret, ou Bourse a Berger; по Ишаліански Burla Paftoris; по Аглински Shepherds Purfe или greater common Shepherds Purse.

BURSA PASTORIS MONTANA, GLO-BULARIÆ FOLIO, Eypca nacmopuch Monтана, глобуларіе фоліо. Смотри Thlaspi

montanum, Тласпи монтанумЪ.

BURSA PASTORIS MAIOR, FOLIIS NON SINUATIS, Expea nacmopueb maгорь, фолись нонь синуатись. Машоночникь съ неразръзнымъ или цъльнымъ мистомъ. По Аглински Great shepherds Purle with undented or whole Leaves. Смотри Bursa Pastoris Matth. Бурса пасторись.

BUSAMIS, Bycamuch. CMompu Peuce-

danum, ПевцеданумЪ.

BUSTALMONAGON, Бусталмона.

BUSTALMUAGRION, Bycmanmyaгріонь. Смотри Arthemisia, Артемизіа.

BUTHOR MARIEN, Bymoph Mapi. ень. Смотри Сусіатен, Цикламень.

ВИТОМОЙ, Бутомонь. Смотри Асо.

rus palustris, Акорусъ палусприсъ.

BUTOMOS DAMOCRATIS, Eymomocb Дамократись. Смотри Tribulus aquaticus, Трибулусь аквашикусь.

BUTOMOS THEOPHRASTI, Eymo. мось Теофрасти. Смотри Sparganium,

СпарганіумЪ.

ВИТОМИМ, Бутомумь. Смотри Ви tomus, БушомусЪ.

BUTOMUS. Coef. Pit. Tournef. Eymomycb. Butomus umbellatus Linn. Iuncus floribus maior C. B. Calamagrostis C. B. Trag. Gladiolus aquaticus Dod. gal. Gladiolus palustris. Cord. Hist. Carex alterum. Lon. Bepвлюжые стно, Сусакь, Ситный цивть, Бълое Ситопые, Волчыя трана или Волчыи Бовы, расшеть вы водахь, вы болотахь и на сырых в мъстах в п цвътеть в в вы вы мъсяцъ. Сіе водяное произрастьніе имъеть прямыя, гладкія, ровныя, безкольнчатыя, въ маленькій палецъ толщиною и въ два аршина вышиною бывающія пірости или стволы, вырасшающие между длинными и узкими листьями и производящіе изЪ вершинЪ своих в шести - листочные, безтрубочные, на подобіе розона расположенные, либо розовые (Butomus flore rolco, Бушомусъ флоре розео) либо бълые (Butomus flore albo, Бутомусъ флоре албо), плоскими шапочками растущіе и на длинных в изв одной точки врознь разходящихся спебелочках в сидящіе цвіны; по спаденіи которых в появляется перепонистая, видъ маленькаго рожка имъющая и часто изъ шести вмъств соединенных в и по шести продолговашыхъ, шонкихъ свиячекъ въ себв заключающих в составлена свиянодержательница. Корень у сего раствнія толстый, колвичатый, былый и преволокнистый. Оно содержишь вь себь много влажности, масла и нъсколько соли, разтворяетъ и чистить; корень и съмя его почитается преизящнымъ средствомъ отъ ужаленія змъй. Бутомусь есть Греческое от словь Вой, быкъ происходящее имя, потому что быки охотно вдять его листья. Въ Апшекахъ ничего не имъешся. Господинъ Линней полагаеть оное въ ІХ классь Девяшишычковых В Шесшипесшичных В расшь. ній (Enneandria Hexagynia) а ГосподинЪ Турнефоршь въ VI классъ, въ VI ощдъ леніе, въ Х родъ травъ съ подобнымъ розону цвътомъ, котораго пестикъ превращапо Гречески Вёторог и Вёторог; по Нъмецки Звиренде Запрен; по Француски Ionc fleuri; по Италіански Giunco fiorito; по Аглински Water Gladiola или Burr Reed, Sheer Graß, Sword Graß, Burr weed, Sedge.

BVTOMVS FLORE ALBO, Eymo-

мусь флоре альо. и

BVTOMVS FLORE ROSEO, Eymomycb prope poseo. Смотри Butomus, Бутомусь.

BVXADE, Bykcage. u

BVXARION, Eyecapionb. Cmompu Sa-

tyrion, Camupion'b.

ВУХВАУМІА АРНУІЛА Linn. І. Буксвауміа афилла. Безлистная Буксвьемуміа, есть моховое раствніе, имвющее одинь пыльный мвшечекь, покрывающійся перепонистою крышечкою и сидящій на особомь стебелючкь. Господинь Линней полагаеть оное вы XXIV классь Тайнобрачныхь раствий (Стуртодатіа Миєсі, криптогаміа Мусци). По Гречески Вяловавий афилля; по Нъмецки Діє Вирвантіа офпе Діаtter; по Француски Вихвантіа івпх feuilles; по Італіански Вихвантіа белга foglie; по Аглински Вихвантіа without Leavs.

BVXIDE, Bykenge. CMompu Plantago,

Плантаго.

вухуз. Dod. I. В. Буксусь Вихиз vulgaris Trag. Вихиз arborescens, С. В. Ріс. Тоигпея. Вихиз semper virens Linn. VI. Зеленичье дерено или Букстаумь есть древесовато кустарное произрастьніе, или деревцо принадлежащее къ увеселительнымъ садамъ и бывающее шести родовъ, изъ коихъ почитаются однакожъ только два главные: высокое или большое и низкое или карла (Вихиз humilis, Буксусъ гумилисъ). Высокое, растущее деревомъ бываетъ часто въ руку толщиною, имъетъ кръпкое, желтоватое, гладкое и столь тяжелое дерево, что естьли оное въ воду бросищь, то какъ камень упадаетъ на дно вмъсто

того, что всякое другое дерево плаваеть по поверьхности оной; сверьхъ же того примъчено, что крепость и горькость его препященнуеть завестись въ немъ чер вямЪ. Оно покрывается бълою шероховатою корою и выпускаеть по бокамь множество сучьевь и вышвей окружающихся малень кими, всегда зеленвющими, толстыми продолговато - круглыми, крвикими, гладкими, лоснящимися и нЪкошорымЪ образомЪ на Миршовые похожими лисшьями пемно-зеленато првта и крвпкаго, но непріятнаго запаха и противнаго вкуса; каждый лисшокЪ удвоенЪ или двойный, шакъ что легко можно перочиннымъ но жемъ одинъ ошъ другаго ощавлишь. Цев пы на немъ и мужескіе и женскіе, растуть другь оть друга отдъленно, показывающся въ Іюнъ мъсяцъ и сущь малень. жіе, травянисто зеленые, мужескіе трехв листочную чашку и три шычка, а жене скіе четырех в листочную чашку и три пестика им вюще првты; которые после себя ничего не оставляють, мбо плодь родишся на особливомъ и ошъ цвъта оп даленномъ мъстъ, имъетъ красноватый двоть и подобіе миртовых в ягодь опрокинушаго горшечка, раздъляется виу при ни при мъста, въ каждомъ изъ ко ихЪ находишся по одной хрящевашой св мянодержащельницы, содержащей по два лоснящіяся, длинныя и шемновашыя св мячка, которыя крвпкимъ своимъ сжаще емъ (contraction) выбрасываеть изъ себя весьма далеко. Маленькое или карла быва енів ръдко выше осмнапіцани вершковы, но распроспраняется очень въ ширину ве ликимъ числомъ поненкихъ своихъ сучьевь: Листья его меньше, кругаве и зеленве вышеописаннаго, съ кошорымъ впрочемъ во всъмъ сходствуетъ, Большаго баума дерево употребляется сполярами; инспрументальщиками, токарями и двла пелями гребней на разныя ихъ рабошы. 号2年

mb

TOTO

ero

rep.

тою

TIBO

Hb-

IMI

14

pa.

IMI

He-

an

И,

100

B-

a

a-

150

T

He

e-

(3

1-

06а любять гористыя и птвнистыя мвста, и служать въ садахъ великимъ украшениемъ; ибо обсаживають ими цв втники, двлають пи-Рамиды, и прекрасные шпалеры, подстригая их в по шнуру ножницами. Пчелам в цввтв их весьма вредишелень, чего ради и должно оныя отдалять от пчельниковъ: Листья их в удобривають землю и способствують плодовиности деревъ, естьми обнаружа ихъ коренья, обложинь оные листвіем в сих в деревь, и пошомь опяшь покроешь землею. Кромъ теперь описанных в сортов в сего дерева, есть еще претій, который во время зимы долженЪ быть сохраняемь вы оранжереяхы, потому что не можеть терпьть морозовь и называется позлащеннымЪ. Сте послъднее есть РодЪ высокаго Буксбаума и названо упомяпушымъ имянемъ пошому, чио лисшья его окружены желтою коемочкою и кажупися какЪ будто позлащенные. Всв три сорта размно-*аются раздъленіемъ кустовъ и чрезъ отрасли. Зеленичное дерево содержишть въ себъ много масла: и соли, отворяетъ и го-нишь пошь. Листья почитаются Фернелі емъ слабительными и вареные съ сывороткою полезными от желчи: Многіе варять чхв вв щолокв и моюшь онымь голову, чтобъ сдълать волосы желтыми; дерево у: топия поть, и употребляет ся часто вмъсто Бакаутоваго. Приготовлен ное изъ онаго и изъ листовъ питье или декокть полезень оть фрянокь, оть поносовъ, осны и желчи: Перегонное изъ де-Рева масло лишаешь чувствь, однакожь полезно от в падучей бол взни и наружно от в зубной боли, пустых в червивых в зубовв, когда вымажешь онымъ упощребляемую зубочистику. Экстракть гонить поть, умервнутренные черви и составляеть хорошее средство от падучей бользни и Ганди. Корень соввтують всть въ случав нещастия от ужаления змви. ВЪ Аптеках в им вется дерево, и иногда перегонное масло. Буксусъ есть Греческое от слова полуотия вивердость происходящее имя, по-

тому что сie дерево крвпко и твердо: ТосподинЪ Линней полагаешЪ оное вЪ XXI... классь распівній, имвющихь на одномь и томъ же корнъ цвъты и мужеские и женскіе, и въ перывыхъ по три тычка или: мужчинки (Monoecia Triandria). а господинЪ Турнефоршь въ XVIII. классъ, во II ошдвленіе, въ Гродъ деревъ и кустарниковъ съ безлистнымъ цвътомъ, на одномъ и пюмь же распівній опів плода опід вленномь... По Гречески большое Πύξος δενδρικός; низкое, или карла Пибос тапсілос, а позлащенное Пибос хрибве; по Нъмецки І. Стобет или Hoher Bur-Baum; II. Miedriger unn Zwerg Bur-Baum; III. Berguldter Bur-Baum; no Француски I. Grand Buis ou Bouis, qui croît à la hauteur d'un petit arbre; Il Bouis à parterre; III. Bouis doré; по Міналіански I. Bosso, или Basso arboreggiando; II. Bussolo или Bosso picciolo, также nano; III Bosso dorato; по Аглински I. The great Box-tree; II. Sharp pointed Box; III. The goiden Box tree.

BUXUS ARBORESCENS С. В. Ріп. 471. Буксусь арборесценсь. Высокое или: 6ольшое деревом'в растущее зеленичье дерево. Смотри Вихия, Буксусъ.

BUXUS FOLIIS ROTUNDIORIBUS: C. B. Pit. Tournef. Eyrcych foninch po-myngiopusych. Cmompu Buxus, Eyrcych.

BUXUS HUMILIS. Dod. Буксусь гумились. Ниское зеленичье дерево или карла. Смощри Вихиз. Буксусъ.

BUXUS MAIOR, FOLIIS PER LIM-BVM AVREIS. H. R. Par. Byrcych maioph poninch neph лимбумь апренсы. и

BVXVS SEMPERVIRENS Linn. Byk-

сусь семперпиренсь. и

BUXVS: VULGARIS, Буксусь пул-

BUZNARIAM, Бузагорамь. и:

BUZNARUM, Бузнарумь. Смотри Ze-doaria, Зедоаріа.

BUZERAS, Bysepach. m

BUZEROK, Бузерокь. и

BUZEROS, By sepoch. Cmompu Foenum

Graecum, ФенумЪ ГрекумЪ.

ВУЅЗИЅ FLOS AQVÆ Linn. XII. Виссь, Водиная тина, или цивть есть родь пюнчайшаго водянаго пороста, плавающаго по поверыхности водь и состоящаго изъ множества перистыхь волошей. Господинь Линней полагаеть всв сорты онаго въ XXIV. классь тайнобрачных растый, или у коихъ корень, стволь, и листья составляють одну штуку, такъ что никакой части различить не можно. (Стуртодатіа Algae) по Гречески Виотос.

BYSSUS, Enceyeb. Byssus velutina. Плесень есшь несовершенное, обыкновенно помощію паровь изв разныхв жидкостей и сырости проискодящее раствніе, которому наружный, сырый и шеплый воздух в поспъществуещь в в приращеніи, что довольно явствуеть изв газных в опышовь: ибо родишся плесень лешомь скорве, нежели зимою и въ шеплыхъ горницахъ, или погребах в нежели в в холодных в, пошому чшо наружная теплота пары притягиваеть, а внутренняя всякой вещи плесень составляющей жидкости умножаеть. Плесень бываеть синяя, бълая, зеленоватая, а иногда и из Бразных Б цввтовь смвшанная, какь то бывающая на каменьяхъ (Byffus faxatilis, Биссусъ саксатились) им веть обыкновенно пепельной или черной цвъть. Когда разсматривается плесень чрезъ увеличивающее стекло, то представляется она на подобіе испещреннаго луга, и видны сидящіе на волошях в или нишках в ед непримъщныя головочки маленькими грибочками. Вомногіе родах в плесени зараждающся по томЪ червячки. ИзЪ сего заключить можно, что всёмъ шёмъ вещамъ, кои должны бышь сберетаемы ошь плесни, надобно им вшь нъкошорую густоту или твердость и никакой лишной на поверхности жидкости и сырости, а когда оная начнень на нихъ садинься, що должно ихъ заблаговременно ощь оной очищать. По Гречески Ейрыс; по Нъмецки Schimmel; по Француски Moifishure, Barbe; по Италіански Мияа или Lanugine.

BYSSVS CRYPTARVM Linn. Биссусь криптарумь. Въ подземныхъ каменныхъ строеніяхъ бывающая плеснь. Смотри Вуз-

fus, БиссусЪ.

BYSSVS SAXATILIS Linn. Euccych carcamunuch. u

BYSSVS VELVTINA Linn. Euccycb

пелутина. Смотри Byffus, Биссусъ.

BYTTNERIA SCABRA Linn. Bummul. ріа скабра. Шерохопатан Биттнеріа, еспъ Американское растъніе, имъющее длинный, темно-зеленый, угловатый и по тремв своимЪ споронамЪ длинными вершинками своими нъсколько внизъ загнущыми иглами обсаженный сшволЪ, окружающійся большими, н⁸ одной половинѣ шемнѣе, нежели на другой бывающими, длинных в игламиж в обсаженных в сшебельках в сидящими и Померанцовым видомЪ подобными листьями. При основаніи листовых вырастають листочные, на подобіе звіздки расположен ные, но ръдко совсъмъ раскрывающиеся блай нокрасные, сЪ исподи желшоватые, изъ пяшилисточной звъздовидной чащечки вырастающіе и пяшь красновашых в шычковв, комхв спички или волоши (Filamenta) срослись внизусь листочками, им вющіе цввиючки, посл в комкв остающся пятисъмянныя остроконечныя съмя нодержащельницы. Господинь Линней полага еть сте растьне вы V классь Пятитычко вых вых Однопестичных в растыній (Pentandria Monogynia). Πο Γρεчески Βυττνέρια, φυτόν της Α. реріять; по Нъмецки Die Butmeria in America; по Француски Byttneria plante de l'Amerique по Ишаліански Byttneria pianta dell'America по Аглински Byttneria an American Plant.

конець І части.





системы господина линнея.

REGNVM VEGETABILE И A P C T B O P A C Т Ѣ Н I Й.

DELINEATIO PLANTAE. ИЗОБРАЖЕНІЕ РАСТЬНІЙ.

I. THEORIA.

или мысленное описание.

TENUS. POAB.

Nomen selectiffimum, Избраннъйшее имя.

Character naturalis, Естественный видь.

Character effentialis, Существенный видъ.

Character artificialis, по наукт описанный видъ.

Classis ordoque systematis præstantissimi, классъ и порядокъ по наилучшему расположению.

Ordo naturalis demonstrativus, Порядокъ естественный доказательный.

Species. Спеціесь. Видь или фамилія.

Nomen triviale, Простое имя или название.

Differentia specifica demonstranda, Разность къ виду относящаяся доказательства требующая.

Differentia specifica certissima, Разность къ виду относящаяся върнъйтая.

Differentia specifica breuissima, Разность къ виду относящаяся кратчайшая. Critica, Критика или настоящее назнаніе разных в родонь и пидонь раствній.

> Etymologia nominis generici, Происхохожденіе имени родоваго.

> Etymologia nominis specifici, Происхожденіе имени къ виду относящагося.

> Inventor cum tempore, Изобръщатель и время, ъъ которое онъ жилъ.

II. DESCRIPTIO, OПИСАНІЕ.

т Radix, Корень выпаеть Duratione, долгольтствиемь или продолжениемь времени. Аппиа, однольтний. Вісппіз, двультній. Регеппіз, многольтній, также прозимующій.

Figura, наружнымь индомь.

а. Fibrola, волокнистый.
Ramola, вътвисшый.
Fuliformis, верешену подобный.
Praemorla, жъ верьку, какъ бы обгрызенъ.

b. Repens, въ землъ далеко поперегъ распространяющійся, и отростки отростки отростки

Articulata, кол вичатый, или членный. Dentata, зубчатый.

с. Globofa, круглый, шаровидный. Tuberofa, шишковашый, или изъ кругловашыхъ между собою соединенныхъ частей состоящій.

Fasci-

Su

Fascicularis, по пучкамЪ расположенный, или изЪ нъсколькихЪ пучковЪ составленный.

Palmata, на подобіе ладони расположенный.

d. Bulbofa, шишковатый, или на подобіе луковицы изъ многихъ другъ въ другъ заключенныхъ пленокъ состоящій.

Granulata, зерновидный.

Truncus. Пень, бываеть. Specie, родомъ или видомъ.

Caulis, стебель.

Culmus, стволь: какъ у Пырея &. Scapus, безлистный, но плодоносную часть производящій стебель.

Stipes. ЧерешокЪ или листовый стебел юкЪ.

Duratione, продолжениемъ времени и свойствомъ.

Herbaceus, травянистый, а по Философіи Господина Линнея, прозимующій, но лишающійся листьевь.

Sufficiticolus, нѣсколько древесоватый, или кустарниковый.

Fruticofus, кустом Брастущій, кустованый.

Arboreus, дрегесный или собственно пънь.

Solidus, твердый, плотный.

Inanis, пусшый, внушри дуплистый. Fistulosus, дотковатый.

Mensura, msporo.

A linearis, равноширный.
Vnguicularis. съ ногошь.
Pollicaris, въ дюймъ.
Palmaris, въ чешвернь аршина.
Spithameus, въ пядень.
Dodrantalis, въ чешвершь.
Pedalis, въ футь или въ шесть

Pedalis, въ футь или въ шеств вершковъ съ половиною.

Orgyjalis, въ охватъ шолщиною.

Directione, наклонениемь.

z. Erectus, прямостоящій.

Strictus, сжавшійся, или прижавшійся. Rigidus, твердый.

Laxus, вялый.

Obliquus, наклоненный.

Adscendens, поднимающійся къверьку. Declinatus, загибающійся въ низъ. Incuruatus, искривленный.

Nutans, висячій, колеблющійся, качающійся.

Diffus, расширенный, расширяю щійся, распускающійся.

Procumbens, поперегъ по земл^в лежащій.

Stoloniferus, по бокамЪ отпрыски пускающій.

b. Sarmentolus, выющійся. Radicans, корнемъ въ землю идущій. Repens, расшилающійся.

c. Geniculatus, колънчашый. Flexuolus, изгибисшый. Scandens, восходящій.

Volubilis, восходящій чрезъ стороно нія отрасли.

Sinistrorsum, на правую сторону. Dextrorsum, на аввую сторону.

Figura, наружнымь пидомь.

а. Teres, круглый, прубкою, цилиндо рообразный.

Semiteres, полукруглый. Compressus, сжапый.

Anceps, на два угла раздъленный 3 10. Angulatus, от трехъ до 10. угловъ имъющій.

Acutangulus, остроугольный. Obtufangulus, тупоугольный.

b. 3 6, Gonus, трехь, четырехь, пяти, и шести угольный.
3. 5. queter, трехь, четырехь

пяти сторонній. Vestitu, покрыщкою или опущкою.

Nudus, голый,
Aphyllus, безлистный.
Foliatus, листьями обсаженный.
Vaginatus, лунковатый, вогнутый.

Squammofus, чешуеватый, или чешуйками покрытый.

Imbricatus, черепишной, или выложенный на подобіе черепицы.

Superficie, поперхностью.

a. Tuberolus, круглый. Rimolus, разсълистый. Tunicatus, корою покрытый.

b. Læuis, гладкій. Striatus, бороздчатый дорожчатый. Sulcatus, сплюснутый, бороздчатый.

с. Glaber, гладкой.
 Scaber, шароховатый.
 Muricatus, на подобіе раковины.
 Tomentofus, мошистый, мохнатый.
 Villofus, волосками покрытый.
 Hispidus, шершавый, или острыми щетиночками обсаженный.
 Aculeatus, итолчатый.
 Spinofus, колючими иголочками обсаженный, колючими иголочками обсаженный, колючий.

Vrens, жгучій.
d. Stipulatus, чешуйчатый.
Метьгапаtus, пленчатый, перепоночной.
Виlbiferus, из Б многих Б друг Б друга покрывающих Б перепонок Б со-

Compositione, сложениемь.

a. Enodis, цълый, безкол внуатый. Simplicissimus, самый ръдкій, проствищій.

Simplex, ръдкій, простый.

b. Articulatus, составчатый, кол вичатый. Prolifer, простый, и только из вершины выходящія вышви им вющій. Dichotomus, развалистый, на двое раздылющійся.

Brachiatus, прямо вЪ ширину распрошершыя вѣшви имѣющій.

с. Subramosus, нѣсколько вѣшвисшый. Ramosus, вѣшвисшый. Ramosissimus, превѣшвисшый.

d. Virgatus, грудсю растущій, а иногда лозъ подобный. Рапісиlatus, цвътоносный. e. Patens, оттопыривающійся. Dinaricatus, растопырившійся, разогнутый.

Ramis, вътвями.

a. Structura Caulis et Frondis, по положенію стиола и сучкопь.

b. Alternis, поперемѣнно разпоряженными, или расположенными.

Distichis, по двумъ бокамъ сидящими. Sparsis, безъ всякаго порядка разметанными.

Confertis, близко или плошно одна возлъ другой сидящими.

Oppositis, противоположенными, или другъ противъ друга сидящими. Verticillatis, вокругъ до самаго верьку около пня или стебля сидящими.

c. Erectis, прямостоящими. Coarctatis, стъсненными.

Diuergentibus, на двъ стороны разведенными.

Dinaricatis, растопырившимися.

Deflexis, наклоненными.

Reflexis, отогнутыми.

Retroflexis, назадъ наклоненными. Fulcratis, почти до корня наклоненными.

2. Folia, Aucman.

Determinatione loci. По опредълению оть мъста происходящему.

Radicalia, корневые, или не посредспвенно изъ корня вырасшающіе. Caulina, спеблевые.

Ramea, сучковые или вѣточные.

Axillaria, угловые.

Floralia, цвѣточные.

Numero, по числу.

Unicum, по одному сидящіе.

Duo, по два.

Tria, no mpu.

Pauca, по немногу. Plurima, по многу.

Situ, по положению.

a Alterna, по перемънно разпоряженные. Difticha, по двумъ бокамъ сидяще.

Bifa-

Bifaria, по объимъ сторонамъ сидящіе. Sparfa, безъ всякаго порядка раз. метанные.

Conferta, другъ подав друга сидящіе. Imbricata, другь друга покрывающіе. Fasciculata, по пучкамЪ расположен-

Віпа, по два пучкомЪ.

Terna, no mpu.

Quaterna, no ченыре.

Quina, по пяши.

Confluentia, по нВскольку вмЕстЕ.

Approximata, близко другъ возлъ друга сидящіе.

Remota, далеко другь оть друга отстоящіе.

b. Opposita, прошивоположенные.

Decussata, крестообразно расположен-

Stellata, на подобіе звъзды расположенные.

Directione, наклонениемь.

а. Егеста, прямо стоящіе.

Stricta, сжавшіеся или прижатые.

Rigida, къ верьху торчащіе.

Adpressa, прижащые.

Patentia ; оттопыривающіеся ими ошкрышые.

Horizontalia, горизоншальные, или подъ прямымъ угломъ отъ стебля отходящіе.

Affurgentia, къ верьку прямо сидящіе. Іпнеха, вогнупные.

Reclinata, дугою приклоненные.

Recuruata, искривленные.

Revoluta, внизъ наклоненные.

Dependentia, прямо кЪ земав наклоненные.

b. Obliqua, наклоненные.

Adversa, противо - обращенные. Verticalia, съ верьху сидящіе.

Resupinata, исподнею стороною кЪ верьку обращенные.

с. Demersa, подъводою скрывающіеся. Natantia, плавающіе.

Radicantia, корен вющіе.

Insertione, положениемь.

a. Petiolata, черенястые. Penata, щитистые, на подобіе щита расположенные.

b. Seffilia, приземистые.

Adnata, къ стеблю приросшіе.

Connata, приближенные.

Decurrentia, поперетъ своего черешка проходящіе.

Amplexicaulia, стебель обнимающіе, или обвивающіе.

Perfoliata, проросшіе, или сквозь сте бель проходящіе.

Vaginantia, лунковатые, или на подобіе ножень.

Structura, строениемь.

Figura по наружному пиду.

а. Subrotunda, кругловатые. Orbiculata, кружкомЪ расположенные Ovata, продолговато - круглые, яйцеобразные.

Ovalia, нъсколько яицу подобные.

b. Oblonga, продолговащые. Parabolica, параболические, или коихъ поперешникъ въ длину больше, не жели въ ширину, а къ верьху Авлается полукружнымЪ.

Cunciformia, клиноподобные. Spatulata, на подобіе лопашки.

с. Rotundata, округленые, круглые, или угловъ неимъющіе. Lanceolata, копьевидные, или копье-

образные. Subulata, шилу подобные.

Linearia, равноширные.

Асегова, плевистые.

Angulofa, угловатые.

Integra, цъльные.

3. 4. 5. Angularia, mpexb, четырехь

Deltoidea, шреугольные, делшсобраз ные, или видъ Греческой буквы делшы А имъющіе. Rhom.

Rhombea, ромбоическіе, или четыре другъ другу противостоящіе углы имѣющіе.

Trapeziformia, трапезо видные или имъющіе четыре другь противь друга косо стоящіе углы.

Sinubus,, првзами, пырвзками.

a. Cordata, сердцевидныя.

Reniformia, на подобіе почекъ.

Lunata, полукруглые на подобіе мъсяца.

Sagittata, на подобіє стрълы.

Hastata, какъ копье продолговато заощренные.

Panduriformia, продолговатые и бывающіе внизу широкіе, а съ верьху узкіє.

b. Fiffa, разсвлистые, расщепленные. 2. 3. Loba, двухъ, трехъ, четырехъ и пяти выръзчатые.

2. 5. Fida, двухЪ, трехЪ, четырехЪ и пяти сторонніє.

3. 5. Partita, на три, четыре и пять частей раздъленные.

Palmata, на подобіє распрошершой руки.

Lyrata, на нѣсколько частей, изъ коихъ верьхнія больше нижнихъ, поперегъ раздъленные.

Pinnatifida, городочные, съ город-

Sinuata, выръзчатые.

Laciniata, одинъ противъ другато съ городками, на подобіе лоскутковъ.

Squarrofa, шероховатые.

Margine, краями.

а Integerrima, цъльные.

Crenata, зазубристые, или съ зазубринами.

Serrata, на подобіє пилы връзанные. Ciliata, опороченные.

Dentata, зубчатые.

Spinola, колючіе.

Cartilaginea, будто бы хрящевые.

b. Repanda, по краямъ съ выръзками. Lacera, неравные, косматые. Erofa, мълко выръзчатые, какъ бы разгрызенные.

Daedalea, узорчито выръзанные.

Superficie, поперхностію.

а. Pagina, стороною:
Superiore, верхніе.
Inferiore, нижніе.
Nuda, голые.
Glabra, гладкіе.

Nitida, нъжные, чистые.

Lucida, лоснящіеся.

Colorata, разцвъченные.

Nervola, жиловатые:

Trinervia, съ шремя жилами. &с. и проч.

Triplinervia, многожильные.

Enervia, безжильные.

Lineata, полосатые, или полосами испещренные.

Striata, бороздчатые. Sulcata, жолобоватые.

с. Venola, имъющіе многія боковыя раздъляющіяся жилы.

Rugofa, сморщившиеся.

Bullata, водяными пупырошками покрыпые.

Lacunola, ямистые. « Avenia, колосоватые.

d. Punctata, точками испещренные.
Papillofa, прыщатые.
Papulofa, пушистые.
Viscida, клейкою влажностію наполненные.

е. Villofa, волосяные, или волосками покрытые.

Tomentofa, мошистые,

Sericea, мяткою на подобіе шелка шерешью обведенные.

Lanata, шерстистые.

Barbata, мохнашые.

Pilosa,

Pilosa, волосеные. Scabra, жесткіе. Hispidas, шершавые, колкіе. Aculeata, иголчатые. Strigola, колючіе.

Арісе, концомь, или першиною.

a. Obtusa, mynsie. Emarginata, впадиною оканчивающіеся. Retula, притупленные. Praemoría, какЪ бы обгрызенные. Truncata, или какЪ бы опсъченные.

b. Acuta, остроконечные. Acuminata, заощренные. Cuspidata, острые. Mucronata, жальцом в оканчивающиеся Cirrofa, пленьми, или дикими волошьми оканчивающіеся.

Ехрапропе, разширениемь. Plana, плоскіе.

Canaliculata, лощинкою.

Concava, лунковащые. Convexa, выпуклистые.

Cucullata, свернувшіеся.

Plicata, сложенные какЪ бы складками.

Undata, выпуклые. Стібра, кудрявые.

Substantia, сложениемь.

a. Membranacea, пленчатые. Scariola, cyxie, обсохшіе. Gibba, горбоващые. Teretia, трубкою, круглые. Depressa, прижатые. Compressa, сжатые. Carinata, жолобоватые.

b. Compacta, пвердые. Tubulofa, трубчатые, пустые. Pulpofa, влажностью напоенные. Carnola, тучные, мясистые.

с. Triquetra, трехъ сторонные. Ancipitia, на подобіе топора, Lungulata, плоскоперистые. Ensiformia, на подобіе шпаги. Subulata, шилу подобные.

Acinaciformia, ложбиною выдавшіеся или на подобіе сабли.

Dolabriformia, съ одной стороны плоскіе тупые, а сЪ другой выпуклистые.

Mensura, mapon.

Brevissima, кратчайшіе.

Longissima, самодлинные, но вст по мъръ расположения стебля.

Duratione, долгопременностью Decidua, опадающіе, или спадающіе. Caduca, погибающіе. Persistentia, пребывающіе. Perennia, прозимующіе,

Sempervirentia, всегда зеленъющіе. Compositione, cocmanneniemb.

> Composita, составленные. Articulata, колънчащые. Conjugata, сложные. Digitata, на подобіе пальцовь, нъскольку вмъсшъ сидящіе. Binata, двойные. Ternata, тройные.

Quinata, по пяши вмъсшъ сидящіе. Pedata, сЪ подпоркою. Pinnata, перистые, изъ перышковъ

составленные.

Bijuga, двуперистые. Trijuga, mpexb перистые. Quadrijuga, изъ четырехъ перыш. ковъ составленные. &с.

Cum impari, съ однимъ неравнымъ, Abrupte, съ однимъ какъ бы ощор. ваннымЪ.

Cirrhofa, изЪ павтей состоящіе. Foliolis oppositis, съ прошивополо. женными другЪ другу листочками. Alternis, съ сидящими поперем вино. Interruptis, съ сидящими изръдко разбросанными.

Decomposita, называется, естан спебель одинъ разъ опдълившись многими лиспия ми обвъщивается.

Bigemina, двойные.

Biter.

Biternata, два раза по три совокупленные.

Bipinnata, двуперистые.

Supradecomposita, называется, есть ли стебель нъсколько разъ раздвляется и обвещивается повсем всшно лисшьями.

Tergemina, тройные.

Triternata, три раза по три совокупленные.

Tripinnata, mpexb перистые.

Fulcra, Подпорки.

Petiolus, черешокЪ или листовый стебелюкъ.

Stipulae, застрѣжки.

Cirrhus, павши.

Pubes, мошокъ.

Arma, opywie.

Pedunculus, стебелокъ.

Petiolus figura, черешокь выпаеть наружнымь пидомь.

Linearis, равноширный.

Alatus, съ крылошками.

Clauatus, пишковапый.

Membranaceus, пленчашый, или перепонкою обведеный.

Teres, круглый.

Semiteres, полукруглый.

Triqueter, треугольный.

Canaliculatus, жолобоватый.

Magnitudine, пеличиною.

Brevissimus, самый корошенькій.

Brevis, корошкій.

Mediocris, посредсивенный.

Longus, длинный,

Longissimus, предлинный.

Insertione, положениемь, какь приростаеть или истаплипается.

Infertus, включенный.

Adnatus, приросшій.

Decurrens, поперегь проходящий.

Amplexicaulis, стебель обвивающій. Vaginans, лунковашый, или на подобіе ноженЪ.

Appendiculatus, съ прибавочкою.

Directione, наклонениемъ.

Егесния, прямый.

Patens, отпопыривающися, открытый.

Assurgens, возвышающийся.

Recurvatus, изкривленный.

Superficie, поперхностью.

Glaber, гладкій.

Aculeatus, иголочками обсаженный.

Nudus, толый.

Articulatus, кол внчатый.

Spinescens, колючими иглами усажденный.

Stipulae, застръжки.

a. Geminae, двойныя. Solitariae, по одиначкъ сидящія. Nullae, никакія

b. Laterales, боковыя Extrafoliaceae, надъ лиспъями Infrafoliaceae, подъ листьями.

Oppositisoliae, прошивоположенныя лисшьямЪ.

с. Caducae, погибающія, спадающія. Deciduae, опадающія Persistentes, пребывающія. Spinescentes, терноватыя.

d. Seffiles, приземистыя. Adnatae, приросшія. Decurrentes, поперегь проходящія. Vaginantes, на подобіе ноженъ объемлющія.

e. Subulatae, шилу подобныя. Lanceolatae, копьевидныя. Sagittatae, стрвлообразныя Lunatae, на подобіе мъсяца.

f. Erectae, прямыя, Patentes; оттопырившіяся. Reflexae, отогнутыя.

g. Integerrimae, цъльныя.

Serratae, на подобіе пилы зубчика-

ми връзанныя.

Ciliatae, отгороченныя,

Dentatae, зубчашыя

Fiffae, разовлистыя, расщепленныя.

h. Bre-

h. Breviffimae, само коротенкія или маленькія.

Меdiocres, средственныя

Longa, длинныя.

Cirrbus, Tinema.

a. Axillaris, угловая, Foliaris, лиственная, Petiolaris, черенястая, Peduncularis, стеблевая

b. Simplex, простая или одинакая Trifidus, на три раздъленная Multifidus, на многія части раздъленная.

с. Convolutus, свертывающаяся. Revolutus, внизъ загнутая.

Pubes, мощокв.

a. Pili, волосы,
Lana, шерсть,
Barba, пухъ,
Tomentum, мохъ.
Strigae, иголки.
Setae, щетинки.
Simplices, простыя
Натовае, на подобіе крючковъ закорючившіяся.

Ramofae, вътвистыя или частыя, Plumatae, перистыя
Stellatae, звъздовидныя.

с. Hami, крючечки Glochis,

d. Glandulae, желёзки, бородавки или пупырики,
Vtriculi, сосудцы, особливою влажностью наполненныя.
Foliares, листовыя
Petiolares, черенястыя,
Pedunculares, голенястыя.
Stipulares, застрёжныя,

e. Viscositas, липкость
Glutinositas, клейкость
Arma, оружія

a. Aculei, жальцы: Recti, прямые, Incurui, нагнутые, Recurui, искривленныя.

b. Furcae, вилочки,
Bifidae, двойныя,
Trifidae, пройныя.

с. Spinae, спички,
Terminales, вершину занимающія,
Axillares, угловыя,
Calycinae, чашеччыя,
Foliares, листовыя
Simplices, простыя или одинакія
Divifae, раздъленныя,

d. Stimuli, волоски, Pungentes, колючіе Vrentes, жгучіе.

Bracteae, Подполочные листыя.

а. Coloratae, расцвъченные, Caducae, пропадающіе Deciduae, опадающіе, Persistentes, пребывающіе.

b. Una, одинъ duae, два, Plures, многіе.

с. Coma, волоски. Pedunculus, черешокь или везлистный частный стебелбокь.

> Partialis, отдъленный, Communis, общій, Pedicellus, маленкій раздъленный черешокъ.

а. Loco, по мвсту.

Radicalis, корневый,

Caulinus, стеблевый,

Rameus, въточный, изъ вътъм вырастающій;

Petiolaris, изъ черешка вырастающій.

Cirrhiferus, плътьми или длинными волотьми обвещенный.

Terminalis, вершину занимающій,

Axillaris, угловый,

Орровітібовіць, листьямъ противопо

ложенный, b. Situ, по положенію. Alternus, на искось поперем'вино сидящій. Sparfus,

C. 7

Um

c.

P

Sparlus, безъ всякаго порядка раз-

Oppositus, прошивоположенный, Verticillatus, кружком в обвивающійсть Numero, по числу.

Solitarius, по одиначкъ сидящій, Geminatus, двойный, &c.

Umbellula sessilis, сь приземистою перь-

Directione, наклонениемь.

Adpressus, прижатый, Erectus, прямый.

Patens, отшопыривающийся, отворен-

Cernuus, внизу наклоненный, Resupinatus, назадъ загибающійся. Declinatus, наклоненный, Nutans, колебающійся. Flaccidus, повислый какъ блеклый, Ascendens, къ верьку прямо идущій, Pendulus, висящій,

Strictus, сжавшійся, Flexuolus, изгибисшый,

Retrofractus, назадъ загнушый, Mensura, мърою.

Breuis, корошкій, Brevissimus, прекорошенькій, longus, долгій, или длинный, Longissimus, предлинный.

f. Multiflorus. много - цвъшный, или много цвъшовъ производящій, Uniflorus, одноцвъшный, Biflorus, двуцвъшный, Triflorus, прехъцвъшный еtc.

в. Structura, сложениемь.

Teres, круглый,
Triqueter, треугольный,
Tetragonus, четвероугольный,
Siliformis, ровный,
Adtenuatus, заощренный,
Clavatus, толще къ цвъту становищійся,

Nudus, голый, Часть I.

Squammolus, чешуйчатый, или чешуйками покрышый.

Foliatus, листьями окруженный, Bracteatus, подволочный, листомЪ

покрышый. Geniculatus, колънчаный,

Articulatus, изЪ многихЪ звенышковЪ составленный.

Inflorescentia, Latmb.

Flores, цвъты бывають
Тегтinales, вершину занимающіе.
Laterales, боковые,

Sparsi, разбросанные, Sessiles, приземистые,

Pedunculati, черенясные, или на стебельках b сидящіе,

Unicus, по одному сидящій. Solitarius, особо растущій,

Terni, по три вмъстъ сидящіе etc.

Соріові, кучами,

Erecti, прямо стоящіе, Сегиці, наклоненные,

Nutantes, колеблющіеся.

Verticales, вершикальные, отвъсные или прямо съ верьку висящіе.

Horizontales, горизоншально или понерегъ сидящіе,

a. Verticillus, цпвтное кольцо около стевля.
a. Sessilis, приземистое,

Pedunculatus, черенястое,

b. Nudus, голое, Involucratus, пленою обведенное, Bracteatus, подволочное, листомъ, покрытое.

с. Confertus, одно возлъ другаго плотно сидящее, или кучею, также сжавщись.

Distans, отстоящее.

b. Capitulum, голошка, пупочекь.

a. Subrotundum, кругловатая. Globosium, круглая, шаровидная, Dimidiatum, половинчатая.

b. Foliofuin, лисшьями окруженное, Nudum, голое,

c. Spi-

Fasciculus, пучокЪ.

c. Spica, колось.

а. Simplex, простый, или одинакій, Composita, spicillis, изЪ колосочковЪ составленный .

Glomerata, клубочкомЪ растущій.

- b. Ovata, продолговато круглый, Ventricola, надупый,
 - с. Imbricata, жолобовашый. Articulata, составчатый, Ramola, вѣшвистый, Linearis, равноширный, Ciliata, оппороченный, Foliacea, лиственный, Сотова, волосками обсаженный.

d. Corymbus, Kucma. Simplex, простая, одинакая, Compositus, сложная.

е. Тугбия, шапочка. Nudus, голая, Foliatus, листьями обсаженная.

L. Racemus, Kucma.

- а. Simplex, простая, Compositus, сложная.
- b. Unilateralis, одно боковая, Pedatus, коленистая, Conjugatus, no HECKOALKY EMECITE соединенная,
- c. erectus, прямая, Laxus, не пивердая, вяхая, Dependens, прямо къ землъ висящая.

d. Nudus, rozas; Foliatus, лисшьями насажденная,

g. Panicula, метелка, цвътоносная часть бываеть по

Trunci structura, сложенію пня или стебля.

Frudificatio, плодоносная часть, зави-

Ex numero, omb числа, Figura, наружнаго вида, Proportione, соразминости, Situ partium, положенія частей.

Simplex, npocman, Composita ex flosculis, изЪ цвѣточ ковъ составленная. Calyx, чашка. Perianthyum, околоцвѣтіе Fructificationis, плодоносной части, Floris, цвъща, Fructus, плода. Ргоргиип, собственное,

a. Monophyllum, однолисточное, Polyphyllum, многолисшное,

b. 2. 5. fidum, ошь двухь до пяти частей раздвленное.

2. 5. Partitum, на двв, три, че шыре и пяшь лапочек выръзанное.

Integrum, цъльное. с. Tubulosum, трубчатое, на подобів трубки свиное, внутри пустое, Patens, отпоныривающееся, откры

Reflexum, omornymoe, Inflatum, надуше.

- d. Abbreviatum, укороченное, Longum, длинное,
- e. Obtulum, mynoe, Acutum, ocmpoe, Aculeatum, иголчатое, Соттипе, общее. Imbricatum, жалобоватое. Squarrofum, шероховатое, Calyculatum, чашечное. Involucrum, плена.

а. Universale, общая, Partiale, отдъленная, частная. Ргоргіит, собственная,

b. Monophyllum, однолисточная, Gluma, мякина, щелуха, кожа на зерыя.

а. Uniflora, одноцевтная, Multiflora, мистоцивиная.

b. Univalvis, одношелушная, Bivalvis, двушелушная.

с. Colorata, разцевченная, Glabra, гладкая,

Hilph

Ніspida, шершавая.

Агіва, мякинное жало, или колось.

a. Mutica, безоружное
Terminalis, вершину занимающее,
Dorfalis, на внъшней сторонъ сидя-

b. Recta, прямое, Tortilis, извитое, Geniculata, колънчатое, Recuruata, искривленное.

Amentum, III и шка.

Squammolum, чешуйчатая,

Nudum, голая.

Spatha, пдоль раскрыпающаяся чашечка.

Univalvis, одношелушная,
Вivalvis, двушелушная,
Dimidiata, половинчатая.
Саlурта, моховая чашка.
Recta, прямо стоящая.
Obliqua, наклоненная.
Volva, грибовая перепончатая чашечка.
Арргохітата, приближенная,
Remotiffima, далеко отстоящая.
Согоша, Цатть, а лучше пнтиняя часть

4ntma.
Ретаlum, перышко, цвЕтный листокЪ.

a. Tubus, спиволЪ,

Unguis, ноготь, самая нижняя часть цевта.

Lymbus, шовъ, опушка.

b. Monopetala, одноперый или однолисточный,

2. 6. Polypetala, двухЪ, трехЪ, четырехЪ, пяти, шести и многолисточный,

c. Regularis, правильный, Irregularis, неправильный, Inaequalis, неравный,

d. Globofa, круглый,
Сатрапиlata, колокольчастый,
Infundibuliformis, на подобіе воронки
къ верьку разширенной,
Rotata, круглый, на колесо похожій.

Ringens, загнушый, Personata, покрышый,

Labio superiore et inseriore, верыхнимъ и нижнимъ устыемъ.

Cruciata, крестообразный,

Patens, оттопыривающися или от-

Papilionacea, бабочк в-подобный:
Vexillo, вымполом в,
Alis, крылошками,

Carina , дномЪ.

e. Composita, соетавленный:
Ligulata, плоскій, съ плоскими пе-

Tubulola, пустый, трубкою. Radiata, вънцомъ обведенный.

f. Color, цввть, краска.
Nectarium, медовый сосудець,
Proprium, особенный,
Petulinum, цввтный.
Stamina, тычки или мужчинки.
Filamenta, волоти, волокны, также

тычки, спички.
Numero, по числу.
Figura, по наружному виду,
Infertione, по вложенію,
Aequalia, равные,
Inaequalia, неравные,
Connata, сросшіеся.

Antherae, тычкопыя голопки, шляпка, пыльный мышечекь.

Distinctæ, отдъленныя. Connatæ, сросшіяся, Laterales, боковыя.

Pollen, плодородная цивта пыль, св. мянная пыль.

Figura, наружнымъ видомъ. Pistillum, пестикь или женочка, Germen, зародышь, яичникь.

Superum, верхній,
Інferum, нижній.

Stylus, стольокь, спичка, стевелюкь. Numero, по числу,

Pro-

Proportione, по соразмърности, Diuisione, по раздъленію, Figura, по наружному виду.

Stigma, пестичная перыхушка, струпикь. Numero, числомЪ,

Figura, наружнымь видомь.

Pericarpium, пленка, обподящая свыяна. Сарбива, съмянодержательница, коробка или капсуля.

Valvulae, menyxu,

Loculamenta, THE3Qы.

Dissepimenta, перегородки.

Bicapfularis etc. двукапсульный, или о двух в съмяно держательницах в &с. Bilocularis, двугнъздный еtc. Тгісосса, о трехъ зернахъ.

Siliqua, стручокь.

Figura, по наружному виду, Сотргева, сплюснутый, Torulofa, укручастый, Articulata, колънчаный,

Dissepimentum paralellum, пдоль проходящая или паралельная перегородка. Legumen, стручечная шелуха.

Figura, наружнымь пидомь. Articulata, колънчашая.

• 1. 2. Locularis, одно и двугивадная.

Folliculus, мякина, кожица. Univalvis, одношелушная. Bivalvis, двушелушная.

Figura, 11120Mb. Drupa, ягода. Succulenta, сочная. Sicca, сухая. Ротит, яблоко. Figura, видомЪ. Loculamenta, съмянными гнъздами.

Васса, ягода. Monosperma, etc односъменная и проч.

Strobilus, шишка. Totius, цвавная. Squamatus, чешуйчатая.

Semen, coma. Numero, числомЪ. Figura, наружнымЪ видомЪ. Loculis, мѣстечками. Superficie, поверьхностію. Confistentia, сложеніемЪ, или плот

Hilum, стия имъющее omb соединения споего съ плодомь на наружности рубчикв.

Corculum, сердечко. Corona, пучокъ, коронка. Pappus, вънчикъ. Stipitatus, на корешкъ, Capillaris, на волоскахЪ, Plumofus, перистый, пушистый. Cauda, хвостикЪ, Hamus, крючечекЪ, Calyculus, meayxa. Nux, optxb Vnilocularis, одногивздный, Bilocularis, двугнъздный &с. Arillus, кожица Cartilagineus, хрящевая Succulentus, сочнал.

Receptaculum, имъстилище также Гу-Menijo.

Fructificationis, плода съ цевтомв. Floris, цвѣта Fructus, одного плода,

Commune, общее

a. Nudum, rozoe, Punctatum, ямочками, точками покрышое, Pilofum, волосеное, или волосками

насажденное. Paleaceum, мякиннос.

b. Planum, плоское, Convexum, выпуклое, Vnicum, одинакое, гладкое, Subulatum, шилу подобное.

Compositus flos, изЪ многихъ 6ез черешных В цввточков В вленный цв вшъ, котораго вм всти лище цъльное, или сложный цввий. Aggregatus flos, изъ многихъ вмв.

CHIB

ств соединенных в цввточков в со-

Umbella, круглый пвиець или коронка.

a. Simplex, простая, Composita, составленная, Prolifera, плодоносная.

b. Concava, лунковатая, Fastigiata, заощренная, Convexa, выпуклистая,

с. Erecta, прямая, Nutans, колеблющаяся,

Сута, першинка. Nuda, голая Втасteata, подволочная, листкомъ покрытая.

Spadix, плодоносная пътпъ.

a, Uniflorus, одноцвъшная, Multiflorus, многоцвъшная. Simplex, простая, цъльная, Ramosus, вътвистая.

III. HABITVS, НАРУЖНЫЙ СОСТАВЪ. Gemmatio, Разпокипание, ими состаць почки.

Bulbus, пукопица.

Solidus, плотная,
Tunicatus, одътая,
Squammatus, чешуйчатая,
Caulinus, на стебль сидящая
Origine, происхожденіемь,
Petiolaris, черенястая,
Stipularis, корневая,
Corticalis, корою объеденная.
Contento, содержаніемь,
Foliaris, лиственная,
Floralis, цвътная,

Vernatio, Расположение.

Conduplicata, двойное,
Convoluta, свершывающееся,
Inuoluta, внушрь вогнущое,
Revoluta, назадъ загнущое.
Imbricata, жолобоващое.
Equitans, равное,
Obuoluta, покрыщое,

Plicata, сложенное,
Reclinata, дугою приклоненное,
Inclinata. наклоненное,
Circinalis, закорючившееся на подобіе колечка.

Atellivatio. Летнее расположение
Convoluta, свершывающееся
Imbricata, жолобоващое.
Conduplicata, двойное,
Valvata, шелушное
Inaequivalvis, неравно шелушное.

Sommus, conb:

Connivens, сжавшись,
Includens, сокрывшись,
Circumsepiens, окружившись своимъ
оружіемъ, какъ то иглами, жальцами &с. или выставя оныя
наружу,
Muniens, вооружась, или надувшись,
Conduplicans, удвоясь,
Involvens, скрывшись подъ листья,
Divergens, одзавинующись

Involvens, скрывшись подъ листья, Divergens, раздвинувшись, Dependens, повиснувъ, Invertens, перевернувшись, вогнувшись. Imbricans, сморщившись, вогнувшись.

Torfio, обращение на которую нибудь сторону.

a. Conformis, однообразно прямое. Difformis, разнообразное

b. Dextra, на правую сторону. Sinistra, на авыю сторону, Reciproca, на объ стороны.

 €. Refupinata, назадЪ затнущое Circinalis, закорючившееся на подо біе колечка.

Variatio, Отменность, различие ра-

Coloris, цвъта,
Magnitudinis, величины,
Pubescentiae, роста.
Aetatis, лътъ или старости.
Externa, наружная;
Plicata, какъ бы складками сложенная,
Fasciata, обвернутая, обведенная.

Lati-

Latifolia, широколиственная, Tenuifolia, узколиственная, Crispa, кудрявая. Миtica, обезоруженная. Interna, внутренная:

а. Mutilata, какъ бы отрубленная, недостаточная,

Grandiflora, великоцевтиная. b. Multiplicata, умноженная.

Plena, полная.
Prolifera, плодоносная.

с. Vivipera, живородная, Bulbigera, въ видъ шариковъ, или луковокъ, или луковицъ родящаяся.

Sponfalia, Бракь или сопряжение.

Mas, мужъ, мужчинка или тычекъ, Femina, жена, женочка или пестикъ, Androgyna, двуполый, или мужчинка съ женочкою.

Hermaphrodita, обоеродный, и женскаго и мужескаго рода,

Generationis mysteria, Тайна рожденія или совокупленія.

Seminatio, Происхождение съмяни,

Seminis cauda, съмянный стебелечекъ или жвостикъ

Ala, крылошко, Раррия, вънчикъ,

Hamuli, крючечки,

Cluten, клей или съмянная влажность,

Curvatio, изгибы.

Pericarpii baccatio, пупавки перемъненіе въ ягоду.

Inflatio, надувание,

Viscositas, клейкость, липкость, Elasticitas, разширеніе, упругость.

Structura, сложение.

Placentatio, Расположение зародыща.

Dicotyledonis, о двухъ пупочкахъ, Acotyledonis, бывающаго безъ пу-

Polycotyledonis, о многихЪ пупочкахЪ.

IV. LOCVS, MECTO.

Clima, Страна или Климать

Boreale, съверная,
Orientale, восточная,
Occidentale, западная,
Mediterraneum, среди-земная
Australe, южная, полуденная,
Indicum, Индіанская,
Alpinum, Горная Алпійская.

Solum, Seman, Mecma.

Marinum, морская, Lacustre, озерная; Maritimum, приморская, Littorale, набережная, Palustre, болошная, Inundatum, наводненная; Vliginosum, влажная, Caespitosum, дерновая, Alpinum, горная, Nemorolum, рощная, Sylvaticum, AECHAH, Arvense, пашенная, Pratenfe, Ayrobas, Campestre, полевая, Montanum, гористая, Ruderale, пребенная или въ пуств

лежащая, Cultum, обработанная,

Тегуп, земля.

Humus, черноземь.
Argilla, глина,
Creta, мъль,
Arena, песокъ,
Parasitica, смъшенная, постороная.

V. TEMPVS, BPEMA.

Germinatio, позрастание или произрастание.

> Dierum, дневное, Mensium, мъсячное, Annuum, однолътное, Bienne, двулътное.

Fron-

Frondescentia, Опушение или когда деренья или растения начнуть распу скаться.

Vernatio praecox, скорое или раннее опушение лиспьями,

Aequalis, обыкновенное или въ настоящее время,

Serotina, позднее.

Autumnatio praecox, скорое или раннее спаденіе или оголеніе лисповЪ осенью

Lenta, мало по малу,

Cunctanea, медлительное или поздое. Calendarium, Мясоцослонь, или Кален. дарь показынающій.

1. Germinat. Frondenscentiae, время Распокиванія лисшьевь или раскидыванія расшвній,

Florescentiae, цвѣтенія.

2. Groffificationis, оберемененія или зачатія загодыша плода

Maturationis, созръванія или поспъяванія,

Messis, собиранія плодовъ

3. Exfolationis, опаденія или спаденія плодовЪ,

Defoliationis, оголенія или спаденія листьевь

Congelationis, замерзанія-

4. Brumalis, кратчайшій день. Glacialis, покрыванія льдомЪ. Regelationis, растанванія.

Horologium, часы показыпающие

a. Vigiliae meteoricae, время воздушных Б явленій,

Тгорісж, пропическое или солнечнаго оборонта.

Aequinoctiales, равнодъйстве.

b. Apertionis, время, въ которое цвъты распускаются.

Reclusionis, время, въ которое распустившіеся цвёты скрываются. Duratio plantae, долголётствіе или продолженіе премени растёнія, Caducae, увядающее, Senfiles, чувствительное, или всякой перем внъ легко подвергаемое.

Perpetuae, всегдашнее или долго-Floris, цвѣта (временное. Ephemeri, однодневнаго,

Ephemeri, однодневнаго, Tridur, предневнаго, Menstrui, мъсячнаго.

Fructus, плода

Praecocis, ранняго, Serotini. позднего.

Аппиі, годоваго.

VI. QVALITAS, CBOUCTBO NAM KAYECTBO,

Odov, samaxb:

Inodorus, непахучій или без Б запаха, Fragrans, душистый.

Ambrofiacus, пріяпнаго запаха

Alliaceus, произищельнаго или чесноку подобнаго,

Aromaticus, благовонный или аромашическій,

Virolus, ядовитаго.

Hircinus, непріятнаго, псиною опизывающагося

Teter, пропивнаго.

Sapor , пкусь.
Siccus , сухій ,
Stipticus , вяжущій ,
Amarus , горькій ,

Salius, соленый, солковатый,

Acris, пряный, острой, Aquofus, водянистый,

Pinguis, припормный. Acidus, кислый,

Dulcis, сладкій,

Viscolus, клейкій.

Color, untmb:

Hyalinus, прозрачный,

Albus, былый, Cinereus, сырый или пепельный,

Niger, черный, Luteus, желтый,

Ruber, красный, Caeruleus, голубый,

Viridis, зеленый,

b. Muta-

b. Mutabilis, перемънчивый, Autumnalis, осенній.

Confistentia, сложениемь или инутреннимь состояниемь.

- a. Exfueca, безсочное, Carnofa, тучное, Succofa, сочное, Glutinofa, клейкое,
- b. Aquola, водянистое Viridis, зеленое, Alba, бълое, Lutea, желтое, Rubra, красное.

VII. UTILITAS, MOABBA.

з. Naturalis, Естестпенная

Oeconomia naturae, Экономія, домостроительство или распоряженіе естественное,

Sympathia, симпатія или тайное, не понятное вЪ вещахЪ сходство, дружество.

Antipathia, Антипатіа, или природная въ вещакъ между собою противность

Pandora Infectorum, кормилица насъкомых Б.

Artificialis, художественная, по искуству.

Culinaris, въ поварняхъ. Radices, кория Olera, огородныя правы, Fructus, плоды. Officinalis, въ Апшекахъ.

- a. Simplicia, просто употребляемыя Praeparata, составленныя, приготовленныя
- b. Pretium, цвна, Locus, мвсто.

Medica, пв Медицинв.

Vires, силы, дВиствіе, свойство. Vius, употребленіе

Oeconomia instrumentalis, Инструментальное или до землед влыных в орудій касающееся домострои-

Pastoralis, деревенское, или пастущеское.

Tinctoria, красильное.

Culture, касающееся до хаббабопашества и обработыванія земель

とうらくらくらいとうで

Cerealium, хавбопашенных В Medicarum, для врачеванія.

Hortorum, садовыхв,

Arborum, древесных в, Sepium, изгородов в

Pratorum, луговых Б.

изъяснение

КЛАССОВЪ, или ПОРЯДКОВЪ РАСТЪНІЙ.

- 1. MONANDRIA, Монандріа или однотычкопыя. Сіе названіе происходить оть Греческихь словь мого одинь и агтр анирь, мужь, то есть такія раствнія, у коихь вы певть находится только одинь гвоздокь или тычекь называемый Ботаниками мужчинкою. Сей классь раздълется опять на два, изь коихь первый называется.
 - 1. Monandria Monogynia, Монандріа моногиніа, или Растенія, имъющія вы цевшахы своихы по одному гвоздку или мужчинкы и по одному песшику или женочкы вмысть.
- 2. Monandria Digynia, Монандріа дигиніа. растънія, у коихъ въ цвъщь одинъ гвоздокъ вмъстъ съ двумя пестиками.

II. DIANDRIA, Aiangpia или Дпутыч копыя. Растънія, у коихъ въ цвыпъ два пычка или мужчинки вмъстъ.

I. Diandria Monogynia, Діандріа Моногиніа. Дпутычкопыя однопестичныя, у коих вы цвыть два тычка и одинь цестикь вмъсть.

- 2. Diandria Digynia, Діандріа Дигиніа. Дпутычкопыя двупестичныя, у коих в в в цв в два тычка и два пестика вм вств.
- 3. Diandria Trigynia, Діандріа тригиніа. Дпутычкоцыя трехь пестичныя, у коихь въ цвёть два тычка и три пестика.
- III. TRIANDRIA. Трехь тычконыя, или имѣющіе въ своемь цвѣшѣ по шри шычка.
- 1. Triandria Monogynia. Тріандріа моногиніа. Трехьтычконыя однопестичныя
- 3. Triandria Trigynia. Тріандріа тригиніа. Трехьтычкопыя трехьпестичныя.
- IV. TETRANDRIA. Тетрандріа. Четырехътычковыя или растенія имѣющія въ своемъ цвѣтѣ по четыре тычка или мужчинки.
 - I. Tetrandria Monogynia. Тетрандріа моногиніа. Четы рехьтычкопыя Од-нопестичныя.
- 2. Tetrandria Digynia. Тетрандріа Дигиніа. Четырехь-тычкопыя Двупесшичныя.
- 3. Tetrandria Tetragynia. Тетрандріа Тетрагиніа. Четырехьтычконыя четырехь-пестичныя.
- V. PENTANDRIA. Пентандріа. Пятитычкопыя, или расшенія им'вющія в'в обоеродном'в своєм'в цвёт'в по пяти пычков'в или мущинок'в.
 - 1. Pentandria Monogynia. Пентандріа Моногиніа Пятитычкопыя Однопестичныя.
- 2. Pentandria Digynia. Пентандріа Дигиніа. Пятитычконыя Диупестичныя.
- 3. Pentandria Trigynia. Пентандріа Тригиніа. Пятитычкопыя Трехвпестичныя.
- 4. Pentandria Tetragynia. Пеншандріа Тетрагиніа. Пятитычконыя Четырежь-пестичныя.
- 5. Pentandria Pentagynia. Пентандріа Пен-

- тагиніа Пятитычкопыя Пятипестичныя.
- 6. Pentandria Polygynia. Пеншандріа полигиніа. Пятитычкопыя Многопестичныя или расшенія иміжній вів своемів цвітів боліве песшиковів или женочеків, нежели шычковів или мужчиноків.
- VI. HEXANDRIA. Тександріа. Шеститычконыя растенія, или им'вющія въ обоеродномъ своемъ цвъть по шести тычковъ или мужчинокъ.
 - 1. Hexandria Monogynia. Гександріа Монстиніа. Шеститычкопыя Однопестичныя.
 - 2. Hexandria Digynia. Гександріа Дигиніа. Шеститычкопыя Дпупестичныя.
 - 3. Неханdria Trigynia. Гександріа Тригиніа. Шеститычкопыя Трехьпестичныя.
 - 4. Неханdria Теtragynia. Гександріа Тетратиніа. Шеститычкойыя Четырех впестичныя.
 - 5. Hexandria Polygynia. Гександріа Полигиніа. Шеститычконыя Многопестичныя.
- VII. Heptandria. Гептандріа. Седмитычконыя мли Растенія им'вющія въ обоеродномъ своемъ цвёть по седьми тычковъ или мущинокъ.
 - 1. Heptandria Monogynia. Гептандріа Моногиніа. Седмитычкопыя Однопестичныя.
 - 2. Heptandria Digynia. Гептандріа Дигиніа. Седмитычкопыя Дпупестичныя.
- VIII. OCTANDRIA. Октандріа. Осьмитычконыя, или Раствнія им'вющія в'ю своем'ю цвёть осьмы тычков'ю или мужчинок'ю.
 - 1. Octandria Monogynia. Октандріа Моногиніа. Осьмитычкопыя Однопестичныя.
 - 2. Octandria Digynia. Октандріа Дигиніа Осьмитычкопыя Дпупестичныя.

3. Octandria Trigynia. Октандріа Тригиніа. Осьмитычкопыя Трехьпестичныя.

4. Octandria Tetragynia. Октандріа Тетрагиніа. Осьмитычкопыя Четы-

рехвиестичныя.

IX. ENNEANDRIA. Эннеандріа. Депятитычкопыя, или расшенія имьющія въ своемъ цвёшь по девящи шычковь или мужчинокъ.

1. Enneandria Monogynia. Эннеандріа Моногиніа. Депятитычкопыя Однопе-

стичныя.

2. Enneandria Trigynia. Эннеандріа Тригиніа. Депятитычкопыя Трипестичныя.

х. DECANDRIA. Декандріа. Десятитычконыя, или Раствнія имвющія въ обоеродномъ своемъ цвътъ по десяти тычковъ или мужчинокъ.

 Decandria Monogynia. Декандріа Моногиніа, Десятитычкопыя Однопе-

стичныя.

2. Decandria Digynia. Декандріа Дигиніа. Десятитычкопыя Дпупестичныя.

3. Decandria Trigynia. Декандріа Тригиніа. Десятитычкопыя Трехьпестичныя

- 4. Decandria Pentagynia. Декандріа Пентагиніа. Десятитычконыя Пятипестичныя.
- 5. Decandria Decagynia. Декандріа Декагиніа. Десятитычконыя Десятипестичныя.
- XI. DODECANDRIA. Додекандріа. Дпенатцати, Депятнатцати-гпоэдочныя, или Растенія имбющія отб двенатцати додевятнатцати тычков или мужчинок в в своем в цв втв.

 Dodecandria Monogynia. Додекандріа Моногиніа. Диенатцати, 13. 14. 15.
 16. 17. 18. и 19. Тычкопыя Одно.

пестичныя

2. Dodecandria Digynia. Додекандріа Дигиніа. Толикожь тычкопыя Диупестичныя. 3. Dodecandria Trigynia. Додекан дріа Трит гиніа. Толикож в Тычкопыя Трипе стичныя.

4. Dodecandria Pentagynia. Додекандрів Пентагиніа. Дпенатцати, Депят натцати-тычкопыя Пятипестичныя.

5. Dodecandria Octagynia. Додекандріа Окшагиніа. Шестнатцати-гпоздочныя или тычкопыя Осьмипестич, ныя.

6. Dodecandria Dodecagynia. Додекандріа додекагиніа. Диенатцати тычконыя

Дпенатцати-пестичныя.

XII. ICOSANDRIA. Икосандріа опр словъ вікоот, двашцать и отр, ангры мужъ. Днатцати тычконыя, или Растенія имъющія въ своемъ цвътъ дватцать и болье тычковъ или мужчинокъ, кои приросли ко внутренному краю цвъточной чашки нижними своими концами.

 Icofandria Моподупіа. Икосандріа Моногиніа. Дпатцати гно здочныя 09-

нопестичныя.

2. Icolandria Digynia. Икосандріа Дигиніа. Диатцати Тычконыя Диупестичныя.

3. Icolandria Trigynia. Икосандріа Триги ніа. Дпатцати тычконыя Трехвпестичныя.

4. Icosandria Tetragynia. Икосандріа Тетирагиніа. Диатцати пестичныя пырехь тычконыя.

5. Icofandria Pentagynia. Икосандріа Пентагиніа. Дпатцати тычкопыя Пятипестичныя.

6. Icosandria Polygynia. Икосандріа Полигиніа. Дпатцати-тычкопыя Многопестичныя.

XIII. POLYANDRIA. Поліандріа, происходить оть Греческихь словь полія много и сітр, анирь мужь. Многотычкопыя, или Раствнія имъющія вы цвъткахь своихь оть дватцати до нь. 2

4

6

X

1

67

X.

скольких в сошв шычков в или мужчинок в приросших в св песшиками кв гуменцу (Receptaculum, Рецепшакулум в.)

1. Polyandria Monogynia. Поліандріа Моногиніа. Многотычконыя Однопестичныя.

2. Polyandria Digynia. Поліандріа Дигиніа. Многотычкопыя Дпупестичныя.

3. Polyandria Trigynia. Поліандріа Тригиніа. Много - тычкопыя Трехв - пестичныя.

4. Polyandria Tetragynia. Поліандріа Тетрагиніа. Много тычконыя Четырехь-пестичныя.

5. Polyandria Pentagynia. Поліандріа Пентагиніа. Много-тычкопыя Пятипестичныя.

6. Polyandria Hexagynia. Поліандріа Гексагиніа. Много тычкопыя Шести пестичныя.

7. Polyandria Polygynia. Поліандріа Полигиніа. Много-тычкопыя Много пестичныя.

VIV. DIDYNAMIA. Angunamia от Греческих в словь біз; дись, два, и білація, динамись пладеніе, или Растенія о двухь неравных втиках в или мужчинках в; сіи растенія им воть вы цевтках в своих в четыре тычка, из в коих в два тычка длиниве, а два короче.

1. Didynamia Gymnospermia, Дидинаміа Гимносперміа. Растенія о двух в неравных в тычках в и св обнаруженными и в в чашках в раждающимися свменами.

2. Didynamia Angiospermia. Дидинаміа Ангіосперміа. Раствнія о двухі неравныхі шычкахі и съ заключенными віз капсуляхі или съмянодержашельницахі съменами.

ТЕТКАДУНАМІА. Тетрадинаміа. Растьнія о четырех в неравных в тыч-ках в, или им вющія в в цв втках в своих в тесть тычков в или мужчинок в, из в кому в четыре длинь в, а два друг в против в друга стоящіє короче:

Теtradynamia Siliculofa. Тетрадинаміа силикулоза. Растінія о четырехі неравныхі тычкахі, и короткими струч. ками.

2. Tetradynamia Siliquofa. Тетрадинаміа Силиквоза. *Растінія* о челіырех виеравных вычках в свідлинными стручками.

XVI. MONADELPHIA. Монаделфіа, отв Греческих в словь могос монось, единый и абедфос, брать Единовратныя, или Раствнія съ сросшимися въ одну кучку тычками

1. Monadelphia Pentandria. Монаделфіа Пентандріа. *Растінія* съ пятью въ одну кучку сросшимися тычками, или Единобратныя Пяти-тычковыя.

2. Monadelphia Decandria. Монаделфіа Декандріа. Раствнія Единовратныя Десяти-тычкопыя, или съ десящью въ одну кучку сросшимися тычками.

3. Monadelphia Polyandria. Монаделфіа Поліандріа. Единовратныя Многотычкопыя или съ многими въ одну кучку сросшимися тычками.

XVII. DIADELPHIA. Діаделфіа. Растінія съ сросшимися въ двъ кучки пычками, или у коихъ мужчинки вырастають изъ двойнаго вмъстилища, какъ въ двойной маткъ.

1. Diadelphia Pentandria. Діаделфіа Пентандріа. Раствиін съ пящью в'в двв кучки сросшимися тычками.

2. Diadelphia Hexandria. Діаделфіа Гександріа. *Растічія* съ шестью въ двъ кучки сросшимися тычками.

3. Diadelphia Octandria. Діаделфіа Октандріа. Растинія съ остью въ двъ куч. ки сросшимися пычками.

4. Diadelphia Decandria Діаделфіа Декандріа. *Раствнія* съ десяпью въ двъ кучки сросшимися пычками.

XVIII. POLYADELPHIA. Поліаделфіа. Многобратныя, или Растінія съ сросшимися во многія кучки шычками.

1. Polya-

- 1. Polyadelphia Pentandria. Поліаделфіа Пеншандріа. *Растівнія* съ пяшью въ пісколько кучекъ сросшимися шычками.
- 2. Polyadelphia Icosandria. Поліаделфіа Икосандріа. *Растінія* съ дватцатью въ многія кучки сросшимися тычками.
 - 3. Polyadelphia Polyandria. Поліаделфіа Поліандріа, *Pacmtнiя* съ множествомъ во многія кучки сросшихъ тычковъ.
- XIX. SYNGENESIA, Синтенезіа от Греческих в словь ой вмість и убресь, рож деніе. Растінія съ сросшимися вверьку тычковыми головками или шляпками и отділенными въ низу тычками.
- зупрепена Polygamia aequalis, Сингенезіа полигаміа екпались. Сугубо растуція многобрачныя равныя или одинакін раствнія, или имвющія одни обоеродные или двуполые сложные цввты (Hermaphrod.) то есть, вы коихы находятся тычки или мужчинки вы верху шляпками вы цилиндры сростіяся и пестики или женочки вміств.
- 2. Syngenesia polygamia superfilua, Синге незіа Полигаміа суперфлуа. Сугуто растушія многобрачныя лишнія, или растивнія им'вющія сложные цвіты, бывающіе віз серединіз обоеродные или обоих і половіз. Віз коих і шычки соединены віз верьху своими шляпками, а подіз краями на одной половиніз женскіе или из і одних і пестиков і составленные, а на другой мужескіе или из і шычков із состоящіє.
- з. Syngenesia Polygamia frustranea, Сингененезіа Полигаміа фрустранеа. Сугуво растущін многоврачныя везплодныя, или раствнія имвющія множество сложных в извобоеродных в и безплодных в, или ни тычков в, ни пестиков в в в себ не имвющих в цевтков в составленных в цевтов в, изв коих в находящісся в в обоеродных в тычки соединены в в верьку тычками.

- 4. Syngenesia Polygamia Necessaria, Сингенезіа Полигаміа нецессаріа. Сугуво растущія нужныя, или растівнія иміющія мужескіе и женскіе цвіточки, изів коихів вів мужеских із тычки содинены вмісті вів верьху шляпками.
- 5. Syngenelia Monogamia. Сугуво растущія Однополыя, или имъющія разнаго пола не одинакіе цвъщы.
- XX. GYNANDRIA, Гинандріа от Грег ческих в слов в умій, женка и амір, анир в мужв. Уродныя дпуполыя или раствия, в в цвытках в коих в шычки или мужчинки срослись с в пестиками или жен ками, так в что нычки сидять на пестиках в.
 - 1. Gynandria Diandria, Гинандріа Діандріа. Растънія имъющія диа св пестиками сросіцівся тычка или мужчинки.
 - 2. Gynandria Triandria, Гинандріа Тріан дріа. Растинія о трехь сь пестиками сросшихся тычкахь.
 - 3. Gynandria Tetrandria, Гинандріа Тет трандріа Раствнія о четырехь сь пестиками сросшихся тычкахь.
- 4. Gynandria Pentandria, Гинандріа Пентандріа. Растьнія опяти сь пести ками сросшихся тычкахь.
- 5. Gynandria Hexandria, Гинандріа Гександріа. Раствийн о шести сь пестиками сросшихся тычкахь.
- 6. Gynandria Octandria, Гинандріа Октандріа. Растънія о осьми сь пестика. ми сросшихся тычкахь,
- 8. Gynandria Polyandria, Гинандріа Полі андріа. Растънія о многихь сь пестиками сросшихся тычкахь.
- XXI. MONOECIA, Монеціа от в Греческих в слов в моюсь, монось, едниный, и ожа, дом в или Овщежилищныя, или Растенія имвющія на одном в и том в же корн в цв вты и тычковые или муже-

- скіе и пестичные или женскіе или сЪ отдЪленными полами.
- 1. Monoecia Monandria, Монеціа Монандріа. Раствнія св отделенными попами однотычкопыя, или содержащія въ мужеских в своих в цвётах в по одному тычку.
- 2. Monoecia Diandria, Монеціа Діандріа. Растънія сь полуотувленными попами Диупестичныя.
- 3. Monoecia Triandria, Монеціа Тріандріа. Раствнія св полуот дъленными полами Трехв-пестичныя.
- 4 Monoecia Tetrandria, Монеціа Тетрандріа. Растънія сь полуот дъленными полами четырехь тычконыя.
- 5. Моновсіа Pentandria, Монеціа Пентандріа, Растенія сь полуотувленными полами Пяти-тычконыя.
- 6. Monoecia Hexandria, Монеціа Гександріа. Раствнія сь полуотувленными полами Шеститычконыя.
- 7. Monoecia Heptandria, Монеціа Гепшандріа. Раствнія сь полуотувленными полами седмитычконыя.
- 8. Monoccia Polyandria, Монеціа Поліандрія. Растенія сь полуот деленными полами Многотычконыя.
- 9 Monoecia Monadelphia, Монеціа Монаделфіа. Растінія св полуот зіленны ми полами, и у коих в вы мужеских в цевтах в тычки срослись внизу вы одну кучку.
- 10. Моноесіа Syngenesia, Моненіа Сингенесіа. Раствнія св полуотувленны ми полами, и у коихв вв мужескихв цевтахв тычки срослись вв верьху шляпками своими.
- 11. Monoecia Gynandria, Монеціа Гинандріа. Раствнія сь полуот двленными полами, и у коихь тычки срослись сь пестиками.

- XXII. DIOECIA, Діеціа. Отдъленно растущія, или Растънія, имъющія мужескіе и женскіе цвъпы соесемъ на особыхъ произрастъніяхъ.
- 1. Dioecia Monandria, Діеціа Монандріа, Отдъленно растущія Однотычконыя.
- 2. Dioecia Diandria, Діеціа Діандріа, Диутычкопыя.
- 3. Dioecia Triandria, Дісціа Тріандріа. Отделенно растущія Трехь-тычконыя.
- 4. Dioccia Tetrandria, Діеціа Тетрандріа. четырежь тычконыя.
- 5. Dioecia Pentandria, Діеціа Пентандріа. Пятитычкопыя.
- 6. Dioecia Hexandria, Діеціа Гександріа. Шеститычкопыя.
- 7. Dioecia Octandria, Діеціа Октандріа. Осьмитычконыя.
- 8. Dioecia Enneandria, Діеціа Еннеандріа. Депятитычкопыя.
- 9. Dioecia Decandria, Діеціа Декандріа. Десятиты уконыя.
- 10. Dioecia Icolandria, Діеціа Икосандріа. Апатиатитычкопыя.
- 11. Dioccia Polyandria, Дісціа Поліандріа. Отделенно-растущін, много-глоздочныя.
- 12. Dioccia Monadelphia, Діеніа Монаделфіа. Отовленно растущія св сросшимися пв. низу пводну кучку тычками.
- 13. Dioecia Syngenesia, Діеціа Сингенезіа. Отдъленно растущія св сросшимися пв перьху шляпками споими тычками.
- 14. Dioecia Gynandria, Діеціа Гинандріа. Отдъленно растущія сь сросшимися сь пестиками тычками.
- XXIII. POLYCAMIA, Полигаміа от Греческих в словь тодія много, и уйнов, гамось, бракь, то есть Многоврачныя или сь перемъщанными полами у нъкоторых в изв сего класса растъній бывають

вають обоеродные или мужескіе сь женскими вмѣстѣ цвѣты, у другихь одни мужескіе, или однѣ женскіе, а у третьихь всѣ на одномь произрастѣніи.

- 1. Polygamia Monoccia, Полигаміа Монеціа. Многобрачныя, на одномы и томы же корны цвыты и мужескіе и женскіе имбющія растынія.
- 2. Polygamia Dioecia, Полигаміа діеціа. Многобрачныя, либо мужескіе, либо женскіе цвёшы им'ёющія.
- 3. Polygamia Trioccia, Полигаміа Тріеціа, Многоврачныя имвющія всв три рода цввтовв.
- XXIV. CRYPTOGAMIA, Криптогаміа. происходить от Греческих словь приттов, тайный и уа́нов, бракь или Тайноврачныя, или сь непримѣтными полами.
 - 1. Cryptogamia Filices, Кринтогаміа филицесь. Тайноврачныя Папоротники или им'вющіе цевтушную часть с'в противной стороны.
- 2. Стуртодатіа Миєсі, Криптотаміа мусци. Тайноврачныя Мхи, у которых в тычковыя головки или шлянки без в спичек в отдалены от в цв в та женскаго рода; не им в тестика, а свмена не в в кожиц в и без в зародыща.
- 3. Cryptogamia Algae, Криптогаміа Алге. Тайноврачныя Поросты, имвющіе корень, листь и стебель вы одномы мысть.
- 4. Cryptogamia Fungi, Криптогаміа фунги. Тайнограчныя Григородныя, или не имъющія ни цевтовь, ни съмянь.

названія.

полученныя мною послБ напечатанія сей ичасти.

Стран. строжа.

5. 35. Abies Dod. Абіесъ Дод. Сосна пересадная.

26. 18. Acanthus, Акантусъ. Подлища. 173. 29. Anchusa Officinalis, Анхуза Оффициналисъ. Утячие гивэдышки.

48. 23. Aconitum Lycoctonum, Аконишумъ Ликокшонумъ. Циттошникъ.

51. 7. Acorus adulterinus, Желтый Мячикь.

68. 40. Agaricus lacteus, Агарикус в лактеус в. Молочайник в и Молошник в Гриев, растуть вы березовых в и еловых в рощах в, имъють длинный былый и молошным в соком в наполненный корешок в, и большую круглую, груздю подобную и слизковатую шляпку. Еспыли молод в, то крестьяне употребляють его высныдь, но и то весьма рыдко.

115. 43. Alnus, Альнусъ. Ольха, на зывается по Гречески кλήθρα, а у нъкоторыхъ кλήθρη.

мов. і. Alkekengi, Алкекенги Мошна, Мъшечникь, Пузырная трана.

126. 19. Alfine, Алсине. Курячья трапа, а у иныхъ Мышле Ушко.

179 г. Andromeda Caliculata, Андромеда каликулата. Болотная Былина, Батульникь.

Anemone Dichotoma, анемоне дихотома. Разпалистая пътреница.

189. 8. Anemone nemorofa, Анемоне немороза. Дубропная Вътреница.

Anemone umbellata, Анемоне умбеллата. Подсолнечная Вътреница.

222. 30. Apios vera, Anioch вера. Волчи узлы.

290. 16. Alarum, Азарумь. Водолей. 303. 3. Alparagus Syluestris, Аспарагусъ силеестрисъ. Катиполе.

うとうらうでうる

OFAA:



ОГЛАВЛЕНІЕ

НАХОДЯЩИХСЯ ВЪ СЕЙ І ЧАСТИ БОТАНИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ

деревъ, кустарниковъ, травъ, грибовъ и проч.

А Спран.	А Спран
Абелазисъ, права Египепская. Смотри	Азалеа желтая. Смотри Azalea lutea,
Abelasis, Абелазисъ 2.	Азалеа лушеа 352
Абелицеа, Кандійское дерево. Смотри	Азалеа Индіанская. Смотри Azalea In-
Abelizea, Абелизеа 3.	dica, Азалеа Индика 352.
Абрикосовое дерево большаго роду. Смо.	Азалеа Лаппонская. Смощри Azalea Lap-
три Armeniaca malus , Арменіака	ропіса, Азалеа Лаппоника 352.
малусъ 268.	Азіатская Аннона, Смотри Аппопа
Абрикосовое дерево маленькое. Смотри	Afiatica, Аннона Азіатика 204
аттеприса типот. Аоменіака миноры. 269.	Азіатская Бухнера. Смотри Buchnera
Абриносовое дерево съ большимъ пло-	Аffatica, Бухнера Азіатика 498.
Aomb. Cmompu Armeniaca fructu maiori,	Азонарушсъ, Мадагаскарское дерево.
nucleo dulci, Арменіака фрукту маіо-	Смотри Asonaruts, Азонарутсъ. 297.
Ри, нуклео дулци 269.	Акаціа. Смотри Acacia Germanica,
Абрикосъ плодъ. Смощри Armeniaca, Ар-	Акаціа Германика.
меніака 268.	Акаціа Египешская. Смощри Acacia ve-
Аброшаноидесь, морское раствніе. Смо-	га veterum, Акаціа вера вешерумь. 24.
три Abrotanoides, Абротаноидесъ. 9. Абулаза, Африканское дерево. Смотри	Акаціа Сибирская. Смотри Асасіа Sibi- гіса, Акаціа Сибирика 22.
Аbulata, Абулаза 18.	Акая Бразильское дерево. Смощри Асаіа,
Аваккари, Азіатское деревцо. Смотри	Акая 25.
Avaccari . Аваккари 244.	Акмелла, Цейланская трава. Смотри
Авила, Американскій плодъ. Смотри	Acmella, Armenaa 46.
Avila Abuna 6	Аламушы, Мадагаскарскіе плоды. Смо-
Авраамово дерево, Смотри Agnus castus,	при Alamutes, Аламушесъ 84.
CITHUCH Kacmuch - 744	Алатернъ, кустарникъ. Смотри Alater-
Агіагалидъ, Африканское дерево. Смо-	nus, Алашернусъ 85.
MUNICIPALITY A TOTAL OF A	АлгуелагуенЪ, Американское деревцо.
уаи, Американское дерево. Смощри	Смотри Alguelaguen, АлгуелагуенЪ. 100.
	Aloe, Anoe. CMompu Aloe, Anoe. 118.
Агуакане, Перуанскій плодъ. Смотри	Алфардъ, Азіатскій плодъ. Смотри
Aguacate, Aryaname. 79.	Аспапаса, Аханака 42.
Agienia, Aenia. 79. Ayienia, Aenia. 350.	Алфелаіе, Египетскій плодъ. Смотри
Азалеа, деревномъ растущая. Смотри Адаlea Pontica, Азалеа Понтика	Alfelaie, Andenaie. 97.
Azalea Pontica, Азалеа Понтика. 353.	Алцея, Смотри Alcea vulgaris, Алцеа
, 2200 to 1200 minde. 353.	вулгарисъ.

		The state of the s	
Ананасъ съ неколючимъ листомъ. Смо-		три Antaes, Антаесъ	2071
три Ananas folio non ferrato, Ана-		Антоцерось, иностранное растъніе.	
насъ фоліо нонъ серрапю		Смотри Anthoceros, Антоцеросъ	208.
Ангиве, Мадагаскарскій кустарникЪ.		Анооксанфъ mpава. Смотри Anthoxan-	
Смотри Anghive, Ангиве.		thum, АнтоксантумЪ	210.
Анда, Бразильское дерево. Смотри Ап-		Аовара, Американскій плодЪ. Смотри	
da, Анда	176.	Aoyara, Aobapa	217
Андира, Бразильское дерево. Смотри		Апалаханскій чай. Смотри Apalachine,	
Andira, Андира	177.	Апалахине.	218
Андіанъ булога, Мадагаскарскій ку-		Апеннинская вътреница. Смотри Апе-	7
старникъ. Смотри Andian Buloha;	100	mone Apennina, Анемоне Апенника.	185.
АндіанЪ Булога.	176.	АпокапукЪ, Мадагаскарское дерево.	
Андромеда мошистая. Смотри Andro-		Смотри Аросарис, Апокапукъ	229.
meda Hypnoides, Андромеда Типно-		Ангонки, грибы. Смотри Agaricus fra-	
идесъ.	179.	gilis, Агарикусъ фрагилисъ -	68.
маромеда цвътоносная. Смотри Ап-		Араліа, Американское растъніе. Смо-	
dromeda paniculata, Андромеда па-		mpu Aralia, Араліа.	240.
никулата.	179.	Арара, Американскій плодъ. Смотри	
Андромеда чашечная. Смотри Andro-		Arara, Apapa.	
meda calyculata, Андромеда калику.		Арека, Азіашское дерево. Смотри Аге-	
лаша.	179.	са, Арека.	The state of the s
Анемонъ цвъшъ. Смошри Апетопе,		Ариндрауто, Мадагаскарское дерево.	
Arms T	183.	Смотри Arindrauto, Ариндрауто	
Аниль, Бразильское дерево. Смотри		АсмаргокЪ, Азіатская трава. Смотри	
Anil, AHMAB.	200.	Almarhoc, Acmaproxb	
Анисовое дерево. Смотри Anisum stella-		Асонорушсь, Мадагаскарское дерево.	
tum, Анизумъ стеллатумъ	203.	Смощри Afonoruts, Асонорутсъ	
Анисъ. Смощри Anisum, Анизумъ	201.	Ассонь Пассехь, Мадагаскарское дере-	
Анисъ звъздочный. Смощри Anifum Rel-		во. Смотри Asson Passech, АссонЪ	4000
Aннона Азіатская. Смотри Annona	203.	Haccexb.	2970
Afiatica, Аннона Азіашика.	201	Астерь цввть. Смотри After, Астерь	311
Аннона Африканская. Смощри Аппопа	204.	АсшерЪ великоцвъшный. Смошри After grandiflorus: АсшерЪ грандифлорусъ.	078
Africana, Аннона Африкана.	805	graditiones: Wemenn then Muchan.	2.4.
Hacma I.	20). F	A	стеръ
	- 43		The same of the same

) 19	30
Астерь восточный. Смотри After fibi. Стран.	Бадьянъ. Смотри Anifum stellatum, Стран.
ricus, Астеръ Сибиринусъ 316.	Анизумъ стеллатумъ 203.
Астерь гладкій. Смотри Aster lævis,	Базелла бёлая
АстерЪ левисЪ 314.	Базелла бѣлая Базелла красная Базелла лосиящаяся. Базелла лосиящаяся. Базелла бѣлая Базелла бѣлая Базелла бѣлая Базелла бѣлая Базелла лосиящаяся.
АстерЪ кудрявый горный. Смотри After	Базелла лосиящаяся. Вазелла 39
montanus hirsutus, Астеръ монта.	Баластъ. Смотри Веп., Бенъ. 410.
нусъ гирсушусъ 315.	БанбарисЪ. Смотри Berberis, БерберисЪ. 416.
Aстерь кустарный. Смотри After fru.	Балсамина цвъшь. Смотри Balsamina,
ticosus. Астерь фрутикозусь 314.	Балсамина 363.
АстерЪ льнянолиственный. Смотри Aster	Балсамное дерево. Смощри Balfamum
linifolius, Астерь линифоліусь 315.	Iudaicum, Балсамумъ Юдаикумъ. 369.
АстерЪ ложный. Смотри Asteroides,	Балсамъ бълый. Смощри Ballamum Iu-
Астероидесь 317.	daicum, Балсамумъ Юдаикумъ. • 369.
Астерь пряный. Смотри After acris,	БалсамЪ бълый Бразильскій. Смотри
Астерь акрись 311.	Ballamum Copaiba, Bancamymb Ko-
Астерь сь выръзаннымь на подобіе	паиба 366.
сердца листомЪ. Смотри After cor-	БалсамЪ копаиве, тожъ 366.
difolius, Астеръ кордифоліусь 314.	БалсамЪ Меккскій. Смотри Ballamum
Асшерь съ прошивоположенными другъ	de Mecha, Балсамумъ де Меха 367
другу лисшьями. Смощри After op-	БалсамЪ Перувіанскій бѣлый, черный
positifolius, Астерь оппозитифоліусь. 316.	и сухій. Смощри Balfamum Peruvia-
Астеръ терноватый. Смотри After du	num, Балсамумъ Перувіанумъ 371.
mofus, Астерь думозусь 314.	БалсамЪ Толушанскій. Смотри Вава-
АстерЪ узколиственный. Смотри After	mum de Tolu, Балсамумъ де Толу. 367.
tenuifolius, АстерЪ тенуифоліусЪ. 316.	Бамбусь, простникъ. Смотри Ватьои,
Африканская Аннона. Смотри Annona	Бамбу 374
Africana, Аннона Африкана 205.	Баміа. Египешская права. Смоток Ва-
Африканская въпреница. Смотри Апе-	mia, Bania 376
monospermos, Анемоноспермосъ 193.	Бангве. Индіанская права. Смощри
Африканская Отуречная шрава. Смотри	Ваприе, Бангве 378.
Borrago Africana, Борраго Африкана. 460.	Банисшеріа, Американская шрава. Смо-
Африканская Христова иголка. Смотри	три Banisteria. Банистеріа 379°
Azarolus, Азаролусъ 354.	Баніанское дерево. Смошри Вег, БерЪ. 415
Африканский бълый Тернь. Смотри Ада-	Бараней шавель. Смотри Acetola mi-
rolus, Азаролусъ 354.	пог, Ацепоза миноръ 41.
Африканскии Переступъ. Смотри Вгу.	БаранецЪ плодъ. Смотри Agnus Scy-
onia Africana, Бріоніа Африкана 490.	thicus, Arnych Chumukych
Аханака, Индійская права. Смотри	The state of the Parise
Асһапаса, Аханака 42.	Барань, роды труда. Смотри вохиз, 466.
ІхарВ, Египешское дерево. Смотри	Баранъ непорочный права. Смотри Ад-
Achar, Axapb 43.	Codus AT
Акупалла, Американское расшъніе. Смо-	The same of the Alifons Angeway 107
три A hupalla, Aхупалла 46.	Dapoaphed. Chollipu Delbells, Depoching
зонуалала - Мадагаскарская ягода.	БарбарисЪ Кандійскій широколиспівен-
Смотри Azonualala, Алонуалала 357.	ный. Смотри Berberis Canadensis la tissimo

tissimo folio, Верберисъ Канаденсисъ Стран,	Бекеа, Шведское растъніе. Смотри Вжс. Стран.
лаписсимо фоліо 416.	кеа, Бекеа 359.
Барбора трава. Смотри Barbarea, Бар	
бареа 383.	хидо, Бексуго 432.
Бархеріа, Американская шрава. Смошри	Беллоніа, Американская права. Смотри
Barleria, Барлеріа 388.	Bellonia, Беллоніа 410.
Барреріа, Американская шрава. Смощри	Бельцы цвъть. Смотри Bellis, Беллисъ. 406.
Barreria, Bappepia 389.	Бензоинъ смола. Смотри Benzoinum,
	Бензоинумъ 413.
Баршсіа 389.	
варисіа бавдная. Смотри Bartsia palli-	БаланусЪ Мирепсика 410.
da, Бартсіа паллида 390.	Береза дерево, Смотри Betula, Бетула. 448.
баугинія, Американское дерево. Смощри	Береза бълая. Смотри Betula alba, Бе-
Bauhinia acuminata, Баугиніа акуми-	тула алба 428.
наша 396,	Береза Карла и
Бархашень цввшь ? Смошри Amaran-	Береза малорослая. Смотри Betula nana,
БархапникЪ 5 thus, АмаранпусЪ. 137.	Бешула нана 432.
Бархашный цвыть Смотри Атаган-	Береза черная. Смотри Betula nigra,
thus, Амараншусъ и Bellis, Бел-	
Аисъ 137. и 406.	
Бархашныя Просвирки. Смошри Abuti-	Acmparanych Bapiych 322.
lon, Абушилонъ 19. Башащасъ, Индіанское расшъніе. Смо-	
mpu Batatas, Bamamacb 92.	Болещусь лушеусь 451. Березовый Ерникъ. Смотри Betula fruti-
Вделліумъ смола. Смотри Bdellium,	соба, Бетула фрутикоза 431.
Бделліумъ 396.	Бернардіа, Американская права. Смотри
ВегенЪ бълый, корень. Смотри Behen	Bernardia, Бернардіа 418.
album, Berenb andymb 402.	Беръ дерево. Смотри Вег, Беръ 415.
бегенъ красный. Смотри Венеп гивгит,	Беюкка, Американское растъніе. Смотри
Бегенъ рубрумъ 403.	Веіиска, Беюкка 404.
регоніа, Американская права. Смощри	Бигай, Американская права. Смотри
Begonia, Beronia.	Вінаі, Бигай 437.
змеріа, жемтая трава. Смотри Belle.	Бигноніа Кашалпа, Американское дере-
Fla beakeria.	во. Смотри Bignonia Catalpa, Бигно
ЗАИСШНАЯ КИСЛАЯ ШОЗВА. И	ніа Каталпа 435.
облистиный карагазинь. Смотри Апа-	Бикса, Смотри Bixa Orellana, Бикса
TEQ	Ореллана 441.
Безплодный болошный кусть. Смотри	
Andromeda arborea, Андромеда ар-	Битинеріа шероховатая, Американское
6opea 178.	раствніе. Смотри Byttneria scabra, Биштнеріа скабра.
Безплодный болошный кусть синецвъ.	
линый. Смотри Andromeda cærulea, Андромеда церулеа 178.	Благовонная Маріона. Смотри Asperula . odorata, Асперула одората 304
Безсмершная шрава. Смошри Ambrofia,	одогата, Асперула одората. Благовонная трава. Смотри Anthoxan-
	thung
143.	

18 E

E

E

B

thum, и Антоксантумъ Ballote la. Стран.	nas aculeatus fructu ovato carne albida, Cmpan
nata, Баллоте ланата 210.	АнанасЪ акулеатусЪ фрукту овато
Блазіа, Смотри Blasia, Бласіа 441.	карне албида 169
Блакеа, Смотри Blakea, Блакеа 441.	Большій золошоголовникЪ. Смошри Afpho-
Блеріа щешинная. Смотри Blaeria Ericoi-	delus albus ramolus, Асфоделусь ал-
des, Блеріа Ерикоидесь 441.	бусъ рамозусъ 307
Блестящая сыровга. Смотри Agaricus	Большій морскій пупЪ. Смотри Acetabu-
radiosus, Агарикусъ радіозусь 70:	lum marinum procerius, Anemaby-
Влюмколь. Смотри Braffica cauliflora,	лумъ маринумъ процеріусъ 38-
Брассика кавлифлора , - 473.	Большій расходникЪ. Смошри Buphthal-
Бобарціа Индіанская Смотри Bobartia	mum vulgare, Буфталмумъ вулгаре. 514
Indica , Бобарціа Индика 346.	Большій РепейникЪ. Смотри Bardana
Бобовник В дерево, Смотри Amigdalus	five Lappa maior, Бардана сиве Лап-
папа, Амигдалусъ нана 156.	па маїорь 385
Божіе дерево. Смотри Abrotanum, Аб-	Большій черный Царскій корень. Смо-
рошанумъ 10.	три Astrantia maior , Астранціа
Божіе дерево дикое. Смотри Ambrofia,	майоръ 324
Амброзіа 143.	Бондукъ, Американскій плодъ. Смо-
Божіе дерево похевое. Смотри Abrotanum	три Bonduc Indorum, БондукЪ Ин-
сатреяте, Абротанумъ кампестре. 10.	дорумъ 45)
Божіе дерево садовое. Смотри Авгота-	Бонціа растъніе. Смотри Bontia Daph
num mas, Аброшанумъ масъ 11.	noides, Бонціа Дафноидесь 456
Божій бышЪ. Смотри Botrys Dod. Бо-	Борбонія Американское расшаніе. Смо-
трисъ 463.	три Borbonia, Борбоніа 459
Бозеа, дерево. Смотри Bosea Ervamora,	Борбоніа зубчащая, Смощом Вогропіа
Бозеа Ервамора 462.	crenata, Борбоніа кренаша 459°
Бокконіа, Американское растівніе. Смо-	Tanfarria marranta CMarray Daubania
три Воссопіа, Бокконіа 447.	lanceolata, Борбоніа ланцеолата - 459
Болошная Амманіа. Смощри Ammania	Борбоніа мохнашая. Смотри Borbonia tomentosa. Борбоніа томентоза.
palustris, Амманіа палустрись 146.	tomentosa, Борбоніа томентоза 4)
Болошная былина. Смощри Andromeda	БоровикЪ грибЪ. Смотри Boletus Boul-
calyculata, Андромеда каликулата. 179.	and 3 Doneiny of Owning of
Болошная Петрушка. Смотри Арінт	Боровикъ трава. Смотри Blitum album
palustre, Aniymb nanyempe 227.	et rubrum, Блитумъ албумъ эть
Болошный безплодный кусть. Смотри Ап-	рубрумъ.
dromeda arborea, Андромеда арбореа. 178.	Борода Іовова. Смотри Barba Iovis, Бар. 282.
Болошный мохв. Смошри Bryum paludo-	ба Іовисъ.
вит, Бріум'в палудозум'в 496.	Борода козья бълая. Смотри Barba са- 280.
Большая дикая бёлоцеёшная вётреница.	ргае - Барба капре.
Смотри Anemone fylvestris, Анемоне	Борода чершова. Смотри Asparagus (уl. 299)
силвестрись 19т.	Veitris. Achaparveb Cuarechipueb.
Большій Амараншъ. Смотри Amaranthus	Борщовик В. Смотри Acanthus lylvettris, 28.
cristatus, Амарантусъ кристатусъ. 139.	Акантусь силвестрись.
Большій былый Ананасы. Смотри Апа-	Борщь. Смотри Acanthus, Акантусь.

Ботенъ. Смотри Allium lativum, Аллі-Стран.	Буквица красная; и Страж
умъ сашивумъ.	Буквица черная. Смотри Betonica, Ee-
Боярская снишь шрава. Смотри Bupleu-	mоника 426.
rum, БуплеурумЪ 575.	Букин Верево. Смотри Веп, Бен В. 410.
Брабеюмъ расшъніе. Смотри Brabeium Rellatiferum, Брабеюмъ стеллащи-	Вуксбауміа, безлистное растъніе. Смо- три Buxbaumia aphylla, Буксбауміа
Ферумъ 466.	
Бразильскый бълый БалсамЪ. Смотри	афилла 523. Буксбаумъ дерево. Смотри Вихиз, Бук-
Balfamum Copaiba, Балсамумъ Ко-	сусъ 52-32
майба 366.	
Вразильское сливное дерево. Смотри А-	um, Адіаншум в авреум в, - 526.
саіа, Акая 25.	Бурманніа расшініе. Смотри Вигтаппіа,
Врейнія Американское растівніе. Смотри	Бурманніа 519.
Вгеупіа, Брейніа 481.	БутунЪ права. Смотри Allium Altaicum,
Бриндонесъ, Индіанскій плодъ. Смо-	АлліумЪ АлшанкумЪ 110-
три Brindones, Бриндонесъ 481.	Буфоніа узколисшвенная, растѣніе. Смо-
Брій, родъ мка. Смотри Вгунт, Бріумъ. 494.	три Bufonia tenuifolia, Буфоніа те-
Бровалліа, А. Растівніе. Смотри Вго-	нуифоліа 5002
wallia alienata, Бровалліа аліенаша. 485.	Бухнеріа Азіатская и Американская.
Брокколи. Смотри Broccoli, Брокколи. 482.	Смощри Buchneria Afiatica et Ameri-
Бромеліа, Американское распівніе. Смо-	сапа, Бухнеріа Азіатика эть Аме-
три Bromelia Karatas, Бромеліа Ка-	рикана 498-
рашасъ 483. Бронколь. Смотри Braffica rubra crifpa,	Буцида, Американское раствие. Смо-
Брассика рубра криспа 476.	три Buzida Buceros, Буцида Буцерось. 499. Вычачій красный языкь. Смотри Ап-
Бросовая трава. Смотри Blitum album	chusa officinalis, Анхуза оффицинались. 1732
et rubrum, БлишумЪ албумЪ эшЪ	Бычій глазв. и
Рубрумъ 444.	Бычій ноготокъ. Смотри Buphthalmum
Брупіа шерстистая, мало извістное	vulgare, БуфшалмумЪ вулгаре 574-
раствніе. Смотри Вгипіа, Бруніа. 489.	Бълая Базелла. Смотри Bafella, Базелла. 391-
Брунсфелсіа, Американское расшиніе.	Вълая береза. Смотри Betula alba, Бе-
Смотри Brunsfelfia Americana, Брунс-	тула алба 428-
Фелсіа Американа 490. Брюква. Смощри Brassica raposa, Брас-	Бълая Вуквица. Смотри Betonica, Бе-
CMKS CMOMPN DIGHTCA TAPOIA, DPac-	тоника 426.
Буддлеіа, Американское растівніе. Смо-	Бълая ель, Смотри Abies, Абіесь 4.
три Buddleia, Буддаеіа 499-	Бълая капуста. Смотри Braffica alba
Бузинная губка. Смотри Auricula Iudae,	et viridis, Брассика алба эть ви- ридись 567.
дврикула Юле	
музинный наросшь шожь.	ргае, Барба капре 380.
YRENILA. CMOMPH Betonica Formania	Бълая Нефорощь, Смотри Ablinthium
E. CMompu Betonica alba,	Ponticum, АбсиншіумЪ ПоншикумЪ. 17:
- шоника алра.	Белая Олька. Смощри Alnus vulgaris,
буквица горная- Смошри Alisma Matth. Алисма Маш.	Алнусъ вулгарисъ.
Tog.	ББлаж

Boz

	Водяная Петрушка. Смотри Аріит ра- Стран.	Волоски простые. Смотри Adianthum Стран.
	lustre, Aniymb nanycmpe 227.	vulgare, АдіантумЪ вулгаре 57.
	Водяная Порченная помощь. Смошри	Волоскій осошь. Смотри Acarna flore
	Вессавинда, Беккабунга 397.	
	водяная Райская трава. Смотри Асо-	патуло 29.
	rus verus, Акорусь верусь. 52.	пашуло 29. Волуй грибъ. Смотри Agaricus integer, Агарикусъ интегеръ 68.
	водяная шина. Смотри Byflus flos	
	адиае, БиссусЪ флосЪ акве 527.	Волчецъ кудрявый съ сабурнымъ ли-
	Водяный Кровавникъ. Смотри Barba	стомъ. Смотри Апапаз, Ананасъ. 167.
	lovis, Варба Іовисъ 382.	Волчій корень желшый. Смощри Anthora,
	Водяный ПопушникЪ. Смотри Alilma	Антора 209.
	natans, Алисма наппансъ 104. Водяный Расходникъ. Смотри Buphthal-	Волчій корень съ бъловатымъ цевтомъ
	mum aquaticum, Буфшамумь ак-	Смотри Aconitum Lycoctonum, Ако- нитумъ ликоктонумъ 48.
	ВашикумЪ 512.	нишумъ ликокшонумъ 48. Волчье молоко съ круглымъ шишкова.
	водяный цвёть. Смотри Bysfus flos	вашым в корнемь. и
	addae buccuch danch aupe	Волчьи узлы права. Смотри Apios vera,
	воинская mpaвa. Смотри Aizoon palu-	Апіосъ вера 222.
	THE ATTROOPER TEGILING	Волчья шрава. Смощри Butomus, By-
	Воджанка грибъ. Смотри Agaricus cina-	томусъ 522.
	A CONTROL OF THE OWN OWN OF THE PARTY OF THE	Вонючая дикая лебеда. Смотри Atriplex
	одкоубивственная трава. Смотри Асо-	foetida, АтриплексЪ фетида 332.
	Tum Lycoctonum, Аконишумь ли-	Вонючее дерево. Смотри Anagyris foetida,
	коктонумъ 48-	Анагирисъ фетида 166.
	Арокистоцивъщная Червяница. Смотри	Вонючій дягиль. Смотри Archangelica,
	- All Hill 1000 Higgs Original A second	Архангелика 251.
	воловій языкъ шрава. Смощри Buglosium	Вонючка трава. Смотри Acanthus,
	училонит, руглоссум в ангустифо.	Акантусъ 26.
	водовій языкь Кандійскій. Смотри Ви-	Вороній глазЪ трава. Смотри Anthora,
	glossum Creticum maius, БуглоссумЪ	Антора 209.
	Крешикимъ мамсъ	Boponiu Marb. Cmompu Argemone Mexi
	водовій хвость. Смотри Alphodelus al-	сапа, Аргемоне мексикана 255. Воронка права. Смотри Atractylis frutico-
	запона, асфоделусь албусь ра.	fa, Атрактились фрутикоза 328.
	VID 3 2 7	Восточная звъздочная права Смотри
	OKO. CMOMON Buphthalmum vul-	After Sibiricus, Астерь Сибирикусь. 316.
1	Водоплатия вуднаре 514.	Восточная огуречная права. Смотри
	TAOARA MOARA. CMATTON RICING	Borrago orientalis, Bopparo opienma nuch. 460.
-	BOARAVIII SOA.	Восточная кустарная Греча. Смотри
	Bynagana mpaga. Cmompu Bupleurum,	Atraphaxis orientalis, АтрафаксисЪ
	Волоски колоски болоски колоски колоски	оріеншались.
	Vulgara A: CMoliph Adianthum	Восточная червяница. Смотри Anchufa
	Boлоски Машери Божіей, и	orientalis, Анхуза оріеншались. 175.

B

391	
Восточный Астерь. Смотри After Sibi- Стран. ricus, Астерь Сибирикусь 316.	Въпреница малая съ Кишнецовымъ Стран. листомъ. Смотри Anemone tenuifo.
Восточный Иръ Смотри Acorus Afiati-	folia, Анемоне шенуифоліа 192. Въщреница подсолнечная. Смотри Апе-
сия, АкорусЪ АзіашикусЪ 57. Восточный чернобыльникЪ. Смотри Аг-	mone umbellata, Анемоне умбеллаша.
themisia Chinensis, Артемизіа Хинен- сисъ 274.	Вътреница полевая. Смотри Anemone agreftis, Анемоне агрестисъ 184
Востролистное дерево. Смотри Aquifoli- um, Аквифоліумъ 234.	Вътреница Португальская. Смотри Anemone latifolia prima, Анемоне
Вошь свиная. Гартри Аріит palustre, АпіумЪ палустре 227.	лашифоліа прима 187- Въпреница пянилистная. Смотри Апе- mone quinquefolia, Анемоне квин-
Вошь слоновая, плодъ Смотри Anacar-	кгефоліа 190.
dium, АнакардіумЪ 161. ВыжлинЪ трава. и	Вѣтреница развалистая. Смотри Ane- mone dichotoma, Анемоне дихотома.
Вызолникъ шрава. Смотри Antirrhinum	Въщоенина садовая. Смощом Апетопе
vulgare, Анширргинумъ вулгаре. 214.	hortenfis, Анемоне горшенсисъ 186. Въщреница съ подобнымъ Нарциссу
Высщійся КирказонЪ. и Высщійся ПхиновникЪ. Смотри Aristo-	TIPETION'S CHOTTON Anemone Narciffi-
lochia clematitis, Аристолохіа клема- титись. — 260.	Явтореница съ похожими на желтый волчій корень листьями. Смотри Апе-
Въникъ Царскій права Смотри Barbarea, Барбареа 383.	топе secunda, Анемоне секунда. 191. Въщреница съ шишковащымъ корнемъ.
Въшвисный мохъ. Смотри Вгуцт всора-	
гіцт, Бріумъ скопаріумъ 497.	Анемоне булбоза радице 185° Въпреница прехълистная. Смотри А
Въпреница цвъпъ. Смотри Anemone, Анемоне 183.	nemone trifolia, Анемоне трифоліа. 192. Вътреница узколиственная красная.
Вѣпреница Африканская. Смопіри Ane. monospermos, 193.	Смотри Anemone angustifolia mul-
Въпреница Апеннинская. Смотри Ado- nis Apennina, Адонисъ Апеннина. 185.	ліа мултиплексъ рубра. Вътреница Цареградская. Смотри Апе-
Въпреница большая бълоцвъпная ди- кая. Смотри Anemone fyluestris, Анемоне силвестрисъ 191.	mone maxima polyanthos Chalcedonica, Анемоне максима поліаншось
Въпреница Виргинская. Смотри Ane- mone Virginiana, Анемоне Вирги-	Вътреница широколиственная. Смотри Anemone latifolia prima, Анемоне латифоліа прима.
Вътреница торная. Смотри Апетопе Аріпа, Анемоне Алпина 184.	Въпренныя ятоды. Смотри Belladonna, 405. Белладонна. Вязо - Желдь. Смотри Aquifelium, Ак
Въпреница дубровная. Смощри Апето- де петогоја, Анемоне немороза. 189.	вифоліумЪ.
The second secon	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

F

TB LN

LN

Ln

TAN TAN TAN TAN TAN THE AREA TO A TO AN A

のできた。 19 mile 19 mi	Гвоздочная шрава Смотри Вирleurum, Страна апдивівовійт, Буплеврумь антустиноліумь 576. Проздичный Перець. Смотри Атотит гасетовит, Амомумь рацемозумь. 510. Пишпанская ясень дерево. Смотри Агьог Атегісапа ріппатія Fraxini вовія, Арборь Американа пиннатись Фраксини фоліись 242. Пишпанскій длинный Кирказонь. и пишпанскій длинный Пхиновникь. Смотри Агівовосніа вопда Ніврапіса, Аристолохіа лонга Гиспаника 262. Пишпанскій Пустозернь. Смотри Аругіоп, Апиріонь 233. Пладкая завидочная трава. и пладкая капуста. Смотри Brassica leuis, Брассика левись 475. Пладкій Астерь. Смотри After laeuis, Астерь левись 314. Плазь бычій. Смотри Вирһthавтит vulgare, Буфталмумь вулгаре 514. Плазь вороній Смотри Вопдис Іпдогит, Вондукь Индорумь 455.	Толый Горох В. Смотри Войдис Indorum, Страт Бондук В Индорум В. 45 5 Горлец В трава. Смотри Вівота тайог гадісе тадісе тадісе тадіс инторта. 439 Горлянка трава. Смотри Вгипева, Брунелла. 439 Горлянка трава. Смотри Вгипева піворібова, Брунелла гиссопифоліа. 488 Горлянка синецвітная. Смотри Вгипева дгандівога, Брунелла грандифлора. 488 Горная буквица. Смотри Авівта, Алисма. 103 Горная вітреница. Смотри Апетопе Авріпа, Анемоне Алпина. 184 Горная кудрявая звіздочная трава. Смотри Авет топапия вітвици данеры монтанує гирсутує в. 315 Горная торица. Смотри Арвоп іпсапит топапит висент данеры монтануть лутеуть. 134 Горное Эбеновое дерево Американское Смотри Вашіпіа аситіпата, Баугиніа акумината. 396	5
	Глазъ чижевъ. Смотри Вига paftoris, Бурса пасторисъ. Глукая Сибирская крацива. Смотри Вал.	Горный кудрявый Астерь. Смотри А- fter montanus hirfutus, Астерь мон- танусь гирсутусь 315 Горныя образки трава. Смотри Асасіа	, .
	инодога того Согопора, Баллоте	Sibirica, Акаціа Сибирика. Горохъ дорожчатый. Смощри Aftragalus fulcatus, Астрагалусъ сулкатусъ. 322.	
Contraction of the last of the	Бромось герба 484.	торох в журавлиной дикій. Смощри Ara- chus, Арахусъ 239	
	173.	Торохъ Кишайскій. Смотри Afpalathus arborescens, Аспалатусь арборесценсь. 297. Горохъ мышій. Смотри Arachus, Арахусь	
	num Peruvianum, Балсамумъ Перу-	и Astragalus, Астрагалусь. 239 и 317. Горожь полевый волосистый. Смотри	
	Volce собачья. Смотри Antirrhinum	Altragalus pilolus, Acmparanych nu-	
	Аквилетіа. Смотри Aquilegia,	Торохъ силюснутый. Смотри Astragalus, Астрагалусь 317.	
	Yacma I. 236.		
		I OD:	26

Тортанная трава. Смотри Brunella, Стран.	Губа лиственническая. Смотри Agaricus Страв
Брунелла 486.	vegetabilis, Агарикусъ вегетабилисъ. 70.
Горчишная mpaвa. Смотри Barbarea,	Губка бузинная. Смотри Auricula Iudæ,
Барбареа 383.	Аврикула Юде 34 ¹
Горькій Миндаль. Смотри Amygdalus	Гусиная лапа сЪ треугольнымЪ листомЪ
amara. Амигдалусъ амара 156.	Смотри Bonus Henricus, БонусЪ
Горькоглинная трава. Смотри Aloe, Алое. 118.	Генрикусъ 457
ГребешокЪ пастушій. Смотри Amaran-	0 3 C
thus cristatus, Амарантусъ криста-	Acomo Acomo Granda Armeniaca
тусЪ 139.	Дерево Абрикосовое. Смотри Armeniaca
Гремячка трава. Смотри Ballote lanata,	mards, ilpheniana manyen
Баллоте ланата 361.	Дерево Авраамово. Смотри Agnus са-
Треча дикая. Смотри Achillea foliis pin-	itus, masinyob kaomyob.
natis, Ахиллеа фоліисЪ пиннашисЪ. 44.	Дерево Анисовое. Смотри Anifum stel-
Греча дикая желтая, Смотри Achil-	latum, Анизумъ сшеллашумъ 200 Дерево Бальсамное. Смопри Ballamum
lea tomentofa, floribus in fastigio cau- lis corymbiferis, Ахиллеа томенто-	Iudaicum, Балсамумъ Юдаикумъ. 369
за, флорибусь инь фастиго кавлись	Дерево Баніанское. Вст., Берь 41)
коримбиферисъ 45.	Accord Famile Cwarrey Abrotonum .
Греча дикая мохнатая. Смотри Achil	АброшанумЪ.
lea tomentosa, Ахиллеа томентоза. 44.	Дерево великосеянное. Смотри Brunella.
Греча кустарная восточная. Смотри	Брунелла 480
Atraphaxis orientalis, Атрафаксисъ	Дерево вонючее. Смотри Anagyris toeti-
оріеншались 330.	da, Анагирисъ фешида.
Греча кустарная колючая. Смотри At-	Дерево остролистное. Смотри Aquifoli-
raphaxis spinosa, Атрафаксисъ спино-	ит, Аквифоліумъ 234
за 330.	Дерево гороховое. Смотри Acacia Sibirica,
Греческій СабурЪ. Смотри Aloe Graeca,	Акаціа Сибирика.
Алое Грека 121.	Дерево зеленичье. Смотри Вихиs, Буксусь 5 ²³
Грибъ, Agaricus campestris, Агарикусъ	дерево земляничное. Смотри Агригио
кампестрисъ.	Арбутусь.
ГрибЪ Оленій. Смотри Boletus Cervi,	Дерево вемаяничное съ цвавнымъ ли- 60
Болетусъ Церви 448.	дерево земляничное съ цёльным в ли 60 стомъ. Смотри Adrachne, Адрахне. Дерево золощое. Смотои A spalathus In.
Тромовый корень. Смотри Afparagus fyl-	The first of the f
vestris, Acnaparych силвестрись. 299.	dica, Аспалатусъ Индика.
Трудница. Смотри Abutilon, Абутилон Б. 19.	Дерево иностранное колючее съ подоб-
Груздь, грибъ. Смотри Agaricus Geor-	ными МасшичнымЪ листьями. Смотри
gii, Агарикусъ Георгіи 68. Груша земляная. и	Arbor exotica spinosa foliis Lentisci,
Груша красная. Смотри Apios vera,	Арборъ екзопика спиноза фоліись 455
Апіосъ вера 222.	Лентисци.
Грушевидный мохъ. Смотри Bryum Ру-	Дерево коренное. Смотри Вег, Берв. Дерево миндальное. Смотри Amygdalus, 15
riforme, БріумЪ Пириформе 496.	Амигдалусъ
Губа. Смотри Agaricus Georgii, Arapu-	Дерево молошное. Смотри Ahouai Nerii foli
кусь Георгіи 68.	Profess Monomines, Charles 22-22-22

Дикая опаль трава. Смотри Acanthus

lyluestris, Акантусь силвестрись.

4.

0.

-

*10

Длинный Гишпанскій ПхиновникЪ или

B B 2

20.

376.

290.

289.

457.

Кирка-

Кирказонъ. Смотри Aristolochia lon- Стран. ga Hispanica, Аристолохіа лонга Гиспаника. Дикій Пхиновникъ или Кирказонъ. Смотри Aristolochia longa, Аристолохіа лонга. Дорожчатый горохъ. Смотри Astragalus fulcatus, Астраталусъ сулкатусъ. 322. Дорожчатый мехъ. Смотри Bryum striatum, Бріумъ стріатумъ. Дорожчатый Красномолотникъ съ дубовыть листовъ Смотри Воссопіа гасетова sphondylii folio tomentoso, Бокконіа рацемоза сфондиліи фоліот томентово. Дорожнат Вътреница. Смотри Вирнанатит агрогесеня вуфталмумъ арборесценсъ. Дубровная Вътреница. Смотри Апетопе петогова, Анемоне немороза. 189. Дурманъ сонный. Смотри Belladonna, Белладонна. Дурный духъ. Смотри Asta foetida, Аса фетида. Дурный духъ. Смотри Востуз, Ботрисъ. Дутистая лебеда. Смотри Вотуз, Ботрисъ. Дутистая лебеда. Смотри Вотуз, Ботрисъ. Дутистая сыворочная трава. Смотри Агрегиlа odorata, Асперула одората. 305. Дягель Смотри Апревіса Агснапде-Дагильникъ Канадійскій. Смотри Апревіса Сапасенія tennifolia, Ангелика Канаденсисъ тенуифоліа. Дягильникъ ягоды приносящій изъ канады. Смотри Агавіа, Араліа. 240.	Ежовка дерево. Смощри Arbutus, Ар-Стран- бутусь 250. Ель дерево. Смощри Abies, Абіесь 4. Ель бълая. Смощри Abies, Абіесь 4. Ель виргинская. Смощри Abies Сада- пепія fructu brevi, Абіесь Каданен- сись фрукту бреви 8. Ель красная. Смощри Abies Dod. Абі- есь Дод 5. Елька дерево. Смощри Олька 115. Ерникъ Березовый. Смощри Веtula fruti- соба, Бетула фрутикоза 431. Евіопскій сшепный шалфей. Смощри Астіорія, Этіопись 62. Евіопскій Тиманъ. Смощри Атті ve- rum, Амми верумъ 147. Евіопскій Тминъ простый. Смотри Атті ті vulgare, Амми вулгаре 148. Жабья костка трава. Смотри Аро. супит, Апоцинумъ 229. Жабрей трава. Смощри Аптігтіпит vulgare, Антиргинумъ вулгаре 214. Желтая Азалеа Смощри Вевегіа lu- tea, Безлеріа. Смотри Вевегіа lu- tea, Безлеріа лушеа 49. Желтая дикая Греча. Смотри Achillea tomentola, floribus in fastigio caulis согутьістія, Ахиллеа томентоза, флорибусъ инъ фастигіо кавлись ко римбиферись 44. Желтая мокрица. Смотри Anagallis ter tia lutea, Анагаллись терпіа лутеа. Желтая челма. Смотри Aiphodelus lu- reus, Асфоделусь лушеусь 308. Желтоголовникъ. Смотри Aftragalus grandiflorus, Астрагалусь гранди-
Дягильникъ ягоды приносящій изъ канады. Смотри Aralia, Араліа. 240.	желтая Челма. Смотри Alphodelus luteus, Асфоделусъ лутеусъ 308.
Египетскій дикій Просвирникъ. Смо- три Ватіа Баміа, - 376. Египетскій Сабуръ. Смотри Aloe Ac- gyptiaca, Алое Эгипціака - 119.	grandiflorus, Астрагалусъ гранди- флорусъ 321. Желтоцвътная порченная помощъ. Смо
Египетскій ТернЪ. Смотри Асасіа vera veterum, Акаціа вера ветерумЪ 24.	лисъ mepuja луmea 166.

желный волчій корень. Смотри Antho Стран. га, Антора 57.	Журавлиный дикій горохЪ. Смощри Стран. Arachus, АрахусЪ 239.
Желпый дикій НарциссЪ. Смотри Bul- bocodium vulgatius, БулбокодіумЪ	Журавлиныя ягоды. Смошри Asparagus fylvestris, Аспарагусъ силвесшрисъ. 299.
вулгаціусь 509.	
Желпый мячикъ. Смотри Acorus adul- terinus, Акорусъ адултеринусъ - 57.	Заячей хоходокъ трава. Смотри Агра-
Желтый осеть. Смотри Atractylis fru-	ragus lylveltris, Acnaparych силве-
ticofa, Апірактились фрунцикоза. 328.	стрисЪ 299.
Желшыя Жидовскія вишни. Смотри Al. kekengi Virginianum, Алкекенги Вир.	Заячье ушко. Смотри Bupleurum angu- ftifolium, БуплеврумЪ ангустифо-
гиніанумЪ 106.	ліумЪ 516.
Желудь. Смотри Balanus, Баланусь. 360. Женишокъ трава. Смотри Agerathum	Звъздовидная шрава- Смотри Asteroides, Астероидесъ 317.
ригригеит, АгератумЪ пурпуреумЪ. 72.	Звъздопечоночная шрава. и
Женскій волосъ трава. Смотри Adian.	Звъздоподручная трава. Смотри Абре-
thum vulgare, Адіантумъ вулгаре. 57.	rula odorata, Асперула одората. 305.
Женскій волось кустарный Американ-	Звъздочки. Смотри Anemone, Анемоне
скій. Смотри Adianthum Canadenie,	и Aster, Асшеръ 183. и 311. Звъздочная трава. Смотри Aster,
АдіантумЪ Канаденсе 57. ЖесминЪ Индіанскій. Смотри Відпопіа	Астерь 311.
Indica, Бигноніа Индика 436.	Звъздочная права большая. Смотри
Живопиный корень. Смотри Bistorta ma-	After grandiflorus, Астеръ гранди-
ior radice magis intorta, Бисторта	ФлорусЪ 314.
мајорь радице магисъ инторпа 439.	Звъздочная права восточная. Смотри
Живучая трава Смотри Bugula, Бугула 504. Живучая трава бълоцевтная. Смотри	After fibiricus, Астеръ Сибирикусъ. 316. Звъздочная трава гладкая. Смотри
Bugula sylvestris villosa store albo,	Aster læuis, Астеръ левисъ 314.
Бугула силвестрисъ виллоза флоре	Звъздочная трава кудрявая горькая.
a160 504.	Смотри After montanus hirfutus,
Живучая права косматаа. Смотри Ви-	Астеръ монтанусъ гирсутусъ - 315.
gula (ylvestris villosa flore coeruleo,	Звъздочная права кустарная. Смотри
Бугула силвестрисъ виллоза флоре перулео.	After fruticolus, Acmep b фрутикозусь. 314.
Жидовскія вишни. Смощри Аlkekengi,	Звёздочная права льнянолиственная. Смотри After linifolius, Астеръ ли-
Алкененти.	нифоліусь.
Мидовскія вишни желшыя. Смощри AI-	Звъздочная права ложная. Смотри Аfte-
Ackengi Virginianum Akekehin Bup-	roides, Астероидесъ 317.
тиніанумЪ год:	Звъздочная права пряная. Смотри
Кминда права. Смотри Blitum album et rubrum, Блитумъ албумъ этъ	After acris, Acmepb akpueb 311.
Pyopymb -	Звъздочная права съ подобными дико-
Жолдь Смотри Aquifolium, Aквидо	му льну листьями. Смотри After li- nariae foliis. Астеръ линаріе фоліисъ. 315.
ліумь 234.	Звъздочная права съ прошивоположен
	HEIMIX

The state of the s	
ными другь другу листьями. Смощри Стран. Аfter oppositisolius, Астерь оппозити- фоліусь 316. Звіздочная трава терноватая. Смотри Аfter dumosus, Астерь думозусь, 314. Звіздочная трава узколиственная. Смотри Аfter tenuisolius, Астерь тенуи- фоліусь 316. Звіздочный Анись. Смотри Апівт ftellutum, Анисумь стеллатумь. 203. Звіздочный цвіть. Смотри Аfter Atticus, Астерь Аттикусь 312. Звіробой Сибирскій. Смотри Androsae- тит тахітит frutescens, Андрозе- мумь максимумь фрутесценсь 182. Звіробой степный. Смотри Blattaria, Блаттаріа 442. Зеленая капуста. Смотри Вгаявса alba et viridis, Брассика алба эть виридись. 467. Зеленичье дерево. Смотри Вихиз, Бук- сусь 523. Зеленичье дерево высокое или большое. Смотри Вихиз агьогевсепь, Буксусь арборесценсь 523.	Злый Генрикъ. Смотри bonus Henricus, Стран бонусъ Генрикусъ 458 Змієва ягода. Смотри Вгуопіа alba, Бріоніа алба 491. Змієвникъ. Смотри Вівтотта таіог, Бисторта маіоръ 439 Змѣиная трава. Смотри Вівтотта таіог, Бисторта маіоръ 439 Змѣиная трава. Смотри Вівтотта таіог, Бисторта маіоръ 439 Змѣиный орѣкъ Американскій. Смотри Ауіа, Авила 349 Змѣйовникъ. Смотри Арготапит сатревте, Абротанумъ кампестре. 10. Золотоголовникъ трава. Смотри Аврно- delus, Асфоделусъ 309 Золотоголовникъ вольшій. Смотри Аврно- фень албусъ рамозузъ 307. Золотоголовникъ простый трава. Смотри Аврноdelus albus гатовия, Асфоделусъ лутеусъ 309. Золотое дерево. Смотри Авраватния впейса, Аспалатусъ Индика 296. Золоть корень. Смотри Аврноdelus albus гатовия, Асфоделусъ албусъ
Зеленичье дерево низкое или карла. Смотри Buxus humilis, Буксусь ту- мились 523.	рамозусъ. 307 Золошый мохъ. Смошри Agnus Scythicus, Агнусъ Сцишикусъ. 76.
Веленичье дерево позлащенное. Смотри Вихиз aureus maior, Буксусъ авреусъ маіоръ 523. Зеленоватый мохъ. Смотри Вгуит viri-	Ивановъ Поясъ трава. Смотри Arthemisia latifolia vulgaris, Артемизіа ла тифоліа вулгарись.
dulum, БріумЪ виридулумЪ 498. Зеленоцвѣтный Амарантъ. Смотри А. тагаптния (рісатия, Амарантусъ спикатусъ 141.	Иванъ цвътъ. Смотри Buphthalmum vulgare. Буфталмумъ вулгаре Ивишенья грибы. Смотри Agaricus quin-
Земляная Груша. Смотри Apios vera, Апіосъ вера 222,	quepartitus, Агарикусъ квинквепар- титусъ 70. Ивовидная лебеда. Смотри Atriplex
Земляничье дерево. Смотри Arbutus, Арбутусъ 250	falicina, Ашриплексъ салицина 304
Земляничное дерево съ цёльнымъ ли- стомъ. Смотри Adrachne, Адрахне. 69,	lare, БріумЪ ацикуларе 494
Земляные оръшки. Смотри Bulbocasta- num, Булбокастанумъ. – 506.	Беккабунга
Зерны мускусовыя. Смотри Abelmosch, Абельмошъ 3.	Ибунка мадая. Смоніри Вессавинда ті- пог, Беккабунга миноръ Икоп

Икопная права. Смотри Alysson inca. Стран. пит montanum luteum, Алиссонъ инканумъ монтанумъ лутеумъ 134. Нибирь Нъмецкій. Смотри Arum offici- пагит, Арумъ оффицинарумъ 280.	Іеросалимъ права. Смотри Вотгуз, Стран. Ботрисъ 464. Іовова Борода. Смотри Вагва Іочіз, Барба Іовисъ 382. Іръ корень. Смотри Асогиз Verus, Ако-
Индейскій. Смотри Индіанскій Индіанская Азалеа. Смотри Azalea Indica, Азалеа Индика 352. Индіанская Бобарціа. Смотри Bobartia Indica, Бобарціа Индика. 346.	русь верусь 52. Ірь восточный. Смотри Acorus Afiaticus, Акорусь Азіатикусь 51. Іудово ушко. Смотри Auricula Iudae, Аврикула Іуде 341.
Индіанская Огуречная права. Смотри Воггадо Indica, Борраго Индика. 460. Индіанскій Амаранть. Смотри Атагастник вассівет Indicus, Амарантусь бакциферь Индикусь 138. Индіанскій дикій Тернь. Смотри Абраlathus Indica, Аспалатусь Индика. 296. Индіанскій Жесминь. Смотри Відпопіа Indica, Бигноніа Индика 436. Индіанскій мохнатый Просвирникь. Смотри Ватіа Мобсһата, Баміа Мосхата. 377. Индіанскій Орьшникь. Смотри Агеса, Арека 253. Индіанскій сахарный корень. Смотри Вататак, Бататась 393. Индіанскій Тростникь. Смотри Агипдо батіца, Арундо сатива, и Ватьои,	Кабурейба дерево. Смотри Balfamum Регичіапит, Балсамум'в Перувіанум'в. 371. Кавалерскій цвіть. Смотри Aquilegia, Аквилегіа. 236. Калмыцкіе Оріжи. Смотри Amygdafus папа, Амигдалусь нана. 157. Калмыцкія шилы. Смотри Agul, Агуль. 80. Каменная липа Смотри Alaternus, Ала- тернусь 85. Каменная Песчанка. Смотри Arenaria faxatilis, Аренаріа саксатились. 254. Каменная Роса. Смотри Androface alte- га, Андросаце алтера. 180. Каменный Чеснокъ. Смотри Allium Alta- ісит, Алліум'в Алтаикум'в. 110. Каменный Плющь великоцвітный. Смо- три Аfarina, Азарина. 289. Камыш'в. Смотри Arundo Officinarum,
Бамбу 374. Индіанскіе конопли. Смотри Bangue, Бангус 378.	Арундо Оффицинарумъ 285. Канадійскій Дягильникъ. Смощри Ап- gelica Canadensis, Ангелика Жола- денсисъ 197
Иностранное колючее дерево съ подо- бными Мастичнымъ листьями. Смо- три Arbor exotica spinosa foliis Len- tisci, Арборъ экзотика спиноза фо-	Канадійскій Подлесникъ. Смотри Ава- rum Canadense, Азарумъ Канаденсе. 291. Кандінскій воловій языкъ. Смотри Ви- glossит Стетісит maius, Буглоссумъ
ліисъ Лентисци 455. Иссополистная Горлянка. Смотри Вги- nella Hystopifolia, Брунелла Гиссопи- фоліа 488. Ишаліанская Верба. Смотри Agnus са.	Крешикумъ маіусь. 502. Кандіискій воловій языкъ съ лазоре- вымъ цвъшомъ. Смощри Buglossum Creticum maius slore caeruleo purpu- rante, Буглоссумъ Крешикумъ ма-
Itus, Агнусъ кастусъ 74.	юсь флоре церулео пурпуранше. 502.

Кандійск ійволовій языкЪ сЪ пестрымЪ Стран.	Капуста Савойская. Смотри Вгавіса Стран.
душистымъ цвъшомъ. Смотри Ви-	Sabauda, Брассика сабанда 469.
glossum Creticum minimum flore va-	Капуста синяя. Смотри Brassica levis,
rio odorato, БуглоссумЪ КретикумЪ	Брассика левисЪ. 475.
минимумъ флоре варіо одоращо 502.	Капуста цвѣтная. Смотри Braffica cau-
Кандійскій широколиственный Барба-	liflora, Брассика кавлифлора. 472.
рисъ. Смотри Berberis Canadensis la-	Капуста черная. Смотри Braffica arven-
tissimo folio, Берберись Канаден-	
сисъ латизсимо фоліо 416.	
Кандійскій мнимый Сандалъ. Смотри	Карагазинъ mpaва. Смотри Anabasis,
	Анабазисъ 158.
Abelycea, Абелицеа 3.	КарагазинЪ Безлистный. Смотри Апа-
Кандійскій ТминЪ. Смотри Ammi ve-	basis aphylla, Анабазисъ Афилла. 158.
тит, Амми верумъ 147.	Карагазинъ многолисшный. Смощри Апа-
Капуста. Смотри Brassica, Брассика. 467.	basis soliosa, Анабазисъ фоліоза. 160.
Капуста бълая. Смотри Brassica alba,	КарашасЪ, Американское растъніе.
Брассика алба 467.	Смотри Bromelia Karatas, Бромеліа
Капуєта вилая. Смотри Brassica apiana,	Каратасъ. 483.
Брассика апіана.	Каролинская Кассіа. Смотри Apalachine,
Капуста гладкая. Смотри Braffica le-	Апалахине 218.
vis, Брассика левисъ 475.	Кассине. и
Капуста зеленая. Смотри Braffica alba	Kaccia Королинская. Смотри Apalachine,
et viridis, Брассика алба эть ви-	Апалахине 218.
ридисъ 467.	Катиполе. Смотри Абрагадия, Аспаратусъ 298.
Капуста кочанная. Смотри Braffica ca-	Кашшанъ свиный. Смощри Bulbocafta-
pitata, Брассика капишаша 473.	num, Булбокастанумъ. 506.
Капуста кочанная бѣлая. Смотри Bras-	Кервель дікій. Смотри Antrifcus, An-
fica capitata alba, Брассика капита-	трискусъ 216.
ша алба 471.	Кирказонъ mpава. Смотри Aristolochia,
Капуста кочанная красная. Смотри	
Brassica capitata rubra, Врассика ка.	КирказонЪ выощійся. Смотри Arifto-
	lochia clematitis, Аристолохіа клема-
Kanycma копорская. Смотри Braffica	титисъ.
capitata alba, Брассика капитата	Kworesouh Amuning Chromos AsiAsla
алба.	chia longa Hi panica, Apucmonoxia
альа. 471. Капуста кудрявая. Смотри Braffica	лонга Гиспаника 262.
origo Topograma	
Капуспіа кудрявая бѣлая. Смотри Bras	КирказонЪ круглый. Смошри Aristolochia
fica alba crifpa, Брассика алба криспа. 469.	it am in the contract
Капуста кудрявая красная. Смотри	КирказонЪ круглый сЪ буреющимЪ цвЪ-
Brassica rubra crispa, Брассика рубра	томЪ. Смотри Aristolochia rotunda
	altera, Аристолохіа ротунда алтера. 266.
KPUCHA. 476.	Кирказон b малый. Смотри Aristolochia
Kanycma nepucmas. Cmompu Braffica al.	Pistolochia, Аристолохіа Пистолохіа. 263.
bula, Брассика албула. 470.	Кислая трава. Смотри Anabasis creta-
Капусша рѣпная. Смошри Brassica ra-	сеа, Анабазисъ крешацеа.
рова, Брассика рапоза. 476.	Ku-

Кислая шрава безлисшная. Смошри Апа-Сшран.	Козыль шрава. Смощри Ambrofia, Ам- Стран-
basis Aphylla, Анабазисъ афилла. 158.	брозіа • 143.
Кислица mpaвa. Смотри Acetosa minor,	Козья борода бълая. Смотри Barba
Ацетоза миноръ 41.	саргае, Барба капре 380.
Китайскій ГорохЪ. Смотри Aspalathus	Козья Морда. Смотри Beccabunga mi-
arborescens, Аспалатусъ арборесценсъ. 297	пог, Беккабунга миноръ 398.
Китайскій ЧернобыльникЪ. Смотри Аг-	Кокорникъ. и
themisia Chinensis, Артемизіа Хинен-	КокорнякЪ трава. Смотри Aristolochia
сисЪ 274.	The state of the s
КленЪ дерево. Смотри Асег maior,	Кокушка права. Смотри Asparagus syl-
Ацеръ мајоръ 33.	vestris, Аспаратусь силвестрись. 299.
Кленъ Американскій. Смотри Acer fo-	Кокушникъ Ленъ. Смотри Adianthum
liis quinquelobis subdentatis, Ameph	aureum, Адіантумь авреумь 56.
Фоліисъ квинквелобисъ субдентатисъ. 32	Колкая права. Смотри Agul, Агулъ. 80.
Кленъ Американскій, подобный Явору.	Колокольчики. Смотри Aquilegia, Акви-
Смотри Acer Platanoides, Ацеръ	나는 아이들은 아이들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다면 아이들은 사람들은 사람들이 되었다면 하는데 그렇게 하는데 살아 나를 하는데
Платаноидесъ 36.	Колоколчики кровавые. Смотри Androlæ-
Кленъ Американскій съ трехъ лапоч-	mum maximum frutescens, Андрозе-
нымЪ листомЪ. Смопри Acer trivel	мумъ максимумъ фрутесценсъ. 182.
Quinque lobatis foliis, Angelb mpu	Колокольчики лъсные. Смотри Alperula.
вель квинкве лобапись фоліись. 37.	odorata, Асперула одораша 305.
КленЪ красноцвътный. Смотри Асег fo-	Колокольчики Павилишные Американскіе
liis quinquelobis subdentatis, Auepb	Смотри Bignonia Indica, Бигноніа
фоліисЪ квинквелобисЪ субдентатисЪ. 32.	Иидика 436.
КленЪ малый. Смотри Acer minus,	Колосникъ mpaвa. Смотри Arenaria fa-
Ацеръ минусъ 35.	хатіlія, Аренаріа саксатились 254.
Клещикъ mpaвa. Смотри Arifarum,	Колючая кустарная Греча. Смотри Atra
Аризарумъ 258.	phaxis spinosa, АтрафаксисЪ спиноза. 330.
Клокочина дерево. Смотри. Azedarach,	Колючая Пупавка. Смотри Buphthal-
АзедарахЪ 355.	mum spinosum, Буфшалмумъ спино-
Ключь трава. Смотри Aethiopis, Эщіо-	зумъ 514.
писъ 62.	Колючее молошное дерево. Смотри Bdel-
КленЪ Орвежскій. Смотри Acer Pla-	lium, БделліумЪ 396.
tanoides, Ацерь Плашаноидесь. 36.	Колючій макъ. Смощок Argemone Mevi-
Кнафликча. и	сапа, Аргемоне Мексикана 255.
Кнафликъ. Смотри Blattaria, Блат-	Конопли Индіанскіе. Смощри Ваприе,
mapia.	
маріа. Кобылій щавель шрава. Смощри Argemo-	Eagree 378.
ne Mexicana Assertation Algeria	Коноплянка. Смотри Bidens tripartita,
пе Мехісапа, Аргемоне Мексикана. 255.	БиденсЪ трипартита 434-
Козельи рожки. Смотри Bidens tripartita,	Коперъ права. Смопри Anethum graveo-
Биденсъ припарпипа 434.	lens, Анешумъ гравеоленсъ 194.
Козій росшь трава. Смотри Вессавин-	Копетень трава. Смотри Afarum, Aза-
od IIIInor hekkahurra muroot ooo	румЪ 290.
Коздородъ права. Смотри Вагра сарга,	Копишникъ трава. Смотри Agul, Агулъ. 80.
а з80.	Г г Конор-
Часть І.	

Копорская капуста. Смощри Brassica са. Стран. pitata alba, Брассика капитата алба. 471. Копытникъ трава. Смотри Asarum,	Коровка права. Смотри Angelica Ar- Стран. Коровошникъ. Смотри Angelica, Ангелика Архангелика. 195.
Азарумъ 290.	Косатникъ. Смотри Acorus adulterinus,
Копыто Львиное. Смотри Alchimilla, Алхимилла 93.	АкорусЪ адултеринусЪ 51.
Копье Царское. Смотри Asphodelus lu- teus, Асфоделусъ лутеусъ. — 309.	Косматая живучая трава. Смотри Ви- gula fylvestris villosa, Бугула силве- стрисъ виллоза 505
Коренное дерево. Смотри Вег, БерЪ. 415.	Костка жабья трава. Смотри Аросі-
Корень волчій желтый. Смотри Antho-	num, АноцинумЪ 229.
та, Антюра	Кочанная капуста. Смотри Brassica ca-
Којень волчій съ бъловатымъ цвётомъ. Смотри Aconitum Lycoctonum, Ако	ріtata, Брассика капишаша 473. Кошичій глазъ. Смотри Bonduc Indo-
нишумЪ ЛикокшонумЪ 48. Корень громовкий Сустана в Сустана Gri	rum, БондукЪ ИндорумЪ 455°
Корень громовый. Смотри Afparagus fylvestris, Аспаратусь силвестрись - 299. Корень животный Смотри Bistorta ma-	Кошичій хвость. Смотри Amaranthus caudatus, Амарантусь кавдатусь. 141.
ior, Бисторта маiоръ 438. Корень золотый. Смотри Asphodelus al-	Кошка шрава. Смотри Agrimonia, Агри- моніа 77.
bus ramofus, Асфоделусь албусь ра- мозусь 307.	Крапива Глухая Сибирская. Смотри Вallote inodora, Баллоте инодора. 361.
Корень красный. Смотри Anchula Officianalis, Анхуза Оффициналисъ. 173.	Красавица трава. Смотри Belladonna, Белладонна.
Корень красный Цареградскій. Смотри Anchusa Officinalis, Анхуза Оффи-	Красная Базелла. Смотри Basella rubra, 391.
nalis Корень Макаршинъ. Смотри Bistorta	Красная буквица. Смощри Ветопіса, Бе- шоника 426.
foliis ovato oblongis acuminatis, Бис- торта фоліись овато облонгись аку-	Красная Груша Смотри Apios vera, Aniocb вера 222.
минашисъ 438. Корень почечный. Смотри Agerathum	Красная Ель. Смотри Abies Dod. Абіес В Дод. или Рісеа, Пицеа.
purpureum, Агеришумъ пурпујеумъ. 72.	Красная ромашка. Смощом Алетопе
Корень салодковый. Смотри Aftragalus,	agrestis, Анемоне агресписъ 184
Астрагалусь 317.	Красная садовая лебеда. Смотри Аtri-
Корень сахарный Индіанскій. Смощри	plex hortensis rubra, Атриплексъ гор-
Вататая, Бататасъ 393. Корень скипидарный. Смотри Afarum,	піенсисъ рубра 339 Красная свекла. Смотри Вета rubra
Азарумъ 290.	Бета рубра.
Корень сухотный. Смотри Arum venis albis, Арумъ венисъ албисъ 281.	Красная кочанная капуста. Смотри Вraffica capitata rubra, Брассика ка-
Корень Царскій большій. Смотри Astran-	пишаша рубра.
tia maior, Астранціа маіоръ. 324. Корень Царскій малый черный. Смотри Aftrantia minor, Астранціа миноръ. 325.	Краснош вльный Ананасъ. Смотри Апапаз fructu carne rubra, Ананасъ фрукту карне рубра.
325.	фрукшу карне руора.

КрасномолошникЪ древесоващый съ ду. Стран.	КрупикЪ ложный. Смотри Атогра Стран.
бовым в листом в Смотри Воссопіа	fruticosa, Аморфа фрупикоза 152.
frutescens, Бокконіа фрумесценсь. 447.	Кудрявая капуста. Смотри Braffica,
Красноцьвиная порченая помочь. Смо-	Крассика 467.
mpu Anagallis prima fev mas, Ana-	Кудрявець. Смотри Вотгуз, Ботрись, 463.
галлисъ прима севъ масъ 164. Красноцвъшный кленъ. Смотри Асег	КудрявецЪ Мексиканскій. Смотри Во-
foliis quinquelobis subdentatis, Auepb	trys Mexicana, БошрисЪ Мексикана. 465.
фоліись квинквелобись субдентатись. 32. Красные волоски. Смотри Adianthum	Кудрявый волчецъ съ Сабурнымъ ли- стомъ. Смотри Ananas, Ананасъ. 167.
vulgare, АдіантумЪ вулгаре 57.	
Красный Ананасъ. Смотри Ananas fo-	Кудрявый горный Астерь. Смотри After montanus hirlutus, Астерь
lio vix ferrato, Ананасъ фоліо виксъ серрато.	монтанусъ гирсутусъ 315.
Красный Бегенъ. Смотри Behen rub-	Курячья саблота. Смотри Anagallis
rum, Бегень рубрумь 403.	Phoenicea, Анагаллисъ феницеа. 164.
Красный бычачій языкъ. Смотри Anchu-	Куросабиъ шрава. Смотри Anagallis pri-
sa officinalis, Анхуза оффициналисъ. 173.	та sev mas, Анагаллисъ прима севъ
Красный корень. Смотри Anchusa,	масъ.
Анхуза 173	
Красный чернобыльникЪ. Смотри Аг-	Мурчавая лебеда. Смотри Atriplex laci-
themisia vulgaris, Артемизіа вулга-	niata, АшриплексЪ лациніаша 334.
	Курячьи черевы. Смотри Alfine, Алсине 126
Красота тысячная трава. Смотри Amaranthus cristatus, Амарантусъ	Кустарная восточная греча. Смотри
кристатусь.	Atraphaxis orientalis, АтрафаксисЪ
Красный чернобыльникъ. Смотри Аг-	оріеншались 330
themisia vulgaris, Аршемизіа вулга-	Кустарная звъздочная трава. Смотри
рисъ 275.	After fruticosus, Астерь фрутикозусь. 314
Красота тысячная трава. Смотри	Кустарная колючая греча. Смотри
Amaranthus cristatus, Амарантусъ	Atraphaxis spinosa, Ampadakcuch cnu-
кристатусъ 139.	ноза 330.
КровавникЪ водяный. Смопіри Barba	
Iovis, Барба ІовисЪ 382.	Кустарный Американскій женскій волось. Смотри Adianthum Canadenie, Аді-
Кровавые колокольчики. Смотри Andro-	аншумь Канаденсе 57.
faemum maximum frutescens, Андро-	
земумъ максимумъ фрутесценсъ 182.	Кустарный Астерь. Смотри After fru- ticofus, Астерь фрутикозусь 314.
Круглолиственный садовый щавель. Смо-	
mpu Acetosa Romana rotundisolia,	
Аценоза Романа рошундифоліа 42.	три Buphthalmum frutescens, Буф.
Круглый Кирказонь, и	
Круглый мохъ. Смотри Вгушт Роті-	Кусть безплодный болошный. Смотри
forme, БріумЪ помиформе. 496. Круглый ПхиновникЪ. Смотри Arifto-	Andromeda arborea, Андромеда ар-
lochia rotunda, Аристоложіа ротунда. 265.	6opea 178.
	Aa-
Гг	2

A

A

AI

Ab

TE

在

社

酒

1	Лебеда собачья. Смотри Bonus Henri. Стран
Ладанъ росный. Смотри Benzoinum, Стран.	сия, Бонусь Генрикусь 457
Бензоинумъ 413.	Лебеда стрвлолиственная. Смотри At-
Лазоревая лебеда. Смопіри Atriplex	riplex hastata, Атриплексъ гастата. 333
glauca, Ашриплексъ главка 332.	Лебеда сЪ Поршулаковыми лисшьями.
Лазоревый мохъ. Смотри Bryum glau-	
сит, БріумЪ главкумЪ 495.	CMompu Atriplex Portulacoides, Am-
Лапа мужеская. Смотри Androface al-	риплексЪ Портулакоидесъ 336
tera, Андросаце алшера 180.	Лебеда Татарская. Смотри Atriplex
Лаппонская Азалеа. Смотри Azalea Lap.	Таtarica, Атриплексъ Татарика. 339- Лебеда узколиственная. Смотри Atri-
ponica, Азалеа Лаппоника 352.	(1) (1) 전에 가는 사람들은 이번 경기 전에 가는 사람들이 되었다면 보다 있다면 보다 있다면 보다 되었다. (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Лапушка смольная и	plex falicina, Атриплексъ салицина. 337
Лапушникъ mpaвa. Смотри Bardana,	Лебеда черенястая. Смотри Atriplex
Бардана 3830	pedunculata, Атриплексъ педунку-
Лапушникъ шерстистый. Смотри Bar-	лата 335. Лебедолиственная Чербода. Смотри Ві-
dana siue Lappa maior, Бардана сине	dens atriplicis folio, БиденсЪ атри-
Ланна мајоръ 386.	плицисъ фоліо 434.
Лашть права. Смотри Achane, Ахане. 43.	Льнянолиспренный Астерь или звъздоч-
Лебеда. Смотри Atriplex, Атриплексъ. 330.	ная права. Смопри After linifolius,
Лебеда дикая. Смотри Atriplex tylue-	Астеръ линифоліусь 315.
ftris, Атриплексъ силвестрисъ 338.	Ленъ кокупичій. Смотри Adianthum au-
Лебеда дикая вонючая. Смотри Atri-	reum, Адіантумь авреумь 56.
plex foetida, Атриплексъ фетида. 338. Лебеда дикаа маленкая. Смотри Atri.	Лизунъ права. Смопри Allium nutans,
그 없는데 하는데 하는데 보면 하는데	Алліумъ нутансь 111.
plex fyluestris, Атриплексъ силвестрисъ. 338.	Лилейка. Смошри Bulbocodium vernum,
Астіром (уруванія Істіблія Ажат	БулбокодіумЪ вернумЪ 509.
Atriplex tyluestris latifolia, Ampu-	Липа каменная. Смощри Alaternus, Ana-
330	mернусъ 85·
Мебеда душистая. Смотри Botrys, Ботрисъ 463.	Лисій хвость трава. Смотри Аюреси-
Мебеда Ивовидная. Смотри Atriplex fa-	rus, Алопекурусь 124.
licina, Атриплексъ салицина 337.	Лиственничная губа. Смотри Agaricus
Лебеда курчавая. Смотри Atriplex laci-	vegetabilis, Агарикусъ вегетабилисъ. 70.
	Лихорадочная права Смотри Aristolochia
Ієбеда лазоревая. Смощри Atriplex	longa, Аристолохіа лонга 262.
glauca, Атриплексъ главка 322.	Лишай Чешуйчатый. Смотри Вгуит,
Ієбеда л'єсная; и	БріумЪ 494.
	Ложное винных в ягод в дерево. Смотри
листьями. Смотри Atriplex (yluestris,	Azedarach, АзедарахЪ 355°
Атриплексъ силвестрисъ 338.	Ложный АстерЪ или звѣздочная трава.
Ісбеда садовая бълая. Смотри Аtri-	Смотри Afteroides, Астероидесъ. 317.
plex alba hortenfis, Априплексъ алба	Іожный крушикЪ. Смощри Amorpha fru-
горшенсисъ 331.	ticola, Аморфа фрушикоза. 152.
	Госнящаяся Базелла. Смощом Bafella lu-
plex hortenfis rubra, АтриплексЪ	cida, Базелла луцида. 391.
гортенсисъ рубра.	Лоша-

ошадиный Сабуръ. Смотри Aloe са- Стран. ballina, Алое кабаллина 121.	Макаршинъ корень. Смошри Bistorta Стран. foliis ovato oblongis acuminatis, Би-
Лукъ каменный. Смотри Allium Altai-	сторта фоліись овато облонгись
сит, Алліумь Алтанкумь 110.	акуминапись 438
Мукъ Нъмецкій. Смощри Ascalonia сера, Аскалоніа цепа 292.	Макъ вороней; и Макъ колючій. Смотри Argemone Me-
Лучица трава, Смотри Alga angustifo-	хісапа, Аргемоне Мексикана 255.
lia, Алга ангустифоліа 98-	Малаварскія Псинки. Смотри Basella, Базелла 391.
Львиная лапа. Смопіри Львова лапа. 93.	Базелла. — 391. Малая Ибунка шрава. Смотри Весса-
Львино копыто. Смотри Alchimilla, Aд-	bunga minor, Беккабунга миноръ. 398.
химилла 93. Львиное Рыльцо. Смотри Antirrhinum,	Малая снишка. Смотри Bulbocodium,
Антирргинумъ 214.	БулбокодіумЪ 509. Маленькая дикая лебеда. Смотри Аt-
Аьвова лапа. Смотри Alchimilla, Алхи-	riplex sylvestris, Атриплексъ силве-
милла 93.	Managera Grand Retula na
Львовы уста. Смотри Antirrhinum vul-	Малорослая береза. Смотри Betula па- па, Бетула нана 432.
gare, Антирргинумъ вулгаре 214. Львовы уста дикія. Смотри Antirrhi-	Малый Амаранть. Смотри Amaran-
num syluestre, Антирргинумъ сил-	thus, Aмараншусъ 137.
вестре 214.	Малый АнанасЪ продолговатый. Смо- три Ananas aculeatus, iructu ovato,
Абвовы уста съ Беллисовымъ листомъ.	carne aurea, Ананасъ акулеатусъ,
Смотири Antirrhinum Bellidis folio, Ан-	фрукту овато, карне авреа 169.
тирргинумъ беллидисъ фоліо 213. Пъвовы уста съ подобными душицъ	малый дикій ПуховникЪ. Смотри Acar- na flore luteo patulo, Акарна флоре
дистьями. Смотри Antirrhinum Ori-	лушео пашуло 29.
ganifolio, Антирргинумъ Оригани-	Малый дикій щавель. Смотри Acetola
Фоліо 213.	minor, Ацетоза миноръ 41. Малый кирказонъ. Смотри Aristolochia
мравъ дисшьями. Смотри Antirrhinum	Pistolochia, Аристолохіа Пистолохіа. 263.
Genistae folio, Антирргинумъ Гени-	Малый клень. Смотри Acer minus.
сте фоліо 213.	АцерЪ минусъ 35. Малый Пхиновникъ. Смотри Aristolo.
Мые колокольчики. Смотри Asperula	chia Piltolochia, Аристолохіа Писто-
odorata. Acheovas ogoogus 206	лохіа 263.
Феная слива. Смотри Brabyla, Брабила. 466. Феное яблоко. Смотри Arbutus, Ар.	Малый Царскій корень черный. Смотри Aftrantia minor, Астранціа миноръ. 325.
mycD = a	Малые образки mpaвa. Смотри Arifa-
осный чеснокъ. Смощом Alliaria An-	rum. АризарумЪ 278.
	Манжешка трава. Смотри Alchimilla, Алхимилла 93.
Myuin onech Chomon Bromos herbo	Маріонка благовонная права. Смотри
Вромось герба 484.	Asperula odorata, Асперула одората. 305.
	Ma-

туу Мехісапа, Ботрисъ Мексикана. 465. Мексиканскій чай. Смопіри Вотуу те. хісапа, Ботрисъ Мексикана 465. Мендажникъ есть кривый, извилистый и стелющійся лъсъ. Метлика. Смотри Втото ріппатия, Бромось пиннатусь 484. Миндаль горькій Смотри Amygdalus amara, Амигдалусъ амара 156. Миндаль сладкій Смотри Amygdalus dulcis, Амигдалусъ дулцисъ 154. Миндальное дерево. Смотри Amygdalus, Амигдалусъ - 154. Миръ трава. Смотри Воту, Ботрисъ. 464. Млечная сыроъта. Смотри Адагісия Інсеция, Агарикусъ луктеусъ 68. Многолистный Барагазисъ Смотри Апаваїя foliofa, Анабазисъ фоліоза. 160. Многолистный морскій Пуполистникъ. Смотри Асетавишт тагіпит тіпия, Ацетабулумъ маринумъ минусъ 38. Многоножная трава. Смотри Ariftolochia Piftolochia, Аристулохіа Пистолохіа 263. Мокрица трава. Смотри Alfine, Алсине. 128 Мокрица трава. Смотри Alfine, Алсине. 128 Мокрица трава. Смотри Anagallis tertia lutea, Анагаллисъ терціа лутеа. 166. Молоко волчье съ круглымъ тишковать тільть корнемъ. Смотри Аріоз уста, Апіосъ вера 222. Молочайникъ грибъ. и	Молошное дерево. Смощри Аноца Nerii Став folio, Агуай Неріи фоліо. — 81. Молуккскій Оръхъ. Смощри Вопице Індогит, Вондукъ Индорумъ. — 455. Моралки, трава. Смощри Вопиз Непгісия, Бонусъ Генрикусъ. — 457. Морская Пупавка. Смощри Вирантантит татітинит, Буфталмумъ маринимумъ. 513 Морская трава. Смощри Вгуит татіпит, Вріумъ маринумъ. Морскій поростъ. Смощри Alga angustifolia vitrariorum, Алга ангустифоліа випраріорумъ. — 98. Морскій пуполиствикъ. Смотри Асетавинт татіпит реосегіия, Ацетабулумъ маринумъ мироскій Пуполиственникъ многолиственный. Смотри Асетавий Пуполиственникъ многолиственный. Смотри Асетавий пупъ. Смотри Асетавий пупъ. Смотри Асетавий пупъ. Смотри Асетавий пупъ большій. Смотри Асетавийт татіпит татіпит реосегіия, Ацетабулумъ маринумъ маринумъ маринумъ процеріусъ. — 38. Морскій пупъ большій. Смотри Асетавийт татіпит реосегіия, Ацетабулумъ маринумъ процеріусъ. — 38. Морскій пупъ большій. Смотри Асетавийт патіпит реосегіия, Ацетабулумъ маринумъ процеріусъ. — 34. Мохнатая дикая Греча. Смотри Асетавий Индіанскій просвирникъ. Смотри Ватіа тобелата, Баміа мосхата 377. Мохъ болошистый. Смотри Вгуит райнабит, Бріумъ палудозумъ. — 496. Мохъ бълесоватый. Смотри Вгуит райнабит, Бріумъ палудозумъ. — 494. Мохъ въщвистый. Смотри Вгуит райнабит, Бріумъ палудозумъ мохъ прушевидный. Смотри Вгуит ругібетте, Бріумъ пириформе. — мохъ дерновый. Смотри Вгуит сжірітістте, Бріумъ пириформе. — мохъ дерновый. Смотри Вгуит сжірітістте, Бріумъ пириформе. — мохъ зеленоватый. Смотри Вгуит смірітьстте. — 496. — 496. — 496. — 496. — 496. — 496. — 496. — 496. — 496. — 496.
Молошникъ. Смотри Agaricus lacteus, Агарикусъ лактеусъ 68.	Moxb зеленованый. Смотри Bryum vi- ridulum, Бріумъ виридулумъ 498.

МохЪ золошый. Смотри Agnus scythi- Стран.	Мышій горохЪ. Смотри Arachus, Apa- Стран.
cus, Агнусъ Сцитикусъ 76.	жусь и Astragalus, Астрагалусь. 239. и 317.
МохЪ иголчатый. Смотри Вгуит асі-	Мышій горох'в песочный. Смотри Aftra.
culare, БріумЪ ацикуларе 494.	galus arenarius, Астрагалусь арена-
Мохъ круглый. Смотри Вгупт роті.	ріусъ 318.
forme, БріумЪ помиформе 496.	Мышій горохъ свилованый. Смощри
МохЪ лазоревый. Смотри Brynm glau-	Astragalus contortuplicatus, Acmpa-
сит, БріумЪ главкумЪ 495.	галусъ контортупликатусъ 319.
Мохъ полевый. Смотри Bryum rurale,	Мышій горохъ съ косматыми струч-
БріумЪ рурале 497.	ками. Смотри Astragalus caulescens
Moxb полосатый. Смотри Bryum stria-	erectus, Астрагалусь кавлесценсь
tum, БріумЪ стріатумЪ 497.	эректусъ 319.
Мохъ прозрачный. Смощри Bryum pel-	Мышій чеснокъ. Смотри Allium angu-
lucidum, Бріум'в пеллуцидум'в 496.	lare, АлліумЪ ангуларе
Мохъ роганый. Смотри Вгуит соги-	Мышки. Смотри Bulbocastanum, Булбо-
tum, БріумЪ корнутумЪ 495.	кастанумъ 506.
Мохъ серебряный. Смощри Bryum argen-	Мышье ушко mpава. Смотри Alfine,
тент Бойим дополителя	
teum, БріумЪ аргеншеумЪ 494	Алсине 126. Мълколистная стручковая трава. Смо-
МохЪ скрипучей. Смотри Bryum extin-	
Ctorium, БріумЪ экстиншоріумЪ. 495.	mpu Astragalus microphyllus, Acmpa-
Мохъ ствиный. Смотри Вгупт ти-	галусь микрофиллусь 321.
rale, Бріумь мурале 495.	Мѣшечникъ mpaвa. Смотри Alkekengi,
Можъ Целзіевъ. Смошри Bryum Celsii,	Алкекенги 106.
БріумЪ целзіи 495.	Мяшлина. Смотри Arundo Officinarum,
Мохъ чешуйчатый. Смотри Вгупт,	Арундо ОффицинарумЪ 285.
БріумЪ 494.	Мяхунька ягода. Смотри Alkekengi,
МохЪ шилу подобный. Смотри Вгушт	Алкекенги 106.
fubulatum, БріумЪ субулатумЪ 497.	МячикЪ; и
Мошистая Андромеда. Смотри Andro-	Мячикъ желтый. Смотри Acorus adul-
meda hypnoides, Андромеда гипно-	terinus, Акорусъ адултеринусъ 51.
идесь 179.	いっというにいいいのはのいのいのいのいのいのいのいのいのい
Мошна. Смотри Alkekengi, Алкекенги. 106.	Нарость бузинный. Смотри Auricula
Мужеская дана. Смотри Androface al-	Iudae, Аврикула Юде 341.
tera, Андрозаце алтера 180.	НарциссЪ желшый дикій. Смотри Bul-
Мужичья mpaвa. Смотри Bugloffum an-	bocodium vulgatius, БулбокодіумЪ
gustifolium, Буглоссумъ ангусшифо-	вулгаціусь 509.
ліумЪ,	Невареная трава. Смотри Berasbola,
Муринская mpaва. Смотри Aethiopis,	Берасбола 416.
Oillionuch.	Негодная права. Смотри Blitum album,
мускусовыя зерны. Смотри Abelmosch.	
TOCAMOIII b.	БлишумЪ албумЪ 444. НекленЪ Ташарскій. Смотри Асег Та-
мухоморникъ права. Смощри Абрагаона	성명하다 보니 하면 이 아이들은 살아 있는데 그는데 그 아니는 사람들이 되었다. 그는데 아이들은 사람들이 되었다. 그는데 아이들이 아이들이 없는데 그는데 그는데 그는데 그는데 그는데 그는데 그는데 그는데 그는데 그
TIVELLES, ACHAPATYCH CHARCEMENT 200	taricum, Ацеръ Татарикумъ 36. Неприступь трава. Смотри Аргохія,
мухоморь грибь. Смотри Адагісия ти	
	АпроксисЪ 233.
Агарикусь мускаргусь 64.	He-

Ортшки земляные. и

пит, БулбокастанумЪ.

Орѣшки полевые. Смотри Bulbocasta-

506.

OPB-

The state of the s
Hеспячокъ трава. Смотри Adrachne, Стран.
Адрахне 60.
Hешманъ права. Смотри Apium palustre,
Апіумъ палустре 227.
Неумирающій цвѣть. Смотри Amaran.
thus, Амарантусъ 137.
Нефорощь бълая. Смотри Absinthium
Ponticum, АбсинтіумЪ ПонтикумЪ. 17.
Нефорощь черная. Смотри Arthemisia
Iudaica, Артемизіа Юдаика 274.
НиколаекЪ трава. Смотри Botrys, Бо-
трисъ 463.
Hora ослиная трава. Смотри Alliaria,
Алліаріа 108.
Hora телячья. Смотри Arum Officina-
rum, Арумъ Оффицинарумъ 280.
Ноготокъ бычій. Смотри Buphthalmum
vulgare, Буфшалмумъ вулгаре. • 514.
Норвежскій кленъ. Смотри Acer Plata.
noides, Ацеръ платаноидесъ 36.
とうとうとうとうとうとうと
Облапа шрава. Смотри Аfarum, А-
зарумъ 290.
Образки горные. Смотри Arum venis al-
bis, Арумъ венисъ албисъ 281.
Образки малые. Смотри Arifarum, A-
ризарумъ 258.
Образки трава. Смотри Anchula offici.
nalis, Анхуза оффициналисъ 173
Овесецъ. Смотри Bromos herba, Бро-
мосъ герба 484.
Овесъ. Смотри Avena, Авена 345.
ОвесЪ глухій. и
ОвесЪ летучій. Смотри Bromos herba,
Бромосъ герба 484.
ОвесЪ пестрый. и
ОвесЪ черный. Смотри Avena nigra,
Авена нигра 348.
Огнистая трава. Смотри Arianis, Apia.
нисъ.
Огуречная права. Смотри Воггадо, Бор-
paro 461.
Огуречная права Африканская. Смотри
Borrago Africana, Борраго Африкана. 460.

Авена нигрь,

180

348.

Песчан-

altera, Андрозаце алшера.

Yacma I.

Thereway was a Cramon Angula Angula	
Пасчанка права. Смотри Arenaria, Аре- наріа. — — 254.	Повой плодный. Смотри Aquilegia,
Песчанка каменная. Смотри Arenaría faxatilis, Аренаріа саксатилнов 254.	Аквилетіа 236. Поганка грибъ. Смотри Agaricus campa-
Песчанка полевая. Смощри Arenaria	nulatus, АгарикусЪ кампанулатусЪ. 66.
campestris, Аренаріа кампестрисъ. 254.	Подлесникъ. Смотри Авагит, Азарумъ. 290.
Петрушка болопная ; и	Подлесникъ дикій. Смотри Afarina,
Петрушка водяная: Сметри Аріст ра- Інвте, Апіумъ палустре 227.	Азарина 289. Подлесник Б. Канадійскій: Смошри Ава
Петрушка сладкая. Смотри Аріцт dul. се, АпіумЪ дулце: - 224.	um Canadenie, Азарумъ Канаденсе: 291- Чюдлища: трава. Смотри Acantha,
Петрушка собачья, Смотри Aethufa,	Аканша: 25'
Linn. Этуза. Пешущей Гребешокъ. Смотри Атагап-	Подоръшникъ Смопри Afarum, Аза-
thus Criftatus, Амарантусъ кри-	Подсолнечная въпреница. Смотри А
сшашусь: 139:	nemone: umbellata, Анемоне умбеллаща.
Печальное дерево. Смотри Arbor triffis,	ПодсолнечникЪ сшенный Смотри Abu-
АрборЪ тристисъ 248. Печеночный корень. Смотри Agerathum	tilon', Абушилон Б
ригригеит, Агератумъ пурпурсумъ. 72.	Подчосъ права. Смотри Asparagus fyl- vestris, Аспаратусъ силвестрисъ 299.
Печеночный корень желщо цебшный. Смотри Achillea lutea Agerati folio	Подъельникъ грибъ еснь родъ пога- нокъ подъ елями растущихъ.
longiore, Ахиллеа лушеа Агераши:	Полевая въпреница. Смощри Anemone
Печеночный СабурЪ, Смотри: Aloe he-	agressis. Anemone arpecnuch 184
раtica, Алое генашика 122.	Полевая рожа Смотри Althaea, Алтеа. 130.
Пирамидальный АнанасЪ Смотри Апа-	Полевое Божіе дерево. Смотри Abrota-
nas aculeatus fructu pyramidato, А- нанасъ акулеатусъ фрукту пира-	пот сатрейте, Аброшанумъ кам-
мидато 170	Полевые орбики. Смотри Bulbocasta-
Пищій ТресшникЪ. Смотри Arundo	пип, Булбокастанумъ 497.
feriptoria, Арундо скрипторіа 288 Пихта дерево. Сметри Рісса, Пицеа.	Полевый колосистый горох в. Смотри Affragalus pilofus, Астрагалусь пи-
u Abies Dod. Asiech Aog 5	лозусь 322.
Плавъ ръчный. Смотри Aquabilia, Ак-	Полевый мохъ: Смотри Bryum rurale, Бріумъ рурале. 497.
Плаун Б булавистый Смотри Adian- thum aureum, Адіаншум Б авреум Б. 561	Полевый ПерсикЪ. Смотри Amygdalus папа, АмигдалусЪ нана.
Плеснь. Смотри Вуятия, Биссусв 527.	Полевый чеснокв. Смощри Allium foliis
Плющь каменный. Смотри Alarina,	radicalibus petiolatis, floribus umbel-
Азарина» 289. Повилишные Американскіе колокольчики:	latis: AMIVM'S dowing to page 246VCB
Смотри: Bignonia: Indica, Бигноніа	женіолатись флерибусь умбеллатись. 111° Полынь. Смотри Abinthium . Абсин-
Индика 436.	тіумБ 13.

Полынь бёлая, а многими называется	Ananas aculeatus fructu ovato carne
бълый. Смотри Arthemisia alba, Ар-	aurea, АнанасЪ акулеатусЪ фрукту
mемизіа алба. —274.	овато карне авреа 169.
Полынь малая узколиственная. Смотри-	Прозрачный мохЪ. Смотри Bryum pel-
Absinthium Ponticum, АбсинтіумЪ	lucidum, Бріум'в пелхуцидум'в. 496.
ПонтикумЪ	Просвирка дикая. Смотри Alcea vulga-
Полынь сшепная или сшепный. Смошри	ris, Алцеа вулгарись 90.
Absinthium Ponticum, АбсинтіумЪ	Просвирки барханныя. Смотри Abutilon,
Поншикумъ и 7.	АбушилонЪ.
Поповъ цвътъ. Смотри Betonica vul-	ПросвирникЪ дикій. Египетскій. Смотри
garis, Бешоника вулгарисъ428.	Bamia, Bamia 37.
ПопушникЪ водяный. Смощри Alisma	Просвирник в Индіанскій мохнаный. Смо-
natans, Алисма нашансъ 104.	три Bamia Moschata, Баміа Моската. 377.
Порость. Смотри Alga, Алга 98.	ПроскурнякЪ бълый. Смотри Althaca,
Поростъ морскій. Смотри Alga angusti-	Алиеа 131.
folia vitrariorum, Алга ангустифоліа	Просшая охватка трава. Смотри Ава-
витраріорумъ 98.	rum, АзарумЪ 290.
Португальская Вётреница. Смотри А-	Простыте волоски Смотри Adianthum
nemone latifolia prima, Анемоне ла-	wulgare, Адіантумъ вулгаре 57.
тифоліа прима 187.	Проспый золошоголовъ. Смотри Аррю-
Порченная помощь трава. Смотри Апа-	delus luteus, Асфоделусь лушеусь. 308.
gallis, Анагаллисъ 164.	Простый тимонъ Ефіопскій. Смотри Ат-
Порченная помощь желпо цв впная. Смо-	mi vulgare, Амми вулгаре 148.
три Anagallis tertia lutea, Анагал-	Пряная mpasa. Смотри Bucconia frute
лисЪ перціа лутеа.	scens, Букконіа фрумесценсь 447.
Порченная помощь красно-цвъшная.	Пряный Астерь. Смотри After acris-
Смотри Anagallis, prima seu mas,	Астерь акрись 311.
Анагахлисъ прима севъ масъ 164.	Псинки Малаварскія Смотри Bafella,
Порченая помощь синецвётная. Смотри	Базелла 391.
Anagallis secunda, Анагаллисъ секунда. 165	Псинки черныя. Смотри Belladonna,
Порченая помощь водяная. Смотри Всс-	Белладонна 405.
саbunga, Беккабунга 397.	Пузырная mpaвa. Смошри Alkekengi,
Поточникъ трава. Смотри Beccabunga,	Алкекенги.
Беккабунга 397.	Пупавка. Смотри Buphthalmum vulga-
MBahobb. CMompu Arthemilia la-	те Буфшамимъ вулгаре - С14.
titolia vulgaris, Apmemusia namuponia	Пупавка великоцвъщная. Смощои Вирь-
Булгарись.	thalmum grandiflorum, БуфталмумЪ
Пресладкая трава. Смотри Agrifis, A-	трандифлорумъ 513.
PHICKED.	Пупавка колючая. Смотри Buphthalmum
Прикрышь. Смотри Aconitum Lycocto-	spinosum, Буфшалмумъ спинозумъ. 514.
ини Аконишум В Ликоктопия В	Пупавка морская. Смощри Buphthalmum
присноживошная шрава. Смотри Аіхооп	maritimum, Буфталмумъ маритимумъ 513
Рашиге, Аизоонъ палусира	Пуповникъ Смотри Alifma natans,
Продолгованый малый АнанасЪ. Смотри	Алисма натансъ.
ЛД	1 Пупо-

Пуполистинк вольшій. Смотри Асета- вийни тагівит ргосегіня, Ацетабу- лум в маринум і порнеріусь 38. Пуполистинк і маринум і порнеріусь 38. Пуполистинк і маринум і маринум і мурскій Смотри Асетавий морскій Смотри Асетавий морскій Смотри Асетавий морскій Смотри Асетавий (Смотри Аругіоп , Аптріоль. — 323. Пуховик і малый дикій. Смотри Асаг- па flore lureo patulo , Акарна флоре лушсо пашуло. — 323. Пумновник і малый дикій. Смотри Асаг- па flore lureo patulo , Акарна флоре лушсо пашуло. — 323. Пумновник і даминый. Смотри Ariftolochia сlетавітік, Аргетолокіа в семативтик і Тимновник і крутлый. Смотри Ariftolochia спананика. — 326. Пкиновник і крутлый. Смотри Ariftolochia- спананика. — 326. Пкиновник і крутлый. Смотри Ariftolochia- спананика. — 326. Пкиновник і крутлый. Смотри Агібоlосніа- спананика. — 326. Пкиновник і крутлый. Смотри Агібоlосніа- спананую і виді фоліков, форов віо- лацею. — 323. Права простинна, Аристолокіа в семативтик і права простинная. Смотри Агібоlосніа- та твепаника. — 326. Пкиновник і крутлый. Смотри Агібоlосніа- потавин і крутном права. Смотри Агібоlосніа- тепаника і права Смотри Агібоlосніа- тепаника. — 326. Пкиновник і даминый смотри Агібоlосніа- па твепаника. — 326. Пкиновник і крутном права. Смотри Агібоlосніа- потави крутном права. Смотри Вирікта питум і варана і бубта на права (тостри в питум і варана і питум і пананика і панана і питум і варана і питум і варана і пана	631 n P	P 632
жодь Биная. Смощом Afragalus viciae Аканшусь.	ПуполистникЪ большій. Смотри Асета- Стран.	foliis, floribus in capitulum congestis Сшран ригригеіs, Астрагалусь виціе фоліись, флорибусь инь капишулумь конгестись пурпуреись. 323 Разнообразная Стручковая трава сь фіолетовымь цвътомь. Смотри Авгаgalus Viciae foliis flore violaceo, Астрагалусь виціе фоліись флоре віолацео. 322 Райская водяная трава. Смотри Асогиз verus, Акорусь верусь. 52 Расшь трава. Смотри Агівоюсьіа готинда, Аристолохіа ротунда. 265 Расходникь больтій древесный. Смотри Виратальный кустарный. Смотри Виратальный кустарный. Смотри Виратальный кустарный. Смотри Виратальный смотри Виратальный смотри Виратальный смотри Виратальный. Смотри Виратальный смотри Вагальный можь. Смотри Вгушт согпытит, Брумь корнутумь. 77 Рогатьй можь. Смотри Вгушт согпытит, Брумь корнутумь. 495 Рожа дикая, и Рожа полевая. Смотри Асаптыз. 130.
		Pow

Рожь дикая. Смотри Bromos herba, Стран. Бромось герба 484.	Сабельникъ меншій. Смотри Acorus Страна adulterinus, Акорусь адултеринусь. 51.
Роса каменная. Смотри Androface altera, Андрозаце алтера. 180.	СабельникЪ раменный. Смотри Війогта таіог, Бисторла маіоръ 439.
Росной ладанъ. Смотри Benzoinum, Бензоинумъ. – - 413.	Сабурное дерево окаментлое. Смотри Аgallochites, Агаллохитесъ 64.
Рость козій. Смотри Вессавипда вей Vстопіса аquatica minor, Бекка- бунта севь Вероника акватика минорь 398. Ромашка красная. Смотри Апетопе адгевії, Анемоне агрестись 184. Рыбій Осоть. Смотри Асатпа flore luteo ратию, Акарна флоре лущео патуло. 29. Рыжикь грибь. Смотри Agaricus delitios, Атарикусь делиціозусь 67. Рызуха скальная. Смотри Androsace altera, Андрозаце алтера 180. Рызуха скальная. Смотри Випіаз Отієпталіз, Буніась орієнтались 511. Рызуха скальная сы гладкими и шилуподобными листьями. Смотри Апстовасе сатпеа, Андрозаце карнеа. 181. Рызь трава. Смотри Аігооп равивте, Аизоонь палустре 82. Рыпа дикая. Смотри Аріоз vera, Апісось вера 222. Рыпа параличная. Смотри Вгуопіа alba, Бріоніа алба 491. Рыстьяникь Смотри Вагдапа, Бардана. 385. Рыстьяникь больтій; и Рысть трава. Смотри Вагдапа вие Lарра таіог, Бардана сиве Лаппа	Адаївосвітея, Агаллохипнесь. Сабурь Смошри Авое, Алое. Сабурь Американскій. Смошри Авое Атегісапа, Алое Американа. Сабурь Греческій. Смошри Авое Стаеса, Алое Грека. Сабурь Египетскій. Смошри Авое Аседурт аса, Алое Эгиппіака. Сабурь лошадиный. Смошри Авое сававівна, Алое кабаллина. Сабурь печеночный. Смошри Авое Сававівна, Алое кабаллина. Сабурь Суккотринскій. Смошри Авое Нератіса, Алое гепашика. Сабурь Суккотринскій. Смощри Авое Зиссоттіпа, Алое Суккотрина. Саборь Суккотринскій. Смотри Вгавіса ава стібра, Брассика алба криспа. Саловая Въщреница. Смотри Автатавия, Аспаратусь. Саловая спаржа. Смотри Аврагадия, Аспаратусь. Саловое Божіе дерево. Смотри Автатавия, Асетова Котапа тотипсівовія, Ацетова Романа ротундуфоліа. Салодковый крутлолиственный щавель. Асетова Котапа тотипсівовія, Ацетова Романа ротундуфоліа. Салодковый корень. Смотри Автадавия, Астараталусь. Салодковый корень. Смотри Втавіса ава стібра, брассика алба криспа. Сафой канусша. Смотри Втавіса ава стібра, брассика алба криспа. Сахарный Индіанскій корень. Смотри Вататая оббсіп. Бататась. З92.
Ръпная капуста. Смотри Braffica га-	Свекла бълая. Смотри Вета alba, Бе- та алба.
Ръпничекъ права. Смотри Barbarea,	та алба 420. Свекла красная. Смотри Вета rubra , Бета рубра 421.
зароареа 383-	C

The state of the s	And the second of the second o
Свекла съ колючим в свменемъ. Смотри Вета fpinofa, Бета спиноза 423.	Синецвъшный безплодный болошный кусть. Смотри Andromeda coerulea,
Свербигусъ. Смотри Bunias orientalis,	Андромеда церулеа 178
Буніась оріеншались 511. Свиловащый мышій горохь. Смощри	Сирскій тростникЪ. Сметри Arundo farcta., Арундо фаркта 284.
Astragalus contortuplicatus, Астрага.	Сишный цввшъ. и Сишовье бълое. Смотри Butomus, Буто-
Свиная вошь права. Смотри Арішт ра-	мусъ 522.
lustre, Апіум'в палустре 227. Свиные язычки. Смотри Alchimilla,	Скала права. Смотри Antiligma Анти-
Алхимилла 93.	руго прокумбенсъ 303.
Свящое дерево. Смощри Abrotanum,	Скальная ръзука. Смотри Androface
Аброшанумъ 10.	altera, Андросаце алтера 180
Селдерея; или	Скипидарный корень. Смотри Afarum,
Селлери Смопіри Аріцт dulce, АпіумЪ дулце 224.	АзарумЪ 290 Скороси Баки. Смотри Bellis, БеллисЪ. 466.
Семилистникъ трава. Смотри Blatta-	Скрипица грибъ. Смотри Agaricus ex-
ria, Brammapia 442.	tinctorius, АгарикусЪ екстинкторіусЪ 67.
Сердечная радость. Смотри Воггадо	Скрипучій мохЪ. Смотри Bryum extin-
Officinalis, Борраго Оффицинались. 460.	ctorium, Бріум'ь експинкторіум'ь. 495°
Сердечная трава. Смотри Bellis, Вел-	Слабительный оръхъ. Смотри Веп та-
Bistorta maior. Eucmogma maiopb. 439.	Слабительный осоть. Смотри Агдето-
Сердечный корень. Смотри Bistorta ma-	пе Мехісапа, Артемоне Мексикана, 255
і іог, Бисторта маїорЪ - 439.	Сладкая Петрушка. Смотри Apium dul-
Сердечный цвътъ. Смощри Borrago offi- cinalis, Борраго оффициналисъ 460.	се, Апіумъ дулце. 224. Сладкое дерево. Смошри Aquifolium,
Серебряникъ. Смотри Вагра Iovis, Бар	АквифоліумЪ 233
ба Іовисъ 382.	Сладкій миндаль. Смощои Amvodalus
Серебреный мохъ. Смотри Bryum argen-	dulcis, Амигдалусь дулцись. 156. Сладколиственная стручковая трава.
teum, Бріумь аргеншеўмь 494 Серебряный расходникь. Смотри Вагьа	Смотри Aftragalus Glyciphillos, Астра-
Iovis, Барба ІовисЪ 382	галусъ глицифиллосъ - 321.
Сибирская тлухая крапива. Смотри Ballote inodora, Валлоте инодора. 361.	Слива бёлая. Смотри Armeniaca fructu maiori, nucleo dulci, Арменіака фрук-
Сибитскій зв робой. Смотри Androfae.	ту мајори, нуклео дулци. 269.
mum maximum frutescens, Андрозе-	Слива дикая. Смотри Acacia Germanica,
мумЪ максимумЪ фрутесценсЪ. 182. Сиворотка трава. Смотри Burhanina,	Акаціа Германика. Слива лісная. Смотри Brabyla, Брабила. 466.
Бурганина.	Сливное дерево Бразильское. Смотри
Синецавшная Гораянка. Смотри Brunel-	Асаіа, Акая 25
la grandiflora, Брунелла грандифлора. 488,	СлизЪ великій. и
Синецавшиная порченая помощь. Смотри	Слизъ дикій. Смотри АІгнаев, Алтев. 130
Anagallis secunda seu fæmina, Анагал-	Словова вошь. Смотри Anacardium, Aна
лисъ секунда севъ фемина 164.	кардіумь, 161,

C

d

Commence of the commence of th	
Слъпота курячья. Смотри Anagallis pri- ma seu mas, Анагаллисъ прима севъ масъ.	Сонная права. Смотри Belladonna; Сонный дурманъ. Белладонна 405
Смогная права. Смотри Арагіпе, Апа- рине 218.	Сонь трава.
Смолошочное дерево. Смотри Bdellium, БделліумЪ 396,.	Сорочьи ягоды права. Смотри Blitum rubrum, Блитумъ рубрумъ 345. Сосенка. Смотри Аfparagus, Аспаратусъ 298.
Смольная лапушка. Смотри Bardana fiue Lappa maior, Бардана сиве лаппа	Сосна пересадная. Смотри Abies Dod. Абіесь Дод. Спаржа. Смотри Абрагадия, Аспаратусь. 298.
маіорЪ 485. Смотри Арагіпе, А. парине 218.	Спаржа дикая. Смотри Asparagus sylve- stris, Аспаратусь силвестрисъ 303.
Смольникъ. Смотри Aristolochia clema- titis, Аристолохіа клематитисъ 260	Спаржа садовая. Смотри Asparagus hortensis, Аспаратусь гортенсись. 302.
СморчокЪ грибъ. Смотри Boletus esculen- tus rugosus albicans, quasi fuligine in-	Сплюснушый горохъ. Смотри Aftraga- lus, Астрагалусъ 317. Степная или степный польінь. Смотри
fectus, Болетусь эскулентусь руго- зусь албикансь, квази фулигине ин- фектусь 4491	Авинтым Роптісит, Абсинтіумъ Понникумъ 17.
Сметанное яблоко. Смотри Annona: Afi- atica, Аннона Азіатика: - 204.	Степная чилига. Смотри Abroranum campestre, Абротанумъ кампестре. 10. Степный звъробой. Смотри Blattaria,
Снишка малая. Смощи Bulbocodum " БулбокодумЪ. – 509.	Блаттаріа. — — — — 442 Степный ПодсолнешникЪ. Смотри Abuti.
Снишокъ. Смотри Bilbocodium vulgatius, Булбокодіумъ вулгаціусъ 509.	lon, Абушилонь 19 Степный Шалфей Ефіонскій. Смотри
Снишь боярская. Смотри Вирештит, Буплеврумъ 515 Снедокъ трава. Смотри Antrifcus, Ан-	Aethiopis Offic. Omionuch 62 Cmorpamb Cmompu Bellis,
прискусь. и — 216. Bulbocodium vulgatius, Булбокодіумь	СтојокЪ; илт
Вулгаціусь. 509.	струюкъ. Смотри Boletus efculentus rugolus albicans, pyramidalis, Боле- тусъ эскулентусъ ругозусъ алби- кансъ пирамидалисъ 449.
Собачья головка. Смотри Antirrhinum vulgare, Антирргинумъ вулгаре 214	кансы пирамидалисы 4.49 Сиручковая права. Смотри Aftragalus,, Астрагалусы 3 гд
Собачья лебеда. Смотри: Bonus Henri- cus, Бонусъ Генрикусъ. — 457. Собачья петрушка. Смотри: Aethusa	Спручковая права, имбющая подобіє козьей рушы. Смотри Aftragalus Gal-
Linn. Этуза. Смотри Аросіпит Е.	legiformis, Астрагалусь Галегифор- мисъ 32 г.
дуртіасцт, Апоцинум'в Египціакум'в. 229 Соколья трава. Смотри Bangue, Бангуе. 378.	Сторучковая: права: мёлколиственная. Смотри Affragalus: Microphyllus:, А страгалусь Микрофиллусь. — 321
, Danie, 3/0)	Cinova.

нумъ моншанумъ лушеумъ.

TOPH b.

Bapivcb.

віолацео.

корнушусЪ.

Стручковая трава разнообразная. Смо. Стран три Astragalus varius, Астрагалусь

The state of the s

Стручковая трава разнообразная багряноцвётная. Смотри Astragalus Viciae foliis, floribus in capitulum con-

gestis purpureis, Астрагалусь виціе

фоліись, флорибусь инъ капиту-

Стручковая трава разнообразная сЪ

Астрагалусь виціе фоліись, флоре

Стручковая трава рогатая. Смотри

Стручковая трава сладколиственная.

Стрълолиственная лебеда. Смотри At-

Ствиный мохв. Смотри Вгупт ти-

rale, БріумЪ мурале. - -

Суккотринскій СабурЪ. Смотри АІос

Суровшка. Смотри Agaricus violaceus,

Сухій Водолень. Смотри Авагит, Аза-

Сухотный корень. Смотри Arum venis

Сыворочная права душистая. Смотри

Сыровга блествщая. Смотри Agaricus

Сыровга млечная. Смотри Agaricus La-

Сыробга однонощная. Смотри Agaricus

Сыровга шишковащая. Смотри Адагі-

Сыровшка. Смотри Agaricus violaceus,

Агарикусъ віолацеусь.

cus bulbolus, Агарикусь булбозусь.

cteus, Агарикусь Лактеусь. -

radiofus, Агарикусь радіозусь.

Asperula odorata, Асперула одората. 305.

пустнетия, Агарикусъ никтемерусъ. 69.

albis, АрумЪ венисЪ албисЪ.

Сусакъ. Смопіри Витотив, Бутомусь. 522.

fuccotrina, Алое суккотрина.

АгарикусЪ віолацеусЪ.

Astragalus cornutus, Acmparanych

Смотри Astragalus glycyphyllos, A-

страгалусь глицифиллось. -

riplex haftata, АтриплексЪ гастата. 333.

фіолешовым в цвётом в. Смотри А-

stragalus Viciae foliis, flore Violaceo,

лумЪ конгесписЪ пурпуреисЪ.

322.

70.

68.

66.

71.

5

+

7.

Торнъ. Смотри Acacia Germanica, A. Стран	Трава морская. Смотри Bryum mari- Стран
каціа Германика 20.	num, БріумЪ маринумЪ.
Товдъ шрава. Смощри Aconitum ly-	Трава мужичья. Смотри Buglossum an.
состопит, Аконитумъ ликоктонумъ. 48.	gustifolium, Буглоссумь ангусти.
Трава баранья. Смотри Alisma, A-	фоліумъ 500.
листа 103.	Трава муринская. Смотри Aethiopis,
Трана безсмершная. Смотри Ambrosia,	Этописъ 62.
Амброзіа 143.	Трава невареная. Смотри Berasbola,
Трава благовонная. Смотри Anthoxan-	Берасбола 416.
thum, АнтоксантумЪ 210.	Трава огуречная. Смотри Borrago,
Трава воинская. Смотри Aizoon palu-	Борраго 461.
ftre, Аизоонъ палустре \$2.	Трава перелойная. Смотри Androlace
Трава волкоубійственная. Смотри Асо-	altera, Андрозаце алтера 180-
nitum lycoctonum, Аконишумъ ли-	Трава пресладкая. Смотри Agrifis,
кокшонумъ 48.	Агризисъ.
Трава волчья. Смотри Butomus, Бу-	Трава пряная. Смотри Bocconia frute-
томусь 522.	fcens, Бокконіа фрушесценсь 447.
Трава гвоздочная. Смотри Bupleurum	Трава пузырная. Смотри Alkekengi,
angustifolium, Буплеврумъ ангусти-	Алиекенти 106.
фоліумь 516.	Трава Св. Амвросіа. Смотри Ambrofia,
Трава гортанная. Смотри Brunella,	Амброзіа 143.
Брунелла 486.	Трава стручковая. Смотри Astragalus,
Трава горчишная. Смотри Barbarea,	Acmparanych 317.
Барбареа 383.	Трава присноживошная. Смотри Aizoon
Трава горькоглинная. Смотри Аloe,	paluftre, Аизоонъ палустре 82.
Anoe 118.	Трава чесношная. Смотри Alliaria, Ал-
Трава живучая. Смотри Bugula, Бугула. 3.	Aiapia 108.
Трава звъздовидная. Смотри Asteroi-	Трава щетинная. Смотри Agul, Агуль. 80.
des, Астероидесъ 317.	Трехъмъсячная Стручковая трава.
Трава звъздопеченошная; и	Смотри Aftragalus trimeftis, Астра-
Трава звъздоподручная. Смотри Абре-	галусъ триместрисъ 321.
rula odorata, Асперула одората. 305.	Томмистия в Въщении Смотом Апе-
Трава звъздочная, Смотри After, A-	mone trifolia, Анемоне трифоліа. 192.
cmepb.	Тримъсячное съмя. Смотри Alicastrum,
грава икопиная. Смотом Alvston inca-	АликаструмЪ.
num montanum luteum, АлиссонЪ	Троспинная пвна. Смотри Adarca,
MINAHYMD MOHINAHUMB ATTHETTED - 194.	Адарка 55.
Pasa Ruchan, CMomor Ancholic creta-	Троспинное дерево. Смотри Ватьои,
AHADASMCD KDETTONES TEO	
- Pana RUARAH. (MOHIDI Acuil Acuil	Бамбу 374. ТростникЪ. Смотри Arundo Officinarum,
- Pana Ryphabh. CMOHION Aline Archive 126	Арундо Оффицинарумъ 285
Трана лихорадочная. Смотри Aristolo-	Тростникъ Гишпанскій. Смотри Агип-
cina longa, Apucmoloxia lours	do fatina, Арундо санива 286-
Трава многоножная. Смотри Arifolo-	do latida, apyndo camasa 280.
CD19 Utilia la clata	Tona
Yacma I.	Tpocm-


Тростникъ Индіанскій. Смотри Агип- Стран. do fatiua, Арундо сатива, 286. и Ватьои. Бамбу 374. Тростникъ пищій. Смотри Агипдо fcriptoria, Арундо скринторіа 288. Тростникъ Сирскій. Смотри Агипдо farcta, Арундо фаркта 284. Трость. Смотри Агипдо Officinarum, Арундо Оффицинарумъ 285. Турецкій Чернобыльникъ. Смотри Вотуу Dod. Ботрисъ 463. Тысячная красота. Смотри Атагапthus Criftatus, Амарантусъ Кристатусъ 138. Тънстый цвътъ. Смотри Аfteroides, Астероидесъ 317.	Умъ и разумъ нірава. Смотри Anagal. Стран. lis prima fev тая, Анагаллись прима севъ мась. Уста Львовы. Смотри Antirrhinum vulgare, Антирргинумъ вулгаре. Уста Ословыя. Смотри Anchufa officinalis, Анхуза оффициналисъ. Утиная нога трава. Смотри Anapodophyllon, Анаподофиллонъ. Утячія гнъздышки. Смотри Anchufa officinalis Анхуза оффициналисъ. Утячія гнъздышки. Смотри Auricula Iudae, Аврикула Іуде. Утячо заячье. Смотри Вирісигит апди- фібовійт, Буплеврумъ ангустифоліумъ 5 16. Утячо мышье. Смотри Авбпе, Алсине. 126.
Увѣчная права морская. Смотри Ве-	федорколъ. Смотри Braffica albula,
hen album, БегенЪ албумЪ 402. УжовникЪ шрава. Смотри Bistorta maior, Бисторта маіорЪ 438.	Брассика албула 470 - 47
Узколиственная Буфоніа. Смотри Вибо- піа tenuifolia, Буфоніа тенуифоліа. 500. Узколиственная звъздочная трава. Смо- три After tenuifolius, Астеръ тенуи- фоліусь. — 316. Узколиственная лебеда. Смотри Atri- plex falicina, Атриплексъ салицина. 337. Узколиственная или узколистный малый полынь. Смотри Abfinthium Ponticum, Абсинтіумъ Понтикумъ. — 17. Узколистная самокрасная вътреница. Смотри Апетопе angustifolia multi- plex rubra, Анемоне ангустифоліа	Хвость воловій. Смотри Аірhodelus, albus ramolus, Асфоделуєв албуєв рамозуєв. — 307. Хвость кошичій. Смотри Атрантуєв кавдатуєв. Хвость лисій. Смотри Аloресигия, Алопекуруєв. — 124. Хврастів. Смотри Агрития, Арбутуєв. 250. Хлопчатую бумагу приносящее деревцо. Смотри Вотрах Оfficinarum, Бомбакєв Оффицинарумъ. — 45.
мултипленсь рубра 285. Узколистный Канадскій дягильникь. Смотри Angelica Canadensis tenusolia, Ангелика Канаденсись тенуифоліа. 197. Узлы волчы. Смотри Аріоз усга, Апі-	Холодецъ. и Смотри Afparagus, Аспаратусъ 298. Христово око. Смотри After Atticus, Астеръ Антикусъ 312.
осъ вера. — — 222 Укропъ. Смотри Anethum graveolens, Анетумъ гравеоленсъ. — 193.	Христофорова трава. Смотри Aconitum Lycoctonum, Аконитумъ ликокто- нумъ 48.

Дареградскій красный корень. Смотри Стран. Anchula officinalis, Анхуза оффици-	Чай Апалаханскій. Смотри Apalachi. Стран. пе, Апалахине 217.
нались 174.	Чай Мексиканскій. Смотри Botrys Me-
Царскій въникъ. Смотри Barbarea, Бар-	хісапа, Ботрисъ Мексикана 465.
6apea 383.	Чалма. Смотри Челма.
Царскій корень большій черный. Смо- три Astrantia maior, Астранціа маіорь. 324.	Чашечная Андромеда. Смотри Andro- meda caliculata, Андромеда калику-
Царскій корень малый черный. Смотри	лата 179.
Astrantia minor, Астранціа минор в. 325.	Челма бълая. Смотри Asphodelus al-
Царское копье. Смотри Asphodelus lute-	bus ramosus, Асфоделусь албусьра-
us, Асфоделусь лутеусь 308.	мозусъ 307.
Царь права. Смотри Aconitum Lycocto- num, Аконитумъ ликоктонумъ 48	Челма желтая. Смотри Asphodelus luteus, Асфоделусь лушеусь 309.
	Червецъ трава и Смотри Buglossum angustifolium, Буглос-
Цветная капуста. Смотри Braffica cau-	Червонець трава. аngustifolium, Буглос- сумь ангустифол. 500.
liflora, Брассика кавлифлора 472.	Червяница права. Смопри Апсния
Щвѣтоносная Андромеда. Смотри Andromeda paniculata, Андромеда панику-	Оfficinalis, Анхуза Оффицинались. 173.
лата 179.	Червяница Виргинская. Смоттри Ап-
Цвъщошникъ. Смощри Aconitum Lycocto-	chusa Virginiana, Анхуза Виргиніана. 176.
пит, Аконипумъ ликоктонумъ 48.	Червяница волнистоцвѣтная. Смотри
Цвѣтуха. Сметри Brassica caulistora,	Anchusa undulata, Анхуза ундулата. 175.
Брассика кавлифлора 472.	Червяница восточная. Смотри Anchula
Цвёть бархатный, Смотри Bellis, Бел-	orientalis, Aнхуза opieнтались 175.
Auch 406.	черевная трава. Смотри Bistorta ma-
Цвёть водяный. Смотри Byssus flos	ior, Бисторта маїоръ 438. Черевы курячьи. Смотри Alfine, Ал-
аquae, Биссусъ флось акве 527.	сине 126.
Цвъшъ кавалерскій. Смотри Aquilegia,	Черемица. Смотри Allium urfinum, Ax-
Акеилегіа 235.	ліумъ урсинумъ 114.
Цвёть неумирающій. Смотри Атагап-	Черемша. Смотри Allium foliis radicali.
thus, Амарантусъ 137.	bus petiolatis, floribus umbellatis,
Цвътъ очный. Смотри Anagallis prima	АлліумЪ фоліисЪ радикалибусЪ пе-
lev mas, Анагаллись прима севъ	ціолашись, флорибусь умбеллашись. 111.
MacD 160	Черенястая лебеда. Смотри Atriplex
Цевть сердечный. Смотри Borrago,	pedunculata, Атриплексъ педунку-
Dopparo 16r	Nama 335.
Цвёть осенній. Смотри Bulbacadium бе-	Черіода. Смотри Bidens tripartita, Би- денсь трипартита 434.
TOTALILI, DVADOROATIVM'S	денсь трипартита 434. Чергода лебедолиственная. Смотри Ві-
CAMBIN. CMOMPH Butomic Ev-	dens atriplicifolia, Биденсъ априпли-
andry CD.	цифоліа 434.
тынистый. Смотои А Печанов	Чербода сивжная. Смотри Bidens niuea,
Астероидесь. 317.	БиденсЪ нивеа 434.
E	e 2 Yerio.

647	4
Черіода съ Петрушечнымъ листомъ, Стран	five Lappa maior, Бардана сиве Лап-Спран па маіоръ.
Смотри Bidens Apiifolia, БиденсЪ	па маіорЪ 38). Черный Царскій корень большій. Смо-
Апіифоліа 433. Черная береза. Смотри Betula nigra,	мри Afrantia maior, Астранціа
Бетула нигра. 432.	маїоръ 324
Черная Буквица. Смотри Betonica vul-	Черный Царскій корень малый. Смо-
garis, Бенюника нулгарись 426.	ыри Аfrancia minor, Астранціа ми-
Черная капуста. Смотри Вгавіса ат-	норъ 325.
vensis, Брассика арвенсисъ 470.	Черныя Псинки. Смотри Belladonna,
Черная нефорощь. Смотри Arthemisia	Белладонна 405
Iudaica, Артемизіа Юданка 274.	Чертова борода. Смотри Asparagus fyl-
Черная Ольха. Смотри Alnus vulgaris,	vestris, Acnaparych силвестрись. 299.
Алнусъ вулгарисъ 116.	Чертово дермо. Смотри Asa foetida,
Черная Шанша. Смотри Ballote nigra,	Aca фешида или Almarhoc, Acмар-
Баллоте нигра 361.	гокъ 295
Чернобыль: и	Чеснокъ. Смотри Allium sativum, AA-
Чернобыльникъ. Смотри Arthemisia la-	ліумъ сашивумъ.
tifolia vulgaris maior, Аршемизіа	Чеснокъ авсный. Смотри Alliaria, An-
латифоліа вулгарись маїорь 275.	ліаріа 108.
Чернобыльникъ бълый. Смотри Arthe-	Чеснокъ мышій. Смотри Allium angu-
misia latifolia, Аршемизіа лашифоліа. 275.	lare, АлліумЪ ангуларе.
ЧернобыльникЪ восточный. Смотри Ar-	Чеснокъ полевый Смощри черемша. Чесношная трава. Смотри Alliaria,
themisia Chinensis, Аршемизіа Хи-	Алліаріа 108
ненсисЪ 274. ЧернобыльникЪ Китайскій. Смотри Ar.	Чешуйчашый лишай; и
themisia Chinensis, Apinemusia Xu-	Чешуйчашый мохв. Смотри Вгунт,
ненсисъ 274.	БріумЪ 494
Чернобыльникъ красный. Смотри Arthe-	Чижевъ глазъ. Смотри Bursa Pastoris,
misia latisolia, Артемизіа латифоліа. 275.	Бурса Пасторисв 515.
ЧернобыльникЪ Турецкій. Смотри Во-	Чилита степная. Смотри Abrotanum
trys, Ботрисъ 643.	сатрейте, Абротанумъ кампестре. 10.
Чернобълъ шрава. Смошри Botrys, Бо-	
трисъ 463.	
Черноголовка. Смощеи Brunella, Бру-	Палфей степный Ефіопскій. Смотри
нелла 486.	Aethiopis, Этіописъ 62.
ЧернокудренникЪ трава. Смотри Ballo-	Шанта трава. Смотри Ballote, Баллоте.
te nigra, Баллоте нигра 361.	Шанта черная. Смошри Ballote nigra,
Чернука грибъ. Смотри Boletus fimeta-	Баллоше нигра 361.
rius, Болетусь фиметаріусь 450.	Шарлотъ. Смотри Ascalonia сера, А-
чернь трава. Смотри Amaula nigra,	скалоніа цепа 292.
Амауза нигра.	Шероховашая Бишинеріа. Смотри Вут-
Черный овесь. (мотри Avena nigra,	tneria scabra; Бишшнеріа скабра.
Авена вигра.	Шерстистая Бруніа. Смотри Brunia
Черный ГепейникЪ. Смотри Bardana	lanuginola, Бруніа ланугиноза.
	Ma

Шерсинистый ЛапушникЪ. Смотри Ваг Стран dana five Lappa maior, Бардана	Яблеко авсное Смотри Arbutus, Ар-Стран бущусь, — 220.
сиве Лаппа маіоръ 386. Шилуподобный мохъ. Смотри Вгуцт fubulatum, Бріумъ субулашумъ. 497. Шилы Калмыцкія трава. Смотри А- gul, Агулъ 80.	Яблоко Ренештовое. Смотри Ananas aculeatus, fructu ovato, carne aurea, Ананас вакулеатусь, фрукту овато, карне авреа.
Шипъ Ерихонскій. Смотри Атотит га- сетовит, Амомумъ рацемозумъ. 150. Широколиственная въпреница. Смотри Anemone latifolia prima, Анемоне ла- тифоліа прима. — 187.	Яблоко сметанное. Смотри Annona Afiatica, Аннона Азіатика 204. Ягода змієва. Смотри Вгуит album, Бріумъ албумъ 494.
Широколистная дикая лебеда. Смотри Atriplex fyluestris latifolia, Атриплексъ	Ягоды вътренныя. Смотри Belladonna, Белладонна 405.
силвестрисЪ латифоліа 338. Широколистный Канадскій БарбарисЪ. Смотри Berberis Canadensis latissimo folio, БерберисЪ КанаденсисЪ латис-	Ягоды журавлиныя. Смотри Afparagus fyluestris. Аспарагусь силвестрись. 299. Ягоды сорочьи. Смотри Blitum rubrum, Блитумъ рубрумъ 345.
симо фоліо 417. Шишковашая сыровга. Смощри Agari cus bulbofus, Агарикусь булбозусь. 66. Шпинать дикій. Смотри Bonus Henri-	Адроръзъ права. Смопри Aizoon ра- lustre, Аизоонъ налустре 82. Язычекъ бычій. Смопри Buglossim an- gustifolium, Буглоссумъ ангустифо-
сия, Бонусь Генрикусь 457. Правель. Смотри Асетова, Ацетова 39. Правель бараній. Смотри Асетова тіпот,	ліумЪ 500. Язычки свиные. Смотри Alchimilla, Алхимилла 93.
Ацетоза миноръ 41. Щавель садовый круглолиственный. Смо- три Acetosa Romana rotundifolia, Ацетоза Романа ротундифоліа. 42.	Языкъ бычачій красный. Смотри Ап- chufa Officinalis, Анхуза Оффици- налисъ 173. Языкъ воловій. Смотри Bugloffum an-
Щавъ кобылей. Смощри Argemone Me- хісапа, Аргемоне Мексикана 255.	gustifolium, Вуглоссумъ ангустифо- ліумъ 500.
Щешинная Блеріа. Смотри Blacria Eri-	Ярица. Смотри Alicastrum, Аликаструмъ. Япола. Смотри Angelica Archangelica,
Шетинная трава. Смотри Agul, Агуль. 80.	Ангелика Архангелика 195.
Эбеновое дерево Американское гладкое. Смотри Bruhinia acuminata, Баугиніа акумината. 496 Эсіопскій. Смотри Есіопскій.	Ясень Гишпанская. Смотри Arbor Americana, pinnatis Fraxini foliis, Ap-бор В Американа пиннапись фраксини фоліись.
Южовникъ. Смощри Anabasis Cretacea, Анабазисъ Крешацеа.	Ясень синецвътная. Смотри Azedarach, Азедарахъ 355





погръшности и опечатки.

15. 35. Singenesia, Syngenesia. 10. 23. Яика, Ура 54. 35. Acidoton, Acydoton. 10. 26. Яиком , Ура 55. 38. Acious, Acydoton. 10. 26. Яиком , Ура 61. 31. Aegiptiaca, Aegyptiaca. 72. 19. Chrifocome, Chrysocome. 21. 31. Внушренно, Внут 82. 34. straiates, straiotes. 22. 24. италіатехи, ита 83. 20. Acade, Akade. 33. 9. сладкая, гла, 83. 40. Acrimia, Akrimia. 35. 4. Власс , Кла 132. 14. Althea,	Стран. строз	с. напечатано.	читай.	Стран.	строк.	напечатано.	читай.
54. 35. Acidoton, Acydoton. 55. 38. Acinus, Acynus. 61. 31. Aegiptiaca, Acynus. 61. 31. Aegiptiaca, Acynus. 62. 19. Chrifocome, Chryfocome. 82. 34. firatiates, firatiotes. 83. 20. Acade, Akade. 83. 40. Acrimia, Akrimia. 83. 40. Acrimia, Akrimia. 85. 31. Bhympehho, Bhympehho, Bhympehho, Bharach, Combach, Com				10.	23.	Яика,	Урала.
55. 38. Acinus, Acynus. 18. 19. Тиберіадихумів, Таб. 61. 31. Aegiptiaca, Aegyptiaca. Chrifocome, Acyptiaca, Chryfocome. 21. 31. Ввушренно, Вкум 82. 34. firatiates, firatiotes. 22. 24. Ишаліански, Иша 83. 20. Acade, Akade. 33. 9. сладкая, тла, Akrimia. 35. 44. ВлассЪ, Кла 132. 14. Althea, — 16. Altea, — 18. Althea, — 21. Altea, — 23. Althea, — 66. 14. Коллая, Коллая, Коллая, 142. 16. Gary, Garz. — 151. 13. ктеколько, нтек торования, троб 142. 16. Gary, Garz. — 151. 14. горбками, гроб 142. 16. Gary, Garz. — 153. 36. Состива, Состива. 160. 9. моло, мал 173. 20. Eolio, Folio. 158. 41. козій. кост трок, рроз. 211. 15. Antropomor— phos, phos, phos, 211. 15. Antropomor— phos, phos, phos. 221. 37. Prma, Arquiron. 315. 3. Linifolius, Linariae folio. 172. 20. Мадагарское, Мал 172. 28. Aquiron, Afquiron. 315. 3. Linifolius, Linariae folio. 172. 20. Мадагарское, мал 173. 310. 28. Aquiron, Afquiron. 315. 3. Linifolius, Linariae folio. 172. 20. Мадагарское, мал 173. 310. 28. Aquiron, Afquiron. 315. 3. Linifolius, Linariae folio. 172. 20. Мадагарское, мал 173. 310. 28. Aquiron, Afquiron. 315. 3. Linifolius, Linariae folio. 172. 20. Мадагарское, мал 173. 310. 28. Aquiron, Afquiron. 315. 3. Linifolius, Linariae folio. 172. 20. Мадагарское, мал 173. 310. 28. Aquiron, Afquiron. 315. 3. Linifolius, Linariae folio. 172. 20. Мадагарское, мал 173. 310. 28. Aquiron, Afquiron. 315. 3. Linifolius, Linariae folio. 172. 20. Мадагарское, мал 173. 310. 28. Aquiron, Afquiron. 315. 310. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.				10.	26.	ЯикомЪ,	УраломЪ:
61. 31. Aegiptiaca, Aegyptiaca. 72. 19. Chrifocome, Chryfocome. 82. 34. firatiates, firatiotes. 83. 20. Acade, Akade. 83. 40. Acrimia, Akrimia. 132. 14. Althea, 16. Altea, 18. Althea, 18. Althea, 18. Althea, 19. Cytificus, 133. 43. Cytificus, 142. 16. Gary, 143. Trag. 163. 20. Frag. 164. 157. 21. Kaamsii, pacm. 175. 12. He, 186. 33. pacmeniň, pacm. 187. 160. 141. Konnar, Kon. 188. 31. Degmeniň, pacm. 189. 343. Cytificus, Cytifius. 199. 34. Trhabidb, Thur. 1142. 16. Gary, Gaiz. 151. 14. Topfskamu, pod. 178. 36. Coerulea, Coerulea. 160. 9. Moao, Mar. 178. 36. Coerulea, Coerulea. 160. 9. Moao, Mar. 178. 36. Coerulea, Coerulea. 160. 17. Usběchibimu, usbechibimu, usbechibimu, mosa. 112. 18. Anthilis, Anthyllis. 112. 18. Antilion, Antyllon. 163. 8. Ceepbxb, Ebel 112. 18. Antilion, Antyllon. 211. 19. Anthilis, Linariae folio. 449. 37. Infectus, Infeftus. 315. 3. Linifolius, Linariae folio. 449. 37. Infectus, Infeftus. 489. 29. 10040cobb, 1004 440. 8. άξον, άγριον. 451. 12. Havhhabim, Havilion, Hav				18.	19.		
72. 19. Chrifocome, Chryfocome. 82. 34. firatiates, firatiotes. 83. 20. Acade, Akade. 83. 40. Acrimia, Akrimia. 83. 40. Acrimia, Akrimia. 85. 31. coembaehb, coembae						in the ten while the	кумЪ.
82. 34. firatiates, firatiotes. 83. 20. Acade, Akade. 83. 40. Acrimia, Akrimia. 83. 40. Acrimia, Akrimia. 85. 40. Baaccb, Kaa 132. 14. Althea, 18. Al				21.	31.	Вичиренно	Внутренно
83. 20. Acade, Akade, 33. 9. сладкая, гла, 83. 40. Acrimia, Akrimia. 35. 4. ВлассЪ, Кла 132. 14. Althea, 16. Altea, 2 75. 12. не, на. 16. Altea, 2 78. 22. осирое, осицое, осицое 21. Altea, 60. 14. Коплая, Кол 60. 14. Коплая, Кол 60. 14. Коплая, Кол 142. 1. monanthus, monanthos. 151. 13. кѣсколько, нѣсколько, нѣсколько, трад. 173. 20. Eolio, Folio. 158. 41. ковій. кост 178. 36. Coerulea, Cœrulea. 160. 9. моло, мал 178. 36. Coerulea, Cœrulea. 160. 9. моло, мал 178. 36. Coerulea, Cœrulea. 160. 9. моло, мал 178. 36. Anthillis, Anthyllis. 163. 8. сверьхъ, вын 179. 37. Prma, Prima. 310. 28. Aquiron, Afquiron. 168. 10. возвышается, возі 179. 38. Aquiron, Afquiron. 179. 39. Кыргызается, возі 179. 6. маленьке, мал 179. 28. Sterils, Sterilis. 179. 6. маленьке, мал 20. 179. 28. Sterils, Sterilis. 179. 6. маленьке, мал 20. 28. Сверьх 5. Sterilis. 179. 6. маленьке, мал 20. 28. Аquiron, Afquiron. 172. 20. Мадагарское, Маленьке, мал 20. 28. Аquiron, Afquiron. 179. 6. маленьке, мал 20. 28. Аquiron, Afquiron. 179. 6. маленьке, мал 20. 37. Плессия, Іпестия, Греф 6. маленьке, мал 20. 37. Греф 6. Маленьке, мал 20. 38. Сверьх 5. По по, по. 265. 13. Кууглый, Кру 289. 29. подлесянка, под 299. 2. Подсовъ, Под 212. 12. урлыя, платия. 453. 12. начинающь, нач 1533. 36. тяз, тё 466. 14. шруша 2 пру 191. 27. вухуюз, филог 476. 9. Нарекой, На		stratiates,	stratiotes.				Италіанск
83. 40. Acrimia, Akrimia. 35. 4. Влассь, Кла 132. 14. Althea, — 16. Altea, — 18. Althea, — 18. Althea, — 21. Altea, — 23. Althea, — 24. I. Monanthus, Monanthos. 151. 13. КЕСКОЛЬКО, НЕСК 142. 16. Gary, — Garz. — 151. 14. Горбками, — гроб 142. 16. Gary, — Garz. — 151. 14. Горбками, — гроб 173. 20. Eolio, — Folio. — 158. 41. Козій. — Кост 178. 36. Coerulea, — Cœrulea. — 160. 9. Моло, — Мало, — Выторомог. — рhos, — phos. — Выторомог. — рhos. — Риза. — Аnthiolis, — Anthyllis. — 168. 10. Возвышаешся, — Возій. — Кай 149. 37. — Prima. — 168. 10. Возвышаешся, — Возій. — Кай 149. 37. — Inifectus, — Infeftus. — 172. 20. — Мадагарское, — Мадагарско			Akade,				гладкая.
132. 14. Althea, ————————————————————————————————————		Acrimia,	Akrimia.				Классъ.
16. Altea, 18. Althaea, 78. 12. не, на. 18. Althaea, 78. 22. осирое, осирое, осирое, 21. Altea, 60. 14. Коплая, колтая, 23. Althea, 78. 24. Коплая, колтая, 78. 133. 43. Cytifcus, Cytifus. 109. 34. гнилыль, тили 142. 1. monanthus, monanthos. 151. 13. късколько, нъсколько 142. 16. Gary, Garz. 151. 14. горбками, гроб 142. 16. Gary, Garz. 151. 14. горбками, гроб 173. 20. Eolio, Folio. 158. 41. козій. коста 178. 36. Coerulea, Cœrulea. 160. 9. моло, мал 178. 36. Coerulea, Cœrulea. 160. 9. моло, мал 179. Аnthillis, Anthyllis. 163. 8. сверых ный как 112. 18. Antillion, Antylion. 163. 10. возвышается, возій. 221. 37. Prma, Prima, 163. 10. возвышается, возій. 164. 37. Infectus, Infeftus. 172. 20. Мадагарское, мал 185. 3. Linifolius, Linariae folio. 172. 20. Мадагарское, мал 186. 28. Sterils, Sterilis. 179. 6. маленьке, мал 186. 28. Sterils, Sterilis. 179. 6. маленьке, мал 186. 29. 29. подлесвнка, под 186. 12. 18. Каруглый, кру 186. 186. 18. Кууглый, кру 186. 186. 18. Кууглый, кру 186. 186. 186. 186. 186. 186. 186. 186.		Althea,					составлен
— 18. Althea, Б. Althaea, 78. 22. осторое, осторое, — 21. Altea, Б. Аlthaea, 60. 14. Коплая, кол. 31. 33. 43. Cytifcus, Cytifus. 109. 34. гнилылъ, гнилыпът, гроб багх. 151. 13. късколько, късколько, късколько, гроб глад. 167. 2. Калмыцкие, кал гроб глад. 168. 41. козій. косколько, мал гроб гроб. 178. 36. Coerulea, Ссетиlea. 160. 9. моло, мал гроб. 179. Апторомогроб гроб. 160. 17. извъстиными, изв		Altea,	The state of the s				
— 21. Altea, — 23. Althea, — 24. Cytifcus, — 109. 34. Гнилыль, — Геремами, — гробками, — гробками	18.	Althea,	Althaea,				ocmpee.
23. Althea, J 133. 43. Cytises, Cytises. 142. 1. monanthus, monanthos. 151. 13. късколько, нъск 142. 16. Gary, Garz. 151. 14. горбками, гроб 173. 20. Eolio, Folio. 178. 36. Coerulea, Cœrulea. 179. Antropomor- phos, phos. 211. 15. Antropomor- phos, phos. 211. 19. Anthillis, Anthyllis. 163. 8. сверъхъ, ввер 112. 18. Antilion, Antylion. 168. 10. возвытается, воз 175. 3. Linifolius, Linariae folio. 172. 20. Мадагарское,		Altea,					Колкая.
133. 43. Cytifcus, Cytifus. 142. 1. monanthus, monanthos. 151. 13. кѣсколько, нѣсколько, нъсколько, нѣсколько, нъсколько, нъсколько, нѣсколько, нъсколько, нъсколько, нѣсколько, нъсколько, нѣсколько, нѣсколько, нъсколько, нъсколько, нъсколько, нъсколько, нъсколько, нъсколько, нѣсколько, насколько, насколько, нъсколько, насколько, нъсколько, нъсколь	23.	Althea, j					расштній.
142. 1. monanthus, monanthos. 151. 13. квсколько, нвск 142. 16. Gary, Garz. Frag. Trag. 167. 2. Калмыцкие, Кал 158. 36. Coerulea, Cœrulea. 160. 9. моло, мал 160. 17. извесшными, извернов, рhos, phos. 211. 19. Anthillis, Anthyllis. 112. 18. Antilion, Antylion. 221. 37. Prma, Prima. 310. 28. Aquiron, Afquiron. 315. 3. Linifolius, Linariae folio. 449. 37. Infectus, Infeftus. 485, 28. Sterils, Sterilis. 179. 6. маленьке, мал 168. 179. 6. маленьке, мал 169. 179. 6. маленьке, мал 179. 6. мал 179. 6. маленьке, мал 179. 6. маленьке, мал 179. 6. маленьке, мал 179. 6. мал	133. 43.	Cytiscus,	Cytifus.	109.			тнилыхЪ.
142. 16. Gary, Garz. Frag. Trag. 167. 2. Калмыцкие, Кал 178. 36. Coerulea, Cœrulea. 178. 36. Coerulea, Cœrulea. 160. 9. моло, мал 160. 17. извЕсшными, извернов, ров. 211. 19. Anthillis, Anthyllis. 112. 18. Antilion, Antylion. 168. 10. возвышается, воздынается, воз	142. I.	monanthus,	monanthos.				н Всколько.
173. 20. Eolio, Folio. 178. 36. Coerulea, Cœrulea. 160. 9. моло, малоно, разветить	142. 16.	Gary,	Garz.		14-	горбками,	гробками.
178. 36. Coerulea, Cœrulea. 211. 15. Antropomor- Anthropomor- 150. 17. извёстными, извернов, phos. 211. 19. Anthillis, Anthyllis. 112. 18. Antilion, Antylion. 213. 37. Prma, Prima. 310. 28. Aquiron, Afquiron. 315. 3. Linifolius, Linariae folio. 449. 37. Infectus, Infeftus. 485, 28. Sterils, Sterilis. 179. 6. маленьке, малень	Strangered reserved residences	Frag.		167.	2.	Калмыцкие,	Калмыцк
211. 15. Antropomor- phos. 160. 17. извёсшными, извернов, phos, phos. 168. 8. сверьх вымения, регипа. 168. 10. возвытается, возможная в	173. 20.	Eolio,	Folio.	158.	41.	козій.	косый.
рhos, phos. 21 I. 19. Anthillis, Anthyllis. 112. 18. Antilion, Antylion. 21 I. 37. Prma, Prima. 310. 28. Aquiron, Afquiron. 315. 3. Linifolius, Linariae folio. 449. 37. Infectus, Infeftus. 485, 28. Sterils, Sterilis. 179. 6. Маленьке, Ма	178. 36.	Coerulea,	Cœrulea.	160.	9.	моло,	мало.
211. 19. Anthillis, Anthyllis. 163. 8. сверых вана возгата во	211. 15.	Antropomor-	Anthropomor-	150.	17.	извЕспиыми,	извест-
112. 18. Antilion, Antylion. 221. 37. Prma, Prima. 310. 28. Aquiron, Afquiron. 315. 3. Linifolius, Linariae folio. 449. 37. Infectus, Infeftus. 485, 28. Sterils, Sterilis. 179. 6. маленьке,		phos,	phos.				ными.
112. 18. Antilion, Antylion. 221. 37. Prma, Prima. 310. 28. Aquiron, Afquiron. 315. 3. Linifolius, Linariae folio. 449. 37. Infectus, Infeftus. 485, 28. Sterils, Sterilis. 179. 6. маленьке,	211. 19.	Anthillis,	Anthyllis.	168.	8.	сверьхЪ.	вверьхЪ.
221. 37. Prma, Prima. 310. 28. Aquiron, Asquiron. 315. 3. Linifolius, Linariae folio. 449. 37. Insectus, Infestus. 485, 28. Sterils, Sterilis. 179. 6. маленьке, мал	112. 18.	Antilion,					возвышае
315. 3. Linifolius, Linariae folio. 449. 37. Infectus, Infectus. 485, 28. Sterils, Sterilis. 179. 6. маленьке, м	221. 37.	Prma,					
315. 3. Linifolius, Linariae folio. 449. 37. Infectus, Infectus. 485, 28. Sterils, Sterilis. 179. 6. маленьке, м	310. 28.			777	20	Мадагарское.	мадага-
449. 37. Infectus, Infectus. 485, 28. Sterils, Sterilis. 179. 6. маленьке, маленьке	315. 3.			1/40	240.	Managaraponocy	скарское.
205. 35. по по, по. 265. 13. Кууглый, Кру На Греческомъ языкъ. 289. 29. подлесника, под тран. строк. напечатано читай 299. 2. Подсовъ, Под 44. 8. йго, йгро. 523. 14. бываетть, быв 122. 12. урпкий, ппатий. 453. 12. начинають, нач. 153. 36. тйс, тё 466. 14. трута, тру 191. 27. вихугос, филлог 476. 9. Нарекой, Наре							маленькіе
265. 13. Кууглый, Кру На Греческомъ языкъ. 289. 29. подлесника, под тран. строж. напечатано читай 44. 8. йоог, йургог. 523. 14. бываешть, быв телинають, начинають, начинаминають, начинають, начинають, начинають, начинають, начинають,	485, 28.	Sterils,	Sterilis.				
На Греческомъ языкъ. 289. 29. подлесника, под пран. строж. напечатано читай 299. 2. Подсовъ, Под совъ, П	· ·	3/6		Charles The State of Land State of			
тран. строк. напечатано читай 299. 2. Подсовъ, Нод 44. 8. ἄρον, ἄγριον. 523. 14. бываешть, быв 122. 12. γρηκική, ηπατική. 453. 12. начинають, нач. 153. 36. τῆς, τε 466. 14. труша, тру 191. 27. θύχχιος, Φύλλοις 476. 9. Нарекой, Наре							Круглый.
44. 8. άζον, άγριον. 523. 14. бываешшЬ, бываешшЬ, бываешшЬ, бываешшЬ, начинаюшЬ,							Подчосв.
122. 12. γρηκική, ηπατική. 453. 12. начинають, нач. 153. 36. τῆς, τε 466. 14. трута, тру 191. 27. θύχχιος, Φύλλοις 476. 9. Нарекой, Наре							бываеть.
153. 36. της, της 466. 14. πρуπα προ 191. 27. θύχχιος, φύλλοις 476. 9. Η Αρεκού, Η Αρ							начинает
191. 27. θύχχιος, φύλλοις 476. 9. Η Αρεκού, Η Αρ						사는 경우 아이들은 많이 그 모든 것이 살아가지 않다.	труда.
191. 27. θυχχιος, φυλλοις 476. 9. нарекой, нар 192. 41. αγριοχένκος, αγριολευκος 481. 15. καπρусы; καπ							Нарской.
192. 41. аурюхёнов, аурюленнов 481. 15. капрусы; кап							каперсы.
199. 23. 700, 78			αγριολευκος	481.	15.	капрусы;	Rancposis 20

Стран	. строж.	напечатано.	читай.	Стран.	строк.	напечатано.	читай.
207	. 10.	700,	78	484.	20.	произрасшение	, произрастъ-
218	. 27.	TOTE,	στοτε	404.			ніе.
254	. I.	Kóguls,	κόρυλος.	100			
296.		Eupianos,	Συριακός	489.	24,	нофлора,	нодифлора.
298.		ξύλον σεν,	ξύλον χρυσεν.	492.	19.	унимаюйъ,	унимаюшь.
345		perior,	µeiov.				
とういういろうないないとういうい							
На НЪмецкомъ языкъ.				На французскомъ языкъ.			
Стран	. строк.	напечатано.	читай.			напечатано.	читай.
2.	13.	Planze.	Pflanke.	23.		dc,	de
5.	31.	Tannen,	Lamen.	83.		de,	des
32.	37.	rosser,	rother,	122.		Greca,	Grecque .
36.	41.	Crelischen,	Cretischen.	146.	38.	piante,	plante.
39.	16.	Mabe,	Mabet .	170.		fevilles,	feuilles
43.	14.	Unrische,	Alsiatische.	491.		Couluvrée,	Couleuvrée.
44.	9.	Achillana,	Achillaea.	Of an Bone	and has my been proced		
		and annual to	31 Williams	На Италіанскомъ языкъ.			
45.	15. }	Achillana,	Alchillaea.				
45.	33.5					напечатано.	читай.
47.	26.	jedianisches,	Indianisches.	37.,		trie,	tire.
67.	10.	Pilken,	Pilte.	44.	13.	profuode,	profunde.
68.	12.	Gaufenreise	Haufenweise.	65.	40.	foémina,	femina
134		Berufswart,		352.		Sopponia,	Lapponia.
151	.0	Pfesser,	Pfesser.	359.		fwezio,	ſvezia.
161			3, Elephantenlaus	469.		veri.	verzi.
161		Brient alijchen	, Erien talischen	509.	25.	Colaco,	Colcico.
181		Madnes,	Manns.	O.S.	II. A.	THE STATE OF THE S	The world
210		Arabisches,	Arabischer			линскомЪ я	
215.		Crant,	Brant.			напечатано.	earlier.
277		Nopfer,	Rother.	49.	44.	carlier,	
330	4	Bundelreb,	Sundelreb.	81.	9.	an prickly plan	nt, Agui, an
342.		Buchwerligen.		-+/			prickly plant. Almond.
377.		Behrlein,	Cehrlein	156.	32.	Almono,	flowered.
473.		Uhlaen,	Alithäen.	166.		floweed,	fruit.
491		Baulfior,	Caulfior.	169.	10.	fruight,	
497.		Gichwurk,	Gichtwurk.	170.	10.	frui,	fruit.
505.		Gestreisses,	Gestreiftes	184.	30.	etye,	eye.
505.		Hunfel,	Günsel.	297-	3.	Devls,	Devil's.
506		Hnugel,	Oungel.	337.	2.	Purfran,	Purstan:
3.00	11.	Hünsel,	Gunsel.	352.	25.	Azalaa,	Azalea.
				469.	44.	Zarden,	Garden,
			.0.				

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВИБЛИОТЕКА 30 213-0

A Company

0.77

Uns. 1865

